
L. VIDAL & M. DAREAU

DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES

1929

OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE
107, Rue Lafayette - PARIS (10^e)



P 11247 - 1929

L. VIDAL & M. DAREAU

DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

1929



Excluse du prêt

~~83218~~


Transféré

Pôle MED 2014

OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE

107, Rue Lafayette, PARIS (X^e)

Tél. : Trud. 41-05.



NOTA

**Les prix des spécialités
pharmaceutiques
donnés dans cet ouvrage
sont ceux pratiqués en France.
Ils varient
pour chacun des autres pays.**

1^{re} Partie

TABLE
par Indications Thérapeutiques
des Spécialités
figurant dans cet ouvrage

Table par indications thérapeutiques des Spécialités figurant dans cet ouvrage

- I. Alimentation — Régimes.
 - II. Antiseptiques — Désinfectants.
 - III. Appareil circulatoire.
 - IV. Appareil digestif et ses annexes.
 - V. Appareil génito-urinaire.
 - VI. Appareil respiratoire.
 - VII. Arthritisme — Goutte — Rhumatismes —
Algies diverses.
 - VIII. Dermatoses — Plaies.
 - IX. Gynécologie — Obstétrique.
 - X. Hémostatiques.
 - XI. Maladies infectieuses et parasitaires.
 - XII. Ophtalmologie.
 - XIII. Opothérapie — Vaccinothérapie — Produits
divers.
 - XIV. Oto-rhino-laryngologie.
 - XV. Reconstituants — Recalcifiants — Toniques
 - XVI. Stomatologie
 - XVII. Syphilis.
 - XVIII. Système nerveux.
 - XIX. Tuberculose.
 - XX. Tumeurs — Cancer.
-

I. — ALIMENTATION - RÉGIMES

Aliment Tinardon.
Aliments de régime Redeuil
(voir pain Redeuil).
Amino sel Byla.
Babeurre nutricia.
Blédine Jacquemaire.
Céréales Bébé Favrichon.
Céréalose.
Decorpa.
Diasés Progil.
Dryco (Lait sec).
Embryonine du Dr Barré.
Extrait de malt français
Déjardin.
Farine de malt Heudebert.
Farines de régime Bloch.
Farine lactée diastasée
Salvy.
Farines Bénédictus.
Farines maltées Jammet.
Forcival.
Gloma.
Jus de raisin Pampryl.
Kina Elzévir.
Lait en poudre Guigoz.

Lait glaxo.
Lait Mont Blanc.
Lévilose Rogier.
Maltea-Moser cristallisée.
Malt français Déjardin
(Extrait de).
Maltosan.
Malt pailleté Progil.
Malt Wander.
Neuro-moka.
Nutrobiase.
Nutromalt.
Oléo-mel laxatif.
Ovomaltine.
Pain essentiel Heudebert.
Pain Redeuil.
Pains spéciaux Heudebert.
Panlax Gmet.
Peptone Vassal.
Phosphatine Fallières.
Phosphogène Favrichon.
Pilules lithuranées du
Dr Bovié.
Quotidien (Le).

II. — ANTISEPTIQUES - DÉSINFECTANTS

A. D. Grosjean.
Aïrol Roche.
Anaquintine Lescène.
Anexol.
Aniodol.
Antiphlogistine.
Berkendyl.
Boricine Meissonnier.
Bulgarine Thépénier.
Chlocci.
Chloral-géranie.
Clonazone Daufresne.
Comprimés Aqua Pura.
Comprimés d'Alibour.
Comprimés Guillaumin.
Créoline Pearson.
Créosoforme Lambiotte.
Crésyl Jeyes.
Ektogan Bocquillon.
Eranol.
Evine.
Formadermine.
Formyl.
Goménol.

Hypochlorine.
Hypochloryl.
Iodex.
Iodo-vitasine.
Ixogynes.
Kerlactine.
Kydalose.
Lauréol médicinaal.
Lusoforme.
Mésoforme.
Néo-collargol.
Néol.
Noviode.
Oxydrol.
Ozonaire.
Plagène Soulas.
Produits Pennès.
Pulvéol.
Salubrine Phénix.
Sanoformine.
Savon Pérusol.
Stéramine.
Synthol.
Thigénol Roche.

Thymol Doré.
Tochlorine.
Tulle gras Lumière.
Ulcéobande.

Ulcéoplaque.
Végétol externe.
Vitargyl.

III. — APPAREIL CIRCULATOIRE

Acécoline.
Acésine Guillaumin.
A. D. Grosjean.
Adoverne Roche.
Adrénaline Clin.
Adrénaline « Usines du Rhône ».
Adrénine.
Adrépatine.
Adrianine.
Aérophagyl.
Afatyl.
Algatan.
Allisatine Sandoz.
Aloysine.
Ampoules Boissy.
Ampoules Churchill.
Ampoules de Digalène Roche.
Ampoules de Sécacornine Roche.
Ampoules de spasmalgine Roche.
Ampoules de Théobryl Roche.
Angioxyl du D^r Roussel.
Antirrhoïde.
Antonal.
Anusol.
Aphloïne Trouette-Perret.
Artériorion Vincardi.
Artério-veineuse.
Asclérosol.
Athérolysine.
Bain carbogazeux Wolo.
Bain Carré.
Banikol.
Baume Suelta.
Benzoflorine Julien.
Benzanyl.
Benzylol.
Bi-Citrol Marinier.
Bouchon Bouteille Emania.
Caféine Invar.
Camphodausse.
Camphostyl.
Cardibaine.

Cardiosthénine.
Catemenyl.
Cipromarol.
Citrofluyl.
Citropaine.
Citrosodine Grémy.
Complexextraits.
Coramine Ciba.
Cratægine.
Crème résolutive du D^r Rap.
Cupressus Dausse.
Curiode.
Delbiase.
Dépuratif Kromelinck.
Dépuriode du D^r R. Weber.
Diasclérol.
Dicaliode.
Digalène Roche.
Digibaine.
Digifoline Ciba.
Digimialbaine.
Digitaline cristallisée Mialhe-Petit.
Digitaline Invar.
Digitaline Nativelle.
Dioséine Prunier.
Diurédause.
Diurène.
Diurocalcine Gros.
Dragées Lumeval.
Dragées toni-cardiaques Le Brun.
Eléodermine.
Elixir de Virginie Nyrdahl.
Éniode Lefebvre.
Eranol.
Ergotine Lamante.
Esculéol.
Eugynol Grandval.
Euphytose.
Eutensyl Grémy.
Génostrychnine.
Globules Fumouze.
Glycocarpine.
Gouttes antispasmodiques Dausse.

Gouttes de Séru.
 Gouttes Fluxine.
 Granulé dépuratif végétal
 du Dr A. Kienckel.
 Gui Byla.
 Guipsine.
 Guitose.
 Hamaméline Roya.
 Hamaméliode.
 Hamamélis Grandval.
 Hémalexine.
 Hémodrome.
 Hémoductyl.
 Hémogénol Dausse.
 Hémoluol.
 Hémopausine.
 Hémostyl du Dr Roussel.
 Hirudinase.
 Hormotone.
 Hypersan.
 Hypophosphites Churchill
 pluriglandulaire.
 Indhaméline Lejeune simple.
 Intrait de digitale Dausse.
 Intrait de gui Dausse.
 Intrait de marron d'Inde
 Dausse.
 Intrait de strophantus
 Dausse.
 Ioda.
 Iodalose Galbrun.
 Iodamélis Logeais.
 Iode organique Boissy.
 Iodex.
 Indhaméline Lejeune
 simple.
 Iodogénol Pépin.
 Iodo-Maisine.
 Iodone Robin.
 Iodonucléol.
 Iodostarine Roche.
 Iodo-Vitasine.
 Iodurase.
 Iodures Pachaut.
 Iodure Philippe.
 Ionyl.
 Kluchol Remeaud.
 Kola granulée Astier.
 Lipoiodine Ciba.
 Ménovarine.
 Mésothorium Buisson.
 Mialbaine.
 Micelliode.
 Mictasol.

Natibaïne.
 Néoriodine.
 Neptal.
 Oléthyle Benzyle.
 Oliolase Corbière.
 Opochol.
 Orthogénol.
 Ouabaine Arnaud.
 Papavéryl.
 Passiflorine.
 Péráziodol.
 Phléboguil.
 Pilules Philippe.
 Pituilobine Byla.
 Pneumogéine Renard.
 Pommade Logeais.
 Pommade Midy.
 Poudre Escouffaire.
 Proveinase Midy.
 Pulmocardine.
 Pulsamone.
 Quinicardine.
 Quinoïdine Duriez.
 Rectoline.
 Rénaleptine.
 Rhodazil.
 Riodyne.
 Rythmosystol.
 Salvénase Legoux.
 Sanedrine.
 Santhéose.
 Scillariène Sandoz.
 Scléramine Dausse.
 Sclérosérol.
 Sclérosérum.
 Scurénaline.
 Sécacornine Roche.
 Sédatuline.
 Sel hépatique U.-N. Ar-
 quevaux.
 Sérum hypotensif Fraisse.
 Silguine.
 Silicyl.
 Siliside.
 Solubaïne.
 Solucamphre Delalande.
 Solvosclérose.
 Sornyal.
 Spasmalgine Roche.
 Spasmoséline.
 Spécific Brachat.
 Spectrol.
 Strictoforme Dausse.
 Strophantine Catillon.
 Strophantus Catillon.

Suppositoires à l'Esculéol.
 Suppositoires Logéais.
 Suppositoires Midy.
 Sylvol.
 Sympathyl Chantereau.
 Synthol.
 Tablettes Zéva.
 Técarine.
 Tétranitrol Roussel.
 Théisine Dubat.
 Théobromine Invar.
 Théobromose Dumesnil.
 Théobryl Roche.
 Théosalvose.
 Tiodine Cognet.
 Théoxantine.
 Tonyol « F. ».
 Tot'Hamelis.
 Trinitrine caféinée Dubois
 Trinitrine Roussel.

Trisodyl Rozet.
 Trypsogène.
 Ulcéobalnéine.
 Ulcéosine.
 Uracétose.
 Varisclérine.
 Vari-sérum Lebon.
 Vascurol.
 Veinofluine.
 Veinoposine.
 Veinosérum.
 Veinosine.
 Veinotrope.
 Velledol Adrian.
 Vénecine.
 Verticurine.
 Vin et sirop Nourry.
 Viscosérum.
 Viscum Zyma.

IV. — APPAREIL DIGESTIF ET SES ANNEXES

Absuric.
 Acide oléique Paul Thibault.
 Acidural.
 Acimyl.
 Acolitol.
 A. D. Grosjean.
 Adrénaline Invar.
 Adrépatine.
 Aérophagyl.
 Agarase.
 Agocholine.
 Allisatine Sandoz.
 Aloïne Houdé.
 Aloysine.
 Alucol Wander.
 Alunozal.
 Amibiasine.
 Amidal.
 Ampoules de Spasmalgine Roche.
 Amylodiasase Thépénier.
 Anapeptone Vassal.
 Aniodol.
 Antacidyl.
 Atural.
 Babeurre nutritia.
 Bacté-dysentéri-phage.
 Bacté-intesti-phage.

Bactériophages Leclerc
 Banikol.
 Belladone Dausse.
 Bemax.
 Benzolactine.
 Benzolactol.
 Benzophosphine Christiaens.
 Benzylol.
 Bi-Citrol Marinier.
 Bileyl Fournier.
 Biliase Raby.
 Bilifluine.
 Billogastrine.
 Bilirhéine.
 Biogastrine.
 Biolactyl Fournier.
 Bis-Ka-Ma.
 Bismusodine.
 Bismuth Desleaux.
 Bismuth du Dr Quesneville (crème de).
 Bismuth Tulasne.
 Blédine Jacquemaine.
 Boldine Houdé.
 Boldoïne Eparvier.
 Boldolactol.
 Boldorhéine.
 Boldo Verne.

Boléase Monal.
 Brides-les-Bains.
 Bulgarine Thépenier.
 Calcozymase.
 Capsules Bardet.
 Capsules Taetz.
 Carbalcaloïdes.
 Carbatropine.
 Carbocitrol.
 Carbolactyl bilié.
 Carbolactyl simple.
 Carbonal magnésien.
 Carbonal princeps.
 Carbonal rhéo-rhamnique.
 Carbonate de bismuth.
 Carbosanis.
 Cascara Midy.
 Cascarine Leprince.
 Cétrarose Gigon.
 Charbon Tissot.
 Chénanthol.
 Chloramine Freyssinge.
 Chlorobyl.
 Chloro-magnésion.
 Cholécystine.
 Choléo-combrétol boldi-
 nisé.
 Choléokinase.
 Choléolactol Daguin.
 Cholergine.
 Chophytol.
 Citrocarbine.
 Citrofluyl.
 Citropaine.
 Citrosodine.
 Colitique.
 Colloïxols du Dr Riquoir.
 Complextraits.
 Comprimés Adrian.
 Comprimés Chéralys.
 Comprimés de Pantola-
 xine du Dr Boveil.
 Coréine.
 Cristolax.
 Cryptargol Lumière.
 Curatoxine Vendel.
 Cuscutine Foulon.
 Decorpa.
 Delbiase.
 Dépuratif Kromelinck.
 Dépuratif Rob Lechaux.
 Diabétifuge.
 Diases Progil.
 Digestif Harvey.
 Doloma.

Dragées Elkin.
 Dryco (Lait sec).
 Dyspeptine Hepp.
 Elixir Bonjean.
 Elixir du Dr Mialhe.
 Elixir Dussaud.
 Elixir eupeptique Tisy.
 Elixir Grez.
 Elixir Spark.
 Endopancrine.
 Entériode.
 Entéro-antigènes.
 Entérobyl Dehaussy.
 Entérohépatine.
 Entéroxin Leclerc.
 Entérozone.
 Entéroseptyl Clérambourg.
 Entéro-vaccin Lumière.
 Erbamil.
 Evolaxine.
 Evonyl.
 Euchol.
 Euonymine Paul Thibault.
 Facmine Longuet.
 Farine de Malt Heude-
 bert.
 Félamine Sandoz.
 Fluobyl.
 Foriod.
 Formocarbine.
 Formine Adrian.
 Fucobiline.
 Fucosine.
 Galabactéine.
 Gambéol.
 Gastricine du Dr Duhour-
 cau.
 Gastrocalcine.
 Gastrocaol.
 Gastrothérif.
 Gastrozymase Bouty.
 Gélagar.
 Gélobarine.
 Gélogastrine.
 Gélotanin.
 Gélo-pansements gastro-
 intestinaux.
 Gélor.
 Génatropine.
 Génésérine.
 Génhyoscyamine.
 Glyco-lactimase.
 Gouttes antispasmodiques
 Dausse.

Gouttes halogènes du	Lobuline.
D ^r Bérù.	Loraga.
Grain de Vals.	Magnésie Erba.
Hépatobyl.	Magnésie lourde de Durel.
Hépatolax.	Magnésium Glardy.
Hépatosodine.	Magnétone Selamon.
Hépatozyl.	Malt Barley.
Héxotal.	Maltase Fanta.
Hipposarcine Roy.	Maltea Moser.
Hopogan Bocquillon.	Maltosan.
Hormolaxine.	Malt pailleté Progil.
Hormobiline.	Mangaine.
Huile Crolas.	Marrubiase.
Hypochlorine.	Méral.
Hypodermozone.	Mucinum.
Iloglandol Roche.	Myrtilline Demasles.
Insuline.	Narsénol.
Insuline buccale Fornet.	Néo-Collargol.
Insuline Byla.	Néo-laxatif-Chapotot.
Insuline Rogier.	Néoriodine.
Insulyl du D ^r Roussel.	Nigérine Vincent.
Iodone Robin.	Normacol.
Iodo-Thyrôidine Catillon.	Novolactol Daguin.
Iodurase.	Nujol.
Iodure Philippe.	Nutrobiase.
Isacène Roche.	Nutromalt.
Isotonyl Bouret.	Oléo-mel laxatif.
Jécol.	Oléoformine Corbière.
Juglane.	Oléthyle Benzyle.
Jus de raisin Pampryl.	Opobyl.
Kaobrol.	Opochol.
Kaolinase.	Opopeptol.
Kerlactine.	Orthogastrine.
Kolatinés.	Orthogénol.
Kymosine Rogier.	Oxydothyridine.
Lab-lacto-Ferment Mialhe.	Oxygénase.
Lactimase.	Pain Redeuil.
Lactobyl.	Panbiline.
Lactolaxine Fydau.	Pancréanne.
Lactochol.	Pancrépatine Laleuf.
Lait de magnésie Phillips.	Pangastrol.
Lansoyl.	Pangestyl Narty.
Larosane Roche.	Panlacto Midy.
Laxamalt.	Papaïne de Trouette-Perret.
Laxatifs Miraton Châtelguyon.	Papavéryl.
Laxamer.	Paquets Védé.
Laxopeptine Girard.	Paradoline.
Lenicure Vichy.	Paralactine Byla.
Lévylose Rogier.	Peptalmine.
Levure B 17.	Pepsodia.
Levure fraîche Mycéta.	Peptalmine magnésinée.
Limonade Godfrin.	Peptodiase.
Lipoiodine Ciba.	Pepto-kola-Robin.
Listose Vicario.	Peptozym.

Péristaltine Ciba.
 Persodine Lumières.
 Phélaïne.
 Phylactone Byla.
 Pilules du D^r Debouzy.
 Pilules du D^r Sjeournét.
 Pilules Éparvier.
 Pilules Philippe.
 Pilules Lithuranées du
 D^r Boveil.
 Pipérazine Midy.
 Polyferments Laleuf.
 Poudre laxative de Vichy.
 Poudre Paterson.
 Poudre de Lausanne.
 Prises Delqué.
 Protaminol Byla.
 Protiodyne.
 Proxytol.
 Pulsamone.
 Purganol Daguin.
 Pyrélaine Collas.
 Quassine Houde.
 Quotidien (Le).
 Radiopaque Heudebert.
 Radiotétrane Gérard.
 Réalphène.
 Recto-Panbiline.
 Régyl.
 Rhizotanin Chapotet.
 Rhodazil.
 Riceyl Billault.
 Ricigel.
 Ricomalt.
 Riodyne.
 Royérine Dupuy.
 Salicaire Dausse.
 Sanluol.
 Salsanos.
 Scialine.
 Scuroforme.
 Sélamon.
 Sédatine Christiaens.
 Sédatuline.
 Sédogastrine.
 Sel de Hunt.
 Sel hépatique L. N. Arquet-
 vaux.
 Sicopion.
 Sinahin.
 Sirop de la Maternité.
 Sirop laxatif Gobey.
 Sirop Teyssédre.

Sodolactine.
 Sodothiol.
 Somalgine.
 Sornyal.
 Spasalgine Roche.
 Stal-Kosal.
 Staphylase.
 Stomal.
 Stomarine Billault.
 Stomaxines Roxelane.
 Stomeol Vichy.
 Stomobrol.
 Stomophile.
 Stupho.
 Sulfobyl.
 Suppositoires Pépet.
 Sylvol.
 Sympathyl Chantereau.
 Tablettes Perroud.
 Tapo.
 Taxol.
 Thaolaxine.
 Théinol.
 Thoroxyl.
 Topique stomacal Dausse.
 Triase.
 Tridigestine Dalloz.
 Trypsogène.
 Uracétose.
 Uralysol.
 Uraseptine Rogier.
 Uriclarine.
 Urilyson.
 Urisanine.
 Urobuccol Malmanche.
 Uroformine Gobey.
 Uroiodine.
 Urométine Lambiotte.
 Uromil.
 Urophile.
 Vacuoline.
 Vaccinothérapie atoxique
 Cépède.
 Valérium Paul Thibault.
 Vanadine Chevrier.
 Varilaxine.
 Vasolaxine.
 Vigardyne.
 Vin de Chassaing.
 Vitamine Rogier.
 Vulcase.
 Yacutine.
 Zymatine Lescène.

V. — APPAREIL GÉNITO-URINAIRE

Absuric.	Hypochloryl.
A. D. Grösjean.	Ixium.
Adrèpatine.	Kerlactine.
Aïroglyce.	Mictasol.
Ampoules de spasalgine	Mictoseptol.
Roche.	Neptal.
Ampoules de Théobryl	Nitium Buisson.
Roche.	Nutrobiase.
Anexol.	Oléthyle Benzyle.
Aniodol.	Opothérapie Henning.
Anusol.	Papavéryl.
Argycuprol.	Paradoline.
Arhéol.	Phaguryl.
Belladone Dausse.	Physiosthénine.
Benzophosphine Chris-	Pipérazine Midy.
tiaens.	Pneumogéine Renard.
Benzylol.	Préventyl.
Blennosine.	Pyrélaïne Collas.
Boricine Meissonnier.	Quotidien (Le).
Butelline.	Réargon.
Capsules Bardet.	Rectagine.
Chlocçi.	Réthrargine.
Citrosodine Grémy.	Rhéantine Lumière.
Clonazone Daufresne.	Salsanos.
Comprimés Guillaumin.	Salvatyl.
Cryptargol Lumière.	Santal Midy.
Curatoxine Vendel.	Santal Monal.
Curiosan.	Santhéose.
Cytrotropines.	Selhépatique U.-N. Arqua-
Dépuratif Rob Lechaux.	vaux.
Dialyl.	Scillarène Sandoz.
Diasclérol.	Solurol.
Diurédause.	Solvuric.
Diurène.	Sornyal.
Diurocalcine Gros.	Spasalgine Roche.
Elatine Bouin.	Spyrolides.
Elgine Julien.	Sylvol.
Ennègo.	Synthol.
Eranol.	Técarine.
Ergotine Lámante.	Théisine Dubat.
Eumictine.	Théobromine Invar.
Eutensyl Grémy.	Théobromose Dumesnil.
Fango Fisch et C ^{ie} .	Théobryl Roche.
Félargent.	Théosalvose.
Fluobyl.	Théoxanthine.
Formocarbène.	Uracétose.
Formine Adrian.	Uralysol.
Gélotube 29.	Uraséol.
Globules Romon.	Uraseptine Rogier.
Goménol.	Urazine.
Gonacrine.	Uriclarine.
Gui Byla.	Urifluine.
Hexotal.	Urilystone.

Urisanine.
Urobuccol Malmanche.
Uroformine Gobey.
Uroiodine.
Urol.
Urométine Lambiotte.
Uromil.

Urophile.
Urosan Dufayard.
Vaccinothérapie atoxique
Cépède.
Végétol externe.
Vitargyl.

VI. — APPAREIL RESPIRATOIRE

Acodros.
A. D. Grosjean.
Adrénaline Invar.
Adrénoïéine.
Æthone.
Algatan.
Allocrysine Lumière.
Aloysine.
Ampoules Boissy.
Ampoules Churchill.
Ampoules de Sécacornine
Roche.
Anapeptone Vassal.
Anaquintine Lescène.
Antiasthme Bengalais.
Anti - asthmatiques du
D^r Cléry.
Anti-asthmine Dehaussy.
Antiphlogistine.
Aqintol.
Arséniode Buriat.
Asthmylose.
Azufrol.
Balsamol Lescène.
Baume Aroma.
Belladone Dausse.
Benzyanyl.
Benzylol.
Béxinine.
Borosodine Lumière.
Bronchitol.
Bronchodermine.
Bronchoseptol Lauriat.
Cachets Kapytan.
Cachets Roche de Thio-
col.
Calcozymase.
Capsules Dartois.
Capsules Noguès.
Cétémol.
Chlorinol Inhalant.
Citrase.
Citrosodine Gremy.
Codoforme.

Collobiase de soufre.
Comprimés Maver.
Comprimés Roche de Thio-
col.
Créosal Dubois.
Curiode.
Cytobiase.
Dépuriode du D^r R. Weber.
Désensibilysine.
Diasés Progil.
Dicaliode.
Diénol.
Edistol.
Elatine Bouin.
Elbon Ciba.
Élixir Duchamps.
Élixir Thiogalacolé Arque-
vaux.
Emulsion Marchais.
Éniode Lefèbvre.
Entéro-antigènes.
Entérozone.
Eranol.
Ercérhinol.
Ergotine Lamante
Eucalinal.
Eucalyptine Le Brun.
Euphon.
Eupnogénol.
Fondant Iodotannique
Dausse.
Freinix.
Germose.
Glottyl.
Goménol.
Goudrinhal.
Gouttes antispasmodiques
Dausse.
Gouttes livoniennes de
Trouette-Perret.
Gouttes Nican.
Gouttes paldophiles.
Gouttes Pilka.
Gouttes scandinaves.

Granules mineral sulfu-
 reux Crosnier.
 Héléline de Korab.
 Hergénol.
 Hypophosphites Churchill.
 Inhalateur Excelsior.
 Inhalol.
 Inhaloxyl.
 Ioda.
 Iodarsenic Guiraud.
 Iodéine Montagu.
 Iode organique Boissy.
 Iodex.
 Iodogénol Pépin.
 Iodo-Malsine.
 Iodométine.
 Iodone Robin.
 Iodonucléol.
 Iodostarine Roche.
 Iodo-Vitasine.
 Iodurase.
 Iodure Philippe.
 Iodures Pachaut.
 Kipsol.
 Kluchol Remeaud.
 Kydalose.
 Lipoféine.
 Lipiodine Ciba.
 Luchon.
 Miroxyl.
 Morrhuel.
 Morrhuxine.
 Mycolysine.
 Narcyl.
 Néopancarpine.
 Néoriodine.
 Oléthyle Benzyle.
 Oliolase Corbière.
 Oxymenthol Perraudin
 (tablettes).
 Papavéryl.
 Papier Fayard et Blayn.
 Paroxyl.
 Peptalmine.
 Péráziodol.
 Perles taphosote Lam-
 biotte.
 Pérubore.
 Phagolysine.
 Phosote Lambiotte.
 Phosphogaiacol Mary.
 Phusasmine.
 Pilules Philippe.
 Pneumogéine Renard.
 Pneumostyl Daguin.

Poudre Escoufflaire.
 Prévalidine.
 Prézymase.
 Pulmocardine.
 Pulmogyl.
 Pulmosérum.
 Pulvéol.
 Pyratone.
 Pyrélaine Collas.
 Révulsif Milko.
 Révulsif Procipha.
 Rézyl.
 Rhinadrol.
 Rhodazil.
 Riodyne.
 Salyptol Narty.
 Sanedrine.
 Sanex-Inhalant.
 Sauge Gmet.
 Scléramine Dausse.
 Sérum anti-asthmatique
 de Heckel.
 Sicopion.
 Sinaplasme.
 Sirop aux hypophosphites
 de Fellows.
 Sirop Brahma.
 Sirop de Sirtal.
 Sirop Famel.
 Sirop Gribell.
 Sirop Lanchat.
 Sirop Mayer.
 Sirop Mireille.
 Sirop Noguès.
 Sirop phénique Vial.
 Sirop Préga.
 Sirop minéral sulfureux
 Crosnier.
 Sirop Roche au Thiocol.
 Soderséine.
 Sodothiol.
 Solution Pautauberge.
 Somalgine.
 Sornyal.
 Staphylase.
 Sthénoléine.
 Sulfarsinol.
 Sulfarsiode.
 Sulfanhal.
 Sulfoidol Robin.
 Sulfoléine Rozet.
 Sulfureux Pouillet.
 Sulfuryl Monal.
 Sylvol.
 Terkal Monal.

Thiocol Roche.
Thiosote Lambiotte.
Thiodine Cognet.
Trinitrine caféinée Dubois.
Tubérol.
Urisanine.
Uroformine Gobey.
Urolodine.
Vaccin anti-asthmatique
du professeur Minet.

Vaccin anti-pneumonique
du professeur Minet.
Vaccin de Weill et Du-
fourt.
Vaccinothérapie atoxique
Cépède.
Vaclydun.
Vin et sirop Nourry.
Zaryl.
Zimbyl.

VII. — ARTHRITISME - GOUTTE **RHUMATISME - ALGIES DIVERSES**

Absuric.
A. D. Grosjean.
Adrialgine.
Afatyl.
Algatan.
Algocratine.
Allophaquina.
Ampoules Reipar.
Anapeptone Vassal.
Anégrine.
Antalgol Dalloz.
Antialgos Christiaens.
Antiphlogistine.
Antiphlogosine.
Antipur.
Arrhéнал Adrian.
Arthritose.
Arséniode Buriat.
Asciatine.
Ascéine.
Aspiphan Boeglin.
Atolysan.
Atophan Cruet.
Atoquinol Ciba.
Azufrol.
Bain Carré.
Baume Aroma.
Baume Bengué.
Baume Rhodia.
Baumolacpine.
Bétul-Ol-Midy.
Bi-Citrol Marinier.
Bouchon Bouteille Ema-
nia.
Boues radioactives Ema-
nia.
Brides -les-Bains.
Bulgarine Thepenier.
Cachets du D^r Bovell.

Calcozymase.
Camphro-Salyl Fraisse.
Capsules Bardet.
Carbonal.
Cataplasme du D^r Lelièvre
Cérébrine Fournier.
Cervol.
Chloréthyle Bengué.
Chéloïdine.
Cibalgine.
Citrase.
Citrofluyl.
Colchi-Sal-Midy.
Collobiase de soufre.
Collobiase de sulphhydrar-
gyre.
Colloïxols du D^r Riquoir.
Crédone Dehaussy.
Crésopirine.
Cryogénine Lumière.
Curatine Brunet.
Curatoxine Wendel.
Curiodé.
Dépuriodé du D^r R. We-
ber.
Dialacétine Ciba.
Dialyl.
Diasclérol.
Diasés Progil.
Dicaliodé.
Dolysine.
Elgine Julien.
Emerson's Bromo-Seltzer.
Eniode Lefebvre.
Entéro-Antigènes.
Eranol.
Fango Fisch et C^{ie}.
Fondant iodotannique
Dausse.

Fosfoxyll Carron.
 Grains céphalgifuges.
 Guipsine.
 Hopogan Bocquillon.
 Ioda.
 Iodalose Galbrun.
 Iodaseptine Cortial.
 Iode organique Boissy.
 Iodex.
 Iodhema.
 Iodogénol Pèpin.
 Iodo-Malsine.
 Iodométine.
 Iodone Robin.
 Iodonucléol.
 Iodostarine Roche.
 Iodo-Vitasine.
 Iodurase.
 Iodure Philippe.
 Iodures Pachaut.
 Ionyl.
 Ixium.
 Jus de raisin Pampryl.
 Levure fraîche Myceta.
 Lipiodine Ciba.
 Liqueur Laville.
 Luchon.
 Mésothorium Buisson.
 Micellode.
 Mitigans Roxelane.
 Nalodine Logeais.
 Nécriodine.
 Nétral Raley.
 Névralgol Brossard.
 Névrosol.
 Nisaméline Trouette-Perret.
 Nitroyl Leysin injectable.
 Nopirine Vicario.
 Nutrobiase.
 Odynal Chevalier.
 Oliolase Corbière.
 Orthogénol.
 Oxygénase.
 Panbiline.
 Papier Fayard et Blayn.
 Paradoline.
 Pavéron Dausse.
 Peptonal.
 Péraziiodol.
 Pharmetan.
 Phoséforme.
 Phylactone Byla.
 Pilules de Moussette.
 Pilules Philippe.

Pipérazine Midy.
 Poudre Génia.
 Prézynase.
 Pyrétaline Collas.
 Pyréthane.
 Quinsal.
 Rectopanbiline.
 Révulsif Procipha.
 Rhésal Vicario.
 Rhoféine.
 Riodyne.
 Salène Ciba.
 Salicéral.
 Salsanos.
 Salysérum.
 Sambul.
 Santhéose.
 Scialine.
 Scéramine Dausse.
 Sédatine Christiaens.
 Sel hépatique U.-N. Anquevaux.
 Seti.
 Sinaplasme.
 Sodothiol.
 Soluprotine Roche.
 Solurol.
 Solutions du D^r Clin.
 Solvurite.
 Spécifique Bejean.
 Stovalne.
 Sulfarsinol.
 Sulfarslode.
 Sulfobyl.
 Sulfoidol Robin.
 Sulfureux Pouillet.
 Sulfurine du D^r Langlebert.
 Sulfurion.
 Sulfuryl Monal.
 Synthol.
 Thébail.
 Théosalvose.
 Théinol.
 Thigénol Roche.
 Thiosyl.
 Tiodine Cognet.
 Ulcéosine.
 Ulmarène Gigon.
 Uracétose.
 Uralysol.
 Uraséol.
 Uraseptine Rogler.
 Urazine.
 Uriftine.

Urilystone.
Urisanine.
Urobuccol Malmanche.
Uroformine Gobey.
Uroiodine.
Urométine Lambiotte.
Uromil.

Urophile.
Urosan Dufayard.
Vaccinothérapie atoxique
Cépède.
Valérianeose Gigon.
Vénécine.
Véralgine.

VIII. — DERMATOSES - PLAIES

Acésine Guillaumin.
Albuplast Vigier.
Alibourine.
Alysine.
Anapeptone Vassal.
Anexol.
Aniodol.
Anthraxone.
Antiphlogistine.
Antiphlogosine.
Antisporine.
Arrhéna Adrian.
Arsylène Roche.
Atemnol.
Atoquinol Ciba.
Azufrol.
Bacté-pyo-phage.
Bactériophages Leclerc.
Bardane stabilisée Dausse.
Baume Delacour.
Baume de la Maternité.
Baume du Dr Baissade.
Baume Saint-Antoine.
Baume Sélénia.
Belhémène.
Borostyrol Schlatter.
Boues Radioactives Emania.
Bulgarine Thépénier.
Calcozymase.
Calmitol.
Capillairal.
Carbolactyl simple.
Cataplasme du Dr Le-
lièvre.
Céthocal.
Chlorobyl.
Chloro-Magnésion.
Chlorosulfol.
Clonazone Daufresne.
Collobiase de soufre.
Colloïdes Amicros.
Comprimés d'Alibour.
Comprimés Guillaumin.

Créosoforme Lambiotte.
Curatoxine Vendel.
Curiode.
Delbiase.
Dépuriode du Dr R. We-
ber.
Dermo-plastol Dumesnil.
Dermo-stalys du Dr Wa-
gon.
Desitin.
Diadermine.
Dialyl.
Dicaliode.
Dmelcos.
Dragées Elkin.
Eczéda.
Ektogan Bocquillon.
Eléodermine.
Emplâtres R. Cavaillès.
Enésol.
Entéro-Antigènes.
Entéroseptyl Clérambourg.
Euphoryl.
Facmine Longuet.
Fondant iodotannique
Dausse.
Formadermine.
Francoplaste.
Furunculase.
Galabactéine.
Ganderma.
Gaze néolée.
Géloïde Stalys du Dr Wa-
gon.
Gélopansement Byla.
Gouttes halogènes du
Dr Béru.
Gouttes païdophiles.
Granulé dépuratif végé-
tal du Dr A. Kunckel.
Granulés minéral sulfu-
reux Crosnier.
Hypochlorine.
Hypochloryl.

Inotyol du D^r Debat.
 Insulanol.
 Insuline.
 Ioda.
 Iodarsenic Guiraud.
 Iodex.
 Iodine Médol.
 Iodo-Maisine (pommade).
 Iodo-thyroïdine Catillon.
 Kerlactine.
 Kerlol.
 Laccodermes.
 Lactochol.
 Levure B 17.
 Levure fraîche Myceta.
 Levurine extractive.
 Lipogazes dermatolo-
 giques.
 Luchon.
 Magnésium Hardy.
 Métacuprol.
 Méta-Titane.
 Méta-Vaccin.
 Néo-collargol.
 Néopancarpine.
 Néol.
 Nisaméline Trouette-Per-
 ret.
 Nitium Buisson.
 Noviode.
 Nutrobiase.
 Onction Angelini.
 Ormatol.
 Orthogénol.
 Ouataplasmé.
 Oxygénase.
 Paralactine Byla.
 Pellicules radifères du
 D^r Vallet.
 Peptalmine.
 Peptonal.
 Phylactone Byla.
 Pipérazine Midy.
 Plagéine Soulas.
 Pommade au Nestosyl.
 Pommade Fornet à l'in-
 suline Fornet.
 Pommade Kléos.
 Pommade Lenoir.
 Pommade Noëlline.
 Pommade Radine (pour
 brûlures).
 Poudre Noëlline.
 Poudre et pommade d'in-
 suline Phyloze.

Poudre Satine.
 Poudre Stéar.
 Prézymase.
 Propidex.
 Propidon.
 Radiobaume Adrian.
 Protiodyne.
 Psathanol.
 Pulvéol.
 Pyrélaine Collas.
 Pyroléol Edet.
 Radiobaume Adrian.
 Rhagadine Bacquemonde.
 Rozoderme.
 Salantale.
 Salicéral.
 Sanoram.
 Sapolan.
 Sarcptol.
 Savon A. Mollard.
 Savon Pérusol.
 Scuroforme.
 Sirop minéral sulfureux.
 Crosnier.
 Sodothioli.
 Soluprotine Roche.
 Stalysine.
 Stanion.
 Stannoxyli.
 Staphylase.
 Staphylocide Audras.
 Staphylo-coccine Fraquet
 Staphyloethanol.
 Stéramine.
 Sulfarsinol.
 Sulfarsiodé.
 Sulfobore.
 Sulfobyl.
 Sulfureux Pouillet.
 Sulfurine du D^r Langlebert.
 Sulfurion.
 Sulfuryl Monal.
 Thigénol Roche.
 Thymol Doré.
 Tiodine Cognet.
 Trophène.
 Tulle gras Lumière.
 Ulcéobande.
 Ulcéoplaque.
 Ulcéosine.
 Ulcéosol (Pommade).
 Ulcéosol (Poudre).
 Ulcérophile Nosan.
 Vaccinothérapie atoxique
 Cépède.

Végétol externe.
Vénécine.
Verrulyse.

Vioforme Ciba.
Vulcase.
Vulnérine du D^r Bergen.

IX. — GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE

Agomensine Ciba.
Algocratine.
Ampoules de Sécacornine
Roche.
Ampoules de Spasmalgine
Roche.
Androstine Ciba.
Anexol.
Aniodol.
Apioline Chapoteaut.
Aseptone.
Baume Delacour.
Baume de la Maternité.
Baume Saint-Antoine.
Belhémine.
Benzylol.
Boricine Meissonnier.
Boues radio-actives Ema-
nia.
Cachets du D^r Boveil.
Capsovules Diplos.
Capsules Joret et Homolle.
Chlocci.
Clisémine Longuet.
Clonazone Daufresne.
Colloïxols du D^r Riquoir.
Complextraits.
Comprimés d'Alibour.
Comprimés Guillaumin.
Crédone Dehaussy.
Créosoforme Lambiotte.
Cryptargol Lumière.
Cupressus Dausse.
Curiosan.
Dioséine Prunier.
Dragées et élixir ferro-
ergotés Mannet.
Ektogan Bocquillon.
Eléodermine.
Elixir de Virginie Nyrdahl.
Entéro-antigènes.
Eranol.
Ergotine Lamantel.
Eugynola.
Evine.
Extrait Hamidi.
Fango Fischet Cl.
Félargent.

Férarsényl Gautier.
Fer Bravais.
Férovarine Vitalis.
Floréase.
Formyl.
Galabactéine.
Galactogil.
Gobérol.
Glycocarpine.
Gouttes antispasmodiques
Dausse.
Gouttes de Séru.
Gouttes Fluxines.
Grassyl.
Gynergène Sandoz.
Gynopausine.
Gynocalcion.
Hémalexine.
Hamamellis Grandval.
Hémagène Tailleur.
Hémodrome.
Hémoluol.
Hémopausine.
Hémypnal.
Holovarine.
Hormotone.
Hormovarine Byla.
Hydralin.
Hypochlorine.
Hypochloryl.
Indhaméline simple. Lejeune
Indhaméline Lejeune pro-
riglandulaire.
Ixogyne.
Kerlactine.
Lachésine.
Lactophorine Vigier.
Laurenol médicinal.
Leucagine.
Lipoides Iscovesco.
Maltea Moser.
Malt paillété Progil.
Menatoh.
Ménosédine.
Ménovarine.
Mésiforme.
Métacuprol.

Méta vaccin.
 Métritols.
 Mictasol.
 Natrosyl.
 Néo-collargol.
 Néol.
 Néothorium Millot.
 Noviode.
 Ocréine Grémy.
 Oléo-mel laxatif.
 Oléthyle Benzyle.
 Opothérapie Henning.
 Ovarine Tisy.
 Ovules Ivula Pearson.
 Ovules Roche.
 Oxydothyridine Paris.
 Oxydovarine Paris.
 Panbiline.
 Panlax Gmêt.
 Papavéryl.
 Pilules de Blancard.
 Pilules héléniennes Naud.
 Pituilobine Byla.
 Pommade Noëline.
 Poudre Gynule.
 Pulsamone.
 Rectagine.
 Réthargine.
 Rhodazil.
 Salantale.
 Salubrine Phénix.
 Sanédrine.

Sanoformine.
 Sanoram.
 Savon Pérusol.
 Sécacornine Roche.
 Sédol.
 Sérodausse ovarien.
 Sirop de Blancard.
 Sistomensine Ciba.
 Sornyal.
 Spasalgine Roche.
 Spyrolides.
 Sulfo-bore.
 Suppo-Gynals.
 Sympathyl Chantereau.
 Syntho.
 Tablettes Zéva.
 Tampol Roche.
 Théinol.
 Thigénol Roche.
 Thymol Doré.
 Tot Hamelis.
 Utéramine.
 Vaccinothérapie atoxique.
 Cépède.
 Végétol externe.
 Veinofluine.
 Veinoposine.
 Veinosine.
 Veinotrope.
 Vioforme Ciba (Ovules au).
 Vin et sirop Nourry.
 Vitargyl.

X. — HÉMOSTATIQUES

Acésine Guillaumin.
 Ampoules de Sécacornine Roche.
 Anthéma.
 Arhémapectine Gallier.
 Belhémine.
 Boricine Meissonnier.
 Calcional.
 Calcium Sandoz.
 Capsellase.
 Chloral Géranié.
 Chloro-Galcion.
 Citrase.
 Clisémine Longuet.
 Colloïxols.

Cupressus Dausse.
 Ergotine Lamante.
 Gouttes fluxines.
 Gynergène Sandoz.
 Hémogénol Dausse.
 Hémoluol.
 Hémopectal.
 Hémostyl du Dr Roussel.
 Kerlol.
 Sécacornine Roche.
 Séroma.
 Séro-Sérum Rivier.
 Sirop phéniqué Vial.
 Spectrol.
 Utéramine.

XI. — MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES

A. D. Grosjean.
 Adrialgine.
 Agamentol.
 Aniodol.
 Antalgot Dalloz.
 Antigrippine Midy.
 Antiphlogistine.
 Arsaminol.
 Arsylène Roche.
 Bacté-phages.
 Bacté-rhino-phage.
 Bactériophages Leclerc.
 Banikol.
 Bismuth Desleaux.
 Cachets du Dr Boveil.
 Cachets Kapytan.
 Caféine Invar.
 Calmosuppos antither-
 miques.
 Capillairal.
 Carbonate de bismuth.
 Céphæmétine.
 Cervol.
 Cétémol.
 Chénanthol.
 Chloramine Freyssinge.
 Chrysémine.
 Collobiase d'or.
 Colloïdes Amicros.
 Colloïxols du Dr Riquoir.
 Cryptogène Lumière.
 Cryptargol Lumière.
 Curatine Brunet.
 Curatoxine Vendel.
 Curoxyure.
 Diénol.
 Di-uroiodine.
 Electrargol.
 Electrocuprol.
 Elgine Julien.
 Elixir Ducro.
 Entéroseptyl Cléram-
 bourg.
 Entérozone.
 Eranol.
 Eucalyptine Le Brun.
 Fer Bravais.
 Ferricodile.
 Ferrocodile.
 Gambéol.
 Gonacrine.
 Grippol.

Huiles cholestérinées
 Dausse.
 Hyrganol.
 Hypodermozone.
 Iodaseptine Cortial.
 Iode organique Boissy.
 Iodo-Maisine.
 Iodométine.
 Kerlactine.
 Kola granulée Astier.
 Kolatinés.
 Lantol.
 Laxia Dannech'h.
 Leucoseptyl.
 Libérine.
 Lipodéterpenol.
 Malarsan.
 Mésothorium Bulsson.
 Micelliodé.
 Mictoseptol.
 Moranyl.
 Mycolysine.
 Narsénol.
 Néo-arsycodyle.
 Néo-collargol.
 Névorol Rafey.
 Névrargol Brossard.
 Névrosol.
 Nopirine Vicario.
 Novarsenobenzol Billion.
 Nucléatol Robin.
 Odynal Chevalier.
 Orargol Amicros.
 Ozonaire.
 Panbiline.
 Panfébrine.
 Pérasiodol.
 Pharmetan.
 Phosote Lambiotte.
 Physiosthénine.
 Phytinate de quinine Ciba.
 Poudre Paterson.
 Protiodyne.
 Pyoformine.
 Pyrélaine Collas.
 Quergémol.
 Quinarsol fébrifuge.
 Quinéase.
 Quinéine.
 Quinium Roy.
 Quinobrome.
 Quinoforme Lacroix.

Quino Thorium.
 Quinio-Stovarsol.
 Quinoïdine Duriez.
 Rhodarsan.
 Rhoféine.
 Sanluol.
 Septicémine Cortial.
 Séroquinol injectable.
 Soluprotine Roche.
 Solution Bardet.
 Staphylase.
 Staphylo-coccine Fraquet.
 Sthénoléine.
 Stovarsol.
 Strychnal Longuet.
 Sulfuryl Monal.
 Suppositoires Corbière.
 Tablettes Perroud.
 Tœnifuge Bardet.
 Tœnifuge français du
 D^r Duhourcau.

Tœnifuge Kirn.
 Théisine Dubat.
 Themsaline.
 Théosalvose.
 Thiosyl.
 Tiodine Cognet.
 Tréparsol.
 Tri-iodo-Ercé.
 Tryparsamide.
 Urisanine.
 Uroformine Gobey.
 Urol.
 Urométine Lambiotte.
 Urosan Dufayard.
 Vaccinothérapie atoxique
 Cépède.
 Vaccin anti-grippal du
 professeur Minet.
 Véralgine.
 Vermirène Audibert.

XII. — OPHTALMOLOGIE

Aniodol.
 Bicollyre.
 Boricine Méissonnier.
 Buttelline.
 Collobiase de soufre.
 Comprimés d'Alibour.
 Conjonctol.
 Cryptargol Lumière.
 Félargent.
 Génostrychnine.
 Glycocarpine.
 Ophthalmine.
 Sanédrine.

Scurocaine.
 Silicyl.
 Thigénol Roche.
 Tiodine Cognet.
 Tubes du D^r Guiraud.
 Tubes Dulcis.
 Tubes ophtalmologiques,
 Ferlux.
 Vaccinothérapie atoxique
 Cépède.
 Végétol externe.
 Vitargyl.

XIII. — OPOTHÉRAPIE - VACCINOTHÉRAPIE - PRODUITS DIVERS

A. D. Grosjean.
 Afatyl.
 Alysine.
 Ampho-vaccins de Ron-
 chèse.
 Anthraxone.
 Antigénines.
 Antivirus.
 Arsenicaux Bouty.
 Bacté-phages.
 Bactériophages Leclerc.

Bilivaccin.
 Billault (produits).
 Blennosine.
 Boléase Monal.
 Calcional.
 Calcozymase.
 Cholergine.
 Collitique.
 Colloïdine Laleuf.
 Complexes colloïdaux du
 D^r Riquoir.

Complextraits.
 Dmelcos.
 Edo vaccins.
 Energetènes Byla.
 Entéroxin Leclerc.
 Entéro-vaccin Lumière.
 Euphoryl.
 Eutensyl Grémy.
 Formo-vaccins (vaccins
 Lucinia).
 Galactogil.
 Gastricine du D^r Duhour-
 cau.
 Globules Romon.
 Granions de Fouard.
 Grippol.
 Hépatol Byl.
 Hépatrol.
 Holovarine.
 Hormobiline.
 Hormolaxine.
 Immunizols Grémy.
 Immuno-antivirus.
 Immuno-vaccins.
 Iodothyroïdine Catillon.
 Kerlactine.
 Lipoides Iscovesco.
 Lipo-vaccins.
 Méta vaccin.
 Néopialysines du D^r Ri-
 quoir.
 Néo-Sphérulines Moncour.
 Ocréine Grémy.
 Oponuclyl.
 Opothérapie associée, du D^r
 Fraysse.
 Opothérapie Bouty.
 Opothérapie Byla.
 Opothérapie Choay.
 Opothérapie Fournier.
 Opothérapie Henning.
 Opothérapie Moncour.
 Opothérapie U. T. A.
 Opothérapiques Meurice.
 Opothérapiques Pélissier.

Opozones Lumière.
 Osmo-vaccins P. L.
 Ostéo-Hépatine.
 Ovarine Tisy.
 Oxydothyroïdine Pâris.
 Oxydovarine Pâris.
 Pancrépatine Laleul.
 Panfébrine.
 Panglandine.
 Phylactone Byla.
 Prézymase.
 Propidex.
 Propidon.
 Proxylases.
 Rhéantine Lumière.
 Salantale.
 Salvénase du D^r Duhour-
 cau.
 Sphérulines synergétiques
 Moncour.
 Stalysine.
 Taburol Monal.
 Tébéphaguine Fornet.
 Thyroxine Roche.
 Tisanes Dausse.
 Vaccin anti-asthmatique
 du professeur Minet.
 Vaccin anti-grippal du
 professeur Minet.
 Vaccin anti-pneumonique
 du professeur Minet.
 Vaccin de Weill et Du-
 fourt.
 Vaccinothérapie atoxique
 Cépède.
 Vaccins atoxiques stabi-
 lisés.
 Vaccins bactériens I. O. D.
 Vaccins Clin.
 Vaccins de Ronchèse
 (ampho-vaccins).
 Vaccins Bruschetti.
 Vaccins « Sténé ».
 Vaclydun.

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Acodros.
 A. D. Grosjean.
 Adréroléine inhalant.
 Allocaïne Lumière.
 Ampoules de spasalgine
 Roche.

Anexol.
 Aniodol.
 Avanazol Couturieux.
 Argybil.
 Arhine Lambiotte.
 Bacté-rhino-phage.

Balmiga.
 Baume Saint-Antoine.
 Boules Quies.
 Boricine Meissonnier.
 Bulgarine. Thepenier.
 Butelline.
 Cataplasme du Dr Lelièvre
 Chlorinol inhalant.
 Cibalgine.
 Cimatryl.
 Clonazone Daufresne.
 Cocaine Midy.
 Collobiase de soufre.
 Colluborine Dupuy.
 Dragées Bengué au menthol.
 Edistol.
 Eléodermine.
 Ercérhinol.
 Eucalinal.
 Euphon.
 Formyl.
 Freinix.
 Galform Lambiotté.
 Glottyl.
 Glycocarpine.
 Goménol.
 Gosiérine Dalloz.
 Goudrinhal.
 Granulé minéral-sulfureux
 Grosnier.
 Hypochlorine.
 Hypochloryl.
 Inhalol.
 Inhalo-bol.
 Inhalone.
 Inhalo-sel.
 Inhaloxyl.
 Inhalateur Exceelsior.
 Inhalation Lancosme.
 Inolène.
 Iodo-Maisine: (pommade).
 Kidoline.
 Kinectine.
 Kipsol.
 Kydalose.

Léniforme.
 Luchon.
 Mésoforme.
 Mucosodine.
 Nazophyl Darva.
 Néo-collargol.
 Néol.
 Néopancarpine.
 Odarsol.
 Orargol Amicros.
 Oxymenthol. Perraudin
 (tablettes).
 Pérubore.
 Pulvéol.
 Rhinadrol.
 Rhinistol.
 Sanédrine.
 Sanex inhalant.
 Scurocaïne.
 Scuroforme.
 Septicémine Cortial.
 Séro-comprimés Mérieux.
 Silicyl.
 Sirop Guillaiermond.
 Sirop minéral sulfureux
 Crosnier.
 Spasmalgine Roche.
 Staphylococcine Fraquet.
 Sulfinal.
 Sulfo-bore.
 Sulfoidol Robin.
 Sulfoléine Rozet.
 Sulfureux Pouillet.
 Sulfuryl Monal.
 Suppositoires Corbière.
 Thigénol Roche.
 Tiodine Cognet.
 Vaccin antigrippal du pro-
 fesseur Minet.
 Vaccinothérapie atoxique
 Cépède.
 Végétol externe.
 Verticurine.
 Vitargyl.
 Zaryl.

XV. — RECONSTITUANTS - RECALCIFIANTS - TONIQUES

Actine.
 Adral.
 Adrénaline Invar.

Adrénocalcine.
 Alexime.
 Aliment Tinardon.

Ampoule Churchill.
 Ampoules névrosthé-
 niques Dausse.
 Amylodiastase Thépénier.
 Antasthène.
 Antiphi.
 Ardogène.
 Arrhénal Adrian.
 Arrhénomartiol.
 Arrhénuclène Bergevin.
 Arsenicaux Bouty.
 Arséniode Buriat.
 Arsi-strychnal Longuet.
 Arsycondyle.
 Arsylène Roche.
 Ascoléine Rivier.
 Bain Carré.
 Baumolacpine.
 Beef Lavoix.
 Belhémine.
 Biocalcose Chevreton.
 Biodynamine.
 Biogénol Demasles.
 Bionergyl.
 Bio-plastine Sérono.
 Biophytol.
 Biotrignon.
 Biozol.
 Blédine Jacquemaire.
 Bouchon Routeille Emania.
 Boues radioactives Emania.
 Cachets Roche de Thiocol.
 Cacodylo-phosphate vital
 de Jacquemaire.
 Calcium Sandoz.
 Capsules de Morrhuine
 Puy.
 Capsules Taetz à l'ext. de
 foie de morue lécithiné.
 Céréalose.
 Cérébrosthénine Dallin.
 Céréossine Dehaussy.
 Cérinil.
 Cériomine.
 Chloro-calcion.
 Chloro-magnésion.
 Cholergine.
 Citrase.
 Clupeyl.
 Collorides Amicros.
 Colloïdogénine du D^r
 Bayle.
 Complextraits.
 Comprimés Roche de Thio-
 col.

Créosal Dubois.
 Crescol.
 Cytobiase.
 Cyto-manganol Corbière.
 Cytosérum Corbière.
 Dialyl.
 Diases Progil.
 Diastogène Dehaussy.
 Doloma injectable.
 Dragées Hecquet.
 Dragées névrosthéniques
 Yse.
 Eatan.
 Electromartiol.
 Elixir Duchamp.
 Elixir Ducro.
 Elixir Dussaud.
 Embryonine du D^r Barré.
 Emulsion Marchais.
 Endocalcase.
 Entérozone.
 Extrait de céréales
 Adrian.
 Eucalcium.
 Eucytol.
 Eudynol.
 Extrait de malt français
 Déjardin.
 Fer Bravais.
 Fer Larcade.
 Féroxal Buisson.
 Ferricodile.
 Ferrocodile.
 Ferrophytine Ciba.
 Fludiose.
 Fludyl.
 Fondant iodotannique
 Dausse.
 Fondant de cola Dausse.
 Fondant mangano-fer-
 reux Dausse.
 Fortossan Ciba.
 Fortossan irradié.
 Forxol.
 Fosfoxyl Carron.
 Fosyls Carron.
 Gaduamine.
 Gaduase.
 Gaurol.
 Gélocalcine.
 Générgosine.
 Glandocalcyl.
 Globugénol Chanal.
 Gloma.
 Glycérophosphate Dalloz.

Glycérophosphate Jacquemaire.
 Glycérophosphate Robin.
 Glyctone phosphatée Charrière.
 Glyphospher.
 Gouttes arséno-sthéniques Dausse.
 Gouttes païdophiles.
 Gouttes phosphosthéniques Dausse.
 Granulés Caremel.
 Granules de Pantofort du D^r Boveil.
 Granulé minéral sulfureux Crosnier.
 Glyctone phosphatée Charrière.
 Hélical.
 Hémagénine Giraud.
 Hémooantitoxine Sofos.
 Hémocyto-Sérum Corbière.
 Hémostixine Branchu.
 Hémogénol Dausse.
 Hémoglobine Deschiens.
 Hémophagosthyl.
 Hémostyl du D^r Rous-sel
 Hémotonine.
 Héparmone.
 Hépatrol.
 Héracléol.
 Hipposarcine Roy.
 Histocalcine.
 Histogénol.
 Holos.
 Huiles cholestérinées Dausse.
 Hypodermozone.
 Injection et gouttes Clin.
 Iodalose Galbrun.
 Iodarsenic Guiraud.
 Ionyl.
 Irradiol.
 Irrastérine.
 Ixium.
 Jémalt Wander.
 Jus de raison Pampryl.
 Kina Elzévir.
 Kola granulé Astler.
 Kolarsine.
 Kolatinés.
 Lactophorine Vigier.
 Lécithosine Robin.

Limol Churchill.
 Lipocalcine.
 Liposplénine du D^r Groc.
 Magol Churchill.
 Magnésium Hardy.
 Maltase Fanta.
 Maltea Moser.
 Malt français Déjardin (Extrait de).
 Malt pailleté Progil.
 Malt Wander.
 Mangaine.
 Mangano-phosphal Julien.
 Marinol.
 Maté Douglas.
 Mésothorium Buisson.
 Métharfer Bouty.
 Métharsol Bouty.
 Micelliodé.
 Morisland irradié.
 Morrhualène Gautier.
 Morrhuéline Jungken.
 Morrhuol.
 Morrhuixine.
 Morubiase.
 Morubiline.
 Moruxase.
 Musculosine Byla.
 Néo-Arsycodile.
 Néo-Rhomnol.
 Néovitalyne.
 Nergine Heulebert.
 Nervocithine Tissot.
 Neuro-Pax.
 Neuroplasma Fort.
 Neuroplasma Massif.
 Neuroplasmine Fort.
 Neurosine Prunier.
 Neurotrol.
 Neurotrophol Byla.
 Névarsite.
 Névrosthénine Freyssinge.
 Nucléarsitol Robin.
 Nucléatol Robin.
 Nucléigène.
 Nucléophorine.
 Nuclhémose.
 Nutrobiase.
 Cenophos.
 Opocalcium.
 Opocalcium irradié.
 Oponuclyl.
 Orexyl.
 Oripbol.
 Ostéo-Hépatine.

Ostéline.
 Ostréine.
 Ovo-Lécithine Billon.
 Ovomaltine.
 Ozobiase.
 Païphos.
 Pangaduine.
 Panglandine.
 Panhémol.
 Parathyrocalcine Mon-
 cour.
 Peptokola Robin.
 Peptonate de fer Robin.
 Peptone Vassal.
 Persodine Lumière.
 Phagolysine.
 Phagosthyl.
 Phiamine.
 Phos.
 Phosoforme.
 Phosol Quinet.
 Phospharsol.
 Phospharsyl.
 Phosphates du Dr Pinard.
 Phosphate Vital de Jac-
 quemaire.
 Phosphatine Falières.
 Phospho-Fluor Beynet.
 Phosphogaiacol Mary.
 Phosphopinal Juin
 Phostanol.
 Phostyl.
 Phyllossan.
 Phytine Ciba.
 Phytogénine Byla.
 Pilules de Blancard.
 Pilules Gyp.
 Plurion Couturieux.
 Poliol Churchill.
 Polyminéral Fort.
 Produits Pennès.
 Prosthénase Galbrun.
 Quassia-Kina Rabot.
 Quassine Houdé.
 Quergémol.
 Quina Baron.
 Quinarsol antianémique.
 Quinéine.
 Quinium Roy.
 Quinoldine Duriez.
 Quotidien (Le).
 Réalphène.
 Reconstituant Mary.
 Réparateur Thuau.
 Rhomnol.

Salins-du-Jura.
 Sanas.
 Sanguil.
 Santhéose.
 Sarco sérum.
 Sérodausse antitoxisényl.
 Sérodausse infantile.
 Sérodausse ovarien.
 Séroma.
 Séro-sérum Rivier.
 Sérosthényl Bouty.
 Sérum ferrugineux Fraisse.
 Sérum névrosthénique
 Fraisse.
 Sérum névrotone.
 Sidérarsan.
 Sirop aux Hypophosphites
 Fellows.
 Sirop de Blancard.
 Sirop Famel.
 Sirop minéral sulfureux
 Crosnier.
 Sirop Roche au Thiocol.
 Sirop Tinardon.
 Solution Bardet.
 Spectrol.
 Sténergine.
 Stérinase Vincent
 Stérogyl.
 Sthénoléine.
 Strychnal Longuet.
 Sulfarsiode.
 Sulfurine du Dr Langle-
 bert.
 Sylcase.
 Synergyl Vadam.
 Synthol.
 Taburol Monal.
 Thiocol Roche.
 Thyroxine Roche.
 Tonikéine Chevreton.
 Tonique Roche.
 Tonudol.
 Total Tonic.
 Tricalcine.
 Triféryl.
 Triganol Vigier.
 Tymocalcine.
 Uvé.
 Uvéstérol.
 Vanadarsine Guillaumin.
 Vanadine Chevrier.
 Vanucléol.
 Végéphos.
 Vénécine.

Vin de Baudon.
Vin de Bugeaud.
Vin de Lavoix (voir, Beef
Lavoix).
Vin et sirop Nourry.
Vin Girard.
Viosten.
Vioxyl.
Vitacalcine Moncour.
Vitamina.

Vitamine Rogier.
Vitamorrhaine.
Vitergomine.
Vivoléol.
Zimbyl.
Zohol.
Zomine du professeur Ch.
Richet.
Zomo-Musculosine Byla.

XVI. — STOMATOLOGIE

Allocaïne Lumière.
Boricine Meissonnier.
Butelline.
Chloral Géranié.
Cachets du Dr Boveil.
Carbonal magnésien.
Elzévir dentition.
Gosiérine Dalloz.
Hypochloryl.
Inolène.
Mésoforme.
Névorol Rafey.
Névrosol.
Odarsol.

Parathyrocalcine Mon-
cour.
Poudre Paterson.
Pulvéol.
Sanogyl.
Sanoram.
Scurocaïne.
Sirop Teyssèdre.
Scuroforme.
Stovarsol.
Synthol.
Tablette oxymenthol Per-
raudin.
Tiodine Cognet.

XVII. — SYPHILIS

Acétylarsan.
Algatan.
Arquéritol Lesure.
Arsaminol.
Banikol.
Benzo Bismuth Millot.
Biazan.
Biodermyl Monal.
Bismhydral.
Bismuthés Maurice.
Bismuthion Couturieux.
Bismuthoidol Robin.
Bivatol.
Cardyl.
Collobiase de sulfhydrar-
gyre.
Comprimés Roy.
Curaluès.
Curiode.
Cynahermine.
Elixir Déret.
Elixir Hymel.
Elixir Spes.

Enésol.
Éranol.
Érythroluès.
Galyl.
Gambéol.
Globules Fumouze.
Granulés minéral sulfu-
reux Crosnier.
Hectargyre.
Hectine.
Huile grise Ercé.
Ioda.
Iodalose Galbrun.
Iode organique Boissy.
Iodo bismuthate de qui-
nine Fraisse.
Iodo-bismuth Ercé.
Iodogénol Pépin.
Iodo-Maisine.
Iodone Robin.
Iodurase.
Iodure Philippe.
Kolarsine.

Lipogyre Ciba.
 Lipoiodine Ciba.
 Ludin.
 Métarsénobenzol Saca
 (voir Uclarsyl).
 Musculargyre.
 Muthanol.
 Néoby-Hg Trouette-Per-
 ret.
 Néoiacol.
 Néo Mésarca Roche.
 Néo-Riodine.
 Néo-Tréparséan.
 Néo-Trépol.
 Novargyre.
 Novarsénobenzol Billion.
 Oliolase Corbière.
 Oxymuth Saca.
 Pilules de Blancard.
 Pilules d'Hermal Breton-
 neau.
 Pilules Lémery.
 Pilules Philippe.
 Préventyl.
 Quinby.
 Quinby soluble.
 Quinimuthol Saca.
 Rhodarsan.

Riodine.
 Rob Oberlin.
 Rubyl.
 Salvatyl.
 Scléramine Dausse.
 Sirop de Blancard.
 Sirop minéral sulfureux
 Crosnier.
 Solmuth.
 Stovarsol.
 Sulfarsiodé.
 Sulfoidol Robin.
 Sulfo Mésarca Roche.
 Sulfo-Tréparséan.
 Sulfuryl Monal.
 Suppargyres du Dr Fau-
 cher.
 Suppositoires Corbière.
 Suppositoires Hymel.
 Tiodine Cognet.
 Tréparséans.
 Tréparsol.
 Trépol.
 Trépoquinol.
 Uclarsyl.
 Tryparsamide.
 Uroiodyne.
 Veinargyre.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX

Actine.
 A. D. Grosjean.
 Alepsal Gênévrier.
 Alexime.
 Algocratine.
 Allocaine Lumière.
 Allonal Roche.
 Ampoules Boissy.
 Ampoules Churchill.
 Ampoules de Pantopon
 Roche.
 Ampoules de Spasmalgine
 Roche.
 Ampoules névrosthéniques
 Dausse.
 Anestile Bengué.
 Antasthène.
 Anti-épileptique de Liège.
 Aphosal.
 Ardogène.
 Arrhénomartiol.
 Arrhénuclène Bergevin
 Arsylène Roche.

Azotyl.
 Bain Carré.
 Ballotyl.
 Balsoforme.
 Béatol.
 Belladéal Sandoz.
 Belladone Dausse.
 Bellafoline Sandoz.
 Bemax.
 Benzoflorine Julien.
 Biocalcose Chevreton.
 Biodynamine.
 Biogénol Demasles.
 Bionergyl.
 Biophorine Girard.
 Biophytol.
 Borosodine Lumière.
 Boues radio-actives Ema-
 nia.
 Bouchon Bouteille Emania.
 Broméine Montagu.
 Bromiase.
 Bromogénol Pépin.

Bromo-Maisine.
 Bromone Robin.
 Bromovose.
 Cachets du Dr Boveil.
 Calmossuppos sédatifs.
 Cérébroil Leysin.
 Cérébrosthénine Dalin.
 Chloral bromuré Dubois.
 Chloroforme anesthésique
 Lambiotte.
 Chloro-Magnésion.
 Colarsé.
 Comitiol.
 Complextraits.
 Comprimés Kléos.
 Cytosérum Corbière.
 Déclonal.
 Delbiase.
 Dialacétine Ciba.
 Dial Ciba.
 Didial Ciba.
 Doloma injectable.
 Dragées du Dr Gélinau.
 Dragées Hecquet.
 Dragées Lumeval.
 Dragées névrosthéniques
 Yse.
 Eatan.
 Elixir Duchamp.
 Erbamil.
 Eudynol.
 Euphytose.
 Euronol.
 Eusomnine Bélières.
 Extrait de céréales Adrian.
 Fer ovarine Vitalis.
 Fluodyle.
 Fondant de cola Dausse.
 Forxol.
 Fosfoxyl Carron.
 Fosyls Carron.
 Freinix.
 Fusthénol Roze.
 Gardénal.
 Gelsémium Dausse.
 Générgosine.
 Génésérine.
 Genhyoscyamine.
 Génoscopolamine.
 Génostrychnine.
 Glycérophosphate Dalloz.
 Glycérophosphates Jac-
 quemaire.
 Glycocarpine.
 Glykolaine Robin.

Glyphospher.
 Gouttes arsénosthéniques
 Dausse.
 Gouttes halogènes du
 Dr Bérù.
 Gouttes phosphosthéniques
 Dausse.
 Granulé Caresmel.
 Granules de Pantofort du
 Dr Boveil.
 Grassyl.
 Hélical.
 Hémosfixine Branchu.
 Hémoluol.
 Hémonotone.
 Hémypnal.
 Histocalcine.
 Histogénol.
 Hormotone.
 Hyosciamine Houdé.
 Injection et gouttes Clin.
 Intrait de Valériane Dausse.
 Iodaselle Delamarre.
 Ixium.
 Ionyl.
 Kalmobrol.
 Kolatinés.
 Kola granulée Astier.
 Kolarsine.
 Lécithosine Robin.
 Libérine.
 Limol Churchill.
 Lipocérébrine Chevreton.
 Mayol Churchill.
 Mangano-Phosphal Julien.
 Marinol.
 Mitigans Roxelane.
 Musculosine Byla.
 Maté Douglas.
 Narcotile Bengué.
 Néo Rhomnol.
 Néovitalyne.
 Nervocithine.
 Neurène.
 Neuréol.
 Neurinase.
 Neurobore.
 Neuro-Pax.
 Neuroplasma Fort.
 Neuroplasmine Fort.
 Neurosine Prunier.
 Neurotrol.
 Neurotrophol Byla.
 Névrалгоl Brossard.
 Nervosan.

Névrosthénine Freyssinge.
 Nopirine Vicario.
 Novobrol.
 Nucléophorine.
 Nyctal.
 Œnophos.
 Opochol.
 Oponuclyl.
 Oripthal.
 Ovolécithine Billon.
 Païphos.
 Panglandine.
 Pantopon Roche.
 Passiflorine.
 Passival.
 Pavéron Dausse.
 Pepto-Kola Robin.
 Phos.
 Phosoforme.
 Phosol Quinet.
 Phosphates du D^r Pinard.
 Phosphate vital de Jacquemaire.
 Phosphobrom.
 Phospho-fluor Becquet.
 Phosphopinal Juin.
 Phosthénine.
 Phostyl.
 Phylossan.
 Phytine Ciba.
 Poliol Churchill.
 Pulsamone.
 Pyréthane.
 Quergémol.
 Réparateur Thuau.
 Rhoféine.
 Rhomnol.
 Rutonal.
 Sandoptal.
 Scurocaïne.
 Sédatose.
 Sédobrol Roche.
 Sédol.
 Sédoneurol Dehaussy.
 Sédormid Roche.
 Sédosine.
 Sérodausse antitoxisenyl.
 Sérodausse infantile.
 Sérum névrosthénique.
 Fraïsse.
 Sérum névrotone.
 Sicopion.
 Siderarsan.
 Sirop aux Hypophosphites
 Fellows.

Sirop du D^r Gelineau.
 Solution Laroyenne.
 Somnifène Roche.
 Somnothyryl.
 Sonéryl.
 Soporalose.
 Soporigène Delqué.
 Spasmalgine Roche.
 Spasmine Jolly.
 Sténergine.
 Stovaine.
 Strychnal Longuet.
 Strychnarsitol Robin.
 Sulfoidol Robin.
 Sympathyl Chantereau.
 Syncaïne.
 Synthol.
 Tablettes Hova (Hovalettes).
 Taburol Monal.
 Tartrate Borico-potassique Pachaut.
 Thébal.
 Tiodine Cognet.
 Tonikéine Chevreton.
 Tonique Roche.
 Total Tonic.
 Tribromure Gigon.
 Triféryl.
 Valbornine Rogier.
 Valéral Puy.
 Valériane Byla.
 Valérianate Gabail désodorisé.
 Valérianate Grignon.
 Valérianate Pierlot.
 Valériane Pachaut.
 Valérianose Gigon.
 Valérinodor Malmanche.
 Valérium Paul Thibault.
 Valéro-menthol.
 Valéronal.
 Vanadarsine Guillaumin.
 Vanadine Chevrier.
 Végéphos.
 Vériane Buriat.
 Véronidia Buisson.
 Vioxyl.
 Viscosérum.
 Viscum Zyma.
 Vitacalcine Moncour.
 Vitamina.
 Zohol.
 Zomo-musculosine Byla.

Actine.
 Adral.
 A. D. Grosjean.
 Algatan.
 Allochrysine Lumière.
 Aloysine.
 Ampoules Churchill.
 Ampoules de Spasalgine Roche.
 Amylodiastase Thépenier.
 Angiolymphé du D^r Rous
 Aniodol.
 Antiphi.
 Antiphymique Vadam.
 Arsénicaux Bouty.
 Arrhéna! Adrian.
 Arséniode Buriat.
 Arsyène Roche.
 Ascoléine Rivier.
 Azotyl.
 Bactioxyne.
 Balsamol Lescène.
 Banikol.
 Beef Lavoix.
 Blocalcoze Chevrelin.
 Blonergyl.
 Biophytol.
 Biotrignon.
 Cachets du D^r Boviel.
 Cachets Roche de Thiolcol.
 Calcium Sandoz.
 Capsules Dartois.
 Capsules de Morrhuine Puy.
 Céréossine Dehaussy.
 Cérinil.
 Cériomine.
 Chloro-calcion.
 Cholergine.
 Cineyl Grysa.
 Cinnozyl.
 Clisémine Longuet.
 Clupeyl.
 Codoforme.
 Colloïdogénine du D^r Bayl.
 Colloïxols du D^r Riquoir.
 Comprimés Roche de Thio-
 col.
 Créosal Dubois.
 Crescol.
 Crisalbine.
 Cryogénine Lumière.
 Crylodol du D^r E. Maigre.

Cupressus Dausse.
 Curiodé.
 Cytobiase.
 Cyto-Sérum Corbière.
 Diases Progil.
 Dicaliodé.
 Dioradin.
 Doloma injectable.
 Eaton.
 Elbon-Ciba.
 Electrocuprol.
 Elixir Duchamp.
 Elixir Dussaud.
 Elixir thiogalaicolé Arque-
 vaux.
 Embryonine du D^r Barré.
 Endocalcase.
 Eniode Lefèvre.
 Eranol.
 Eucalcium.
 Eucalyptine Le Brun.
 Eucytol.
 Féroxal Buisson.
 Ferrophytine Ciba.
 Fludiose.
 Fluodyle.
 Fortossan Ciba.
 Fortossan irradié.
 Fosfoxyl Carron.
 Fusthénol Roze.
 Gaduamine.
 Gélocalcine.
 Génatropine.
 Glandocalcyl.
 Globugénol Chanal.
 Gloma.
 Glyctone phosphatée Char-
 rière.
 Goménol.
 Gouttes cholestérinées
 Dausse.
 Gouttes livoniennes de
 Trouette-Perret.
 Gouttes Nican.
 Gouttes paldophiles.
 Gouttes phospho-calci-
 ques.
 Gouttes scandinaves.
 Granulé Caresmel.
 Hé!ital.
 Hémocantitoxine Sofos.
 Hémosixine Branchu.
 Hémoglobine Deschiens.

Hémostyl du D^r Roussel.
 Héracléol.
 Hipposarcine Roy.
 Histocalcine.
 Histogénol.
 Huiles cholestérinées
 Dausse.
 Huile Gallina.
 Holos.
 Ioda.
 Iodarsenic Guiraud.
 Iodaseptine Cortial.
 Iodenterol.
 Iodo-Maisine.
 Iodonucléol.
 Ipeca-Digitale Dausse.
 Koch-I-Cide Leysin.
 Kolatinés.
 Lécithosine Robin.
 Lipocalcine.
 Liposplénine du D^r Groc.
 Malt Wander.
 Marinol.
 Micelliode.
 Miroxyl.
 Moréthyl Dausse.
 Morisland irradié.
 Morrhuallène Gautier.
 Morrhuétine Jungken.
 Morrhuol.
 Morrhuuxine.
 Morubiline.
 Musculosine Byla.
 Narcyl Grémy.
 Néovitalyne.
 Neuroplasma Fort.
 Neuroplasma Massif.
 Neuroplasmine Fort.
 Nucléarsitol Robin.
 Nucléophorine.
 Nuclhématoze.
 Oliolase Corbière.
 Opocalcium.
 Opocalcium irradié.
 Orexyl.
 Ostréine
 Ozobiase.
 Ozonaire.
 Panbiline.
 Pangaduine.
 Panhémol.
 Parathyrocalcine Mon-
 cour.
 Pélospanines.
 Péraziolodol.

Perles taphosote Lam-
 biotte.
 Persodine Lumière.
 Phagolysine.
 Phagosthyl.
 Phiamine.
 Phospharsyl.
 Phosphates du D^r Pinard.
 Phosphate vital de Jacque-
 maire.
 Phospho-fluor Beynet.
 Phospho-gaiacol Mary.
 Phosphopinal Juin.
 Phosol Quinet.
 Phosote Lambiotte.
 Phostaniol.
 Phytine Ciba.
 Phytogénine Byla.
 Pneumostyl Daguin.
 Polyminéral Fort.
 Poudre Paterson.
 Prévalidine.
 Pulmosérum.
 Quina Baron.
 Rézyl.
 Rhizotanin Chapotot.
 Sanas.
 Sarcosérum.
 Scléramine Dausse.
 Séroma.
 Sérum névrotone.
 Sérum végétal du D^r Cu-
 guillière.
 Sérum ferrugineux de
 Fraisse.
 Sidérarsan.
 Sirop Brahma.
 Sirop Famel.
 Sirop Lanchat.
 Sirop phéniqué Vial.
 Sirop Roche au Thio-
 col.
 Solution Pautauberge.
 Soluprotine Roche.
 Spasalgine Roche.
 Spectrol.
 Stérinase Vincent.
 Sthénoléine.
 Strychnal Longuet.
 Sulfoléine Rozet.
 Sylcase
 Tablettes oxymenthol Per-
 raudin.
 Tébéphaguine Fornet.
 Thalassotonine Vadam.


Thiocol Roche.
 Tiodine Cognet.
 Tonikéine Chevreton.
 Tonique Roche.
 Total Tonic.
 Tricalcine.
 Tridynol.
 Triganol Vigier.
 Triradol.
 Tubérol.
 Tymocalcine.
 Uroiodine.
 Uvé.
 Uvéstérol.
 Vanadarsine Guillaumin.

Vanadine Chevrier.
 Vanucléol.
 Végéphos.
 Vin de Baudon.
 Vin de Lavoix (voir beef
 Lavoix).
 Viosten.
 Vioxyl.
 Vitacalcine Moneou.
 Vitamorrhaine.
 Zimbyl.
 Zomine du professeur Ch.
 Richet.
 Zomo-musculosine By-
 la.

XX. — TUMEURS - CANCER

Algocratine.
 Aniodol.
 Backérine.
 C. 40.
 Cachets du Dr Boviel.
 Carbonal princeps.
 Chéloidine.
 Chloro-Magnésion.
 Clisémine Longuet.
 Delbiase.
 Diachusine.
 Doloma.
 Doloma injectable.
 Dragées Adrian au chlo-
 rure de magnésium.
 Electrocuprol.
 Electro sélénium.
 Gouttes halogènes du
 Dr Bérù.

Ixium.
 Magnésium Hardy.
 Mésothorium Buisson.
 Néolyses.
 Néoplalysines du Dr Ri-
 quoir.
 Œnophos.
 Orthogénol.
 Patholysine.
 Pellicules radifères du Dr
 Vallet.
 Plurion Couturieux.
 Pyrèthane.
 Radiolysine
 Sédol.
 Sélénol.
 Vernis à la Diachusine
 arsénicale.
 Verrulyse.



DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES

ABSURIC

Le meilleur solvant de l'acide urique
Le plus puissant antiseptique urinaire

Composition. — Citro-lactate de lithine,
Pipérazine, urotropine, sulfosalicylate
de quinoleine.

Indications. — Affections des reins et
de la vessie (néphrites, pyélo-néphrites,
cystites, urétrites, etc.), Gouttes, arthri-
tisme, gravelle, rhumatismes, artério-
sclérose, dysenterie amibienne.

Posologie. — 4 à 6 cuillerées à café par
jour dans un demi verre d'eau sucrée.

Le flacon : 14 fr.

Laboratoire BÉLIÈRES

19, Rue Drouot PARIS (IX^e)

ACÉCOLINE

(Acétycholine stabilisée).

Substance hypotensive, vaso-dilatatrice des
artérioles de la périphérie et des membres,
sédatrice des spasmes artériels ; excitante du
vague.

Indications. — Hypertension artérielle dans
toutes ses manifestations, Troubles vasculaires
par spasmes artériels, cérébraux, oculaires, etc.,
Maladie de Raynaud, Claudication intermit-
tente, Artérites sténosantes, Gangrènes juvé-
niles, séniles, etc., Déséquilibre vago-sympa-
thique, Coliques de plomb, Sueurs des tuber-
culeux.

Présentation et mode d'emploi. — Boîtes de
6 ampoules dosées à 2, 5, 10, 20 centigrammes
d'Acétylcholine stabilisée pour injections sous-
cutanées ou intra-musculaires.

Pas d'intolérance, pas de toxicité.

Littérature sur demande. Préciser les indications
qui intéressent.

Laboratoires LEMATTE et BOINOT,

Docteurs en pharmacie,
52, rue La Bruyère, Paris.

ACÉSINE GUILLAUMIN

Composition. — L'Acésine est une pommade à base d'extrait de capsules surrénales de chloré-tone et de stovaine.

Propriétés. — Agent analgésique et vasoconstricteur dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier, dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

Indications. — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

Mode d'emploi. — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes; quand les hémorroïdes sont internes, visser sur le tube, la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications trois ou quatre fois par jour.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS

ACÉTYLARSAN

Oxyacétylanilino-phénylarsinate
de diéthylamine.

Solution stérile, non irritante, injectable dans le muscle ou le tissu cellulaire sous-cutané. Bien toléré. Toxicité réduite.

Indications. — Arsénothérapie de la syphilis et des Spirilloses par les voies sous-cutanées ou intra-musculaires.

Présentation et posologie. — *Acétylarsan pour adultes* : solution à 23.6 %, 1 cc. = 0 gr. 05 d'Arsenic. Ampoules de 8 cc.

Acétylarsan infantile : solution à 9.4 %, 1 cc. = 0 gr. 02 d'Arsenic. Ampoules de 2 cc. Injections hebdomadaires ou bi-hebdomadaires (Consulter les Notices spéciales).

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

ACIMYL

Traitement des Affections du Tube digestif.

ACIMYL GRANULÉ

Composition. — Citrate trisodique, Pepsine, Essences stimulantes.

Indications. — Hypopepsies, Estomacs paresseux.

Doses. — Une à trois cuillères à café après les repas.

ACIMYL-POUDRE

Composition. — Antiacides, Citrate trisodique, Kaolin, Pancréatine, Phosphates.

Indications. — Hyperchlorhydrie, Estomacs suractifs.

Doses. — Par cuillères à café après les repas.

Propriétés. — Analgésie instantanée, Rééducation rapide.

Laboratoires RENÉ MONIMART

Docteur en Pharmacie

23, rue du Grand-Cerf — MEAUX (S.-et-M.)

ACODROS

Composition. — Préparation à base d'aconitine stabilisée, XX gouttes contiennent 1/10^e de milligramme d'Alcaloïde.

Action thérapeutique. — Décongestif, sédatif, analgésique, diaphorétique.

Indications. — Grippe, coryza, inflammations et infections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi. — *Adultes* : XV à XX gouttes 2 à 3 fois par jour dans un liquide quelconque.

Enfants (au-dessous de 5 ans) : 2 gouttes par année d'âge.

Prix : 10 francs.

Laboratoires BOUVELOT

62, rue d'Antibes, Cannes (A.-M.).

ACOLITOL

Topique intestinal.

Composition. — Charbon organique pur à pouvoir d'adsorption élevé. Carbonate de calcium pur amorphe, salicylate de Bismuth, Phosphate tribasique de Calcium pur, Peroxyde de magnésium, Belladone pulvérisée titrée.

Forme. — Granulé spécial, de goût agréable.

Propriétés. — Topique intestinal de choix, neutralisant et sédatif. Régularise les réactions chimiques du milieu intestinal, entrave les fermentations anormales et les putréfactions, modifie la flore microbienne, adsorbe les toxines.

Indications. — Colites, entéro-colites, typhocolites, stases colitiques, fermentations acides, dysenteries, entérites des tuberculeux.

Doses. — 1 cuillère à entremet délayée le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau tiède, et 1 cuillerée à entremet délayée dans 1/2 verre d'eau 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III, PARIS (VIII^e).

ACTINE

(Produits irradiés)

Forme. — Poudre légère dénuée de goût.

Indications. — *Reconstituant physiologique général*: Rachitisme, Troubles de croissance, Déminéralisation, Dentition, Gestation, Ostéomalacie, Allaitement, Anémie, Chlorose, Asthénie, Pré-tuberculose, Convalescence, Surmenage.

Composition. — Vitamines A. B. C. D. Ergostérine et phytostérine irradiées, Farines diverses irradiées, Saccharomices irradiées, jus de citron stabilisé, phosphate tricalcique et bibasique de K, Chlorure de calcium.

Mode d'emploi. — Se prend mélangé avec n'importe quel aliment, potage, purée, sauce, lait.

Dosologie. — 1 cuillerée à café à chacun des principaux repas, une demi-dose pour bébes.

Laboratoires de L'ACTINE

A. VELPRY,

Pharmacien de 1^{re} classe.

60, rue du Vieux-Pont de Sèvres —

BILLANCOURT (Seine)

A. D. GROSJEAN

Composition. — Sérum renfermant les principes actifs des bulbes frais de chevaux. Obtenu en milieu camphré. Suractivité par hypnisation.

Forme. — Délivré en boîtes, 12 ampoules 3 cc. avec dispositif permettant les projections nasales.

Indications. — Affections cytotoxiques et spasmodiques du Rhino-Pharynx : Coryzas, Rhumes de cerveau, Rhumes des Foins, Coqueluche, Mal de Mer, Asthme, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Gripes, Trachéites et Bronchites.

Posologie. — Une, cinq ou six ampoules par jour.

Laboratoires GROSJEAN

8, rue Larayette — PARIS (IX^e)

ADOVERNE " ROCHE "

Glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*

Action thérapeutique. — Cardiotonique, diurétique, eupnéique, neuro-sédative. Complète, remplace ou continue l'action de la digitale.

Indications thérapeutiques. — Toutes les insuffisances cardiaques et rénales. — Asthénies cardiaques, dyspnée, arythmies, œdème pulmonaire, œdèmes périphériques, hydropisies, etc.

Avantages. — Étalonnage physiologique. — Activité optima toujours identique. — Toute l'action utile de la plante elle-même. — Pas d'accumulation. — Pas d'accoutumance. — Pas de toxicité aux doses thérapeutiques. — Emploi facile. — Tolérance remarquable.

Posologie. — XXX gouttes ou 4 granules = 1 c. c. d'une solution à 5 % des glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Modes d'emploi. — Par voie buccale = XV à XXX gouttes ou 2 à 4 granules, 1 à 2 fois par jour et plus dans un peu de tisane ou de liquide.

Adoverne " Roche "

Gouttes (flacon de 15 c. c.).

Granules (flacon de 60).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges, Paris (III^e).

ADRAL

Constitution. — Poudre d'Algues sélectionnées, stabilisées, et privées de leurs sels minéraux.

Principes actifs. — 1° *Iode combiné organique* : modificateur le plus puissant de l'assimilation générale.

2° *Éléments organiques de choix* : Protéines, Graisses. Hydrates de Carbone.

Indications. — *Suraliment spécifique* pour bacillaires, convalescents et amaigris.

Avantages. — *Augmentation* rapide du poids des malades.

Formes. — *Cachets pour Adultes* : 2 à 5 par jour.

Granulé pour Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

37, Rue de Bourgogne — PARIS

ADRÉNALINE CLIN

Principe actif vaso-constricteur des glandes surrénales.

Formes. — Solution d'Adrénaline Clin au 1000^e, fl. de 5 10, et 30 cm³.

2° Collyre d'Adrénaline Clin au 1/5000^e et au 1/1000^e, en ampoules compte-gouttes de 10 cm³. Associations : Collyres Clin, Adrénaline-Esérine, Adrénaline-Cocaïne en ampoules compte-gouttes de 10 cm³.

3° Granules d'Adrénaline Clin, dosés à 1/4 de mgr.

4° Suppositoires d'Adrénaline Clin 1/2 mgr.

5° Tubes stérilisés d'Adrénaline Clin, en boîtes de 6 tubes ; en solution titrée à 1/10 de mgr. par cm³. en solution titrée à 1/4 de mgr., en solution titrée à 1/2 mgr., en solution titrée à 1 mgr. Associations : Tubes stérilisés Clin à l'Adrénaline-Cocaïne, Adrénaline-Stovaïne et Adrénaline-Syncaïne, en boîtes de 6 et 12 ampoules.

Doses. — Localement selon les nécessités. Voies stomacale ou rectale : V à XX gouttes par dose (solution à 1/1000^e), XXX gouttes en 24 heures. Voie hypodermique 1 mgr. d'Adrénaline par jour en 2 fois.

Laboratoires CLIN

PARIS

ADRÉNALINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Vaso constricteur, hémostatique, stimulant circulatoire, coexcitant du sympathique, fixateur du calcium.

Indications. — Rachitisme, coqueluche, tuberculose, dyspnées atoniques, hyposthénies, asthme, hémoptysie, etc.

Formes. — Ampoules de 1 c. c. boîtes de 6 et 12 au 1/4 de millig. au 1/2 millig., au millig. Solution au millième, flacons de 5, 10 et 30 gr.

Pharmacie Centrale de France

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV^e).

ADRENINE

Action. — L'ADRENINE possède une action :

- 1° Sur la pression sanguine ;
- 2° Sur le cœur ;
- 3° Sur les fibres musculaires lisses et plus électivement sur celles des petits vaisseaux ;
- 4° Sur la nutrition.

Posologie :

Per os **C** gouttes à dose fractionnées (toutes les heures, par exemple).

Injections sous-cutanées, 1 à 10 mmgr. par séries d'injections dans les 24 heures.

Pharmacie du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS

ADRÉNOCALCINE

Recalcifiant par excellence.

Formes :

Poudres. — Cachets. — Granulés.

Composition :

Association de glycérophosphates, hypophosphites, phosphates, fluorure de chaux et magnésie.

Posologie :

3 doses par jour.

Laboratoire ADAM

Docteur en pharmacie,
à Granville (MANCHE)

ADRÉNOLÉINE

INHALANT

Forme pharmaceutique et composition. — *Huile adrénalinée* au millième, avec addition de chlorétone, orthoforme et essences antiseptiques.

Propriétés. — Produit employé en ortho-rhino-laryngologie : vaso-constricteur, sédatif, antiseptique.

Avantages. — Tandis que l'adrénaline en solution aqueuse a une action *passagère*, l'adrénaline en solution *huileuse* étant absorbée plus lentement, sa *durée d'action* est considérablement *augmentée*, le pouvoir vaso-constricteur étant aussi élevé.

Indications thérapeutiques. — Si usites, hémorragies nasales, coryza spasmodique, rhume des foins, catarrhe nasal. Troubles respiratoires et coryza de l'enfance adénoïdites aiguës.

L'adrénoléine ne présente aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — En instillations (III à V gouttes dans chaque narine) 2 à 3 fois par jour, et en pulvérisations nasales avec un appareil à huile non métallique *avant* les inhalations.

Prescription. — Un flacon *Adrénoléine Falvy*.

Les Laboratoires A. FALVY

Licenciés-*sciences*

Ex-interne. Lauréat des hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias, Paris (XVII^e)

ADRÉPATINE

POMMADE — SUPPOSITOIRES

Association pluriglandulaire

Composition. — *Extraits d'Organes* : Foie. Surrénale, Thyroïde. Hypophyse, Prostate.

Extraits Végétaux : Marron d'Inde frais stabilisé. Cupressus, Hamamelis.

Excipient Antiseptique et Calmant.

Propriétés et Indications thérap. — L'Adrépatine est une préparation pharmaceutique qui :

1° Par les extraits polyglandulaires englobés ;

2° Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants ;

3° Par son action vaso-constrictive locale ;

4° Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique est destinée à combattre non seulement l'expression anatomique et les complications de l'affection primitive mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui président à la formation des hémorroïdes. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des *Hémorroïdes internes et externes, des Rectites et Prostatites, du Prurit anal, des Fistules.*

Mode d'emploi. — De 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de Pommade est muni d'une canule rectale.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e)

ADRIALGINE

Composition. — Dragées à base de triméthylxanthine et d'acide acétylsalicylique purs, associés au quinquina.

Action. — Antithermique, analgésique.

Indications. — Migraines, névralgies, douleurs intercostales, névrites, fièvre, grippe, rhumatisme, etc.

Mode d'emploi. — 2 dragées au moment des crises violentes.

ADRIAN et C^{ie}

9 et 11, rue de la Perle — PARIS

ADRIANINE

Composition. — Chlorhydrate d'adrénaline naturelle, retirée des glandes surrénales.

Avantages. — Action plus puissante et plus constante que celle de l'adrénaline synthétique.

Action. — Vaso-constricteur, décongestionnant, hypertenseur.

Indications. — Toutes celles de l'adrénaline.

Formes. — *Granulés* dosés à 1/4, 1/2 et 1 milligramme

Ampoules dosées à 1/2 et 1 milligramme.

Solution. — Demi-flacon, grand flacon à prendre par gouttes.

ADRIAN & C^{te}

9 et 11, rue de la Perle — PARIS

AÉROPHAGYL

Boîte de 45 comprimés.

Indications. — Spécifique de l'*Aérophagie* et de ses conséquences: insomnies, troubles cardiaques, nerveux et pulmonaires.

Posologie. — 1 comprimé délayé dans un demi-verre d'eau, au milieu des repas. En cas de crise 2 comprimés à la fois. Enfants 1/2 doses.

Composition. — Combinaison complexe constituée par l'association à une faible dose d'urofomine du citrate de sodium et des ions Br. et Ca.

Échantillons.

Laboratoire Q. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e)

ÆTHONE

*Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche
et de la Toux.*

Doses. — Pour les enfants, administrer :

5 à 6 fois par jour	{	de 1 mois à 1 an : Une goutte par mois d'âge.
		de 1 à 2 ans : 12 à 20 gouttes.
		de 2 à 5 ans : 20 à 25 gouttes.
		de 5 à 10 ans : 25 à 30 gouttes.
		de 10 à 15 ans : 30 à 35 gouttes. et plus s'il est nécessaire.

2° Pour les adultes, administrer : 5 à 6 fois par jour : 50 à 60 gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée ou de sirop, ou le tolu additionné d'eau. La dose totale pour les adultes peut être portée à 400 gouttes par 24 heures, s'il est nécessaire. L'Æthone doit être administré 1/2 heure avant, ou 2 heures après le repas.

FALCOZ et C^{ie}.

9, rue Boissonnade — PARIS

AGAMÉTOL

Traitement rationnel du paludisme.

Solution aqueuse à base de formiate de quinine dont la teneur en quinine (87.56 %) en fait le plus actif de tous les sels de cet alcaloïde.

L'Agamétol étant une solution rigoureusement neutre et stérile, *ne précipite pas* en présence du sérum sanguin. De ce fait, il est totalement indolore et ne provoque jamais ni réactions inflammatoires ni abcès.

Deux modèles :

Boîte de 12 ampoules 0.25, 2 c. c.

Boîte de 12 ampoules 0.50, 2 c. c.

Échantillon gratuit et notice au Corps Médical sur demande.

**Laboratoires des Établissements
H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III^e).

AGARASE

Composition :

Comprimés à base d'agar-agar, de ferments lactiques et d'extraits végétaux.

Action :

Réveille la tonicité de l'intestin, lubrifie la muqueuse, dissocie le bol fécal, supprime les fermentations.

Avantages :

Petits comprimés très faciles à avaler ; enrobage soluble dans l'intestin évitant les réactions gastriques ; répartition de la dose active en plusieurs comprimés ce qui évite une action brutale sur un segment isolé du tube digestif.

Pas d'accoutumance, pas de coliques.

Indications :

La constipation sous toutes ses formes, colites, entéro-colites, entérite muco-membraneuse, appendicite chronique.

Céphalées, obésité, artériosclérose, affections du foie.

Dermatoses.

Mode d'emploi :

Trois comprimés à chacun des principaux repas à prendre avec une gorgée d'eau sans croquer.

Pour les enfants, deux comprimés à chacun des repas.

Laboratoire G. REAUBOURG

1, rue Raynouard — PARIS

AGOCHOLINE

Stimulant hépato-biliaire.

Forme.

Granulé soluble agréablement aromatisé.

Composition.

Sulfate de magnésie desséché,
Peptone sèche purifiée.

Propriétés thérapeutiques.

Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires.
Réalise le drainage des voies biliaires *per os*, et
le rend facile en clientèle.

Indications.

Congestion du foie et de la vésicule biliaire,
Lithiase biliaire,
Ictère et Cholémie,
Cholécystites chroniques,

Certains troubles digestifs	{	Gastropathies réflexes, Inappétence, Nausées, Constipation.	} d'origine hépato-biliaire.
Certains troubles généraux	{	Céphalée, Migraines, Asthénie, Vertiges, Urticaire et Prurit, Certaines dermatoses.	

Contre-Indications. (Temporaires.)

Cholécystites aiguës.
Diarrhées aiguës.

Posologie.

Une à trois cuillerées à café dans un demi verre d'eau chaude le matin à jeun. Faire coucher ensuite le malade un quart d'heure sur le côté droit.

Commencer par les doses faibles surtout chez les malades présentant une grande sensibilité vésiculaire, les diarrhéiques, les lithiasiques; et augmenter graduellement jusqu'à trois cuillerées à café, suivant la tolérance du malade.

Prix : 18 fr. 50

Laboratoire P. ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie.
Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux
Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux

24 et 26, Rue de Fécamp — PARIS (XII^e)

Tél. : Diderot 28-96

AGOMENSINE CIBA

Substance protéolique extraite de l'ovaire, soluble dans l'eau.

Action Physiologique. — Favorise le flux menstruel, accélère le développement des organes et l'apparition des caractères sexuels secondaires.

Indications :

- I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées. Malaises qui précèdent ou qui accompagnent la menstruation.
- II. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale.
- III. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

Comprimés — Ampoules

Doses. — 3 à 9 comprimés par 24 heures, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 20 comprimés : 13 francs.

Le — de 40 — : 22 francs.

Le — de 100 — : 50 francs.

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

(Voir Sistomensine)

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

AIROGLYCE

Composition. — Préparation bismuthée (oxyiodogallate de bismuth spécialement porphyrisée) de consistance sirupeuse, de couleur café au lait.

Mode d'action. — Réalise le pansement et l'antiseptisme de la muqueuse urétrale.

Indications. — Blennorrhagie aiguë (à la période du déclin). Blennorrhagie chronique, en association à la médication locale (dilatation, massages, etc.).

Mode d'emploi. — Après avoir uriné, agiter le flacon et injecter, à l'aide d'une seringue urétrale, 5 cc. de liquide, conserver l'injection 2 minutes, puis prolonger progressivement jusqu'à 5 minutes. Éviter d'uriner autant que possible après l'injection.

Laboratoires PIALOUX

55, rue de Chabrol — PARIS (X^e).

AIROL " ROCHE "

Combinaison basique de bismuth oxyiodé donnant, au contact des plaies, de l'*ode à l'état naissant*.

AIROL " Roche ", en poudre.

Prop. théér. — Antiseptique puissant, désinfectant, cicatrisant, kératoplastique, sans odeur, inaltérable à la lumière ; toxicité moindre que celle de l'iodoforme (dont l'*Airol " Roche "* est le seul succédané pratique).

Indic. théér. — Toutes celles de l'iodoforme. Bien spécifier la marque " Roche ".

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

ALBUPLAST VIGIER

Composition.

Sparadrap adhésif caoutchouté à l'oxyde de zinc.

Avantages.

Suppression des bandes de pansement. — Préparé avec des substances adhésives de première qualité. — Ne se décolle jamais. — Supporté par des épidermes des plus délicats. — Se conserve très longtemps.

Indications.

Contention des pansements. — Traitement des dermatoses (urticaire, érythème polymorphe, ichtyose, furonculose).

Laboratoires VIGIER.

9, rue de la Gare, Levallois-Perret.

ALEPSAL GENEVRIER

Calmant non déprimant.

Spécifique: de l'Épilepsie, des Insomnies, des Convulsions. On l'emploie également avec succès, comme Hypnotique et Antispasmodique dans : Angines de Poitrine, Asthme, Spasmes du Larynx, cardiaques, vasculaires, etc.

Chaque comprimé renferme 0,10 de Phényléthylmalonylurée très pure associée à la Belladone stabilisée et à la Triméthylxanthine.

Posologie. — 2 comprimés par jour, matin et soir absorbés purs ou dans une boisson chaude
AUCUN RÉGIME SPÉCIAL.

« Avec l'ALEPSAL, les convulsions disparaissent sans observer de troubles psychiques; l'intelligence de l'ÉPILEPTIQUE s'éveille et son activité s'accroît normalement. » (D^r Ducoste, médecin chef des Asiles de la Seine).

Contre-indications. — Néant.

Prix.: Le tube : 9 francs.

Laboratoire GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS

ALEXIME

Anciennement " ALEXINE "

Composition. — Préparé par le procédé de Joulié est de l'acide phosphorique solidifié, assimilable, hyperactif.

Les résultats de L'ALEXIME sont remarquables et constants dans tous les états de déchéance organique.

Indications. — Anémies, Phosphaturie, Déminéralisation, Prétuberculose, Neurasthénie, Fatigue, Faiblesse, Impuissance.

Posologie. — 4 cuillerées à café par jour.

Échantillons et littératures au

Laboratoire A. LEBLOND

Pharmacien de 1^{re} classe,

Ex-interne des hôpitaux de Paris

51, rue Gay-Lussac — PARIS (V^e)

R. C. Seine 56 046

ALGATAN

Composition. — Hyposulfite-iodotannate de soude en milieu sulfocalcique fluoré. (Iode entièrement assimilable sans iodisme.)

Formes. — Cachets dosés à 1 gr.
Comprimés dosés à 0 gr. 50

Indications thérapeutiques. — *Tuberculose pulmonaire, intestinale et osseuse. Artério-sclérose. Emphyseme. Asthme. Catarrhe bronchique. Affections cardio-vasculaires. Rachitisme. Tertiarisme. Déchéance physique.*

Dose et mode d'emploi.

Enfants de 3 à 5 ans : 1/2 cachet ou 1 comprimé.
Enfants de 5 à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés.
Enfants de 10 à 15 ans : 2 cachets ou 4 comprimés.
Adultes : 2 à 6 cachets ou 4 à 12 comprimés.
Par jour au moment des principaux repas.

Laboratoires de L'ANIODOL

40, rue Condorcet — PARIS

ALGOCRATINE

(Citrates de Phénylamidoxanthine)

Forme. — Cachets de 0 gr. 75.

Indic. thér. — Migraines, névralgies, sciaticques. En général toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les cas de *régles douloureuses*.

Posologie. — Un cachet dès les premiers symptômes de douleurs, un autre une heure après si nécessaire.
Trois cachets par 24 heures.

Littérature, Échantillons :

LANCOSME

74, Av. Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e)

ALIBOURINE

Formes :

1° **Pommade** en tube de 50 grammes environ.

Composition :

Sulfates de zinc et de cuivre chimiquement purs,
Camphre, Oxyde de zinc, Essence de Niaouli,
Extrait d'Hamamélis et de Millepertuis, Lano-
vaseline.

Indications :

Eczémas suintants, Impétigo, Teigne, Plaies, Ulcères
variqueux, Erysipèle.

2° **Solution concentrée** : Flacon de 60 cc.

Composition :

A base de sulfates de cuivre et de zinc purs, donne
diluée dans un litre d'eau, une solution se
rapprochant d'une Eau d'Alibour un tiers et
chimiquement pure. Ces deux préparations
n'irritent jamais.

Laboratoires B. E. A.

Ph BEHA, Pharmacien de 1^{re} Classe **BELFORT**

ALIMENT TINARDON

Nutrition — Recalcification — Reminéralisation

Forme. — Poudre dosée pour la préparation,
soit au lait, soit à l'eau, d'un entremets agréable.

Composition :

Carbonate de chaux.	0 30	Lactose.....	2 50
Phosphate de chaux.	0 20	Caséine purifiée.....	0 50
Glycéroph. de chaux.	0 05	Arrow Root.....	4 »
Magnésie calc.née....	0 05	Sucre.....	12 »
Éléments céréalo-lé- gumineux.....	5	Cacao vanillé.....	8 50

pour 2 mesures

Posologie. — *Enfants* : 1 à 2 mesures par jour.
Adultes : 2, 3 ou 4 — — —

Indications. — Dégénérescence infantile, Scrofule.
Convalescence chez l'enfant et l'adulte.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} Classe,
de l'École Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

ALLISATINE " SANDOZ "

Tous les principes de l'*Allium Sativum* fixés sur du charbon activé et présentés en dragées, inodores, insipides.

Tolérance parfaite. Stimulant des fonctions gastriques, puissant anti-diarrhéique. Hypotenseur.

Dose. — 2 à 4 dragées d'Allisatine, trois fois par jour à la fin des repas.

Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e)

M. CARILLON, pharmacien de 1^{re} classe.

Dépôt général et vente :

Usine des Pharmaciens de France,
125, rue de Turenne — PARIS (III^e)

ALLOCAÏNE LUMIÈRE

Constitution.

L'*Allocaïne Lumière* est un corps synthétique qui répond à la formule :



Propriétés.

1^o L'*Allocaïne Lumière* est sept fois moins toxique que la Cocaïne

2^o Son pouvoir anesthésique est égal à celui de la Cocaïne

3^o Mêmes emplois que la Cocaïne.

Formes.

Solution A à 1/20%, pour anesthésie locale....	1 a. 25 cc.
Solution AA à 10%, pour anesthésie locale....	3 a. 10 cc.
Solution B à 20%, pour anesthésie régionale..	6 a. 2 cc.
Solution B à 20%, pour anesthésie régionale..	50 a. 2 cc.
Solution BB à 20%, pour art dentaire.....	100 a. 1 cc.
Solution C à 50%, pour rachianesthésie.....	6 a. 3 cc.
Solution J à 100%, pour badigeonnage usage externe et divers.....	5 a. 2 cc.

PRODUITS SPÉCIAUX
des LABORATOIRES LUMIÈRE

9, Cours de la Liberté, Lyon.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

L'Allochryssine Lumière représente le Thiopropanol sulfonate double d'or et de sodium dont la formule est la suivante : $C^6 H^{12} O^8 S^1 Au Na^2$.

Renferme environ 35 p. 100 de son poids d'or métallique. L'Allochryssine Lumière s'administre par *voie intra-musculaire*, application facile de la méthode aurothérapique dans la tuberculose sous toutes ses formes. L'Allochryssine Lumière est présentée en boîte d'une dose ; chaque boîte renferme deux ampoules pour une préparation extemporanée de la solution : une de 2 centimètres cubes Allochryssine à 0^{gr},20 ; une de 8 centimètres cubes de sérum artificiel.

De une à deux injections par semaine.

Produits spéciaux des
LABORATOIRES LUMIÈRE
9, cours de la Liberté — LYON

ALLONAL " ROCHE "

ANALGÉSIQUE RENFORCÉ

Action thérapeutique. — L'Allonal Roche est l'isopropylallylbarbiturate de diméthylamido-antipyrine, il représente les propriétés calmantes bien connues de la diméthylamido-antipyrine augmentées des propriétés sédatives et hypnogènes de l'acide isopropylallylbarbiturique ($C^{10} H^{14} O^3 Az^2$).

Indications thérapeutiques. — Douleurs, accès, névralgies empêchant le sommeil; insomnies légères ou tenaces associées à des phénomènes douloureux ou infectieux ou causées par le surmenage, la fatigue, la neurasthénie, agitation, excitation, délires, etc.

Avantages. — L'Allonal Roche ne contient ni opium, ni morphine, ni scopolamine, ni hyoscine, ni aucune substance du tableau B. Il peut être utilisé avec succès dans un grand nombre de cas où l'opium et la morphine sont indiqués. Il n'est pas toxique aux doses thérapeutiques qui peuvent être d'ailleurs largement dépassées; il ne donne pas lieu à des phénomènes d'accoutumance et il est toujours bien supporté; il calme la douleur, apaise l'excitation, donne un sommeil calme, physiologique, suivi d'un réveil normal; il n'a aucune action nocive ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur les poumons.

Comprimés.

Chaque flacon contient 12 comprimés. Chaque compr. = 0,16 isopropylallylbarbiturate de diméthylamido-antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 compr. p. 24 h. et plus selon les cas. Avaler les comprimés sans les croquer, av. un peu d'eau ou de tisane 1/2 h. av. ou 2 h. après les prises d'aliments.

Produits

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS (III^e)

ALLOPHAQUINA

(le cachet analgésique rationnel.)

Allophanate de benzyle...	10 centigr.
Pyramidon.....	30 —
Poudre de quinquina.....	10 —

Mécanisme d'action. — L'Allophanate de benzyle donne par hydrolyse, *in vivo*, de l'alcool benzylique antispasmodique à l'état naissant et d'une pureté absolue agissant comme un véritable mordant du pyramidon, de l'urée diurétique direct entretenant la perméabilité rénale. La poudre de quinquina protège la muqueuse stomacale de l'action brutale du médicament.

Toutes les Algies. — Articulaires, musculaires, nerveuses : 1 à 3 cachets par jour.

Laboratoire du Jécol

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine)

ALOÏNE HOUDÉ

Granules titrés à 2 centigrammes.

Aloïne Houdé

Principe actif cristallisé de l'aloès de Barbades.

Doses et mode d'emploi :

Comme laxatif :

1 à 2 granules le soir en mangeant.

Comme purgatif :

3 à 4 granules le soir en se couchant.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS

ALOYSINE

Pilules à base de suc d'ail

Sans saveur, sans odeur, ne communiquant à l'haleine aucune odeur alliagée.

Indications. — Entérites. Hypertension artérielle, Tuberculose, Bronchites chroniques, Catarrhes, Gangrène pulmonaire. Urticaire.

Posologie. — 6 à 8 pilules par jour (dans le traitement de l'hypertension interrompre 48 heures tous les 2 jours).

Pommade Aloysine. — Tuberculoses externes, Plaies suppurées, Dermatoses, etc.

Prix de vente { Pilules : 8 francs la boîte.
Pommade : 7 fr. le tube.

Laboratoire GOUZÈNE à PANTIN (Seine)

Dépôt général et vente en gros :

Pharmacie Centrale des Pharmaciens de France,
21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV^e)

ALUCOL WANDER

(Hydrate d'alumine colloïdal)

Réducteur d'HCl.

Traitement sédatif et curatif de l'hyperchlorhydrie et de l'autointoxication intestinale.

1^o Protection de la muqueuse stomacale par le mucilage colloïdal que forme l'ALUCOL au contact du suc gastrique hyperacide.

2^o Fixation par cette masse mucilagineuse des principes fermentescibles et entérotoxines.

Formes. — Cachets, comprimés et paquets.

Les paquets (dose spéciale 3 gr., pour pansement gastrique et traitement des états aigus).

Doses. — Un à deux cachets ou comprimés une heure avant et une ou deux heures après chacun des principaux repas. Le contenu d'un paquet dissous dans un peu d'eau sucrée, le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner et environ deux heures après le repas, midi et soir.

Le traitement peut être renforcé sans inconvénient suivant l'avis du médecin

Établissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

ALUNOZAL

Salicylatè basique d'alumine.

Associe aux effets antiseptiques de l'acide salicylique, l'action astringente et absorbante de l'alumine sous état gélatineux. Tolérance parfaite.

Indications :

Diarrhées aiguës et chroniques de toute nature, Diarrhée des nourrissons.

Posologie et mode d'emploi :

Prescrire par 24 heures, chez l'adulte :
2 à 10 comprimés à 50 centigr. ou 2 à 10 cuillerées à café de granulé à 25 %.

" SPÉCIA "

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

AMIBIASINE

(Extrait de garcinia composé).
(Accepté par le Service de Santé).

Non toxique — Sans contre-indications.

Solution brune stabilisée, de saveur amère.

Action. — Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales, du ténésme. Anti-hémorragique et antidiarrhéique énergique. Agit sur l'amibe et ses kystes.

Indications. — Diarrhées de toutes natures et origines. — Dysentérie amibienne, bacillaire. — Entérites chroniques, muco-membraneuse, tuberculeuse. — Diarrhée infantile, cholériforme.

Dose :

Formes aiguës : 6 à 12 cuill. à café « pro die » pendant 1 à 2 jours

Formes chroniques : 3 à 6 — — — — — 4 à 5 jours

Diarrhée infantile Formuler : Amibiasine B. B. ou

Manne en larmes 5 gr.

Eau bouillie..... 10 gr.

Amibiasine..... 15 gr. (3 cuill. à café).

(Dose à donner dans la journée et répéter pend. 3 à 4 jours)

Remplacer le lait par l'eau bouillie ou eau de riz-sucrée.

Prix : 12 fr. 50

Littérature et échantillons

Laboratoires AMIBIASINE

58, rue de Miromesnil — PARIS

AMIDAL

Amidon paraffiné — Ferments lactiques.

Forme. — Poudre, comprimés, cachets, dragées.

Indications. — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides, diarrhées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfactions intestinales, source d'artério-sclérose, appendicite chronique.

Mode d'emploi. — Deux à trois cuillerées à soupe ou six à huit comprimés, cachets ou dragées par jour.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^e)

AMINO-SEL BYLA

(en flacons-salières).

Composition. — Renferme des corps chimiquement définis, *extraits des féculents et des fruits* : glutamates et tartrates alcalins.

Propriétés. — *Condiment hautement sapide*, absolument inoffensif, de conservation indéfinie. Communique aux aliments *la véritable saveur* du SEL, en même temps que l'arôme de la viande.

Indications. — Tous régimes achlorurés et déchlorurés, albuminurie, affections circulatoires, hépatiques, néphrites aiguës, scarlatine, etc.

Mode d'emploi. — Saupoudrer les aliments avant de les consommer, au goût de chaque malade (ne jamais faire cuire avec les aliments).

Les établissements BYLA

26, av. de l'Observatoire, Paris. (R. C. Seine 71895).

AMPHO-VACCINS de RONCHESE

Lysat bactérien et bactéries traitées
par le brome.

Cinq vaccins injectables : anti-infectieux, anti-staphylococcique, intestinal, pulmonaire, urinaire.

Un vaccin à ingérer : intestinal.

Deux vaccins pansements : antipyrogène, rhino-pharyngien.

Composition, Avantages,

Indications, Posologie :

Voir pages 862-863-864

Vaccins de Ronchèse

AMPOULES BOISSY

pour INHALATIONS

AMPOULES BOISSY de NITRITE d'AMYLE

Indications. — *Angines de poitrine, Hémoptysies, Syncopes, Crises gastriques du Tabes, Mal de mer, Migraines, etc.*

AMPOULES BOISSY d'IODURE d'ÉTHYLE

Indications. — *Asthme, Emphysème, Coqueluche, Dyspnées de toute nature.*

Mode d'emploi. — Chaque ampoule est renfermée dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant l'étui vers les deux bouts, et respirer le liquide qui s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main.

Laboratoire BOISSY

49, rue Hoche, COURBEVOIE, près Paris

AMPOULES DE DIGALÈNE " ROCHE "

(Digitale injectable)

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale soublisées et injectables.

1 cc. = 0,15 cgt. poudre de feuilles fraîches de digitale.

Dose moyenne. — 1 à 4 ampoules et plus par 24 heures.

Prop. thér. — Solubilité parfaite, dosage rigoureux. — Action très rapide, tolérance absolue, effets constants aux mêmes doses, pas d'accumulation (Voir Digalène " Roche ").

Injectations. — Hypodermiques, intra-veineuses, intra-musculaires (indolores).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}
21, Place des Vosges — PARIS

AMPOULES NÉVROSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration indolore de la Strychnine par voie sous-cutanée, en association avec divers reconstituants et tonifiants.

Indications. — Asthénie, neurasthénie, surmenage physique et intellectuel, dépression nerveuse, adynamie.

I. — Névrosés héniques simples.

La dose de strychnine est constante : 1, 2, 3, ou 4 milligr. par ampoule selon la demande. Le type en est la série suivante :

Série A } Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.
Strychnine (Sulfate) 1, 2, 3 ou 4, milligr. suivant la demande.

II. — Névrosthéniques progressives.

Administration de la strychnine à doses progressivement croissantes. Chaque série comprend 24 ampoules et renferme 16 dosages de strychnine allant de 1 à 16 mill.

Le type en est la formule suivante :

Série A } Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.
Sulfate de strychnine.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Abriot. Paris (IV^e).

AMPOULES DE PANTOPON " ROCHE "

(opium total injectable)

1 amp. de 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon " Roche "

Doses et mode d'emploi. — Adultes: 1 à 3 amp. par 24 heures et plus. Enfants 1/4 à 1/2 amp. par année d'âge et par 24 heures.

Indic. thér. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Le PANTOPON " ROCHE " représente tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0,01 ctg. de Pantopon " Roche ",

= 0,50 ctg. de teinture d'opium,

= 0,025 mgr. d'extrait d'opium,

= 0,005 mgr. de morphine.

Boîtes de 3, 6, et 12 Ampoules.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co.

21, place des Vosges — PARIS

AMPOULES REIPAR

Composition. — Acide salicylique d'origine végétale et stabilisé par des procédés spéciaux.

Indications. — Tous les rhumatismes vrais, toutes les algies rhumatismales. Sciatiques.

Action. — Curative certaine. sédative très rapide.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, suivant les indications de la notice.

Prix : 15 fr. la boîte de 10 ampoules de 2 cmc.

Echantillon gratuit à réception d'une simple carte de visite adressée au

Laboratoire du REIPAR

LUCQUY — (Ardennes)

AMPOULES DE SÉCACORNINE " ROCHE "

(Tous les principes actifs de l'ergot de seigle)
(Voir page spéciale Sécacornine " Roche "),

Indic. thér. — Hémorragies de toute nature, myocardites, congestion des poumons et de l'encéphale, atonie utérine avant, pendant et après les accouchements.

Doses et mode d'emploi. — 1 ampoule de 1 cc. de Sécacornine " Roche " agit comme 4 grammes de seigle ergoté.

Doses moyennes : $1/3$ à 1 ampoule par jour.

Dose d'urgence : 2 ampoules et plus par 24 h.
(Voie hypodermique ou intramusculaire).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o

21, Place des Vosges — PARIS (III^e)

AMPOULES DE SPASMALGINE " ROCHE "

(Antispasmodique vrai)

Composition. — Chaque ampoule contient :

Un centigramme Pantopon " Roche ".

Deux centigrammes Papavérine " Roche ".

Un milligramme Atrinal " Roche ".

(Voir page spéciale Spasmalgine " Roche ".

Indications thérapeutiques. — Tous les états spasmodiques et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'estomac, de l'intestin, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation ante et post-opératoire, accouchements difficiles, tous états d'hyperexcitabilité, etc.

Doses et mode d'emploi. — Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour (par voie hypodermique et intramusculaire).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o

21, place des Vosges — PARIS

AMPOULES DE THÉOBRYL " ROCHE "

Indications. — Toutes les fois que la Théobromine n'a rien donné, qu'il y a intolérance gastrique ou susceptibilité des malades ou chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

Doses et mode d'emploi. — Chaque ampoule = 2 cc.

Dose moyenne utile : Adultes, 1/2 ampoule 2 à 4 fois par jour.

Enfants, 1/4 ou 1/2 dose.

Dose d'urgence... Adultes, 3 à 4 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

Enfants, 1 à 2 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

(Par voie endoveineuse ou intramusculaire).

Nota. — Les injections intramusculaires sont *indolores*; il faut les faire à la face externe de la partie fessière de la cuisse — (Voir thèse du Dr Jouisse, Paris 1920 et les travaux des Prof. Pouchet, Rémond, Duhot, des Drs Richard St-Yves, Vigouroux, Ségard, Bénech, etc.)

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, place des Vosges — PARIS (III^e)

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et vitamines
de croissance des Céréales germées

Formes. — Comprimés et Sirop.

Indic. théor. — Entérite et Dyspepsie (salivaire et pancréatique), Tuberculose, Rachitisme, Palpitations, (d'origine digestive). Maladies par carence digestion des féculents.

Mode d'emploi. — Deux comprimés ou deux cuill. à café de sirop 3 fois par jour après le repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou deux comprimés écrasés d'amylodiastase ou une cuillerée à café de sirop dans une bouillie ne dépassant pas 60°.

Prix : Le flacon sirop : 17 fr. 50

La boîte de comprimés : 13 fr. 75

**Laboratoire des Ferments
du Docteur A. THÉPÉNIER**

10 et 12, Rue Clapeyron — PARIS

R. C. 150.8

ANAPEPTONE VASSAL

Forme. — Comprimés de Peptone, remplaçant les cachets (conservation parfaite).

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique par excellence. Traitement rationnel des migraines, asthme, urticares, troubles intestinaux.

La boîte : 18 francs (4 tubes).

Échantillon gratuit sur demande.

Établissements Léon DANJOU
LILLE

ANAQUINTINE LESCÈNE

Composition. — Aldéhydes benzylocinnamiques, Thymol, Eucalyptol.

Forme. — Liquide légèrement rosé, entièrement miscible à l'eau.

Propriétés. — Puissant antiseptique diffusible. En applications sur la gorge et la poitrine, elle calme la toux, et réalise l'antiseptie des voies respiratoires.

Indications. — Traitement externe de la *Coqueluche*, des toux spasmodiques, asthme, laryngites, coryza, toux laryngées.

Associée au *Balsamol*, elle constitue le traitement conjugué des toux spasmodiques donnant des résultats remarquables particulièrement dans la *Coqueluche*.

Prophylaxie des maladies contagieuses en aspersion sur les vêtements, litige, draps, etc. et en inhalations froides. (Méthode de Milne).

Mode d'emploi. — La diluer de 4 à 5 parties d'eau chaude pour compresses sur la gorge et la poitrine, recouvrir de taffetas gommé et d'une bonne couche d'ouate, laisser en place toute la nuit.

En inhalations froides et en aspersions, l'employer pure.

Prix : 10 fr. sans compressé. — 12 fr. avec compressé.

Laboratoires LESCÈNE

LIVAROT (Calvados) - PARIS, 58, rue de Vouillé
Téléph. : Vaug. 08-19

ANDROSTINE CIBA

Hormone issue de la lignée spermatogénétique de la glande génitale mâle.

Action physiologique. — *Chez la femme :* Equilibrante de la sécrétion ovarienne et du système nerveux. Peut se formuler en association avec Agomensine ou Sistomensine suivant le cas. *Chez l'homme :* Activatrice de la spermatogénèse. *Dans les deux sexes :* Active le métabolisme basal, la combustion des graisses et des sucres.

Indications. — *Chez la femme :* Ménopause chirurgicale. Hypersthénie génitale, érotomanie, onanisme, troubles liés à la continence. Aménorrhée rebelle. *Chez l'homme :* Infantilisme, impuissance. *Dans les deux sexes :* Obésité, diabète. Comprimés, ampoules.

Doses. — 2 à 6 comprimés par jour, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

ANÉGRINE

Composition :

Composé de la série quinoléique, associé à l'Arbutine

Action :

Élimination rapide de l'acide urique. — Augmentation du pouvoir de sécrétion et d'excrétion du rein. — Excitation de la fonction cholagogue du foie.

Indications :

Goutte. — Rhumatisme articulaire aigu et chronique. — Sciatique. — Lumbago, etc..

Mode d'emploi :

Cas aigus — 6 à 10 comprimés par jour, en deux ou trois fois, dans un peu d'eau, pendant 3 ou 4 jours, diminuer progressivement les doses jusqu'à 4 comprimés par jour. Cas chroniques : 3 à 4 comprimés par jour, pendant 8 à 15 jours. Cesser 8 jours et reprendre.

Laboratoires RIVIER

26 et 28, Rue Saint-Claude — PARIS

ANEXOL

Antiseptique chloré, parfumé, non irritant.

Formes. — Double boîte de 80 comprimés.
Boîte de 40 —

Principe actif. — Sel sod. acid. sulfam.
Toluène monoch. (chloramine T.)

Doses. — Pour 1 litre d'eau chaude :

Gargarismes..... 1 à 2 comprimés.

Urologie et gynécologie... 2 à 4 —

Pansements des plaies 4 à 6 —

La dissolution des comprimés d'Anexol se fait immédiatement, même à froid.

Prix : 14 fr. la double boîte. La boîte : 8 fr.

LABORATOIRES DROUET ET PLET

Rueil-Malmaison (S.-et-O.).

ANGIOLYMPHE DU D^r ROUS

Prétuberculose — Tuberculose

Dans toutes ses manifestations : Pulmonaire, Ganglionnaire. Osseuse, Péritonéale, Rénale, Intestinale.

Indications :

Dans les formes pulmonaires.

DIMINUTION et DISPARITION de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs, de la Fièvre et de tous les Symptômes.

AUGMENTATION de l'appétit, du poids, des forces, du sommeil, amélioration rapide de l'état général.

DIMINUTION, DEGENERESCENCE et DISPARITION des BACILLES DE KOCH et autres microorganismes pathogènes.

Dans les formes ganglionnaires, osseuses, rénales, etc.

Amélioration rapide de tous les symptômes. Une boîte suffit d'ordinaire pour donner un commencement d'amélioration sensible.

Posologie. — De 2 à 5 cc. en une injection dans la fesse, faite quotidiennement, par série de 8 à 12, et reprise après 10 à 12 jours d'interruption.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE

MORO, Ph. de 1^{re} classe 15, av. de la Défense, Puteaux.

ANGIOXYL DU D^r ROUSSEL

Nature. — Extrait pancréatique hypotenseur à action trophique sur les vaisseaux, titré physiologiquement.

Indications :

- 1^o Hypertension artérielle,
- 2^o Angine de poitrine,
- 3^o Artériosclérose,
- 4^o Artérites de toute nature.

Forme. — En boîtes de 6 ampoules de 2 cc. chaque ampoule contenant 20 unités cliniques hypotensives.

Dose. — De 1 à 3 ampoules par jour en injection intra musculaire pendant 18 jours.

Aucune contre indication.

Laboratoire des PROXYTASES

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e)

Téléph. Littré 68-22, 23, 24.

ANIODOL

Le plus puissant antiseptique interne et externe diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformal glycérine
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

ANIODOL INTERNE

Forme. — Gouttes.

Indications. — Fermentations gastro-intestinales, diarrhée verte des nourrissons, entérites, dysenterie amibienne, gripes, catarrhe des voies aériennes, tuberculose, fièvres infectieuses, fièvre typhoïde.

Mode d'emploi et doses :

Nourrissons : III à V gouttes à chaque tétée.

Enfants : XX à L gouttes.

Adultes : XXX à CC gouttes.

Par jour dans un peu de lait ou de tisane, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas.

ANIODOL EXTERNE

Formes. — Solution normale ; solution concentrée ; comprimés ; poudre ; savons ; ovules ; vaseline.

Indications. — Obstétrique, gynécologie, chirurgie générale, maladies vénériennes et des voies urinaires, dermatoses, cancer, ophtalmologie, rhinologie.

Mode d'emploi et doses. — Normale : 1 cuillerée à bouche pour 1 litre d'eau. Concentrée : 30 gouttes ou 1 division pour 1 litre. Comprimés : (injections vaginales) 1/2 comprimé pour 1 litre d'eau. Poudre : (remplace les poudres dérivées de l'iode et du phénol). Savon : asepsie et désinfection des mains et des plaies. Ovules : (gynécologie) un ovule le soir. Vaseline : plaies, accouchements, rhinologie.

Laboratoires de l'ANIODOL

40, rue Condorcet — PARIS

Envoi d'échantill. gratuits à MM. les Docteurs.

ANTACIDYL

Composition. — Carbonate de bismuth.

Action. — Combat la suracidité gastrique. Aucune toxicité, ne constipe pas.

Indications. — Traitement de l'hyperchlorhydrie, ulcère de l'estomac.

Forme pharmaceutique. — Comprimés.

Dose. — 1 comprimé toutes les 5 minutes contre les douleurs de l'hyperchlorhydrie.

Dans l'ulcère, 1 ou 2 comprimés avant chaque dose de lait.

Prix : 18 francs.

Laboratoires DURET & RÉMY
ASNIÈRES (Seine.)

ANTALGOL DALLOZ

Composition. — Quino-Salicylate de pyramidon.

Forme. — Granulé.

Propriétés. — Analgésique par le pyramidon. Antiseptique par l'acide salicylique. Dissolvant de l'acide urique par l'acide quinique.

Indications. — Rhumatisme aigu ou chronique. Goutte. Lumbago. Sciatique. Migraines. Névralgies. Grippe. Contre l'élément Douleur en général.

Dose. — 2 à 4 cuill. à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans de l'eau.

Le flacon : 15 fr.

Laboratoire DALLOZ

13, Boulevard de la Chapelle — PARIS (X^e)

ANTASTHENE

Composition. — Reconstituant du système nerveux, à base de glycérophosphates associés à un extrait cérébral et spinal.

Formé. — Comprimés - Ampoules de 2 cc.

Indications. — Reconstituant du système nerveux ; particulièrement indiqué dans l'asthénie et tous les états dépressifs quelle qu'en soit l'origine.

MODE D'EMPLOI.

Enfants : 1 injection tous les deux jours.
2 comprimés par jour aux repas.

Adultes : 1 injection par jour.
4 comprimés par jour aux repas.

Prix : 48 francs la boîte (amp. ou compr.)

Laboratoire de Biologie Appliquée

H. CARRION & C^{ie}

54, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)

ANTHÉMA

Sérum sérique antihémorragique
des D^{rs} Dufour et Le Hello.

Médication basée sur les propriétés coagulantes du sérum d'animaux en état d'anaphylaxie.

Aucun inconvénient pour le malade.

Indications :

Hémorragies et États hémorragipares.
Hémoptysies. Hémostase pré-opératoire.

Posologie et mode d'emploi. — Injection du contenu d'une ampoule 10 cc., à renouveler au besoin après quelques heures.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

ANTHRAXONE-FORNET

Vaccin buccal contre la Furonculose

Principe actif. — Staphylocoques de différentes souches, spécialement préparés.

Indications. — Remplace avantageusement tout autre traitement de la Furonculose.

Posologie. — 1 à 3 pilules, trois fois par jour, une demi-heure avant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Fait disparaître les Furoncles naissants, fait mûrir les autres.

Service commercial et échantillons :

Laboratoires THAIDELMO

23, rue du Caire — PARIS (II^e).

Informations scientifiques et échantillons :

INSTITUT de MICROBIOLOGIE

SARRERBUCK

ANTIALGOS CHRISTIAENS

Solution diiodo-salicylate de colchicine en solution salicylée donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique.....	3 gr. 50
Colchicine.....	0 gr. 005
Iode (ce qui peut se combiner)...	1 gr. environ
Excipient, Q. s. p ^r 100 cm ³	

Dose et mode d'emploi. — *Accès* : Par 24 heures, 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois cuill. à soupe, suivant les cas.

Indic. thér. — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc. (Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action secondaire sur le cœur, le reins, le foie et l'estomac). *Calme l'accès en 24 heures.*

**LABORATOIRES DE LA PHARMACIE
DE LA PLACE ROYALE**

2, rue du Champ-de-Mars, Reims

Compte Postal Paris 234-33 R. C. Reims 4478

ANTIASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de
Solanées nitrées et Menthol

Mode d'emploi. — En faire brûler une petite pincée sur une soucoupe et, fermant les yeux, respirer doucement la fumée par les narines.

Indications :

Contre les accès d'*Asthme*, *Emphysème*,
Dyspnée des *Bronchites chroniques* et *Catarrhes*,
Oppression des *Gazés*, *Coryza*, etc.

CIGARETTES SCHULZÉ-BENGALAIS

aux mêmes principes

Échantillons gratuits au Corps médical et aux
Malades sur recommandation du médecin traitant.

Laboratoires FAGARD

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-sur-SEINE
Tél. : Molitor 07-05.

DERNEVILLE

7, rue Joncker — BRUXELLES — Téléph. 111-7

ANTI-ASTHME DEHAUSSY

Composition et propriétés. — A tout *asthme*, quelle que soit sa forme, il faut une *même médication de fond*, visant le déséquilibre vago-sympathique commun à tous ces malades (Lobélie, belladone, adrénaline, calmants anti-asthmiques divers).

A chaque forme d'asthme, il faut, en outre, sa *médication complémentaire spéciale*. C'est pourquoi à la médication de fond ci-dessus, on a ajouté, selon la forme d'asthme à traiter, des agents complémentaires différents (iodure, expectorants, balsamiques, eupnéiques....), — L'Anti-asthmine se présente donc sous les trois formes suivantes :

Anti-Asthmine A (pure). — *Asthme pur*, sans expectoration ou avec expectoration difficile.

Anti-Asthmine B (balsamique). — *Asthme vieilli* avec bronchite chronique et emphysème.

Anti-Asthmine C (toni-cardiaque). — *Asthme vieilli* avec tendance à l'insuffisance cardiaque.

Les états asthmatiformes des vieux touseurs, avec dyspnée survenant par paroxysmes sont de même justiciables de l'Antiasthmine.

Doses et mode d'emploi. — **Sirop** : Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour. A dix ans, 2 à 3 cuillerées à café par jour — **Pilules** : Adultes, 4 à 6 par jour ; dix ans, 2 à 3 par jour.

Laboratoires Ed. DEHAUSSY

36, rue Nationale — LILLE

ANTIGÉNINES

Vaccins par voie buccale.

500 milliards de microbes par ampoules de 20 centimètres cubes.

Boîte de 6 ampoules de 20 centimètres cubes.

Antigénine C. E.

Colibacilles-Entérocoques ; Entérite, Appendicite, Syndrome entéro-rénal, Diarrhée infantile.

Antigénine C.

Colibacilles polyvalents ; Colibacillose, Pyélonéphrites gravidiques.

Antigénine S.

Staphylocoques polyvalents ; Anthrax, Furunculose, Staphylococcies.

Antigénine E. P. S.

Entéro-Pneumo-Streptocoques ; Grippe et ses complications, Fièvres puerpérales, Angines.

Antigénine T. A. B.

Bacilles typhiques, Para A. et Para B. : Fièvres typhoïde et paratyphoïdes.

Posologie. — Donner le contenu d'un flacon-ampoule dans de l'eau sucrée ou dans une infusion aromatisée au gré du malade, matin et soir bien à jeun, une demi-heure au moins avant toute alimentation.

Aux nouveau-nés et enfants : Donner de un demi à un flacon-ampoule, suivant l'âge.

Vaccins par voie hypodermique.

Même série que les Antigénines, vaccins par voie buccale.

Faire une injection hypodermique, tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, suivant le cas, en commençant par un demi-centimètre cube, augmenter d'un demi-centimètre cube chaque fois, jusqu'à deux centimètres cubes.

Bouillon-Antigénine pour pansements.

Rhino-Antigénine pour instillation nasale ou otique.

Ovules-Antigénines métrites et toutes leucorrhées.

Laboratoire des ANTIGÉNINES

1, place Lucien-Herr — PARIS (V^e)

(Anciennement 43, rue Tournesfort)

Gobelins 26-24

ANTIGRIPPINE MIDY

Cachets dosés à 0 gr. 65.

Poudres d'Aconit, de Belladone, de Gelsemium et de Dover, Caféine. Phénacétine et Pyramidon, Codeïne (1 cgr. par cachet).

Ne contiennent ni quinine ni antipyrine.

Dose et mode d'emploi. — Pour les adultes, dès le début de la grippe, prescrire 1 cachet dans un grog chaud, de préférence à distance du repas et au moment de se coucher. Renouveler au besoin 2 heures après. Le lendemain et jusqu'à la fin de l'attaque, un cachet matin et soir.

Propriétés thérapeutiques. — Antithermique, Analgésique, Bactéricide.

Indications. — Grippe, Influenza, Rhume, Coryza, Maux de tête, Courbatures, Névralgies.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e)

ANTIPHI

Le plus rapide reconstituant.
Médication Arsénio-phosphorée.

Formes. — Solution. Elixir.

Indications. — Etats prétuberculeux. Tuberculoses apyrétiques. Surmenages. Anémies. Convalescences. Neurasthénies. Enfants chétifs.

Posologie. — Deux cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires de l'ANTIPHI.
JEAN CAPIN, Pharmacien,
à Roquefort (Landes).

ANTIPHLOGISTINE

Composition. — Glycérine, kaolin, petite proportion d'iode, d'acides borique et salicylique, huiles essentielles (menthe, gaulthéria, eucalyptus).

Propriétés. — Chaleur constante pendant 12 à 24 heures. Cataplasme idéal. Action osmotique et exosmotique de la glycérine agissant à travers la peau sur les liquides organiques chargés de microorganismes qu'il attire et engloutit.

Indications. — Toutes affections nécessitant l'action d'une chaleur constante ou une lutte contre l'infection interne ou externe : Pneumonies, Pleurésies, Bronchites, Rhumatismes, Gouttes, Phlegmons, Furoncles, Orchites, Mastites, Conjonctivites, Plaies infectées, Gynécologie, etc.

Particularités. — Pâte molle, se délivre en boîtes fer blanc embouties de 150 gr., 325 gr., 500 gr., 1 kil., 2 kil. 500. Se chauffe au bain-marie, s'étend directement sur la peau; on recouvre d'ouate. Action manifeste et soins rendus faciles.

Laboratoires de l'Antiphlogistine

B. TILLIER, Pharmacien 11, rue du Petit Parc.
Saint-Maur, près Paris. *R. C. Seine 56.956*

ANTIPHLOGOSINE

Préparation stérile, réfrigérante et adhésive à base d'éther et d'alcool pour le traitement de toute réaction inflammatoire.

Propriétés. — Calme la douleur, abaisse la température locale, diminue le volume de la tuméfaction, isole du contact de l'air, atténue rapidement la rougeur inflammatoire.

Indications. — Lymphangites, fluxion dentaire, tuméfaction douloureuse, contusions, engorgement et abcès du sein, érysipèle, réactions péritonéales, salpingite, infection puerpérale.

S'emploie en badigeonnages, loin d'une flamme ou du feu.

Pharmacie V. HOUSSAYE

126, rue de la Pompe, Paris (XVI^e).

ANTIPHYMIQUE VADAM

Huile iodée, cholestérinée, gaïacolée, goménolée, eucalyptolée et Cinnamate de benzyle.

Indications.

Traitement de toutes les affections infectieuses pulmonaires (bacillaires ou parabacillaires).

Résultats immédiats chez les malades curables (Antisepsie, Cicatrisation et Histogénèse).

Dose.

Une injection rigoureusement indolore tous les deux jours.

Prix au public, boîte de 12 ampoules : 22 fr.

Demander Échantillons et Littérature aux

Laboratoires J. PLÉ

Docteur en Pharmacie.

111 bis, rue de Turenne. — PARIS (III^e)

ANTIPSORINE

Solution dans l'Huile de Vaseline de Monosulfuré de Paracrésyl et de Benzoate de Benzyle.

Indications et mode d'emploi :

Gale : Faire 2 jours de suite 2 onctions sur toute la surface du corps, sans frictions ; 24 heures après, prendre un bain chaud avec savonnage soigné.

Pédiculose de la tête et du pubis, acné, eczéma séborrhéique, pellicules, etc...

Inodore et non irritante.

Présentation. — En flacons de 150 cc (quantité suffisante pour deux onctions générales de tout le corps.)

Prix de vente au public : 18 fr. le flacon.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue Gravel, à LEVALLOIS (Seine)

ANTIRRHOIDE

Huile indienne : Balaninum, Lentiscum,
Myagrium, Laurum, Spirea, etc.

Indications. — Traitement des hémorroïdes.

Mode d'emploi. — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibe largement avec l'huile ANTIRRHOIDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les amoules et bourrelets extérieurs, d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oubli, avant et après chaque garde-robe.

Pour les hémorroïdes internes, employer des SUPPOSITO-CONES ANTIRRHOIDES qui plongés dans l'huile antirrhoïde doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Le grand flacon : 22 fr. 40. — Le demi-flacon : 12 fr. 80
La boîte de supposito-cônes : 9 fr. 60.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e)

ANTIVIRUS

Bouillons-Vaccins filtrés, pour pansements
spécifiques microbiens.

1^o **Antivirus Staphylococcique.**

2^o **Antivirus Streptococcique.**

3^o **Antivirus mixte** (Strepto-Staphylococcique).

4^o **Antivirus Coli-bacillaire,**

3 ampoules : 10 cc. ; Prix : 12 fr.

5^o **Antivirus puerpéral** (Streptococcique).

2 ampoules : 50 cc. ; Prix : 20 fr.

Atoxicité absolue

Conservation indéfinie en ampoules scellées.

“ LA BIOTHÉRAPIE ”

131, Rue Cambrenne — PARIS (XV^e)

Téléphone : Vaugirard 49-20

ANTONAL

Traitement rationnel et polyvalent de l'hypertension vasculaire. — Spécifique des scléroses artérielles et viscérales. A base de principes dynamogénétiques du gui. — Diméthylquinoxanthine. — Extrait total hépatique.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament d'une grande efficacité par son action à la fois diurétique, antitoxique et hypotensive, d'où son indication dans l'hypertension vasculaire et les maladies qu'elle accompagne: Artériosclérose, Cardiopathies artérielles, Angine de poitrine, Ménopause, Congestions, hémorragipares, Néphrites, etc.

Deux formes :

Cachets : 1 à 3 par jour. — Comprimés : 2 à 6 par jour.

Prix : { 10 fr. la boîte de cachets
 { 12 fr. la boîte de comprimés } sans impôt.

Littérature et échantillons :

Laboratoires CARESMEL

2, quai Paul-Bert — TOURS

Téléphone : 19-42.

ANUSOL MIALHE

Iodo résorcino sulfite de bismuth.

Forme :

Suppositoires ; pommade.

Indications :

Hémorroïdes.

Agit également bien contre la constipation, prostatites, etc.

Dose :

Un suppositoire matin et soir.

Pharmacie du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS

APHLOÏNE TROUETTE-PERRET

Elixir contenant en totalité les principes extractifs des plantes tropicales : Aphloïa, Piscidia, Hamamelis, Hydrastis et Viburnum.

Indications. — Spécifique des troubles de la Ménopause, de la Puberté et du Système veineux (varices et hémorroïdes).
Sédatif utéro-ovarien.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café par jour aux principaux repas.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeubles-Industriels

PARIS (XI^e)

APHOSAL

Spécifique de l'insomnie.

Chez les cardiaques, les dyspeptiques, les surmenés.

Composition. — Chloralose chimiquement pur, préparé d'après les travaux des professeurs Ch. Richet et Hanriot.

Présentation. — Tube de 2 cachets de 20 centigr.

Propriétés thérapeutiques. — Procure un sommeil réparateur, sans cauchemar, avec réveil agréable. Non toxique, sans action sur le rein, ni l'estomac. Tonique du cœur.

Posologie. — Un cachet dans un verre d'eau ou d'infusion avant le coucher.

Prix : 9 fr. 75

Laboratoires de l'APHOSAL

48 bis, avenue Mozart — PARIS (XVI)

Usine à Nanterre.

APIOLINE CHAPOTEAUT

Composition. — Principes actifs de l'apium petroselinum.

Indications. — Troubles de la menstruation, Douleurs cataméniales, Ménorragies, Aménorrhée.

Action. — L'APIOLINE régularise les règles et calme les douleurs qu'elles provoquent. Son action est supérieure à celle des autres emménagogues. Complètement inoffensive, reste sans action sur la grossesse.

Mode d'emploi. — 4 à 5 jours avant l'apparition des règles et pendant toute leur durée, prendre 2 à 3 capsules par jour au moment des repas.

**LABORATOIRE
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
D^r PH. CHAPELLE, 8, rue Vivienne, PARIS**

AQUINTOL PETIT-MIALHE *COQUELUCHE*

Chloro. — Bromo. — Fluor.

Modifie, dès les premiers jours, la toux. Le malade n'éprouve plus de suffocation ni de vomissements, il retrouve l'appétit et le sommeil.

Dose :

Au-dessous de 6 mois :	2 à 4	cuillerées à café
Moins de 5 ans :	3 à 8	— à café
Moins de 5 et 15 ans :	4 à 8	— à dessert
Adultes :	5 à 8	— à soupe

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.

Pharmacie du Docteur MIALHE
8, rue Favart — PARIS

ARDOGÈNE

Elixir fortifiant, Reconstituant physiologique, Stimulant énergétique Hyperleucocytaire, Antichlorotique.

Indications. — Convalescence, Faiblesse générale, Chlorose, sous toutes ses formes, Grippe, Neurasténie.

Une cuillerée à soupe contient :

Arrhénal.....	15 milligr.
Phosphate de Soude.....	15 centigr.
Quinium.....	45 milligr.
T ^{re} de Noix vomique :	III gouttes.
Extrait ; Flacon de Kola :	XX gouttes.

Doses :

Adultes : Une cuillerée à soupe ou un verre à liqueur midi et soir avant les repas.

Enfants : A partir de 10 ans une cuillerée à café midi et soir avant les repas.

Flacon : 20 fr.

Laboratoire LEPORCQ

à Enghien, 9, rue du Temple

ARGYEIL

Composition. — Complexe de Vitellinate d'argent (Argyrol de BARNES) et de bile.

Forme. — Liquide.

Indications. — Traitement de l'ozène, infections aiguës ou chroniques du nez et de l'arrière-nez. Donne d'excellents résultats en association avec le vaccin local.

Mode d'emploi. — Par le médecin traitant : Badigeonnages. Pour le malade : prescrire en pulvérisations : 2 à 3 coups de poire dans chaque narine, 2 ou 3 fois par jour.

Littérature échantillon
LANCOSME

71, Avenue Victor-Emmanuel III — PARIS (8^e)

ARGYCUPROL

Traitement intégral et polyvalent
de la BLENNORRAGIE.

Injection urétrale non caustique, absolument indolore et ne provoquant jamais de rétrécissement.

Composition. — Argent colloïdal (10 %), détruit le gonocoque Cuivre colloïdal (0,1 %), attaque les microbes associés.

Forme. — Boîte de 6 ampoules-injections.

Indications. — Activité remarquable et tolérance parfaite aussi bien dans les urétrites les plus aiguës que dans les urétrites chroniques.

S'emploie en injections urétrales dans les cas aigus, en grands lavages dans les cas chroniques; en compresses sur les bourses dans les orchites blennorragiques, en instillations dans les conjonctivités blennorragiques.

Chez la femme, la blennorragie, les métrites, les vulvites et vulvo-vaginites sont justiciables du traitement par l'Arg. cuprol.

Laboratoire de l'ARGYCUPROL

4 bis, rue Hébert, COURBEVOIE (Seine).

MORO, ph. de 1^{re} cl., 15, av. de la Défense, Puteaux.

ARHÉMAPECTINE GALLIER

Antihémorragique

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la guerre et de la marine.

Solution isotonique, stérile, non toxique, non anaphylactisante de *Pectine*, associée à son coferment minéral (Calcium).

La **Pectine**, agent hémostatique vrai, augmente le pouvoir coagulant du sang, sans provoquer de modification de la tension, sans action sur les fibres musculaires (H. Violle et L. de Saint-Rat, C. R. Ac. Médec., 4 nov. 1924).

Formes pharmaceutiques :

Boîte de 4 ampoules de 20 cc.

Boîte de 2 ampoules de 20 cc.

Ovules, la boîte de 6.

Indications et Posologie. — *A titre thérapeutique* : Toutes Hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Métrorragies, etc., Hémorragies post-opératoires, etc.

Faire boire, dans un peu d'eau sucrée, 1 à 4 ampoules, en 2 heures, selon la gravité de l'hémorragie.

A titre préventif : Chirurgie générale et spéciale, oto-rhino-laryngologie, odontologie obstétrique, etc.

Une à quatre ampoules durant les dix heures qui précèdent l'opération. Dans les cas d'urgence l'*arhémapectine* peut être employé en injection *sous-cutanée* à raison de 10 cc.

Ne présente aucune contre-indication.

Laboratoire R. GALLIER

Pharm., Ex-interne des Hôpitaux de Paris

38, bd du Montparnasse — PARIS (XV^e)

Téléph. : Littré 98-89

ARHÉOL

Formule. — $C^{15}H^{24}O$.

Composition. — Principe actif de l'essence de santal.

Forme. — Fl. de 40 capsules contenant chacune 0 gr. 20 environ de produit.

Prop. thér. — Antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections des voies urinaires. Produit chimiquement pur n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal, supérieure elle-même aux essences de Cèdre.

Indications. — Blennorrhagie et blennorrhée, cystites, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

Dosé. — 10, 12 capsules par jour, en 3 fois : le matin, à midi et le soir avant les repas.

Prix : 20 fr.

Laboratoires P. ASTIER

41 et 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e)

ARHINE LAMBIOTTE FRÈRES

Composé formaldéhydo-gaïacolo-tannique chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

Prop. thér. — Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

Indications. — Réalise la véritable thérapeutique causale de l'Ozène, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Excellent agent curatif du coryza, des rhinites et rhinopharyngites.

Mode d'emploi. — On l'utilise soit en insufflations, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boriquée tiède ; 2 ou 3 fois par jour et le soir au coucher dans les coryzas, rhinites, maux de gorge.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, Rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e)

124, Avenue Rogier — BRUXELLES

ARQUÉRITOL LESURE

Huile injectable d'amalgame d'argent
à 40 % de mercure.

Mode d'emploi. — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigrammes Hg.

Indications. — Toutes manifestations syphilitiques.

Avantages. — Injection non douloureuse, absence de nodosités, tolérance parfaite grâce à l'action propre de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Flacon de 5 gr. : 22 fr.

Pharmacie VIGIER-LESURE

70, rue du Bac — PARIS

ARRHENAL ADRIAN

Composition :

Méthylarsinate de soude chimiquement pur.

Action :

Réalise le traitement arsenical par voie buccale avec tolérance parfaite. même chez les personnes les plus délicates. Remplace avantageusement le cacodylate de soude.

Indications :

Dermatoses, tuberculoses pulmonaire et viscérale, broncho-pneumonie, grippe, lymphatisme, scrofule, états de débilité, vomissements de la grossesse, arthritisme, asthme, intoxication palustre.

Formes et mode d'emploi :

Gouttes : 10 à 20 gouttes par jour, dosées à 2 milligr. en 2 fois. Ampoules : à 50 milligr. et à 100 milligr. ; 1 à 2 par jour. Granulés à 1 et 2 cgr. : 2 à 6 par jour. Comprimés à 0,025 : 1 à 3 par jour.

ADRIAN & Co

et 11, rue de la Perle — PARIS

ARRHÉNOMARTIOL

Composition. — Complexe de fer colloïdal électrique (Electromartiol) et de cacodylate de soude ou métharsinate de soude.

Propriétés. — Hématopoiétique, régulateur de la nutrition, analeptique.

Applications. — Anémie essentielle ou symptomatique, Asthénie nerveuse, Convalescences, Anorexie.

Formes :

Ampoules d'Arrhénomartiol: Boîte de douze ampoules.

Gouttes d'Arrhénomartiol : Flacon de 25 cc.

Laboratoires CLIN

PARIS

ARRHÉNUCLÈNE BERGEVIN

Compos. — Complexe de Ferro-manganèse codiastatique, Arrhénal, Sulfate de Strychnine et Fluorure de Calcium.

Propriétés. — Hématopoiétique, phagocytogène et névrosthénique.

Indications. — Toutes les anémies et les asthénies et plus particulièrement la chloro-anémie des adolescents.

Mode d'emploi. De 7 à 11 ans, 1 pilule midi et soir ; 12 à 18 ans, 1 pilule matin, midi et soir ; à partir de 18 ans, 2 pilules midi et soir avant les repas.

Après 8 ou 15 jours de traitement, interrompre pendant une semaine, pour reprendre ensuite jusqu'à guérison.

Prix : 15 francs la boîte de 60 pilules.

G. BERGEVIN

Docteur en pharmacie

CHATEAUDUN (E.-et-L.).

ARSAMINOL

Composition. — 3 acétylamino 4 oxyphénylarsinate de diéthylaminoéthanol, arsenical pentavalent (concentration : 26,13 p. 100).

Propriétés. — La toxicité de l'Arsaminol est environ six fois moindre que celle du 606 ou du 914. Élimination complète par l'urine au bout de quarante-huit heures.

Applications. — *Syphilis* (traitement d'assaut ou de consolidation), *Hérédo-Syphilis*, *Spirochétoses*, *Pian*, *Amibiases*, *Trypanosomiases*, *Paludisme*, *Diarrhées*, *Dysenteries à flagellés*.

Formes. — Ampoules de 3 ou de 5 centimètres cubes titrées à 5 centigr. d'arsenic par centimètre cube. Boîte de 4 ampoules. L'Arsaminol infantile est délivré en boîte de 10 ampoules de 1^{cm}³,5 titrées à 25 milligr. d'arsenic par centimètre cube.

Laboratoires CLIN
PARIS

ARSÉNICAUX BOUTY

Tous les produits arsénicaux présentés par les LABORATOIRES BOUTY sont à base d'acide méthylarsinique remplaçant, avantageusement dans tous les cas, l'acide cacodylique.

Gaiarsol Bouty (Méthylarsinate de Gaïacol.)	$\left\{ \begin{array}{l} 1^{\circ} \text{ ampoules de 1 c. c. ren-} \\ \text{fermant 0,05 de sel.} \\ 2^{\circ} \text{ solution renfermant} \\ \text{0,05 de sel par XX} \\ \text{gouttes.} \\ 3^{\circ} \text{ sirop renfermant 0,04} \\ \text{de sel par cuillerée à} \\ \text{soupe.} \end{array} \right.$	Tuberculose Affections pulmo- naires.
Sérosthényl Bouty. (Méthylarsinate de strychnine glycérophos- phaté.)	$\left\{ \begin{array}{l} 1^{\circ} \text{ ampoules de 1 cc. ren-} \\ \text{fermant 0,001 de mé-} \\ \text{thylarsinate de stry-} \\ \text{chnine et 0,10 de glycé-} \\ \text{rophosphate de soude.} \\ 2^{\circ} \text{ solution d.sée par} \\ \text{XX gouttes comme} \\ \text{une ampoule.} \end{array} \right.$	Asthénie Faiblesse constitu- tionnelle.

Laboratoires BOUTY
3, rue de Dunkerque — PARIS
Téléphone : Nord 51-64.

ARSÉNIODE BURIAT

Forme Gouttes. — Solution inaltérable de tri-iodure d'arsenic méthylarsinée à 1 %.

Indications. — Tuberculoses torpides à manifestations lymphatiques, chlorose symptomatique de tuberculose, anémies, convalescences (fixation d'oxygène).

Emphysème pulmonaire et manifestations du syndrome asthmatique-arthritique.

Mode d'emploi. — Doses moyennes.

Enfant : 2 gouttes par 24 heures et par année d'âge.

Adultes : 15 à 30 gouttes, 2 fois par jour.

Laboratoire BURIAT

25, rue Copernic — PARIS (XVI^e).

ARSYCODILE

Cacodylate de Soude pur

Formes. — Ampoules dosées à 0,05, 0,10, 0,20 et 0,50 pour applications progressives (*bien spécifier*).

Indic. thér. — Accélérateur de la nutrition générale, ramenant l'appétit, etc.

Tout spécialement désigné pour l'usage sous-cutané.

Doses et mode d'emploi. — Une injection par jour pendant huit jours, repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

La première spécialité à base d'arsenic organique (1900).

Laboratoires du Dr M. LÉPRINCE

62. Rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

ARTÉRION VINCARDI

Principes actifs. — Complexes vitaminés et stabilisés extraits du *Viscum album*, de l'*Allium sativum*, du *Fucus vesiculosus*, du *Citrus limonum*.

Forme. — Capsules enrobées de gluten, ne se dissolvant qu'au contact des sucs intestinaux.

Innocuité absolue, tolérance parfaite. Pas de contre indication.

Indications. — Hypotenseur, sclérolysant, diminue la viscosité du sang. — **Action élective** au niveau des capillaires qu'il dégrasse et assouplit. — Artériosclérose. — Hypertension, scléronéphroses, présclérose.

Doses. — 5 à 6 capsules par jour aux principaux repas.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire de l'Artérion VINCARDI

Ph. VIGUIER, pharmacien

42, Avenue Borriglione — NICE (Alpes-Maritimes)

Chèques postaux, Marseille 105-38

R. C. Nice 9046.

ARTERIO-VEININE

Composition. — Crataegus, passiflora, gui, marrons d'Inde, hamamélis (Extraits stabilisés) iode peptonisé.

Indications. — Troubles de la Ménopause, artério-sclérose, troubles nerveux, états congestifs quels qu'ils soient.

Forme. — Gouttes.

Doses. — De XX à LX gouttes avant chaque repas.

LABORATOIRES J. KRIEGER

121, avenue de Saint-Ouen,
PARIS (XVII^e)

ARSI-STRYCHNAL LONGUET

Association « Strychnal-Cacodylate de Na » des dérivés non-toxiques de la strychnine et de l'arsenic.

Strychnal..... 0 gr. 01

Cacodylate de Na..... 0 gr. 25

Sérum isotonique Q. S... 3 cm³

par ampoule.

Injection rigoureusement indolore.

Doses. — 1 à 2 ampoules par jour.

Indications. — Anémie, Convalescence.
(Voir Strychnal Longuet.)

La boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 16 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS

ARSYLÈNE " ROCHE "

Acide allylarsinique.

L'Arsylène " Roche " est un arsénic organique nouveau qui, sur les préparations inorganiques, arséniates, arsénites, liqueur de Fowler, etc., etc., possède l'avantage d'une *toxicité pratiquement nulle*, laquelle permet son emploi à doses élevées, sans craindre la brusque apparition de phénomènes d'arsénicisme tels que sécheresse de la gorge et de la bouche, troubles digestifs et nerveux, symptômes cutanés, bouffées congestives, essoufflement, hyperthermie, etc.; il est en outre, *très bien toléré* par les voies digestives, ne provoque pas de dégagement d'oxyde de cacoylé (odeur alliagée de l'haleine) et il est *utilisé presque complètement* dans l'économie; peut être substitué, en toute sécurité par le médecin traitant, aux cacodylates généralement employés, dans toutes leurs indications et à toutes doses.

Indications Thérapeutiques.

Affections nerveuses et mentales, *sclérose en plaques, Parkinson, contractures, chorée, mélancolie, anxiété, maladies de la peau, psoriasis, affections parasitaires, tuberculose au début, anémie grave, période de dépression du traitement Bi ou Hg*, toutes les Anémies et toutes les Asthénies.

Posologie et Mode d'emploi.

Thérapeutique intensive. — 1 à 4 ampoules de 5 cc. à 0,20 tous les 2 ou 3 jours en injections intramusculaires ou endoveineuses *absolument indolores*.

Thérapeutique toni-stimulante. — 1 ampoule de 2 cc. à 0,05 par jour et plus par voie hypodermique ou intramusculaire (injections *absolument indolores*). — Enfants 1/4 ou 1/2 dose.

Thérapeutique progressive. — Méthode de Fowler. Granules à 0,01 : 1 granule avant chaque principal repas. Augmenter tous les jours d'un granule jusqu'à 8 par jour, puis, progressivement diminuer jusqu'à deux granules par jour.

ARSYLÈNE " ROCHE "

Granules : Flacon de 60.

Ampoules de 2 cc. : Boîte de 12.

Ampoules de 5 cc. : Boîte de 12.

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

21, Place des Vosges — Paris (III^e)

ASCÉINE

Acet-salicyl-para-acet-phénétidine-caféine.

Analgésique · sédatif, antirhumatismal. Par l'association synergique de ses composants, l'Ascéine réalise une médication efficace et inoffensive dont l'action principale et immédiate se traduit par l'atténuation ou la disparition de l'élément douleur.

Indications. — Toutes les algies : Névralgies, sciatique, migraine, etc., Grippe. Arthrites aiguës et toutes manifestations rhumatismales.

Doses. — Adultes : 2 à 4 comprimés par jour ; enfants : 1/2 à 2 comprimés.

Prix. — Le tube de 20 comprimés : 4 francs.

LABORATOIRES O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

ASCLÉROSOL

Traitement de la sclérose et de l'artériosclérose.

Composition :

Combinaison organique des principes actifs du *drosera rotundifolia* et de la silice.

En isolant du *drosera* les principes actifs, il a été obtenu une véritable combinaison chimique de ces principes avec la silice, combinaison dénommée *acide droserosilicique* et dans laquelle ce dernier acide n'existe plus sous sa forme minérale, mais sous une forme organique. En effet, les réactifs habituels de l'acide silicique ne révèlent plus cette substance dans l'acide droserosilicique qui est une véritable combinaison de la silice, analogue à celle de l'acide phosphorique dans la phytine. C'est cet acide droserosilicique qui constitue la base de l'asclérosol.

Sa formule a été établie de telle façon qu'une cuillerée à bouche contient 0 gr. 30 cgr. d'acide droserosilicique, correspondant à 0 gr. 07 cgr. de silice assimilable.

Le médecin peut donc doser exactement la quantité de silice qu'il désire introduire dans un organisme où l'acide silicique est déficitaire.

Prix : 20 francs le flacon (2 flacons pour un traitement).

Préparé par de GENCV, pharmacien.

François CARTIER, 1, rue de la Martinière — LYON
Agent général pour la France.

ASCOLEINE RIVIER

Il a été démontré que l'ASCOLEINE RIVIER renferme 100 fois plus de lipoides de foie de morue que la meilleure huile de foie de morue.

L'ASCOLEINE, à base de lipotide de foie de morue, contient les vitamines A C et D.

Quatre formes. — *Solution huileuse*: Une cuillerée à café 1/4 d'heure avant chaque repas.

Comprimés (véritables bonbons): 1 à 5 comprimés suivant l'âge avant chaque repas.

Granulés: De quelques grains à une cuillerée à café avant chaque repas suivant l'âge et depuis un an.

Ampoules: Une injection intra-musculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Toutes pharmacies ou à défaut chez:

Henri RIVIER, Pharmacien

26-28, Rue Saint-Claude — PARIS

ASEPTONE

L'antiseptique idéal en gynécologie.

Formule. — Menthol, trioxyméthylène, essence thym, sulfate de cuivre, acide borique, alun (deux formes), poudre et comprimés.

Indications. — Antisepsie des organes génito-urinaires de la femme, métrites, vaginites, salpingites, fleurs blanches, ulcération du col de la matrice, toilette intime.

Avantages. — Odeur agréable, solubilité parfaite, ne tachant pas le linge, ni toxique, ni caustique, décongestive, microbicide, laissant après l'emploi une agréable sensation de fraîcheur et calmant immédiatement les démangeaisons.

Emploi. — *Poudre*: une cuillerée à café par litre d'eau bouillie chaude en injections et lavages, matin et soir. *Comprimés*: 1 comprimé pour 2 litres, même emploi.

Prescrire: Une aseptone, poudre ou comprimés. Littérature et échantillons.

Prix au public: 40 francs.

Laboratoires MOULIN

50, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

ASTHMYLOSE

Forme. — Sirop.

Composition. — Chaque cuillerée à bouche renferme :

Sirop thébaïque	10 gr,
KI pur et desséché.....	0 gr. 50
Sirop aromatique.....	Q. S.

Indications. — Asthme, Emphysème, Bronchite chronique.

Avantages. — Goût agréable ; dosage très rigoureux Action rapide et durable. Pas d'intolérance ; *jamais d'iodisme*,

Posologie. — Adultes 1 cuillerée à soupe ou 2 le soir au coucher *loin du repas*.

Dépôt général et échantillons :

France. — **Laboratoires TAETZ**
2, Rue Lesdiguieres — PARIS (IV^e)

Belgique. — **M. F. RAMLOT**
72, Rue de l'Escaut — BRUXELLES

ATEMNOL

Pansement local.

Stérilisé, antiseptique, émollient, analgésique permettant d'obtenir :

Sans Incision, ni Cicatrice,

l'évacuation rapide et complète du pus des Anthrax et Furoncles.

Trois Dimensions des Epithèmes.

N° 1 diam. : 0,050. n° 2 diam. : 0,065
n° 3 diam. : 0,080

Pharmacie V. HOUSSAYE.

126, rue de la Pompe, Paris (XVI^e).

Téléphone.

ATHEROLYSINE

Spécifique de l'Artériosclérose et de ses conséquences. Silicate de Soude chimiquement pur et E' trait Aqueux de Viscum Album extrait de Gu' avec ses indosés organiques).

Propriétés thérapeutiques. — L'ATHÉROLYSINE est le traitement *étiologique* de l'Athérome et des troubles committants propres à la cinquantaine : (Silicate de Soude, antiscléreux, Viscum Album hypotenseur.)

Indications. — Présclérose-Artériosclérose et Hyertension. Toutes Scléroses, Vertiges, Obnubilation intellectuelle, Cérhalées, Bourdonnements d'oreilles, Troubles oculaires, Pertes de la mémoire, etc.

Forme. — Granulés, comprimés-pastilles.

Posologie. — *Granulés* : 1 à 3 cuillerées à café.
Comprimés : 2 à 6 par jour.

Laboratoires JONIDS

DIJON

ATOLYSAN

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Lactate de pipérazine, Bitartrate de lysidine, Quinate de lithine, Anhydrométhylènenecitrate d'hexaméthylène tétramine, Théobromine sodique, Succinate de lithine, Citrate de soude, Phosphate de soude, Hexaméthylène tétramine.

Indications. — Manifestations arthritiques et rhumatismales.

Posologie. — 3 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau.

États aigus : 3 cuillerées à soupe.

MARONNEAU-MOREL

156, rue des Fauvelles,
COURBEVOIE (Seine)

ATOPHAN-CRUET

Marques déposées.

Acide phénylquinolique 2 — carbonique 4.
Produit chimique pur. N'est pas un mélange de médicament.

Formes. — Boîtes de 20 cachets ou comprimés à 40 centigrammes.

Propriétés thérapeutiques. — Rhumatismes, goutte, névralgies.

Mode d'emploi. — Trois fois par jour un cachet ou comprimé pendant le repas. Accompagner l'emploi du médicament de boissons abondantes et alcalines.

PRIX : 13 francs net (sans impôt).

Laboratoires CRUET

6, rue du Pas-de-la-Mule — PARIS (III^e)

ATOQUINOL CIBA

Phénylcinchoninate d'allyle. Solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

Indications. — Diathèse urique en général, goutte, rhumatisme, dermatoses d'origine arthritique et toutes manifestations uricémiques.

Doses. — Etats aigus : 2 à 6 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.

Etats chroniques : 4 à 3 cachets ou cuillerées à café de granulé, huit ou dix jours par mois.

La boîte de 20 cachets : 15 francs.

Le flacon de granulé : 18 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

4, place Morand — LYON

ATURAL

Composition. — Poudre à base d'antilab-ferment et de citrate de soude.

Action. — Produit physiologique, absolument inoffensif, dépourvu de goût. Extrait du sérum du jeune veau, animal le mieux adapté à digérer le lait de vache.

Empêche la coagulation du lait, diminue le séjour des aliments dans l'estomac.

Indications. — Intolérance lactée chez l'enfant et chez l'adulte.

Mauvaise digestion du lait et ses conséquences : vomissements, diarrhée verte des nourrissons, gastro-entérite, troubles digestifs divers.

Mode d'emploi. — Chez l'enfant : une mesure (environ 1 gr.) pour 100 gr. de lait.

Chez l'adulte : une mesure dans un peu d'eau avant chacun des trois repas.

(Ne jamais porter à haute température.)

Prix : 12 fr. 50

Laboratoires RENARD

142, Avenue de Clichy — PARIS.

AVANAZOL COUTURIEUX

Traitement du coryza

Description. — Comprimés composés de Levurine Extractive, extrait de gui et acore, pour le traitement du coryza : à employer dès l'apparition des premiers symptômes.

En flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Les comprimés d'AVANAZOL provoquent une réaction de la muqueuse nasale et une phagocytose énergique (Levurine Extractive), avec disparition de la congestion (gui) et de l'irritation (acore).

Indication. — L'AVANAZOL constitue le traitement le plus efficace du coryza, à condition d'absorber, dès les premiers symptômes, *18 comprimés par jour en trois fois*. Continuer à la dose de 12 à 20 comprimés par jour. On obtient ainsi l'avortement du coryza.

Laboratoires COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

AZOTYL

Composition. — Lipoïdes spléniques et biliaires cholestérine, goménol, camphre.

Forme. — Ampoules et pilules.

Propriétés thérapeutiques. — Médication antibacillaire t berculoses).

Doses et mode d'emploi

A. (Ampoules) injections sous-cutanées ou intra-musculaires (tous les jours ou tous les deux jours).

B. Pilules glutinisées, six par jour aux repas et dans l'intervalle des piqûres.

LABORATOIRES " LOBICA "

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e)

AZUFROL

Soufre colloïdal

Description. — 1° Capsules kératinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal-sec, en flacons de 60 capsules ; 2° Pommade à 1/15 avec, comme excipients, vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

Action thérapeutique. — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du soufre par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie

Indications. — 1° Capsules : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif y adjoindre les injections de sulfuration (voir plus loin).

2° Pommade : Toutes affections cutanées justifiables du soufre.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

BABEURRE NUTRICIA

Composition. — Lait écrémé ensemencé de ferments lactiques sucré au saccharose.

Présentation. — Variétés : babeurre au froment sucré et non sucré. Babeurre au riz sucré et non sucré, en boîtes hermétiquement fermées assurant une conservation du produit pratiquement indéfinie.

Indications thérapeutiques. — Aliment de remplacement dans toutes les gastro-entérites de l'enfance. Le Babeurre simple ne peut être utilisé qu'un jour ou deux. Le Babeurre Nutricia par son froment ou son riz, est un aliment complet dont l'emploi peut être prolongé. Gastro-entérites avec vomissements : Babeurre froment.

Gastro-entérites avec diarrhée : Babeurre au riz.

Mode d'emploi. — Se conformer exactement aux indications formulées sur les boîtes.

Léon CLAEYS

85, Bd Sébastopol — PARIS (I^e)

BACKERINE

ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie

Modifiant l'organisme par développement des agents de fermentation

Forme. — Ampoules, cachets, dragées.

Indication. — Traitement de toutes les hyperplasies (tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.).

Mode d'emploi. — Injecter une ampoule SOUS LA PEAU, tous les quatre à six jours. On prescrira en même temps l'usage des dragées ou des cachets de ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'efficacité des injections. Prendre avant les repas, quatre cachets ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans les cas d'urgence.

LABORATOIRE AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e)

THE HISTORY OF THE

REIGN OF HENRY THE SEVENTH

BY JOHN HALLAM

IN TWO VOLUMES

LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAULS CHURCH-YARD, 1795.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF HENRY THE SEVENTH

BY JOHN HALLAM

IN TWO VOLUMES

LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAULS CHURCH-YARD, 1795.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF HENRY THE SEVENTH

BY JOHN HALLAM

IN TWO VOLUMES

LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAULS CHURCH-YARD, 1795.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF HENRY THE SEVENTH

BY JOHN HALLAM

BACTÉ-PHAGES

Préparations de Bactériophages polyvalents.

Mode d'action. — Le Bactériophage de d'Hérelle est un principe :

- 1° Qui détruit et dissout les bactéries.
- 2° Qui se régénère au cours de la lyse.
- 3° Dont l'action lytique se transmet indéfiniment.

Avantages :

- 1° Action puissante et rapide.
- 2° Inno cuité absolue.
- 3° Pas de contre-indication.

I. — BACTÉ-INTESTI-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des voies intestinales (Entérocoques, Coli, Staphylocoques, Streptocoques, etc.)

Indication. — Entérites, Colites, Diarrhées infantiles.

Mode d'emploi. — Ingestion buccale : Une ampoule matin et soir dans 20 cent. cubes d'eau alcaline.

II. — BACTÉ RHINO-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes du rhino-pharynx, (Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Entérocoques, etc.)

Indication. — Grippe, Coryza, Rhinopharyngites, Otites, Sinusites,

Mode d'emploi. — Pulvériser suivant la gravité des cas la valeur d'une ou plusieurs ampoules, au moyen du pulvérisateur spécial : Pulvolyseur Ercé.

III. — BACTÉ-PYO-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des infections purulentes (Staphylocoques, Streptocoques, Coli, etc.)

Indication. — Furoncles, Anthrax, Panaris, Phlegmons, Ostéites, Plaies infectées.

Mode d'emploi :

1^o *Traitement général* : Une à quatre injections sous-cutanées tous les deux jours. Ne jamais dépasser le nombre de quatre injections.

2^o *Traitement local* : Pansements locaux dans le cas d'ulcérations. Injections locales dans le cas contraire.

IV. — BACTÉ-DYSENTÉRI-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes de la dysentérie bacillaire (Flexner, Shiga, Hiss).

Indication. — Dysentéries bacillaires sous toutes les formes.

Mode d'emploi. — Ingestion : Une ampoule dans un demi-verre d'eau ordinaire froide ; répéter la dose de quatre en quatre heures.

Agents Généraux :

Laboratoires

ROBERT ET CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne, PARIS

BACTÉRIOPHAGES LECLERC

STAPHYLOPHAGE : Bactériophage antibactérien.

ENTÉROPHAGE ; Bactériophage anticolérique.

Composition :

Tous deux sont des bactériophages préparés selon d'Hérelle. Ils sont polyvalents, c'est-à-dire lysent plusieurs types soit de *Coli*, soit de staphylocoques.

Présentation :

Ampoules de 2 cc. (Boîtes de 10 ampoules)

Indications :

ENTÉROPHAGE : Manifestations aiguës de l'infection intestinale.

STAPHYLOPHAGE : Toutes les staphylococcies localisées ou généralisées.

Mode d'emploi :

En ingestion : Sans aucun inconvénient, on peut à tout âge ingérer une ou plusieurs ampoules par jour, à distance des repas, dans un peu d'eau froide.

En injection : Dans les infections aiguës, à la dose d'un cent. cube par piqûre, sans jamais dépasser 3 piqûres s'échelonnant sur une durée de 3 jours.

En pansement : Le Staphylophage peut, en outre, s'employer en pansement en appliquant sur la région infectée une compresse stérile imbibée du contenu d'une ampoule.

Littérature, Échantillon sur demande.

Prix : 25 fr. la boîte de 10 ampoules.

Pharmacie LECLERC

Docteur P. Lemeland... Successeur

10, rue Vignon — PARIS (IX^e)

BACTIOXYNE

Formes. — Gouttes.

Ampoules pour instillations rectales.

Ampoules pour injections intraveineuses.

Propriétés thérapeutiques. — Manganate calcico-sodico-potassique, Médication antibacillaire, hyperoxydante et récalcifiante.

Indications. — Prétuberculose ganglionnaire et osseuse.

Posologie. — LX à C gouttes deux fois par jour, de X à XXX gouttes pour les enfants; en augmentant progressivement de I à II par jour.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS (I^{er})

BAIN CARBOGAZEUX WOLO

Forme :

Poudres qui, dissoutes, produisent assez d'acide carbonique pour saturer l'eau du bain, sans attaquer les baignoires.

Indications :

Maladies du cœur et de l'appareil circulatoire : hypertension, Artériosclérose, etc.

Prix : 8 fr. 45 le bain

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Dépôt à Paris : 49, rue de Paradis

Tél. : Provence 30-32

BAIN CARRÉ

Composition. — Bain iodo-bromo-chloruré, renfermant intacts tous les sels marins naturels. Bain marin complet.

Indications. — *Adultes* : nervosisme, asthénie, surmenage, convalescences, rhumatisme, arthritisme.

Enfants : Débilité, lymphatisme, troubles de la croissance, rachitisme.

Gynécologie : Traitement des affections gynécologiques, irrigations vaginales hygiéniques.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 boîte par bain.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de boîte suivant la capacité de la baignoire.

Bains toniques et stimulants : 28° à 30°. 15 minutes.

Bains sédatifs : 34° à 38°, 25 à 40 minutes.

Injectons vaginales : une cuillerée à soupe par litre d'eau chaude.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e)

BALLOTYL

Agent le plus efficace
de la Phytothérapie Antispasmodique.
Sédatif du grand sympathique.

Composition :

Alcoolature stabilisée de Ballote.

Posologie :

Irritabilité nerveuse. L à LX gouttes au coucher.

États sympathicotoniques ou vagotoniques.
5 prises de XXX gouttes par 24 heures.

Prix au public : 12 fr.

**Laborat. de PHYTOTHÉRAPIE
de PARIS**

M. Guillon, Pharmacien.

113, Boulevard Voltaire, Paris (XI^e)

BALMIGA

Tablettes fumigatoires.

Forme pharmaceutique :

Tablettes comprimées effervescentes.

Composition :

Baume du Pérou, Huile de pin sylvestre, Essence d'eucalyptus, Essence de thym, Essence de menthe, Menthol.

Action :

Antiseptie des voies respiratoires par inhalation.

Indications :

Grippe, Bronchite, Extinction de voix, Coryza, Rhinite, Sinusite, Laryngo-trachéites.

Mode d'emploi :

Mettre successivement deux ou trois tablettes *Balmiga* dans un verre d'eau bouillante et prendre deux ou trois fumigations par jour.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

18, rue Pierre-Curie — PARIS (V°)

BALSAMOL LESCÈNE

Composition. — Drosera, Scille, Chlorocinnamates, Benzoate de Benzyle.

Formes — Sirop. Comprimés.

Caractéristiques. — *Chez les adultes* plus calmant. MOINS TOXIQUE que le bromoforme, les composés forméniques et les narcotiques ; *chez les enfants*, il peut être administré à partir de 5 à 6 mois.

Antiseptique des voies respiratoires.

Indications. — TOUX, COQUELUCHE, toux émetisante des tuberculeux, asthme, toux des vieillards. GRIPPE.

Doses. — *Enfants* de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour suivant l'âge ou 3 à 10 comprimés.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour ou 6 à 15 comprimés par jour.

Prix : Sirop 10 francs. Comprimés 11 fr. 25.

Laboratoire L LESCÈNE

LIVAROT (Calvados) — PARIS. 58. Rue de Vouillé.

Téléph. : Vaug. 08-19

BALSOFORME

Mélange de Schleich
additionné de Goménol Prevet
(formule du Docteur Siauve-Evausy).
Le Balsoforme associe les propriétés du
mélange de Schleich à l'action balsa-
mique du Goménol.

Indications :

**Anesthésie générale, exempte de compli-
cations pulmonaires post-anesthé-
siques.**

Posologie et mode d'emploi :

Verser dans l'appareil d'Ombredanne le
contenu d'une ampoule de 40 gr.

" SPÉCIA "

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

BARDANE STABILISÉE DAUSSE

Médication abortive de la furonculose.

Forme. — *Pilules de Bardane Dausse*
dosées à 0 gr. 20 d'extrait mou par pilule.

Indications. — Spécifique de la Furon-
culose vraie, mais sans action sur la
Folliculite ou sur les autres inflamma-
tions superficielles.

Posologie. — 3 pilules matin, midi et
soir, soit 9 pilules par jour. *Durée du*
traitement : 4 à 5 jours pour obtenir la
cicatrisation complète.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

BAUME AROMA

Spécifique des rhumatismes et des douleurs en général.

Composition et forme. — Baume à base d'essence de plantes aromatiques et des constituants du liniment de Rosen.

Essences aromatiques....	6	Salicylate d'amyle.....	4
Beurre de muscades.....	2	Acide salicylique.....	3
Vaseline.....	60		

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et résolutif puissant. Odeur agréable.

Indications thérapeutiques. — Rhumatisme aigu et chronique, goutte lumbago, torticollis, efforts et toutes douleurs musculaires, courbatures, névrites, sciatiques, crurale et brachiale, pleurésie sèche, points de côté, foulures, varices.

Mode d'emploi. — Frictionner doucement et longtemps avec le baume pour en faciliter la pénétration. Étendre ensuite sur toute la région douloureuse une légère couche de Baume et recouvrir avec une feuille de coton ordinaire que l'on maintiendra par une bande ou une ceinture, suivant qu'il s'agit d'un membre, ou du thorax et des reins.

Faire cette friction suivie du pansement une à deux fois par jour.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e)

A Bruxelles: LE MARINEL, pharmacien,
273, rue Victor-Rauter.

BAUME DU D^r BAISSADE

Composition. — Association de camphre, soufre, goudron, huile de chaulmoogra, de consistance semi-fluide, d'odeur agréable.

Action. — Anti-prurigineux et analgésique, supprime immédiatement les Démangeaisons et la Douleur. Antiseptique puissant, calme et arrête l'élément inflammatoire des lésions cutanées.

Aucune causticité ; peut être appliqué sur les Eczémas les plus aigus et les plus récents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

Indications. — Eczémas suintants, secs, aigus, chroniques. Tous les prurits, avec ou sans lésion cutanée. Lichen, Psoriasis, Acné, Folliculites, Furunculose, Impétigo, Séborrhée de la barbe et du cuir chevelu, Sycosis, Gerçures des seins, Papules et Pustules des fièvres éruptives.

Mode d'emploi. — En onction douce (Dermites aiguës), ou énergiques (Dermites chroniques) sur les parties malades, à la main nue ou à l'aide d'un tampon de coton. Recouvrir d'une compresse de gaze.

Un pansement par jour, le soir de préférence.

Ne pas laver la région traitée avant complète guérison ; se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge.

Laboratoire du Baume du D^r BAISSADE
Saint-Loup — MARSEILLE

BAUME BENGUÉ

Analgésique

Composition.

Menthol, salicylate de méthyle, lanoline.

Indications.

Rhumatisme, goutte, névralgies, points de côté, douleurs abdominales, douleurs de la gorge.

Mode d'emploi.

En onctions deux fois par jour en recouvrant d'une serviette ou flanelle.

Docteur BENGUÉ

pharmacien

16, rue Ballu — PARIS (IX^e)

BAUME DELACOUR

Gerçures et Crevasses des Seins

Gerçures en général

Baume benzo-tannique

Mode d'emploi : Laver la crevasse avec de l'eau bouillie et un tampon d'ouate, appliquer le baume avec le pinceau qui accompagne le flacon et recouvrir les mamelons avec les bouts de sein en métal afin d'éviter le frottement du linge.

Prix du flacon avec le pinceau et deux bouts de sein :

6 fr. 50 (sans impôt).

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie.

56, boulevard Péreire — PARIS

BAUME DE LA MATERNITÉ

Composition :

Anesthésine	0,10
Résorcine	0,20
Acide borique	2gr.
Dermatol	0,50
Baume du Péron	0,10
Lano-vaseline	Q.S.

pour un tube.

Propriétés thérapeutiques. — Cicatrisant énergique des crevasses du sein et de toutes les gerçures.

Indications. — Érythème fessier, toutes gerçures en général.

Laboratoires NOGUÈS

11, rue Joseph-Bara — PARIS.

BAUME RHODIA

à base de Rheumacylal
(Salicylate de Glycol)

Succédanéinodore de salicylate de méthyle.
Ne tache pas le linge, n'est pas irritant.

Indications :

Traitement externe des douleurs rhumatismales et des névralgies.

Présentation et mode d'emploi :

Deux présentations : Forme liquide et forme crème.

Onctions légères suivies d'enveloppement ouaté.

" SPÉCIA "

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille du Temple — PARIS (III^e)

BAUME SAINT-ANTOINE

Composition. — Baume à base d'essences antiseptiques, décongestives et antiprurigineuses.

Avantages. — Inodore, non toxique, ne tache pas le linge.

Indications. — Plaies atones, Ulcères variqueux, Fistules, Hémorroïdes, Dermatoses, Furoncles, Acné, Eczéma, Sycosis, Affections des muqueuses, Coryza, Métrites, Brûlures, etc...

Mode d'emploi. — En applications locales.

Prix :

En France : 11 fr. 20 — A l'étranger : 20 fr.

Laboratoires SAINT-ANTOINE

38, Rue Soult — TARBES (H.-P.)

BAUME SÉLÉNIA

AU SÉLÉNIUM COLLOÏDAL

Propriétés thérapeutiques. — Il en est quatre principales :

Le **Baume Selenia** est *décongestif*. Calme la *démangeaison*, le *prurit*. *Décape* les *téguments*. Est *cicatrisant*.

Indications. — Il est le médicament de choix dans le traitement des *Eczémas*, *Pyodermites*. *Ulcérations de la peau*. *Bouton d'Orient* (Clou de Biskra).

Mode d'emploi. — S'applique à froid, mais de *préférence à chaud*, l'action étant ainsi plus immédiatement calmante et plus grande. Dans ce cas, liquéfier le Baume complètement au bain-marie.

Prix du pot : 12 fr.

Préparé par **C. DAVID et ses fils.**

D^r en Ph^{ie} — Ph^{iens} Ex. Int^{es} des Hôp. de Paris.
49, rue de Biche — COURBEVOIE (Seine).

Belgique : H. Crétin, 8, rue des Eburons,
BRUXELLES.

BAUME SUELTA

Composition.

Extrait de Marrons d'Inde stabilisé. Euproctol (Di-Iodosulforésorcinate de Bismuth). Stovaine. Adrénaline 0,001 %. Baume du Pérou.

Indications et Propriétés.

Traitement local des Hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal. **Sédation immédiate de la douleur, décongestion et vasoconstriction**, antiseptie, suppression des hémorragies.

Mode d'emploi.

Onction le matin et après chaque garde-robe. Pansement pour la nuit. Une canule métallique s'adapte au tube pour permettre l'application de la Pommade sur les Hémorroïdes internes.

Prix: 13 fr.

MICHEL DELALANDE

13, Rue Lacharrière — PARIS

BAUMOLACPININE

pour bains à l'essence de pin.

Forme. — Liquide de fluorescence verte.

Composition. — Essence de pin soluble dans l'eau, ne salissant pas les baignoires.

Indications. — Convalescence, Faiblesse, Débilité, Anémie, Maladies nerveuses, Rhumatismes, Arthritisme.

Posologie. — Une à deux cuillerées à soupe par bain.

Prix: {	Flacon de	30 gr. :	5 fr. 80
	—	150 — :	23 fr. 80
	—	500 — :	60 fr.
	—	1000 — :	110 fr.

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Ilzach, MULHOUSE

Dépôt à Paris : 49, rue de Paradis

Tél. : Provence 30-32

BEATOL

Prop. Thér. — Sédatif nerveux, Hypnotique.

Indications. — Insomnies, Affections aiguës et chroniques, Intoxications. Maladies nerveuses ou mentales.

1^o Forme : Ampoules.

Composition :

Diéthylmalonylurée.....	0 g. 25
Bromhydrate de scopolamine....	1/4 de mgr
Soluté de valériane.....	2 cm ³

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule en injection sous cutanée.

2^o Forme : Liquide

Composition :

Diéthylmalonylurée.....	0 gr. 18
Valériane stabilisée Q. P.....	5 cm ³
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 015

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuill. à café par jour, par doses progressives prises dans de l'eau sucrée, avant le repas du soir, ou au coucher.

3^o Forme : Comprimés.

Composition :

Diéthylmalonylurée.....	0 gr. 18
Intrait de valériane.....	0 gr. 10
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 02

Mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés pris avec de l'eau ou une infusion chaude 1 heure après le repas.

Laboratoires Lobica

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e)

BEEF LAVOIX

ou Vin de Lavoix

Composition. — A base de vieux vin de Banyuls, le Beef Lavoix contient les principes nutritifs de la viande, les principes actifs du quinquina et des phosphates.

Indications. — Convalescence.
Tuberculose.
Épuisement.
Inappétence.
Anémie.
Grossesse.
Allaitement.

Posologie. — Un verre à Madère avant ou après chaque repas.

Maison du Docteur PILLET

5, Avenue Victoria
PARIS

BELHÉMINE

Ampoules de Sérum pur de Sang de Cheval,
Sérum hématoprotéique.

Indications. — Toutes les anémies, hémorragies, fausses couches. En pansements locaux : plaies, ulcères variqueux, brûlures.

Mode d'emploi. — Par voie buccale : 1 à 2 ampoules par jour.

Compléter le traitement par l'usage de la SANGUIPLASMINE.

Granulé préparé avec le Caillot sanguin : 2 cuillérées à café par jour.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire de Sérothérapie

H. AMMANN, Pharmacien Licé en Sciences
Boulogne-Billancourt 76 rue Escudier

Tél. : Molitor 01-90.

BELLADENAL " SANDOZ "

Association de Phényl-éthyl-malonylurée
et de Bellafofiné.

Le plus puissant des anti-nervins

Indications spéciales. — Épilepsie,
angine de poitrine, tremblements,
asthme, tous états de crise, anxiété.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour.

Épilepsie : 4 à 6 comprimés.

Enfants. — 2 à 4 demi-comprimés.

Produits SANDOZ,

3 et 5, rue de Metz, Paris (X^e).

M. CARILLON, Pharmacien de 1^{re} Classe,

Dépôt général et vente :

Usine des pharmaciens de France,
123, rue de Turenne à Paris (III^e).

BELLADONE DAUSSE (1)

Préparation titrée chimiquement et contrôlée *physiologiquement*, présentant toutes les garanties de constance dans son action.

A prendre par gouttes.

Indications. — Tous les états de spasme et d'hyperexcitabilité. Indiqué dans l'asthme, les *gastro-pathies douloureuses*, la *toux spasmodique*, l'épilepsie, l'incontinence d'urine, le mal de mer.

Moderateur des sécrétions dans l'*hyperchlorhydrie*, les *sueurs nocturnes*.

Posologie. — *Adultes* : X gouttes, 3 à 6 fois par jour, dans une tisane.

Enfants : II gouttes par jour et par année d'âge, en 3 fois.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

(1) Ne pas confondre cette préparation avec la solution d'intrait de Belladone.

BELLAFOLINE " SANDOZ "

Alcaloïdes totaux de la Belladone sous forme de malates, purs, stables, exactement dosés, injectables.

Traitement à effets constants
du Spasme et des Vagotomies
· Modérateur des Secrétions

Bellafoline :

Comprimés : 1 à 2, trois fois par jour.

Gouttes : 10 à 20, trois fois par jour.

Ampoules : 1/2 à 2 par jour.

SIROP DE BELLAFOLINE

spécialisé pour la médecine infantile

PRODUITS SANDOZ

3 et 5, Rue de Metz — PARIS (X^e)

Dépôt général et vente :

Usine des Pharmaciens de France

125, Rue de Turenne — PARIS (III^e)

BEMAX

Aliment vitaminé préparé avec les embryons détoxiqués des céréales (orge, froment, seigle). Une cuillère à soupe de Bemax est plus riche en vitamines que quatre livres de pain complet.

Préparation. — Et faite sous la surveillance constante d'un service médical. Par des procédés spéciaux on arrive à conserver et même à concentrer toutes les vitamines (A B et E) des céréales, surtout les vitamines B

Propriétés thérapeutiques. — Le plus précieux des compléments de notre alimentation actuelle.

Indications. — Tous les troubles, provenant d'une alimentation insuffisante en vitamines.

Doses. — Une cuillère à soupe par jour pour les adultes pour les enfants : une cuillère à café. D'un goût agréable se prend mélangé à n'importe quel aliment au repas du matin ou du soir.

ROBERTS & C^{te} Pharmaciens

5, Rue de la Paix — PARIS (II^e)

Téléph. : Central 69-86

BENZO-BISMUTH MILLOT

(Ampoules. Antisypilitique énergique).

Indolores. — Ni abcès. — Ni enkystement.

Le **Benzo Bismuth**, sel soluble, contient quatre centigrammes de Bismuth métal par injection (soit 0 gr. 20 de sel), quantité nécessaire pour obtenir l'effet thérapeutique maximum avec une absence complète de toxicité, car il s'agit ici de quatre centigrammes de métal intégralement actif puisqu'intégralement absorbé. Ce qu'on ne peut obtenir avec un sel insoluble.

Le **Benzo Bismuth**, présenté sous forme de poudre, extemporanément soluble, s'injecte dans les muscles de la région fessière haute avec autant de commodité qu'une banale injection de cacodylate.

Le traitement se fait par séries de 10, 15 ou 20 injections bi-hebdomadaires ou tri-hebdomadaires en cas d'urgence.

Les résultats thérapeutiques sont tout à fait comparables à ceux qu'on est accoutumés d'attendre des arsénobenzols, sans aucun des dangers ni inconvénients de ces derniers.

Les accidents primaires et secondaires disparaissent rapidement. Les syphilis viscérales et nerveuses sont profondément et durablement influencées.

La réaction de Bordet-Wassermann devient négative dans des délais très courts et reste négative sous l'influence du traitement benzobismuthé.

Vendu en boîtes contenant poudre et solvant pour 5 injections. Prix médical : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

LABORATOIRES MILLOT

54, rue de la Bienfaisance, Paris (VIII^e)

Tél. Laborde 0-69

BENZOFLORINE JULIEN

Gouttes

Composition :

Extr. fluide valériane fraîche stabil....	1000
Alcoolature de Passiflora incarn.....	1000
Teinture de Crataegus oxyacantha.....	1000
Benzoate de benzyle et dériv. benzylés	10

Indications. — Tous les états spasmodiques, Insomnies, Angoisses, Vertiges, Érétisme cardio-vasculaire, Tachycardies, Arythmies, Palpitations.

Posologie. — Insomnies : 50 à 60 gouttes le soir dans une infusion.

Spasmes : 25 gouttes 3 à 4 fois par jour.

Prix : 13 fr. — Flacon gratuit sur demande.

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie,

103, rue de Rennes — PARIS

BENZO-IODHYDRINE

(Capsules de)

La Benzo-Iodhydrine n'est pas seulement la première réalisation de la cure iodée, sans iodisme (Thèse du Dr Chenal, F. M. Paris, novembre 1896), elle est aussi un corps iodé qui présente une activité thérapeutique très puissante, très étendue, et rare parmi les corps iodés.

C'est un médicament iodé hypotenseur diurétique, éliminateur puissant d'acide urique. Ces diverses qualités en font le médicament, par excellence, des cardio et des artério-scléreux, des gouteux, des emphysémateux. Chaque capsule de gluten correspond à 30 centigr de KI.

Doses. — 3 à 10 capsules par jour, aux heures des repas.

Le flacon : 14 francs. Brochures et échantillons.

G. BRUEL

36, rue de Paris, COLOMBES (Seine)

BENZOLACTINE

Comprimés digestifs

Alcalins, Absorbants, Reminéralisants.

(Lacto-Alcalino-Phosphatés.)

Propriétés thérapeutiques. — Neutralise l'Hyperacidité, supplée à l'Insuffisance hépatique, annule l'Auto-intoxication. Puissant sédatif, curatif dans les Affections gastriques, hépatiques et intestinales.

Supérieure aux comprimés lactiques grâce à son action régulière et constante.

Indications. — Gastropathies, Dilatation, Stase, Ulcères, Dyspepsies, Entérites, Colites, Hépatites, Fièvres infectieuses, Déminéralisation, Cachexies, Dermatoses, etc.

Composition. — Chaque comprimé de 1 gr. contient : Benzonaphthol 0 gr. 01 Carbonates de Mn 0.02, de Mg 0.07, de Ca 0.15, Bicarbonate de Na 0.15, Glycérophosphate de Ca 0.04, Lacto-saccharose et menthe. Q. S. 1 gramme.

Doses et emploi. — Croquer 2 ou 3 comprimés à la fin des 2 principaux repas ou les délayer dans un demi-verre de liquide quelconque. *Enfants* : 2 à 3 comprimés par jour.

La Benzolactine est présentée sous 2 formes : Comprimés et poudre. Une demi-cuillerée à café de la poudre équivalent à 3 comprimés.

Prix : 10 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires **BACCAVIN** 38, rue Albouy — PARIS (Xe)

BENZOLACTOL

Granulé soluble, d'absorption très agréable

Propriétés therap. — Antiseptique spécifique de toutes les affections du tube digestif. Par son action oxydante (MgO₂), transfixiante et destructive, le *Benzolactol* possède le maximum d'action microbicide gastro-intestinale.

Composition. — Combinaison de Peroxyde de Magnésium (Hopgan), de Benzoate de Naphthyle, de Salicylate de Phenyle Lactate de manganèse et sucre granulé.

Indications. — Toutes les affections aiguës ou subaiguës du tube digestif. Fermentations et infections gastro-intestinales, Entérites, Entéro-colites muco-membraneuses, Embarras gastriques, Langue chargée, Intoxication gastro-limentaire, Grippe à forme gastro-intestinale, Ictère, Gastro-entérite des nourrissons, Fièvre typhoïde, Affections cutanées, Furonculose, Paratyphoïdes, Infections alimentaires, etc.

Cas Chirurgicaux et Affections Contagieuses

Dose et Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café après le repas. Laisse fondre dans la bouche.

Pour les enfants (jusqu'à 3 ans), par demi-cuillerées à café 2 à 4 par jour.

Échantillons et littérature

Laboratoires **FÉVRIER et DECOISY**

10, rue du Parc Royal — PARIS (III^e)

BENZOPHOSPHINE CHRISTIAENS

(Antiseptique des Voies urinaires et de l'intestin).

Solubilisant de l'Oxalate de Chaux

Indications. — Coliques néphrétiques. Lithiase rénale. Diathèse urique et *Oxalurique*, Fermentations du tube digestif.

Composition. — Phosphines, benzoate, magnésium.

Doses. — Moyenne de 3 cuillerées à café par jour. empêche la précipitation de l'Oxalate de Chaux dans les urines.

Dose de 6 cuillerées à café, comme dissolvant des Calculs.

N'irrite pas le rein comme le fait l'Urotropine
et a au contraire une action nettement séda-
tive.

2, rue du Champ-de-Mars, Reims

BENZYANYL

Valérianate de benzyle.

Forme. — Capsules glutinisées dosées à 0 gr. 10 de valérianate de benzyle.

Propriétés. — 1° Vasodilatateur et hypotenseur grâce au radical benzyle.
2° Antispasmodique grâce à l'acide valérianique.

Indications. — Hypertension artérielle sous toutes ses formes, Angine de poitrine, Asthme, Coqueluche.

Avantages. — Abaissement simultané de Mx. et de Mn. Suppression rapide des troubles subjectifs. Toxicité nulle, action durable.

Lab^{res} ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS

BENZYLOL

Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse, à base de Benzoate de Benzyle et de Benzaldéhyde.

Deux présentations : 1° Gouttes. 2° Perles.

GOUTTES. — Action antispasmodique sur tous les muscles lisses de l'organisme.

Spécifique de l'Hypertension. Asthme vrai. Coliques hépatiques ou néphrétiques. Constipation et diarrhée spasmodiques. Hoquet persistant. Coqueluche. Mal de mer.

Posologie. — *Adultes* : 30 à 40 gouttes toutes les 3 ou 4 heures.

Enfants : 2 à 4 gouttes par année, toutes les 3 ou 4 heures.

PERLES. — Spécifique de la Dysménorrhée (règles douloureuses).

Posologie. — Deux perles à un quart d'heure d'intervalle ; 6 à 12 par jour.

Prix : 10 francs.

Laboratoire E. HAUTDIDIER

37, rue Galilée, PARIS (XVI^e).

BERKENDYL

(sodium paratoluène sulfochloramine)
en comprimés à 0 gr. 25.

Dérivé ch'loré pour l'antisepsie suivant la méthode du Dr Carrel.

Non toxique, solubilité parfaite.

Supérieur aux hypochlorites parce que :
Pouvoir bactéricide quatre fois plus grand. Non irritant. Conservation illimitée.

Union Chimique Belge, S. A.

Division :

Produits Pharmaceutiques MEURICE
68, Rue Berkendael,
BRUXELLES (Belgique).

BETUL-OL MIDY

(Méthyl oléo-salicylate comp.)

Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

Composition. — Menthol et chloral en solution dans le salicylate de méthyle.

Mode d'emploi. — Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé, puis de coton. Renouveler l'application plusieurs fois par jour.

L'absorption du *Betul-Ol* se fait si rapidement par la peau, que dix minutes après on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Propriétés thérapeutiques. — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

Indications. — Lumbago, sciatiques, douleurs des articulations, névralgies.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e)

BEXININE

Spécifique idéal de la Coqueluche,
des gripes, toux convulsives,
catarrhe bronchique.

Propriétés thérapeutiques :

Seul médicament inaltérable et non
toxique. Jugule la coqueluche en moins
de huit jours.

Doses et mode d'emploi :

Toujours à jeun dans du lait bouilli et très
chaud ou, à défaut, dans infusion de
tilleul ou feuilles d'orange.

Doses pour 24 heures :

Enfant de 2 mois : 10 à 30 gouttes en trois
fois.

(Augmenter de 10 gouttes par mois.)

1 an : 2 cuillerées à café.

2 ans : 2 à 4 cuillerées à café.

3 ans : 3 à 6 —

4 et 5 ans : 2 à 3 cuillerées à soupe.

6 et 7 ans : 3 à 4 —

8 à 10 ans : 3 à 6 —

Adultes : 6 à 10 —

La *Bexinine* est le seul médicament
garanti jugulant la coqueluche en moins
de huit jours. C'est le spécifique idéal
des toux spasmodiques, grippales et du
catarrhe bronchique.

Observations et attestations médicales à
l'appui. En 1925, les épidémies de Vichy
et de Nancy ont été jugulées par la
Bexinine ainsi que celle de Pau en 1927.

Laboratoire AMBLARD

à Cunlhat (Puy-de-Dôme).

BIAZAN

Solution huileuse parfaitement limpide et incolore permettant de faire proprement une injection intramusculaire non douloureuse d'une quantité de bismuth bien déterminée.

Présentation. — Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. rigoureusement titrées à 0 gr. 04 de Bismuth métal par cc.

Propriétés thérapeutiques. — Le Biazan a été étudié et mis au point dans le service de M. le Docteur L. Fournier à l'Hôpital Cochin. Réunissant les effets rapides des composés hydro-solubles à l'action profonde et prolongée des bismuths insolubles, le Biazan est actuellement la meilleure préparation pour le traitement de la syphilis à toutes ses périodes.

Posologie. — Faire deux fois par semaine une injection intramusculaire de 2 cc. de Biazan. Continuer la série jusqu'à 12 injections. Les 4 à 6 dernières piqûres pourront être faites à 5 et 6 jours d'intervalle. Les doses et le rythme des injections, données à titre d'indications générales, sont susceptibles d'être modifiées par le médecin traitant, en particulier chez les vieillards, les débilisés et les sujets dont l'état général est mauvais.

Laboratoire des ANTIGÉNINES

1, place Lucien Herr, PARIS (V^e)

(anciennement 43, rue Tournefort) Gobelins 26-21.

BI-CITROL MARINIER

Citrates monosodique et trisodique en granulé soluble de goût agréable.

**Eupeptique, Cholagogue,
Antivisqueux, Décongestif.**

DOSES :

2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix du flacon : 15 fr.

Laboratoires MARINIER

159, rue de Flandre — PARIS

BICOLLYRE

Traitement de toutes les Conjonctivites.

Présentation :

2 flacons et 2 compte-gouttes dans la même boîte.

Composition. — Collyre A. : Sulfate de zinc, Sulfate de cuivre, Cocaine.

Collyre B. : Argyrol, Protargol.

(Formule des D^{rs} Plessy et Brevet, anciens médecins assistants des Quinze-Vingt.)

Avantages. — Double formule réalisant le traitement complet et sûr de toutes les conjonctivites (sauf gonococcique et diphtérique) sans avoir recours à un examen de laboratoire.

Posologie :

Une goutte, une à quatre fois par jour de chaque collyre, suivant la gravité des cas.

Prix : 12 francs.

REGAGNON et C^{ie}

Pharmaciens

276, rue — Lecourbe, Paris (XV^e).

BILEYL FOURNIER

Sels biliaires

(extraits de la bile de bœuf)

Forme. — Globules glutinisés (digestion intestinale).

Dose. — 4 à 8 globules par jour, à prendre vers la fin du repas, par 2 ou 3.

Indications. — 1° Les causes d'arrêt d'excrétion : lithiase, compressions, ictères subaigus et chroniques par rétention;

2° Les cas d'insuffisance biliaire : cholémie familiale, entérocolite muco-membraneuse.

L'étui de 60 globules : 12 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, Rue Biscornet — PARIS

BILIASE RABY

Globules d'extrait de fiel de bœuf renfermant tous les principes actifs de la bile.

Mode d'action. — Cholagogue énergique. Le plus constant de tous les agents opothérapiques biliaires.

Indications. — Coliques hépatiques. Ictère. Lithiase biliaire. Entérocólite et constipation par **insuffisance biliaire**.

Doses. — 4 à 12 globules par jour (aux repas).

R. RABY, Pharmacien

Asnières (Seine).

(Échantillons sur demande)



BILIFLUINE

du Docteur L. BIGNON, de Vichy
Traitement de la Lithiase Biliaire
et des Ictères

Composition. — A base d'oléate de soude et de bile dépigmentée et décholestérinée.

Indications. — Lithiase biliaire. Ictère catarrhal, Ictère par rétention. Constipation. Colite muco-membraneuse. Congestion du foie et cirrhoses sous toutes leurs formes.

Posologie. — 4 pilules ou dragées par jour, au moment des repas : le matin, à midi, à 4 heures et au souper ; ou encore en deux fois à midi et le soir (pilules et sirop).

Laboratoires " STÉNÉ "

2, Place des Vosges — PARIS

BILIRHÉINE

Principes extractifs végétaux sélectionnés, renforcés par un catalyseur : le Manganèse.

Indication.

Insuffisance hépatique.

Posologie.

Deux pilules glutinisées à la fin de chaque principal repas.

Laboratoires MONDOLAN

41, rue Étienne-Marcel — PARIS (1^{er})

BILIOGASTRINE CHEVILLON

Composition. — Sulfate, Phosphate, Citrate, Bicarbonate de Soude, Pipérazine, Helmitol.

Indications. — Draine les Voies biliaires, augmente la Diurèse, nettoie le Rein et l'Intestin.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées par jour dans un peu d'eau tiède.

Prix : 15 fr.

Laboratoire CHEVILLON

38, rue Ramey — PARIS

BILIVACCIN

1^o Pastilles Antityphiques Biliées.

2^o Pastilles Antidysentériques.

Adultes : 7 francs.

Enfants : (moins de 7 ans) 5 fr. 50

3^o Pastilles Anticholériques Biliées.

Adultes : 8 fr. 50

Enfants (moins de 7 ans) ; 6 fr. 50

Vaccination préventive, par VOIE BUCCALE,
contre la Typhoïde, les Para A et B, la
Dysenterie bacillaire, le Choléra.

Aucune réaction. — Pas de contre-indication.

Aucune limite d'âge.

A prendre à jeun, trois matins de suite.

“ LA BIOTHÉRAPIE ”

131, Rue Cambronne — PARIS (XV^e)

Téléphone : Vaugirard 49-20

BIOCALCOSE

Tonique, Stimulant, Reminéralisant intégral.

Granulé soluble, de saveur très agréable.

Hypophosphites ; Manganèse, Fer, Magnésie et
chaux en combinaison organique avec le
glucose ; Fluor, Silice, etc., dans les propor-
tions où ces corps se trouvent dans l'orga-
nisme.

Constitue une véritable synthèse minérale de la
matière vivante.

Prop. thér. — Tonique, reminéralisante.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à
café par jour ju-qu'à 8 ans ; 3 ou 4 au-
dessus de cet âge, à croquer, ou dissoutes
dans un peu d'eau, lors des repas.

Laboratoires LEMATTE et BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS

Télégramme : Cheyrematte-Paris

BIODERMYL MONAL

Formes :

Ampoules et globules glutinisés.

Composition :

Chaque *ampoule* de 2 cm³ contient : une solution indolore et bien tolérée de Hg I² à 1 %, soit 0 gr. 02 par ampoule.

Chaque *globule* contient : Hg I² pur 0.0025 ; KI, 0.25.

Doses. — Série de 12 injections.

4 globules par jour, aux repas.

Traitement discret ; pas d'indications sur l'étiquette et le prospectus du flacon de globules.

Laboratoires MONAL & Cie

6, rue Bridaine — PARIS

BIODYNAMINE

Indications générales. — Débilité. Neurasthénie. Phosphaturie. Convalescence. Surmenage intellectuel et tous états asthéniques et atoniques.

1° Ampoules :

Sulfate de strychnine	1 milligr.
Cacodylate de soude	0 gr. 05
Nucléinate de soude	0 gr. 05
Glycérophosphate de soude	0 gr. 05
Sérum isotonique camphré	1 cc. 3

par ampoule.

(1 à 2 ampoules par 24 heures.)

2° Gouttes concentrées (facilitant l'administration progressive) : de X à XL gouttes bien diluées, avant chaque repas, suivant le cas et d'après le tableau :

	20 Gouttes cont.	40 Gouttes cont.	60 Gouttes cont.	80 Gouttes cont.	100 Gouttes cont.
Sulfate de Strychnine	1 mill.	2 mill.	3 mill.	4 mill.	5 mill.
Méthylarsinate de Soude	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
Polyglycérophosphates donnant en Acide phosphorique	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75

3° Elixir : Préparation d'un goût très agréable et contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

Phosphate de soude	0 gr. 060
Acide phosphorique officinal	0 gr. 053
Méthylarsinate disodique	0 gr. 012
Sulfate de strychnine	0 gr. 006

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, pharmacien de 1^{re} classe
de l'Ecole Supérieure de Paris.

47, rue Cadet — PARIS

BIOGASTRINE

Pansement gastrique complet, c'est-à-dire associé à la médication sédative et à la médication antispasmodique

2 Formes. — 1° Granulé non aromatisé, de couleur blanche, ne contenant pas de sucre ; 2° Granulé aromatisé, de couleur jaune pâle contenant 15% seulement de sucre.

Doses. — Chaque jour régulièrement à jeun, loin des repas, une ou deux cuillerées à café.

1° le matin ; 2° vers 17 heures ; 3° le soir au coucher, au moins 3 ou 4 heures après le repas.

Avantages. — Grande efficacité. Pas d'intolérance ni de contre-indication, ne constipe jamais. Pas d'accoutumance, même en cas de traitement prolongé. Prix très avantageux permettant un traitement peu onéreux.

Echantillons et littérature

BERTHIOT et C^{ie}

PHARMACIENS DE 1^{re} CLASSE

1, Boulevard Henri-IV — PARIS

BIOGÉNOL DEMASLES

Puissant accélérateur de la nutrition.

Granulé. — Contenant, par cuillerée à café :

1 centigr. de glycéro-arséniate.

0.50 centigr. de phosphates organiques.

1 cuillerée à café avant les deux repas.

Liquide. — Même composition que le granulé, mais contient de la cola en plus. 1 verre à liqueur avant les repas.

Gouttes Arséno Biogénol. — Strychnine, glycéro-arséniate, extraits de quina, cola, coca.

Gouttes Phospho Biogénol. — Strychnine, acide phosphorique, extraits de quina, cola, coca.

Pour XX gouttes, 1 milligr. de strychnine, 5 milligr. de glycéro-arséniate ou 25 cgr. d'acide phosphorique. Doses moyennes : X à XX gouttes aux 2 repas. Doses progressivement croissantes : jusqu'à CXX gouttes.

Ampoules. — De 1 cm³ une ampoule contient :

glycéro-arséniate..... 0.01 centigr.

sulfate de strychnine..... 0.001 milligr.

LABORATOIRES DEMASLES

à Vienne (Isère.)

BIOLACTYL FOURNIER

Symbiose de deux ferments lactiques
orientaux sélectionnés

Usage médical :

1° Culture en bouillon :

En boîtes de 10 fl., pour adultes.

La boîte : 24 fr.

En boîte de 2 fl., pour nourrissons.

La boîte : 7 fr. 50

En boîte de 6 tubes (pour le caillage du
lait).

La boîte : 6 fr.

2° Culture sèche ; boîte de 60 comprimés (4 à 6 par jour).

L'étui : 12 fr.

Indications. — Traitement des putréfactions intestinales et de l'auto-intoxication digestive.

Usage chirurgical :

1° Culture liquide, en boîtes de 6 tubes

La boîte : 6 fr.

2° Culture sèche en poudre

La boîte : 6 fr.

Indications. — Pansement des plaies infectées, escharres, vaginites, cystite tuberculeuse, affections nasales et laryngées, pyorrhée alvéolo-dentaire.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, Rue Biscornet — PARIS

BIONERGYL

Complexe nucleo manganique. Le plus puissant réparateur des tissus musculaires, nerveux et osseux.

Propriétés thérapeutiques. — Apporte à ces tissus, non seulement le phosphore et l'arsenic (directement assimilables), nécessaire à leur *restitution ad integrum* mais aussi le *manganèse* « véhicule » de l'oxygène indispensable à tous phénomènes d'assimilation et de restauration anatomiques.

Présentation. — 2 formes : Granulé fondant d'une absorption facile.

Elixir d'une saveur particulièrement agréable.

Indications. — Anémies et chloroses. Neurasthénie. Convalescence. Surmenage. Amaigrissement. Tuberculose dans ses triples manifestations : pulmonaire, cutanée, osseuse. Rachitisme. Troubles de la croissance.

Posologie. — Chez l'adulte, granulé : 2 cuillerées à café par jour. Chez l'enfant : 1 cuillerée à café avant les repas.

Elixir : Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 — — —

J. OLIVE, Pharmacien

16, rue Saint-Gilles — PARIS (III^e)

BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycéro-Phosphatée

Granulé à base de Kola, Glycérophosphate de chaux, Quinquina et Cacao vanillé.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Prop. Thér. — *Tonique du système nerveux, facilite l'effort musculaire.*

Indications. — Surmenage, Vertiges, Anémie cérébrale, Névralgies rebelles, Névroses.

Laboratoire A. GIRARD

48, rue d'Alésia, Paris.

BIOPHYTOL

Le plus puissant Reconstituant général

Le « **Biophytol** » associe, sous la forme d'un Elixir très agréable au goût, l'*Arsenic*, le *Manganèse* et le *Phosphore organiques* à la *Cola fraîche* et à l'*Opothérapie Séro-sanguine totale*.

Composition. — Chaque cuillerée à soupe de « **Biophytol** » contient :

Extrait hématique total obtenu par concentration, dans le vide, à froid, de de Sérum et globules d'animaux sélectionnés.	10 cc.
Méthylarsinate de Sodium.....	0 gr. 03
Nucléinate de Manganèse.....	0 gr. 05
Gycérophosphate de Sodium cristallisé.	0 gr. 25
Extrait de cola fraîche.....	0 gr. 75
Sirap à l'Extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorce d'oranges amères et de cannelle vanilliné Q. S. P.....	15 cc.

Posologie. — *Adultes* : Une cuillerée à soupe pure ou mieux diluée dans un peu d'eau gazeuse, immédiatement avant les deux principaux repas.

Enfants : Une ou deux cuillerées à café, suivant l'âge, avant les deux principaux repas.

Ces doses peuvent être doublées dans les cas graves.

Indications. — Toutes les Affections qui réclament une médication réparatrice énergique : Tuberculoses, Anémies, Convalescences des Maladies Infectieuses graves, Troubles de la Croissance, Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme Paludisme, Diabète, Névroses, Asthénies Physiques et Psychiques.

« **Biophytol** » réalise la Synergie reconstituante la plus puissante qui ait jamais été mise à la disposition du médecin.

Laboratoires R. BOUYSSOU, et C^{ie}

90, Avenue des Ternes, Paris (XVII^e)

Tél. : Wagram, 61-42

BIOPLASTINA SERONO

Forme. — Ampoules de 5 c. c. (boîtes de 6).
Ampoules de 1 c. c. 5 (boîtes de 10).

Composition. — Émulsion de léciithine avec les lutéines (éthers de la cholestérine) diluée dans le sérum physiologique.

Propriétés. — Émulsion stable assurant l'assimilation des substances phosphorées.

Indications. — Épuisement et déminéralisation, anémies, neurasthénie et pré tuberculose.

Mode d'emploi. — Injections hypodermiques indolores : 20 à 30 injections pour un traitement, une par jour.

Dépôt général pour la France :

Laboratoires SANTONI

6, Rue des Ursulines — PARIS (Ve)

BIOTRIGON

Composition :

Forme A : Extrait fluide de fénu-grec désodorisé, Arrhénal, Manganèse, Iode, Tanins.

Forme C : Extrait fluide de fénu-grec désodorisé, Calcium, Phosphore.

Propriétés :

Augmentation du poids, des forces, de l'appétit
Amélioration de l'état général.

Indications :

Biotrignon A : Insuffisance organique, Asthénie, Pré tuberculose, Adénopathie, Débilité.

Biotrignon C : Mêmes indications plus tuberculose pulmonaire confirmée à forme évolutive.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 cuillerée à bouche au moment des repas.
Enfants : 1 cuillerée à café au moment des repas.

Prix du flacon de 1/4 de litre : 20 francs.

Laboratoires du BIOTRIGON

8, rue Pierre-Girard — PARIS

BIS-KA-MA

Formes Pharmaceutiques. — Poudre
Impalpable — Comprimés.

Composition. — Bismuth (carbonate), Kaolin, Magnésie, Mucilage, Sucre vanillé.

Action. — Réalise le « poudrage » du tube digestif. Anti-acide, Modificateur de la flore intestinale.

Indications. — Acidité pré ou post-prandiale : 1 cuillerée à café aux 3 repas.

Constipation chez les hyperchlorhydriques et les entérocolitiques : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun.

Un comprimé équivalent à une cuiller à café.

Prix : 20 francs.

Laboratoires DURET & RÉMY

ASNIÈRES (Seine)

BISMHYDRAL

Composition. — Définie et stable de chlorure mercureux-léger pur, et d'azotate basique de bismuth spécialement préparés.

Propriétés thérapeutiques. — Réalise l'association et la synergie médicamenteuse du bismuth et du mercure dans le traitement de la syphilis (Docteur Milian).

Indications. — Syphilis à toutes les périodes et sous toutes ses formes. Cure d'entretien discrète par voie buccale.

Tolérance parfaite, action sûre, aucune toxicité.

Doses. — Un à deux comprimés une heure avant les deux principaux repas.

Littérature et Echantillons

LANCOSME

Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e)

BISMUSODINE

(Granulée.)

Composition. — Une cuillerée à café contient :

0 gr. 50 carbonate de bismuth.

0 gr. 10 benzonaphtol.

0 gr. 50 citrate de soude état naissant.

1 gr. 50 carbonates de chaux et magnésie.

Indications. — Gastropathies. — Hyperacidité. — Sténoses pyloriques. — Colites. — Ulcus. — Antiseptie intestinale.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour délayées dans un demi-verre d'eau ou même croquées telles, suivant indications du médecin.

Laboratoires R. NIEL

60, rue Auguste-Comte — LYON (Rhône)

BISMUTH DESLEAUX

Composition. — Carbonate de bismuth pur, amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial assurant son adhérence parfaite à la muqueuse.

Action. — Pansement idéal de la muqueuse gastro-intestinale, le bismuth étant avant tout dans les affections de l'estomac le médicament de la douleur (Prof. Hayem). — Met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate (nitrites). Supérieur aux produits de substitution (kaolin, talc), goût agréable, facilement absorbé par les malades les plus difficiles.

Indications. — Ulcères, Ulcérations, Gastropathies, Hyperchlorhydries, spasmes, gastro-entérites, Oxyuriasse, etc.

Dosologie. — (Chaque flacon porte un couvercle-mesure dont le contenu correspond à environ 6 gr. de produit). — 10 à 50 gr. par jour suivant les cas, soit le matin à jeun, soit fractionnés 1/2 heure avant chaque repas, dans eau ou tisane. — Oxyures : *Adultes*, 30 gr. par jour, en 2 fois, à jeun. *Enfants*, 5 à 10 gr. par jour en 2 fois, à jeun, selon l'âge, dans un verre d'eau tiède. — Une cure de 6 jours suffit habituellement, une deuxième cure peut paraître utile, une troisième est rarement nécessaire. Faire précéder chaque cure d'une purgation légère au calomel.

Fournisseur des Hôpitaux de Paris et Province,

LANCOSME

avenue Victor-Emmanuel III — PARIS (VIII^e)

BISMUTH DU D^r QUESNEVILLE (CRÈME DE)

Introduite dès 1859 dans la thérapeutique gastrique et intestinale. Mise au point en 1880 par le D^r Quesneville, fils, professeur agrégé à l'École supérieure de Pharmacie de Paris. Expérimentée depuis cinquante ans et reconnue sans contre-indication.

Composition :

Pâte demi-liquide, uniquement constituée par un précipité d'Hydrate de Bismuth, maintenu à l'état gélatineux par un peu d'eau, c'est-à-dire sous une forme particulièrement favorable à l'action médicamenteuse utile du Bismuth. *Aucune addition de matières étrangères ou factices, absence absolue d'acidité.*

La crème se délaie instantanément dans tous les liquides en fournissant un lait de Bismuth finement homogène, bien accepté par les malades.

Indications thérapeutiques :

La crème de Bismuth du D^r Quesneville convient à toutes les applications du Bismuth dans la thérapeutique gastrique et intestinale, soit par doses massives, soit par doses fractionnées, (Gastrites, Hyperchlorhydrie, Diarrhées d'origine diverses dysentéroides tuberculeuses, Ulcérations gastriques ou intestinales, etc.).

Une cuiller-mesure, jointe à chaque flacon, correspond à 25 centigr. d'hydrate de Bismuth pur.

Posologie :

États aigus : 2 à 4 cuillères-mesure 3 ou 4 fois par jour.

États chroniques : 1 à 3 cuillères-mesure une demi-heure avant les repas.

Pansements gastriques : 5 à 20 cuillères-mesure le matin à jeun.

Choléra infantile : par demi-cuillerée-mesure.

Oxyurase : 5 à 10 cuillères-mesure.

Prix : 25 francs.

Laboratoires QUESNEVILLE

12, rue de Buci — PARIS (VI^e)

BISMUTH TULASNE

Pansement gastrique

Au S. Nitrate de Bismuth pur et polybasique préparé suivant la méthode de A. Tulasne, ex-chef de laboratoire à l'hôpital de la Pitié, de façon à pouvoir être employé sans crainte aux plus hautes doses.

Indications. — Traitement classique des affections douloureuses de l'estomac. Cicatrisation des *Ulcères* par formation d'une couche de mucus protectrice (voir Littérature). *Gastrites*, *Dyspepsies*, *Hyperchlorhydrie*, *Douleurs post-opératoires*, *Vomissements*, *Aerophagie*, *Oxyures*.

Présentation. — En boîtes de 10^e tubes-doses de 10 gr. Prix : 25 francs.

Prescrire. — Une dose ou deux, suivant le cas, à prendre en une seule fois le matin à jeun dans un verre d'eau. La même dose peut également être prise en plusieurs fois dans la journée (une demi-heure avant les repas). Le Bismuth donné à ces doses ne produit pas de constipation.

Littérature et Échantillons

Laboratoires **BAUDRY**

63, Boulevard Malesherbes, PARIS.

BISMUTHÉS "MEURICE"

Bismuthyl. — Suspension de Bismuth précipité en milieu glucosé, 97 0/0 de Bi-métallique.

Ampoules de 2 c.c. pour injections intramusculaires.

Biquinyl. — Suspension huileuse d'iodoquinat de Bismuth enrichi par addition de BiOCl (50 0/0 de Bi-métallique).

Ampoules de 3 c.c.

Injections sous-cutanées ou intramusculaires.

Union Chimique Belge, S. A.

Division : Produits pharmaceutiques
"Meurice"

68, r. Berkendael, BRUXELLES (Belgique).

BISMUTHION COUTURIEUX

Description. — Le Bismuthion est une suspension colloïdale de Bismuth pur dans l'eau distillée, obtenue par procédé électrique et destinée au traitement de la syphilis. En boîtes de 4 ampoules de 3 cc.

Action thérapeutique. — Le Bismuthion s'injecte dans les veines ou les muscles sans précautions spéciales. Il est parfaitement toléré, non toxique, ne provoque aucune réaction douloureuse ou autre, diffuse rapidement dans l'organisme et particulièrement dans les lésions syphilitiques et est facilement éliminé sans irriter les reins. Il paraît agir sur les spirochètes comme *catalyseur*.

Indications. — Le Bismuthion grâce à son absence de toxicité, est spécialement indiqué pour le traitement des syphilis anciennes qui exigent un long traitement : syphilis nerveuses, tabès, hérédosyphilis.

Laboratoires CH. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS

BISMUTHOÏDOË

Bismuth colloïdal, à grains fins.

Ampoules.

Titrées à 0 gr. 004 par cc.

Indolores.

Stériles.

Solution aqueuse.

Indications.

Spirillicide.

Syphilis.

Toutes maladies à protozoaires.

Mode d'emploi.

Une ampoule tous les 2 ou 3 jours dans les cas ordinaires. — Une tous les jours dans les cas graves.

Laboratoires M. ROBIN
13, rue de Poissy — PARIS

BIVATOL

Formule. — α Carboxéthyle; β Méthyle nonoate basique de bismuth.

Produit absolument nouveau, le premier des sels de bismuth français présenté en solution huileuse fluide.

Présentation. — Ampoules huileuses fluides de 2 c. c. contenant 4 centigrammes de bismuth métal par c. c. soit 8 centigrammes au total.

Boîtes de 12 ampoules constituant une cure.

Indications thérapeutiques. — Action spirillicide intense. Le plus rapide, le mieux toléré des sels de bismuth. Incolore et rigoureusement *indolore*, produit des effets au moins comparables à ceux obtenus par l'emploi des doses massives d'arsénobenzol.

Posologie. — *Adultes* : 12 injections de 2 c. c. faites intramusculaires à raison d'une tous les deux jours pendant la première semaine, puis de deux par semaine ensuite.

Enfants : 0 cc. 1 par semaine jusqu'à 3 ans.

0 cc. 5 de 3 à 5 ans.

1 cc. à 10 ans.

Laboratoire Français de Chimiothérapie

21, rue d'Aumale — PARIS

BLÉDINE JACQUEMAIRE

Composition. — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines), extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à juillet 1920).

Propriétés. — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

Indications. — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition. Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (Aliment de régime dans le cas suivants : Diarrhée, Constipation, Gastro-entérites) ; désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

Particularités. — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîtes de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur, ni de composition.

Doses. — Du 1^{er} au 4^e mois : 1/2 à 1 cuillerée à café par biberon. Du 5^e au 6^e mois : 1 1/2 à 2 cuillerées à café par biberon. A partir du 7^e mois : 1 cuillerée à soupe par repas ; 1 1/2 à 2 pour les adultes.

Nota. — La Blédine peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

Établissements JACQUEMAIRE
VILLEFRANCHE (Rhône).

Soc. à resp. lim. au cap. de 2.000 000 de francs.
Adm^r-Gérant : **M. MIGUET**, D^r en Pharmacie.

BLENNOSINE-FORNET

Vaccin buccal contre la Blennorragie

Principe actif. — Gonocoques de différentes souches, spécialement préparés.

Indications. — Blennorragie aiguë ou chronique, ainsi que leurs complications.

Posologie. — 1 à 3 pilules, trois fois par jour, une demi-heure avant les repas jusqu'à ce qu'une réaction locale et générale se soit manifestée. Cette réaction, d'ailleurs légère, prouve l'efficacité spécifique de ce vaccin buccal antiblennorragique.

Propriétés thérapeutiques. — Fait diminuer puis disparaître l'écoulement, évite toute complication, guérit les complications existantes.

Service Commercial et échantillons:

Laboratoires THAIDELMO

23, rue du Caire — PARIS (II^e)

Informations scientifiques et échantillons:

**INSTITUT de MICROBIOLOGIE
SARREBRUCK**

BOLDINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

Boldine Houdé

Principes actifs des feuilles de boldo.

Emplois thérapeutiques :

Maladies du foie, lithiase biliaire, ictère, hépatites, insuffisance hépatique, etc.

Mode d'emploi :

De 3 à 6 par jour, le matin, le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS

BOLEASE MONAL

Forme. — Globules glutinisés.

Comp. — Bilé et boldo, extraits complets et inaltérables.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Action. — Cholagogue, toni-hépatique, anti-toxique et sédative.

Indications. — Troubles biliaires et hépatiques. *Affections hépatiques* : lithiase, ictères, congestions, cholémie, cirrhose. *Affections intestinales* : entérites muco-membraneuses, constipation, auto-intoxications.

Laboratoires MONAL & C^{ie}
6, rue Bridaine — PARIS

BOLDOÏNE EPARVIER

Forme et composition. — Granulé sucré, agréable à prendre. Contient, par cuillerée à café, la partie active de 4 grammes de Boldo frais, partie aromatique comprise.

Action physiologique. — Stimulant général. Action spécifique sur le foie, s'oppose aux fermentations intestinales, favorise les oxydations et l'élimination des déchets (urée).

Indications thérapeutiques. — Affections du foie en général, Lithiase biliaire, Lithiase rénale. Ictère, Dyspepsies d'origine hépatique, Anorexie, Atonie des voies digestives, Cachexies.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à café par jour après les repas, prises en nature ou dissoutes dans un peu d'eau chaude.

Prix : 12 fr. 50

Echantillons sur demande adressée à :

Laboratoires ÉPARVIER

26, Grande Rue Saint-Clair — LYON

BOLDOLACTOL

Composition. — Association de ferments lactiques, de ferments biliaires dépigmentés et décholestérinés et de boldine (1/2 milligramme de boldine par comprimé).

Propriétés. — Empêche les fermentations intestinales, excite la sécrétion biliaire, stimule les fonctions hépatiques.

Avantages. — Conservation indéfinie, Tolérance digestive parfaite.

Indications. — Affections hépatiques, Entérites, Auto-intoxication intestinale, Diarrhées paludéennes.

Mode d'emploi. — 4 à 8 comprimés par jour, 20 jours par mois.

La boîte de 60 : 12 fr.

Laboratoires A. SALLES

11, Boul. de Strasbourg — PARIS (X^e)

BOLDORHÉINE

Composition. — Capsules glutinisées à base d'extract de boldo, d'extract biliaire, de podophyllin et de ferment lactique (conservé à l'état sec, mais vivant, dans un milieu approprié).

Action thérapeutique. — Combat l'insuffisance biliaire, stimule l'activité de la cellule hépatique active la sécrétion et l'excrétion biliaires, régularise les fonctions intestinales, et assainit le tube digestif.

Indications. — Insuffisances hépatiques et biliaires, ictère, lithiase, etc...

Mode d'emploi. — Deux à quatre capsules, au moment des repas, avec une gorgée d'eau.

**LABORATOIRE
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
Dr PH. CHAPELLE
8, rue Vivienne PARIS.**

BOLDO VERNE

Le cholagogue sûr et régulier.

Composition. — Extrait total des feuilles de Boldo contenant tous les principes actifs : boldine, essence et matières aromatiques.

Indications. — Tous les troubles fonctionnels du Foie et des voies biliaires. Anorexies, Atonie gastrique, Séquelles du Paludisme.

Posologie. — L à C gouttes par jour.

Laboratoire du BOLDO VERNE
13, rue Docteur-Mazet, Grenoble.

BORICINE MEISSONNIER

Tetraborate de Sodium chimiquement pur en poudre fine. Sel défini, cristallisé en rosettes résultant de la combinaison de l'acide orthoborique et du biborate de sodium.

Infinitement supérieur à ses composants par :

1° Sa pureté. — Sel cristallisé neutre, non caustique.

2° Sa solubilité. — 16 % à froid dans
75 % à l'ébullition) l'eau
parties égales dans la glycérine.

3° Son pouvoir bactéricide = Stérilisante à 6 %.

4° Sa non-précipitation des alcaloïdes et son inaction sur les métaux.

Indications. — Succédané des borax impurs et de l'acide borique dans tous leurs emplois. Succédané de l'iodoforme. Hémostatique puissant.

Hygiène et antiseptique générale de la peau et des muqueuses : conjonctivites, otites, ozène, stomatites, dermatoses, voies urinaires, gynécologie, plaies, brûlures. Bains.

Mode d'emploi :

En poudre : insufflation en gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie.

En solution : De 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau, 1 cuillerée = 8 gr. Boricine.

Prix : 7 fr. 50 net.

Laboratoires J. LOGEAI

22 bis, rue de Silly — BOULOGNE-sur-SEINE
près PARIS. — Auteuil 40-15 et 40-16.

BOROSODINE LUMIÈRE

Médication Borée — Calmant Antispasmodique

Toutes les applications de la médication bromurée. — Aucun de ses inconvénients. — Nervosité infantile. — Insomnie. — Incontinence d'urine. — Névrose. — Délire. — Neurasthénie.

Action constante, rapide, sûre, sans danger

Adultes. — Borosodine Lumière, titré à 5 gr. de tartrate borico-sodique chimiquement pur par cuillerée à café. Une demi à deux cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée à prendre en deux fois à la fin des principaux repas.

Enfants. — Sirop de Borosodine Lumière dosé à 1 gr. de tartrate borico-sodique par cuillerée à café.

Dose : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Produits Spéciaux des LABORATOIRES LUMIÈRE

9, Cours de la Liberté. — LYON

BOROSTYROL SCHLATTER

Spécifique cicatrisant des pertes de Substances cutanées-muqueuses.

Composition et présentation. — 1° Soluté alcoolique; 2° Pommade; les deux à base de dérivés terpéniques et de phénols substitués.

Propr. thérap. — Régénérateur de la cellule. Anesthésique local. Antiseptique. Non toxique.

Indications. — Plaies. Brûlures. Contusions. Boutons. Aphtes. Piqûres. Crevasses du sein. Rougeurs des nourrissons. Ulcères variqueux. Vulvites, Vaginites, Métrites, Prurits.

Mode d'emploi. — Badigeonnages, frictions, pansements adhérents au coton, selon les cas. — Prix : Flacon, 8 fr. 50; tube 7 fr. 50.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e)

A Bruxelles :

LE MARINEL, pharmacien, 273, rue Victor-Rauter

BOUCHON - BOUTEILLE - TUBES RADIOACTIFS " EMANA "

Composition. — Armature métallique portant un tube poreux contenant un sel de Radium insoluble spécial donnant un maximum d'émanation radioactive.

Forme. — 1^o *Bouteille.* — Hexagonale ; peut être couchée sans rouler, le bouchon radioactif l'obstrue en assurant l'étanchéité.

2^o *Bouchon.* — Peut s'adapter sur n'importe quelle bouteille. Étanche, par bague en caoutchouc que l'on presse dans l'intérieur du goulot en tournant la tête du bouchon. Un petit chevalet est joint pour reposer le goulot et empêcher la bouteille horizontale de tourner.

Indications. — Toute les indications de la radioactivité : goutte, rhumatisme, arthritisme, artériosclérose, troubles, ménopause, troubles de la circulation, névralgies, sciatique, anémie.

Mode d'emploi — Remplir la bouteille du liquide à radioactiver (eau de source, eau minérale, boisson, etc.), visser le chapeau dans la bouteille EMANA ou introduire le bouchon dans une bouteille d'eau minérale ou autre. Coucher la bouteille et laisser en contact avec le bouchon pendant une durée de temps en rapport avec le degré de radioactivité à obtenir (voir tableau accompagnant la notice).

Dose. — La radioactivation peut être poussée aux environs de 200 millimicrocuries et le liquide absorbé par doses fractionnées entre les repas jusqu'à la valeur d'un litre par jour.

Une dose double ou triple en émanation, ne peut nuire en quoi que ce soit à l'organisme.

LABORATOIRES " EMA "
14, rue de la Pépinière, PARIS

BOUES RADIOACTIVES EMANIA

Composition. — Sous produits de la fabrication du Radium, spécialement traités et contenant : uranium, radium, actinium, polonium, etc... Préparation ne perdant pas pratiquement sa radioactivité et par suite sans limite d'utilisation.

Forme. — Poudre sèche, sans véhicule, masse entièrement radioactive, pouvant s'utiliser en bains, cataplasmes, pommades, pansements gynécologiques, etc...

Présentées en boîtes de 1 kg., 0 kg. 500, 0 kg. 250.

Pour pansements et applications sur plaies : *boîtes stérilisées* de 0 kg. 250.

Indications. — Rhumatismes divers, goutte, arthrite blennorrhagique, épидидymites, affections nerveuses, névralgies, sciaticques, affections gynécologiques, métrites, salpingo-ovarites, affections cutanées, ulcères variqueux, etc.

Mode d'emploi. — Bains généraux avec 250 gr. Boue Emania.

Bains locaux avec 10 à 40 gr. par litre d'eau.

Cataplasmes avec Boue Emania délayée dans QS. d'eau glycerinée.

Pommade avec, comme excipient : vaseline, lanoline, huile, et...

Pansements gynécologiques.

LABORATOIRES "EMA"

14, rue de la Pépinière, PARIS. — Tél. : Lab. 14-81

BOULES QUIES

Boules plastiques adoptant exactement la forme de l'orifice auditif.

Point de fusion plus élevé que la température maximum du corps = 45° : pas de risque d'obstruction du conduit auditif.

Boules aseptisées ne pouvant, même en cas d'affections de l'oreille, provoquer de complication. Matières premières chimiquement pures.

Anti-vibratoires, ne transmettant pas au tympan les vibrations de l'atmosphère qu'elles interceptent.

Constituent le seul procédé pratique et sans danger d'isolement des bruits.

Indications. — Accessoire précieux de la Thérapeutique, permettant d'assurer le repos de tous les malades sans avoir recours aux hypnotiques et aux soporifiques toujours dangereux.

Contre le mal de mer, les bruits de l'usine et de la rue, du voyage, de l'hôtel, etc.

Indispensable aux nageurs pour éviter les otites dues à l'introduction de l'eau dans l'oreille.

DORMIR ET TRAVAILLER AU MILIEU DES BRUITS

(Grands Prix Marseille 1922).

Echantillons sur demande.

Boules QUIES

47, boulevard Victor — PARIS (XV^e)

BRIDES-LES-BAINS (Savoie)

Ses eaux, ses sous-produits amaigrissants :

EAU DE BRIDES (SOURCE HYBORD)

Affections gastro-intestinales.

Dose. — Un grand verre matin et soir.

BRIDIA

Eau de BRIDES artificiellement minéralisée.

Le purgatif doux par excellence.

Un à deux verres le matin, à jeun.

SEL NATUREL DE BRIDES

Extraits des Eaux de la source Hybord

12 fr. 50 la boîte.

Foie. — **Intestin.** — **Obésité.**

Dose. — Un à deux paquets le matin, à jeun, dans un grand verre d'eau.

FRUCTIA

Le " Sel de BRIDES " effervescent.

TABLETTES-PILULES de BRIDES

Composition. — Extraits végétaux, sels déshydratés des eaux de BRIDES Taurocholate de soude.

Indications thérapeutiques. — Toute la gamme des affections arthritiques et en particulier l'obésité, et l'artério-sclérose.

Doses et mode d'emploi. — De deux à quatre tablettes par jour, soit en deux fois matin et soir, soit en une seule fois au coucher.

12 fr. 50 la boîte.

THÉ DE BRIDES

à base de plantes à actions réductives et toni-laxatives.

En infusion, une cuillerée à soupe par tasse.

A prendre soit le matin comme petit déjeuner soit après les repas soit le soir en se couchant.

7 fr. 50 la boîte.

BAINS de BRIDES

Réductifs Amaigrissants.

Un paquet pour un grand bain à 38°-39°.

Un bain tous les jours ou tous les 2 jours.

45 francs le coffret de 12 bains.

DÉPOT DE LA COMPAGNIE DES SOUS-PRODUITS DE BRIDES

46, rue Pierre-Charron, PARIS (VIII^e)

Tél. : Élysées 76-48.

BROMÉINE MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

Propriétés. — Action sédative et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

Indications. — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

Formes pharmaceutiques. — *Ampoules* dosées 0,02 cgr. — *Pilules*: 0,01 cgr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour. — *Sirop* : 0,03 par cuil. à soupe. Dose : 1 à 3 cuil. par jour. *Gouttes*: X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

BROMIASE

Description. — Capsules kératinisées contenant

Bromure de potassium.....	0 gr. 30
Bromure d'ammonium.....	0 gr. 20
Levurine extractive.....	0 gr. 10

en fl. de 50 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle des bromures, mais sans bromisme grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage de kératine qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie, et ne répugnant pas au malade.

Indications. — 2 à 12 capsules par jour, dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale
(Voir l'étude sur l'Iodogénol)

Forme. — Gouttes.

Doses et modes d'emploi. — 20 gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques. A prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

Prop. thér. — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

Indications. — Toutes celles des Bromures métalliques : affections du système nerveux, insomnie, hystérie, convulsions, épilepsie, névralgies, etc.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUCC
à COURBEVOIE (Seine)

BROMO-MAISINE

Globules.

Combinaison directe du *Brome* et d'une *Albumine* d'origine strictement *végétale*, sans aucune autre association médicamenteuse.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète du bromisme. Disparition de tous les inconvénients dus aux bromures dissimulés ou non. Aucune saturation de l'organisme. Absence de toute altération dans l'estomac. Action directe par absorption intestinale.

Indications. — Médication donnant des résultats certains et permettant, si besoin, d'instituer un traitement intensif dans : tous états névropathiques, psychoses de toute nature, excitabilité, convulsions, épilepsie, insomnies, névralgies, spasmes et toutes affections relevant de la bromothérapie.

Posologie. — Chaque globule contient 2 cgr. de brome actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme de bromure alcalin. *Enfants* : 2 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 15 globules et au delà par jour, en 2 fois, au début des repas.

Laboratoires de l'IDO-MAISINE

J. SOUDAN, Pharmacien, ex-interne des Hôpitaux de Paris
6, rue Rosenwald — PARIS (XV^e)

BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome et de Peptone de viande de bœuf.

Gouttes: dont 40. = 1 gr. de bromure de potassium

Doses et mode d'emploi. — Adultes: 20 à 50 gouttes. Enfants: 10 à 20 gouttes.

A prendre en 3 fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

Prop. thér. — Non toxique très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolerance parfaite. Aucun mauvais goût.

Indications. — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

Laboratoires M. ROBIN
13, rue de Poissy — PARIS

BROMOVOSE

Combinaison organique bromo-albuminoïde stable.

Prop. thér. — Grande affinité du brome pour les tissus, élimination beaucoup plus lente qu'avec les bromures alcalins, d'où action thérapeutique plus sûre et plus prolongée par imprégnation des centres nerveux.

Pas de phénomène d'accumulation, ni de bromisme. Tolérance parfaite.

Indic. thér. — Insomnies. Excitabilité nerveuse. Palpitations cardiaques. Convulsions. Névroses. Épilepsie, etc.

Posologie. — 40 gouttes à prendre 2 ou 3 fois par jour dans un peu de liquide.

Prix de vente au public: 15 fr.

Laboratoire MADYL
14, rue de Miromesnil — PARIS

BRONCHITOL

Sirop de Thiocol pur, procédé français (Thiocol Elzévir).

Modifie et tarit les sécrétions bronchiques. Aseptise la flore microbienne pulmonaire.

Spécifique de la tuberculose et de la bronchite à leurs diverses phases.

Agréable au goût.

Ne donne pas de troubles gastriques.

Augmente même l'appétit des tuberculeux.

Le Thiocol Elzévir est *absolument alcalin* (point capital).

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants: dose moitié. Ces doses peuvent être augmentées, après avis du médecin.

Echantillon et littérature au Corps médical.

Laboratoires H. SALLE

4, rue Elzévir — PARIS (III^e)

BRONCHODERMINE

Laboratoires du Docteur TISSOT

Sous ce nom (déposé) est présenté un nouveau produit à base de *corps gras, spécial, adhérent à la peau*, pour obtenir l'absorption simple et et rapide des éléments les plus connus dans le traitement des voies respiratoires : Gaïacol, Sève de Pin, Terpinol, Eucalyptol et Héliosmine.

La peau est l'agent *d'analyseur, absorbant à grande surface*, le plus actif.

En respectant les *voies stomacales et intestinales et rénales* (ce qui a son prix) on peut traiter par simple application, tous les *rhumes, bronchites, pneumonies, gripes, pleurites, danger de bacillose, coqueluches*, etc... etc...

Mode d'emploi. — A tous les âges, étendre une bonne couche de Bronchodermine sur le dos, et au besoin la poitrine, recouvrir d'ouate ou de flanelle toujours la même.

Laboratoires du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS

BRONCHOSEPTOL LAURIAT

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptise les bronches et les voies respiratoires. Calme la toux, facilite l'expectoration ; fluidifie les sécrétions et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques.

Indications cliniques — Toutes affections broncho-pulmonaires, rhumes, grippe, bronchites, catarrhes, trachéites, broncho-pneumonie, tuberculose pulmonaire.

Composition. — Chaque comprimé renferme :

Poudre de Dover Codéinée (opium 0,01 remplacé par codéine 0,01).....	0,10
Bromol.....	0,02
Extrait d'aconit titré (Codex).....	0,0025
— belladone (titré Codex).....	0,005
Terpine.....	0,05
Benzoate de soude.....	0,10

Comprimés glutinisés se dissolvant seulement dans l'intestin et évitant ainsi l'action émétisante de l'ipéca à doses répétées.

Mode d'emploi :

Adultes. — 4 à 6 comprimés par jour et 2 dans la nuit, s'il y a lieu.

Enfants au-dessus de 8 ans. — 2 à 3 comprimés par jour, et 1 dans la nuit.

Prix : 11 fr. 25

Laboratoires E. LAURIAT

Docteur en pharmacie, *La Garenne-Colombes (Seine).*

BULGARINE THÉPÉNIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares sur milieu végétal

Forme. — Bouillon, comprimés et poudre.

Indic. théér. — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte). Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale), Dysenterie, Dermatose, Furunculoses, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du choléra. **Poudre :** Rhinites, ozènes, stomatites, pansement des plaies.

Modes d'emploi. — Adultes : Sucrer deux comprimés ou boire un verre à madère de Bouillon 4 fois par jour une demi-heure avant le repas. Enfants : Demi-dose.

Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Prix : La boîte ou flacon : 12 fr. 50

Le 1/2 flacon de bouillon : 8 fr. 75

**Laboratoire des Ferments
du Docteur A. THÉPÉNIER**

10 et 12, rue Clapeyron — PARIS

R. C. Seine 150.854

C 40

Traitement des cancers et fibromes toutes tumeurs malignes.

Formes:

- 1^o *C.40 Injectable*, en boîtes de 10 ampoules de 5 cc. et de 2 ampoules de 2 c.c. 5.
2^o *Comprimés*. — En flacons de 120.

Doses:

Ampoules. — Une tous les deux jours par série de 12 ; faire 3 séries à 4 ou 5 jours de distance.

Comprimés. — Deux comprimés le midi. Deux comprimés le soir, pris en mangeant. Faire suivre le traitement pendant un an.

Prix: 60 fr. la boîte d'ampoules.
20 fr. le flacon de comprimés.

Durée: 20 jours.

Laboratoires D. DROUET & PLET
Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise).

CACHET DU Dr BOVEIL

à l'Amino-Phéno- Théine.

Calmant infailible de l'élément douleur, quelle qu'en soit l'origine. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Indications. — Névralgies, Migraines, Crises de Rhumatisme ou de Goutte, Insomnies, Fièvre, Grippe, Influenza, Courbature, Paludisme, Douleurs menstruelles, Maux de dents, Otite. Mastoïdites et toutes douleurs.

Doses et Mode d'emploi. — Un cachet au moment où l'on souffre, avec un liquide chaud de préférence.

Dose moyenne : 2 à 3 cachets par jour.
Échantillon et littérature sur demande.

Prix : 8 fr. l'étui de 12 cachets.

M. PARIS, pharmacien de 1^{re} classe
1, rue Lasalle — LYON (La Boucle)

CACHETS KAPYTAN

contre la Grippe

Composition. — Codéine (1 cent. par cachet),
Teinture d'aconit (3 gouttes par cachet),
Benzoate de soude, terpine benzonaphtol.

Propriétés thér. — Sédatif de la toux, fluidifiant les sécrétions bronchiques. Antisepsie du tube digestif (Grippe, Influenza).

Indications. — Grippe, Bronchites, Asthme pulmonaire, Rhumes et toutes Affections broncho-pulmonaires.

Posologie. — 4 cachets dans les 24 heures, pris entre les repas, dans un grog fortement alcoolisé.

L'étui de 12 cachets : 9 fr.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires BARDET

Fondés en 1860

76, Rue de Sèvres — PARIS (VII^e)

CACHETS " ROCHE "

DE THIOCOL

1 Cachet "Roche" de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol "Roche".

1 gr. Thiocol "Roche" = 0,52 cgr. gaiacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 par jour et plus.

Prop. thér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

Indic. thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

CACHETS " ROCHE " de Thiocol.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e

21, place des Vosges — PARIS

CAFÉINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action cardiotonique et diurétique, favorise la contractilité musculaire, les efforts de la marche ; augmente l'activité cérébrale, facilite le travail intellectuel.

Indications :

Cardiopathie à la période d'asystolie, adynamie cardiaque, maladies infectieuses, syncope, asthme, emphysème, hydropisie.

Forme :

Ampoules à 0,05, 0,10, 0,20, 0,25 cg. par cc.

Pharmacie Centrale de France

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV^e).

CALCIONAL (comprimés)

(Chlorure de calcium naissant)

Association de sels organiques de calcium avec un chlor. alcalin, dégageant au contact de l'eau et des sécrétions digestives, 25 cg. chlor. de calcium naissant par comprimé.

Pas de saveur désagréable, tolérance parfaite, conservation indéfinie.

Prop. thér. — Celles du chlorure de calcium, sans aucun de ses inconvénients.

Indications. — A titre préventif et curatif : *Hémorragies et États hémorragiques. Réactions sériques tardives, Spasmophilie, Tétanie. Décalcification.*

Dose. — A titre préventif : Nourrissons 1 à 2 par jour : enfants 2 à 4 ; adultes 5 à 8, préalablement dissous dans l'eau sucrée. Doubler les doses pour traitements curatifs.

Laboratoires LEMATTE et BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS

“ CALCIUM-SANDOZ ”

Gluconate de chaux pur, sel soluble assimilable.

Le calcium scientifique.

Teneur en chaux (CaO) 13 % soit 9,3 % de Ca élément.
Assure toutes les propriétés physiologiques de l'ion calcium seul.

Le seul injectable par la voie intramusculaire à doses efficaces, et sans inconvénients.

Ampoules à 10 cc., forme granulée (sans sucre) et comprimés.

Posologie. — Ampoules à 10 cc.

Adultes : Une tous les 2 à 3 jours.

Enfants : 2 à 5 cc. tous les 2 à 3 jours.

Granulé sans sucre :

Adultes : 3 cuillerées à café bien pleines par jour.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à café plus ou moins pleines selon l'âge.

Comprimés :

Adultes : 2 comprimés 3 fois par jour.

Enfants : 1/2 à 1 comprimé 3 fois par jour.

Produits SANDOZ 3 et 5, r. de Metz — PARIS (X^e)

M. CARILLON, pharmacien de 1^{re} classe.

Dépôt général et vente : Usine des pharmaciens de France, 125, rue de Turenne — PARIS (III^e)

CALCOLÉOL

à base d'huile de foie de morue concentrée et solidifiée, contrôlée biologiquement sur sa teneur en vitamines A et D, de vitamine B et de sels de calcium et de fer.

Propriétés thérapeutiques. — Avitaminose, assimilation défectueuse du calcium.

Indications. — Rachitisme. Troubles de croissance. Spasmophilie. Maladies infectieuses et contagieuses. Gastro-entérites. Déminéralisation (tuberculose, grossesse, allaitement).

Forme. — En dragées inaltérables, sans odeur, forme la plus pratique de prise de l'huile de foie de morue et en granulés.

Dose et mode d'emploi. — Adultes : 4 dragées ou 2 cuillers à café de granulés avant ou pendant chacun des trois principaux repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, Pharmacien de 1^{re} classe,
21, rue Chaptal, Paris (IX^e).

CALCOZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition. — Association de ferments digestifs : pancréatine, maltine, lab-ferment avec un sel de calcium.

Mode d'action. — Les sensibilités étant, en général, des insuffisants digestifs et hépatiques, la Calcozymase réalise dans l'estomac une digestion artificielle et complète l'action de la *Prézymase* (Voir : *Prézymase*).

Indications. — Tous les accidents dus à une sensibilisation quelconque : urticaire, asthme, arthropathies d'origine anaphylactique, accidents de la goutte, du rhumatisme, etc...

Mode d'emploi. — Une dragée au milieu de chaque repas.

Laboratoires LEBOIME

19, rue Franklin — PARIS (XVI^e)

CALMITOL

Propriétés. — Préparation antiseptique et anti-prurigineuse. (Liquide ou pommade.)

Avantages. — Non toxique, sans odeur désagréable, ne tache pas. Pénètre dans l'épaisseur de la peau.

Indications. — Dermatoses prurigineuses : Eczéma, Lichen de Vidal, Prurigo, Prurit diabétique, Prurit anal, vulvaire.

Urticaire, Engelures, Piqûres d'insectes.
Dermites : Eczéma parasitaire, Impétigo, Teigne, Furoncles, Acné.

Mode d'emploi. — En applications locales, deux fois par jour.

Établissements TENCE

et C^{ie} française

d'applications chimiques réunis

E. VAILLANT, pharmacien de 1^{re} classe.
34, rue de la Justice — AUBERVILLIERS (Seine)

CALMOSUPPOS SÉDATIFS

Seul analgésique et antispasmodique agissant d'une façon constante et sans fatiguer l'estomac.

Un seul dosage pour *adultes* seulement :

Ext. de belladone-codex 1908.....	0 ^{gr} ,025
Ext. de jusquiame-codex 1908.....	0 ^{gr} ,025
Ext. de piscidia-hydro-alcool.....	0 ^{gr} ,025
Analgésime	0 ^{gr} ,50
CO ² Na H.....	0 ^{gr} ,10
Beurre de cacao, Q. S.....	1 suppositoire.
Livrés { en boîtes de 2.....	3 fr. 25
— de 6.....	9 fr. »

CALMOSUPPOS ANTITHERMIQUES

Médication idéale pour combattre la fièvre quelles qu'en soient sa violence et son origine. Trois dosages permettent de les désigner pour tous les âges :

Bébés :

Bromhydrosulfate quinine.....	0 ^{gr} ,10
Amidopyrine	0 ^{gr} ,05
Phénédine.....	0 ^{gr} ,05
Théine	0 ^{gr} ,005
CO ² Na H.....	0 ^{gr} ,05
Beurre de cacao, Q. S.....	1 suppositoire.
Livrés { en boîtes de 2.....	2 fr. 50
— de 6.....	7 fr. »

	<i>Enfants.</i>	<i>Adultes</i>
Bromhydrosulfate quinine	0 ^{gr} ,20	0 ^{gr} ,30
Amidopyrine.....	0 ^{gr} ,10	0 ^{gr} ,20
Phénédine	0 ^{gr} ,10	0 ^{gr} ,20
Théine.....	0 ^{gr} ,02	0 ^{gr} ,05
CO ² Na H.....	0 ^{gr} ,10	0 ^{gr} ,10
Beurre de cacao, Q. S.....	1 suppositoire.	
Livrés { en boîtes de 2... 3 fr. »	3 fr. 50	
— de 6... 8 fr. 50	10 fr. »	

Echantillons :

Laboratoire des CALMOSUPPOS

G.-H. Boivert, pharmacien de 1^{re} classe,

La Mothe-Saint-Héraye — (DEUX-SÈVRES)

R. C. Nfort 6318

CAMPHODAUSSÉ

(Camphre soluble dans l'eau)

(Camphosulfonate de soude)

Ampoules de 1, 2, 5 et 10 c. c. titrées à 10 % de camphre en solution aqueuse. Même posologie que l'huile camphrée. Action plus rapide grâce à sa facile résorption. Injection complètement indolore et ne laissant jamais de nodosités.

Indications. — Stimulant cardiaque dans l'*adynamie* et au cours des *maladies infectieuses*. Son emploi est particulièrement recommandé dans les cas de *collapsus cardiaque imminent*, où il est nécessaire d'agir vite.

Mode d'emploi. — 1 à 5 c. c. une ou plusieurs fois par jour par voie *hypodermique*, *intra-musculaire*, ou *intraveineuse*.

Camphodausse cholestérine

L'Ampoule de 2 c. c. contient 0 gr. 10 de Camphodausse et 0 gr. 02 de Cholestérine.

Camphodausse cholestérine et strychnine

Même teneur en Camphodausse et en Cholestérine que ci-dessus avec en plus, $\frac{1}{2}$ mgr. de Strychnine par ampoule.

Une ampoule tous les deux ou trois jours dans les cas d'*épuisement*, de convalescence et dans la tuberculose pulmonaire à ses débuts.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

CAMPHOSTYL

Composition. — Nouveau dérivé du camphre soluble dans l'eau.

Avantages. — 1° Absorption immédiate
2° Injection indolore ne produisant ni nodosité ni réaction. 3° Élimination sans subir aucune transformation de l'organisme.

Indications. — Adynamie, pneumonie, broncho-pneumonie, collapsus.

Formes pharmaceutiques. — Ampoules.
1° 12 ampoules de 1 cm³. 2° 12 ampoules de 2 cm³. 3° 6 ampoules de 5 cm³. Pour le corps médical en ampoules de 25, 50 et 100 ampoules.

Échantillon sur demande.

Laboratoires LACROIX

37, Rue Pajol (18^e).

CAMPHRO-SALYL FRAISSE

Composition :

Salicylate de Benzyle.....	0 gr. 50
Camphre.....	0 gr. 10
Huile d'olive pure.....	5 cent. cubes.

Indications :

Sciatique. — Névrites aiguës ou chroniques.

Forme :

En ampoules de 5 cent. cubes.

5 à 6 ampoules suffisent pour guérir une sciatique rebelle.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin — PARIS

CAPILLAIRAL

Composition. — Alooclat, coaltaré, éthéré, résorciné de différents pilocarpus cinchonées, hypericacées, labiées, ombellifères, rutacées et synanthérées.

Forme. — Liquide parfumé saponiné ne graissant et ne desséchant pas.

Propriétés. — Esprit régénérateur tonique. Antisepsie capillaire. Asepsie complète : destruction des tricophytons et autres parasites des cuir chevelu et bulbe pileux. Vésication légère vitalisante.

Indications. — Maladies du cheveu. Pelade. Séborrhées. Teigne. Pellicules. Calvitie.

Mode d'emploi. — Légère friction matin et soir à la racine du cheveu.

Prix : le flacon d'essai : 16 fr. 80
Le litre : 80 fr. — Le 1/2 litre : 40 fr. 50

L. ARQUEVAUX , pharmacien
à ETAMPES (Seine-et-Oise)

Dépôt : **Office commercial pharmaceutique**
71, rue du Temple — PARIS

CAPSELLASE

Médicament anti-hémorragique.

Composition. — Extrait stabilisé de Capsella.

Indications. — Métorrhagies, Hémoptysies, Hémorragies de toute nature.

Forme. — Pilules dosées à 125 milligrammes.

Propriétés. — Modère et régularise les périodes menstruelles.

Posologie :

Dose moyenne : 6 à 8 par jour, par prises de deux.

Hémorragies graves : jusqu'à 12 à 14 pilules par jour.

Prix de vente : 12 francs.

Laboratoires GROS

43. Place Delille, CLERMONT-FERRAND

CAPSULES BARDET

à l'Huile de Haarlem vraie.

Composition. — Chaque capsule contient VIII gouttes d'Huile de Haarlem vraie, garantie importée de la *seule* maison fabriquant la véritable Huile.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Calculs biliaires, Coliques hépatiques, Ictère, Coliques néphrétiques, Pyélo-Néphrite, Cystites, Arthritisme, Asthme, etc.

Posologie. — Affections aiguës :
4 capsules par 24 heures.

Affections chroniques et cure d'entretien : 2 capsules par 24 heures.

Formuler :

« CAPSULES BARDET »

Échantillons et Littérature :

Laboratoires BARDET

fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e)

CAPSULES BRUEL

à l'éther Amyl Valérianique

Sous la forme originale (1881) des capsules Bruel, l'Éther Amyl Valérianique est un médicament antispasmodique puissant dont l'emploi est formel toutes les fois qu'on voudra prescrire un antispasmodique puissant et sans danger.

Dépourvu de toute toxicité, il permet, aux doses thérapeutiques, de calmer sans morphine les spasmes les plus rebelles aux médicaments, depuis l'angoisse des aortiques et des nerveux jusqu'au spasme douloureux des coliques hépatiques et néphrétiques. C'est un précieux hypnagogue.

Doses. — 3 à 15 capsules par jour.

Le flacon : 10 fr.

Brochures et échantillons :

G. BRUEL

36, rue de Paris — COLOMBES (Seine)

CAPSULES DARTOIS

Composées de créosote de hêtre véritable, titrée en Gaïacol, à la dose de 0.05 cgr. dissoute dans 0.20 cgr. d'huile de foie de morue garantie d'origine.

Dose. — Commencer par une ou deux capsules pour arriver progressivement à la dose moyenne et généralement suffisante de 3 à 4 à chaque repas ou matin et soir avec une tasse de lait ou de tisane.

Propriétés. — Elles se dissolvent lentement dans l'intestin répandent le produit actif sur une grande surface, divisent la créosote à l'infini et multiplient son action antiseptique sans jamais amener de troubles digestifs.

Indications. — Toux. Catarrhes. Bronchites chroniques. Tuberculose, etc.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS

CAPSULES JORET ET HOMOLLE

Emménagogue

Forme. — Capsules de gélatine de 0 gr. 20, spécialement étudiées pour être rapidement absorbées par l'organisme.

Composition. — Apiol pur et bien défini, préparé et purifié par le procédé des Docteurs Joret et Homolle qui découvrirent et isolèrent ce corps.

Indications. — Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorragie. Inocuité absolue en cas de grossesse.

Posologie. — Une capsule matin et soir pendant toute la durée de la menstruation.

Prix : 13 fr. 50

Pharmacie SÉQUIN

165, rue St-Honoré — PARIS

CAPSULES DE MORRHUINE PUY

à l'extrait complet d'Huile de Foie de Morue
phosphoré et supériodé

Dosées à 2 milligr. d'iode combiné par capsule.

Elles représentent chacune 15 grammes d'huile de foie de morue débarrassée de l'oléine et margarine indigestes.

L'extrait complet d'huile de foie de morue obtenu par un procédé spécial breveté, contient réellement toutes les Vitamines, les acides gras, le brome, l'iode, le phosphore, la lécithine, principes actifs de l'huile de foie de morue.

Maladies du système lymphatique, Ralentissement des fonctions lymphoïdes, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Adénopathie, Arthritisme, Scléroses, Cachexie, Rachitisme.

Doses. — Enfants de 6 à 17 ans 2 à 4 capsules : Adultes 18 ans et au-dessus 4 à 6 capsules par jour, avant manger.

Envoi de littérature. **Laboratoire PUY**
GRENOBLE (Isère)

CAPSULES NOGUÈS

Codéine 0,002, Aconit et belladone (ext.) $\bar{a}\bar{a}$ 0,001, Lobélie (ext.) 0,002, Quebracho bl. (ext.) 0,01, Grindelia (ext.) 0 005, Terpène 0,0125, Eucalyptol 0,02.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 par jour, 2 à chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, antiseptique des bronches ; fluidifie les sécrétions bronchiques.

Indications. — Toux opiniâtres : bronchites, laryngites.

Laboratoires H. NOGUÈS

11, rue Joseph-Bara — PARIS (VI^e)

CAPSULES TAETZ

Elastiques russes à l'Huile de Ricin *vierge*.

Forme. — Capsules molles.

Propriétés. — *Purgatif* le plus doux à l'intestin, *Laxatif* idéal.

Avantages. — Sans odeur ni saveur, de digestibilité parfaite, permettent l'usage même journalier de l'huile de ricin aux personnes les plus délicates.

Présentation. — Boîtes de 4, 6 à 8 capsules selon la grosseur.

Dépôt général et Echantillons :

France. — Laboratoires TAETZ

2, rue Lesdiguières — PARIS (IV^e)

Belgique. — M. F. RAMLOT

72, rue de l'Escaut — BRUXELLES

CAPSULES TAETZ

à l'Extrait de Foie de morue lécithiné.

Forme. — Capsules molles.

Indications. — Toutes celles des glycérophosphates. Toutes celles de l'huile de foie de morue.

Avantages. — Très actives sous un petit volume; d'absorption extrêmement facile; de tolérance parfaite.

Présentation. — Boîtes de 16 capsules.
— 60 —

Dépôt général :

Laboratoires TAETZ

2, rue Lesdiguières, PARIS (I.V^e).

CARBALCALOÏDES

Alcaloïdes (ou principes actifs absorbés par un charbon polyvalent (Carbosanis) qui leur sert de véhicule et ne les relâche que dans l'intestin. Les principaux sont :

La Carbatropine. — Carbosanis atropiné (*Contipation spasmodique*).

Le Carbarsène. — C. + ac. oxyaminophénylarsénique (*Contre parasites intestinaux*).

La Carbémétine. — C. + chlorhydrate d'émétine (*Dysenterie amibienne*).

Le Carbalga. — C. + iode (*Antiseptique intestinal*).

La Carbésérine. — C. + sulfate d'ésérine (*Atonie colique*).

La Carbocarpine. — C. + chlorhydrate de pilocarpine (*Constipation atonique*).

Laboratoires MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS

CARBATROPINE

Charbon organique (Carbosanis) atropiné.

Composition. — 1/2 milligr. de sulfate d'atropine pour 10 gr. de carbosanis, soit 1/4 de milligr. d'atropine par cuillerée à café.

Indications. — La Carbatropine est utilisée avec succès dans les spasmes du côlon et agit efficacement pour combattre la constipation qu'ils provoquent. L'atropine n'est relâchée par le charbon que là où le bol intestinal est retenu, c'est-à-dire au niveau même du spasme. Le spasme disparaît et la constipation cesse.

Formes. — Granulé dosé à 5 milligr. par 100 gr., soit 1/4 de milligr. par 5 gr. (cuillerée à café).

Poudre et cachets.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dosage spécial pour enfants :

1/10 de milligr. par cuillerée à café.

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

CARBOCITROL

Composition. — A base de citrate trisodique chimiquement pur.

Indications. — Gastrite aiguë et chronique. Dilatation de l'estomac. Dyspepsie flatuente. Congestion du foie. Paresse gastrique de toute origine.

Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — 2 à 4 paquets par jour.

Prix : 14 francs.

Laboratoires O. VISCONTI

64, Boul. Barbès — PARIS (XVIII^e).

Téléphone : Nord 30-21

CARBOLACTYL SIMPLE

Cure de désintoxication intestinale,
hépatique et rénale.

Composition. — Ferments lactiques et pancréatiques sélectionnés, adsorbés par du charbon végétal pulvérisé, algues à mucilage.

Indications. — Auto-intoxications gastro-intestinales. Entérites, Diarrhées, Troubles de la nutrition, Troubles fonctionnels du foie, Dermatoses.

Formes. — 1^o Boîte de 30 cachets :

2^o Poudre avec cuiller-mesure
(n'existe pas sous forme de comprimés).

Doses. — Adultes : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures *pro die*. — Enfants : 2 à 6 mesures *pro die*.

CARBOLACTYL BILIÉ

Composition. — Identique à celle du Carbolactyl simple avec addition de Bile purifiée et dépigmentée.

Indications. — Entérite muco-membraneuse d'origine hépatique, Constipation essentielle, Insuffisances hépatiques et biliaires, Angio-Cholite et Cholécystite, Cholémie, Hépatisme et Cyrrhoses, Diabètes par Dyshépatie, Artériosclérose par intoxication.

Forme. — Boîte de 30 cachets
(ni comprimés, ni poudre biliée).

Doses. — 2 à 3 cachets *pro die*, à la fin des repas.

Échantillons et littérature sur demande.

19, Rue de Fleurus — PARIS (VI^e).

CARBONAL PRINCEPS

Charbon médicinal superactif Ed. Urbain

*Pouvoirs Adsorbant et Catalytique très élevés
supérieurs à tous les Produits Similaires actuels.*

MÉDICATION ANTITOXIQUE TYPE

Indications. — Diarrhées. — Empoisonnements.

— Infections. — Intoxications. — Urticaire. —

Diarrhées aiguës des pays chauds. — Maladies
aiguës. — Tumeurs du tube digestif.

Employé au cours des affections septiques de la
bouche, du pharynx et du larynx : neutralise les
produits microbiens déglutis.

Dose :

Deux à quatre cachets dans les 24 heures.

En raison de son activité contre les fermentations,
le Carbonal Princeps amène un léger effet de
constipation. Les deux autres formules du Car-
bonal répondent aux exigences et permettent
d'obtenir le maximum de résultat.

CARBONAL MAGNÉSIE

Composition :

Carbonal Princeps + Magnésie calcinée.

Indications :

Fermentations stomacales, aérophagie, dyspepsie,
gastropathies avec hyperacidité, néoplasies sto-
macales, affections ulcéreuses.

Dose :

Un cachet après chaque repas.

CARBONAL RÉO-RHAMNIQUE

Composition :

Carbonal Princeps + Rhubarbe + Cascara.

Indications :

Putréfactions et fermentations intestinales dues à
la constipation, entérites avec rétention, entéro-
colites, cirrhoses, ictères, infections biliaires.

Dose :

Un cachet une demi-heure avant les repas.

Forme :

Boîte de 30 cachets
pour chacune des trois formules.

LABORATOIRES du CARBONAL

16, rue Cantin, Courbevoie (Seine).

CARBONATE DE BISMUTH

La forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth est certainement la *Tablette Perroud*. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les réflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Compositions. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes, elles seront plus rapides en résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie* 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicamenteusement puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge.) — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *gastralgie*, *hypersécrétion* : dans les fermentations intestinales, à petites doses, seule ou associée, la *Tablette Perroud* rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD

3, rue Sébastien-Gryphe — LYON
(ancien^t 7, rue des Archers)

CARBOSANIS

CHARBON ORGANIQUE A POUVOIR
D'ADSORPTION CONSTANT

Propriétés. — Pouvoir absorbant considérable, puissamment antitoxique dans toutes les infections de l'estomac et de l'intestin ; agit également comme pansement gastro-intestinal beaucoup plus sûr que le bismuth et le kaolin.

Indications. — Empoisonnements. Fermentations gastro-intestinales. Hyperchlorhydrie. Ulcus. Entéro-colitis. Diarrhées intenses.

Formes. — Granulé, poudre et cachets.

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

CARDIBAÏNE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure

Principe actif du *Strophantus gratus*.

Présentation et posologie. — 1° Voie buccale.

Solution glycéro-alcoolique à 2 p. 1000 (25 gouttes = 1 mgr. d'ouabaïne).

Petites doses : 25 gouttes par jour en une fois.

Doses moyen. 50 à 75 g^{tes} par j. en 2 ou 3 fois.

Doses fortes : 100 gouttes par jour en 4 fois.

2° Voie intraveineuse — Ampoules titrées telles

que 1 cc. = 1/4 mgr. ouabaïne ; 1/4 mgr. p. injec.

Indications. — Toutes les insuffisances cardiaques avec hypotonicité marquée ; en un mot, tous les cas où il y a dilatation cardiaque. Dans toutes les autres variétés d'insuffisance cardiaque, voir **Digibaine**.

Echantillons et littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

6, rue d'Assas, Paris (6°). Tél. : Littré 31-85.

Belgique : Agent général : **L. Prunlères**

19, rue Louis-Hap — BRUXELLES

CARDIOSTHÉNINE

Médicament du Cœur et des Vaisseaux.

Définition :

La Cardiosthénine, à base d'extrait de strophantus, de sulfate de spartéine, d'extrait de cratægus oxyacantha et d'extrait de valériane, constitue un toni-cardiaque anti-spasmodique par action vasculaire dilatatrice qui soutient le cœur et diminue les résistances.

Indications thérapeutiques :

Douleurs précordiales, Dyspnée d'effort, Palpitations, Taehycardie. Angine de poitrine, Goutte exooculalnique, Arythmie, Myocardites, Endocardites, Hypertrophie du cœur, Dilatation des cavités du cœur, Hypertension artérielle, Cardio-arthériosclérose, Urémie.

Posologie :

De 4 à 6 capsules par 24 heures, ou davantage suivant prescription du médecin traitant.

Laboratoire de Pharmacologie Générale

D^r Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS

CARDYL

Camphocarbonate de bismuth
en solution huileuse.

Injectable par la voie intra-musculaire.
bien toléré, le Cardyl associe les avan-
tages des sels de bismuth solubles à ceux
des suspensions insolubles.

Indications :

Syphilis, Spirilloses.

Posologie et mode d'emploi :

Injection tous les 5 jours d'une ampoule
de 1 cc. (Cinq centigr. de bismuth métal).
Série de 15 injections.

" SPÉCIA "

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

CASCARA MIDY

à base de Cascara Sagrada naturel, complet et
épuré, mais non dénaturé par des manipu-
lations chimiques.

Pilules dosées à :

1^o 0,12 cgr. d'extrait hydro-alcoolique de Cascara
Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-
anthraquinoniques, à l'exclusion des résines
drastiques et de l'huile essentielle.

1^o 0,10 cgr de poudre sélectionnée de *Rhamnus
purshianus*.

Dose et mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 pilules le
soir au dîner. Après 15 jours, espacer les doses.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux et
à effet constant, ni irritant, ni drastique.

Indications. — Constipation habituelle et ses
troubles, peut être prescrit aux femmes en-
ceintes et aux nourrices.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e)

CASCARINE LEPRINCE

C¹² H¹⁰ O⁵

Indic. thér. — Constipation habituelle. Affections du foie, Constipation dans la grossesse, l'allaitement, etc.

Cholagogue puis Copragogue de tout premier ordre. (Spécifique des *causes* et des *conséquences* de la *constipation*).

Véritable traitement et non pas purgatif banal, employé couramment depuis 50 ans.

Doses et mode d'emploi. — Pilules à 0,10 : 1 ou 2 Pilules le soir au début du repas.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

CATAPLASME DU D^r LELIÈVRE

Antiseptique, instantané, émollient, résolutif.
Approuvé par l'Académie de Médecine de Paris.

Avantages et indications. — Il est *instantané et économique*. — Plus de manipulations compliquées, plus de linges. Il est *antiseptique et résolutif*. — Abscès, furoncles, anthrax, panaris.

Il est *anesthésiant*. — Contusions, entorses, brûlures, engelures, eczéma.

Il est *antiphlogistique et émollient*. — Ecchymoses, épanchements, hydarthrose.

Il est *décongestif*. — Laryngites aiguës, faux croup et toutes inflammations.

Il est *inaltérable*, et remplace tous les pansements humides.

Mode d'emploi. — Soumettre le cataplasme ou un morceau de cataplasme à une faible quantité d'eau tiède ou chaude jusqu'à parfait gonflement, l'appliquer sur la partie malade et recouvrir d'imperméable.

Comme *véhicule*, ce Cataplasme accepte et retient facilement les substances médicamenteuses les plus variées : laudanum, arnica, etc...

On obtient un *Cataplasme sinapisé* en le saupoudrant de farine de moutarde au moment de l'application.

E. BOULLÉ, Pharmacien de 1^{re} classe,

Ex-Interne des Hôpitaux,

Lauréat de la Faculté de Paris

20 bis et 22, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine)

CATEMÉNYL

Composition. — Le *Cateményl* est à base : d'*Hamamelis virginica*, décongestif, vaso-constricteur veineux, hémostatique, sédatif de marbrure d'Inde, qui fluidifie le sang et calme spécialement la douleur hémorroïdale ; de *Piscidia erythrina*, sédatif utérin ; de *Viburnum prunifolium*, tonique nerveux, astringent, anti-abortif ; de *Hydrastis canadensis*, vaso-constricteur abdominal, par action élective sur les splanchniques.

Propriétés et indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Hémorroïdes, Etats variqueux ; Eczéma variqueux, Phlébites infectieuses et variqueuses ; Hyposphysie des extrémités.

Mode d'emploi. — XV à XX gouttes avant chacun des deux principaux repas dans un peu d'eau. Cesser pendant les règles.

Littérature et échantillon sur demande.

Prix : 15 francs.

Laboratoire du docteur LALAURIE

CUXAC D'AUDE (Aude).

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique,
71, rue du Temple, PARIS (III^e), et ses succursales.

CÉRÉALES-BÉBÉ

FAVRICHON

Régime de l'enfant constipé

Composition.

Les Céréales-Bébé, préparées avec la partie des céréales la plus riche en sels minéraux, offrent à l'organisme en formation les phosphates naturels sous leur forme la plus assimilable. Les enfants chétifs et malades qui en font usage ne tardent pas à reprendre du poids.

Propriétés.

La constipation, très fréquente chez les petits enfants, provient souvent de l'alimentation concentrée destinée à favoriser leur croissance. Les Céréales-Bébé joignent à leurs propriétés très nourrissantes, celle de faire disparaître rapidement la constipation la plus obstinée.

Particularités.

Elles ne contiennent aucun produit chimique ou pharmaceutique, aussi, peut-on en faire quotidiennement usage, aussi longtemps qu'il est nécessaire.

Dose.

1 an : 4 cuillères à café pour 150 gr. de lait.
2 ans : 2 cuillères à soupe pour 200 gr. de lait.
4 ans et plus : 3 à 4 cuillères à soupe.

CÉRÉALES GRANULÉES. — Déjeuner délicieux pour adultes et personnes âgées. A raison des catarrhes intestinaux les plus anciennes et les plus rebelles.

Echantillons et littérature sur demande.

FAVRICHON et VIGNON

Pharmacien-Chimiste.

à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).

CÉRÉBRINE FOURNIER

Liqueur agréable, de composition définie, spécifique par excellence des migraines, névralgies rebelles, règles douloureuses.

Cérébrine simple. — Pour tous les cas en général de migraines et névralgies.

Cérébrine bromée. — Migraines, névralgies tenaces, agit efficacement contre les coliques menstruelles.

Cérébrine bromo-iodée. — Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, névralgies faciales, sciatiques.

Cérébrine iodée. — Névralgies rhumatismales.

Cérébrine quiniée. — Courbature, grippe infectieuse.

Dose. — Une cuillerée à soupe dans un peu d'eau une heure avant le repas ou deux heures après. Renouveler au besoin la dose jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

A. FOURNIER & C^{ie}, Pharmaciens
147, boulevard Montparnasse — PARIS (VI^e)

CÉRÉBROÏL LEYSIN

et Sève Cérébralose Leysin.

Sels solubles non oxydés de phosphore directement assimilables. Yagéine, Yagénine, sels de terres rares.

Présentation. — Liqueur, cachets et comprimés.

Indications. — Insuffisance cérébrale, Dépressions nerveuses, Perte de mémoire, de volonté, Apathie, Irrésolution, Phobies, Tics, Aphasie, Asthénie génitale.

Propriétés. — Augmente la Faculté d'attention volontaire, l'Intensité de la pensée, l'Énergie morale, la Puissance de travail et la Résistance physique. Facilite la Rééducation cérébrale. Spécifique réel de la Fatigue, du Surmenage et des Neurasthénies.

Posologie. — Un comprimé ou une cuillerée à café avant chacun des deux principaux repas. Supprimer toutes médications contenant de la strychnine ou de l'arsenic.

Les Laboratoires LEYSIN.

1^{bis}, rue Molitor, PARIS (XVI^e).

CÉRÉBROSTHÉNINE DALIN

Éléments actifs. — Arsenic, Vanadium, Phosphore, Strychnine, Nucléines, Manganèse en combinaison stable et définie.

Indications. — Toutes les maladies déficitaires ou par carence organique, les Asthénies, Anémie, Lymphatisme, Neurasthénie, Maladies consomptives et anergissantes, Grippe, Convalescence, Tuberculose.

Posologie. — 1° Cachets : 1 cachet de Cérébrosthénine avant chacun des deux principaux repas ;

2° Dragées : 2 dragées le matin, à midi et le soir, avant les repas. De 12 à 18 ans : une dragée seulement avant les trois repas.

3° Gouttes : XX gouttes avant les deux principaux repas. De 12 à 18 ans : une goutte par année d'âge avant les deux principaux repas.

C. DALIN, Pharmacien d. 1^{re} classe.

49, quai Saint-Vincent, LYON

CÉRÉOSSINE DEHAUSSY

Reconstituant physiologique.

Minéralisateur complet, facteur antirachitique et de croissance par sa poudre d'os frais, sa parathyroïdine *fixotriple*, son extrait de moëlle osseuse *vitaminée* (facteur anti-rachitique et de croissance).

La Céréossine contient des vitamines naturelles et non des vitamines artificiellement préparées. Les facteurs antirachitiques et de croissance sont dosés biologiquement sur des rats blancs carencés.

Aucune contre-indication.

La Céréossine ne contient, ni adrénaline, ni surrénale.

Indications :

Tous les états de décalcification et de carence minérale.

États pré-tuberculeux et Tuberculose quelle que soit sa localisation; *Affections osseuses* et *Troubles de la croissance* : Rachitisme, Croissance trop rapide, Fractures, Caries dentaires, *Grossesse, Lactation, Troubles douloureux de la ménopause, Anémie, Surmenage physique et intellectuel, Convalescence* des maladies infectieuses.

Posologie :

Cachets. — *Adultes* : 2 par jour; 10 ans : 1 par jour.

Prix : 12 francs : la boîte de 40 cachets.

Poudre. — *Adultes* : 2 cuillerées à café par jour.

10 ans : 1 — — —

5 ans : 1/2 — — —

Prix : 12 francs la boîte.

Granulés. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

10 ans : 2 à 3 — — —

5 ans : 1 à 2 — — —

1 à 2 ans : 1/2 — — —

Prix : 12 francs la boîte.

Laboratoires DEHAUSSY

66, rue Nationale, LILLE

R. C. Lille 1794.

CÉRINIL

Indications :

Tuberculose sous toutes ses formes. Prétuberculose. Anémie. Chlorose. Scrofule, etc...

Action :

Agglutine le Bacille de Koch. Neutralise les Toxines. Provoque l'Oxydase du sang, augmente le taux de l'hémoglobine, le nombre des hémato blastes et des hématies.

Formule gouttes :

Chlorure de Cérium.....	2 gr. 50.
Chlorure de Sodium.....	2 gr. 50.
Bromure de Radium.....	2 micros.
Eau bidistillée.....	100 gr.

Formule ampoules :

Chlorures de Cérium.....	0 gr. 50.
Chlorure de Sodium.....	3 gr. »
Bromure de Radium.....	20 micros.
Eau bidistillée.....	400 gr.

Formes :

Gouttes : Ampoules de 1 c. c. et de 2 c. c.

Posologie et mode d'emploi :

Les 3 premiers jours faire prendre avant les repas du midi et du soir une goutte.

Tous les 3 jours augmenter d'une goutte à chaque repas, jusqu'à 30 gouttes par jour.

Rester à 30 gouttes pendant deux mois, puis diminuer progressivement jusqu'à 0.

Reprendre le traitement progressif après un mois de repos.

Pour hâter les bons effets du CÉRINIL gouttes, faire des injections intraveineuses ou intra-musculaires avec les ampoules CÉRINIL.

Ne commencer les injections que vers le 7^e jour, après que la tolérance du médicament a été affirmée.

Tous les 3 jours une injection :

1 c. c. les 3 premières ;

2 c. c. les 3 suivantes ;

3 c. c. les 3 suivantes ;

4 c. c. les 3 dernières ;

Suspendre pendant un mois et faire 2 ou 3 séries.

Toutes ces doses sont des doses moyennes. Elles peuvent être augmentées, même doublées sans observer aucun trouble particulier.

Dans le cas de courbature ou de migraine violente, diminuer la dose, pour reprendre après disparition de ces troubles, la progression, mais ne pas arrêter complètement. Pour les enfants doses moitié moins fortes.

Echantillons et littérature

Laboratoires CÉRIOMA

16, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie — PARIS (IV^e)

CÉRIOMINE

Réminéralisateur opothérapique radioactif.

Indications. — Anémie. Chlorose. Lymphatisme. Rachitisme. Scrofule. Convalescences. Fractures. Surmenage. Grossesse. Allaitement. Croissance. Formation difficile. Neurasthénie. Caries dentaires.

Action. — Apporte par la poudre d'os frais et donne à l'organisme : la chaux, la magnésie, le manganèse, le fer, l'iode et le fluor qui lui sont nécessaires.

Supplée au rôle défaillant de certaines glandes, par le thymus et la parathyroïde, qui permettent l'assimilation et empêchent la déperdition minérale.

Enfin, la radioactivité induite du radium favorise la division infinie de tous les éléments de la CÉRIOMINE, la libération des ions minéraux et leur fixation dans les tissus vivants.

Par ses rayons alpha et bêta, par son émanation, la radioactivité à dose presque infinitésimale, analogue aux radioactivités naturelles de l'organisme humain en état de santé, provoque une suractivité chimique des sels en solution et des extraits glandulaires favorisant ainsi considérablement le transport et la fixation des ions minéraux ; en outre, elle augmente le taux de l'hémoglobine, le nombre des hématoblastes et des hématies ; elle détermine une leucocytose utile.

Introduit dans l'organisme, le radium exerce une réelle stimulation vitale, qui résulte vraisemblablement de son action élective sur les organes sanguiformateurs et le système nerveux ; on s'explique ainsi le relèvement de l'état général constaté par tous les cliniciens.

Formule :

Poudre totale d'os frais.....	500 grammes
Carbonate de chaux.....	1250 —
Silicate de magnésie hyd.....	500 —
Carbonate de fer.....	250 —
Hydrate de magnésie.....	1000 —
Sulfate de manganèse.....	65 —
Iodure d'amidon.....	25 —
Fluorure de chaux.....	50 —
Parathyroïde.....	5 —
Thymusine.....	15 —
Bromure de radium.....	250 microgrammes
Sucre vanillé.....	3000 grammes
Cacao.....	1250 —

Pour 10000 comprimés.

Forme. — Comprimés agréables au goût.

Posologie et mode d'emploi. — Pour les adultes : 2 comprimés avant le repas de midi et 2 avant celui du soir.

Pour les enfants de moins de 7 ans : moitié de la dose ci-dessus. Délayer les comprimés dans un demi-verre d'eau ou les croquer

Echantillons et littérature

Laboratoires CÉRIOMA

16, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie — PARIS (IV^e).

CÉTÉMOL

Formes. — Capsules glutinisées. Ampoules injectables.

Propriétés thérapeutiques. — Huile antiseptique stérilisée contenant Camphre, Eucalyptol, Menthol et Thymol, en quantités judicieusement dosées.

Indications. — Affections des voies respiratoires, Grippe et tous états infectieux.

Posologie. — *Capsules* : 6 à 8 par jour.
Ampoules : Injection sous-cutanée ou intramusculaire d'une ampoule de 2 centimètres cubes par jour, et même 2 ou 3 ampoules dans les états infectieux.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1^{er})

CETHOCAL

Composition. — Complexe de sulfates de terres rares et sels de calcium.

Action. — Les sels, en particulier les sulfates de terres rares, catalyseurs d'oxydation, sont des destructeurs de toxines, d'où leur action puissante dans l'Eczéma, considéré comme réaction de défense (GOUCHEROT). Antiseptiques puissants, à action élective sur le bacille de Koch (DROUT), ils constituent de véritables spécifiques des dermites, en particulier et tout spécialement des Tuberculoses cutanées.

Indications. — Eczémas de toutes formes, Impétigo, Herpès, Acné, Ulcérations de la peau, Erythème fessier des bébés, Pyodermites, Lupus, Psoriasis, Adénites, Tuberculoses verruqueuses Métrites (en tous pansements). Cure de dés-arsibilisation.

Mode d'emploi. — **Poudre :** Employer la poudre telle quelle ou, mieux, délayée dans un peu d'eau bouillie, à consistance de crème; l'appliquer sur la lésion et laisser sécher, faire tomber l'excès avec un coton ou un linge sec. Une application matin et soir.

Pâte. — Une application matin et soir.

Gouttes. — *Adultes :* XX gouttes, 2 fois par jour, au début des repas de midi et du soir.

Enfants : A partir de 6 ans, V à X gouttes.

Ampoules. — Voir instructions spéciales dans la notice intérieure des boîtes.

Ovules. — Une tous les soirs.

Forme et prix.

Poudre : 8 fr. *Pâte :* 10 fr. *Gouttes :* 12 fr.
Ampoules : 25 fr. *Ovules :* 18 fr.

Laboratoire du CÉTHOCAL

8 bis, Rue J.-J. Rousseau,
FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine)

CÉTRAROSE GIGON

Composition. — Solution d'acide protocétrarique $C^{30} H^{22} O^{15}$ à 0,016 milligr. par cm. c.

Forme. — Gouttes.

Indications thérapeutiques. — Médicament à électivité musculaire. Analgésique gastrique, Spécifique contre les vomissements, Vomissements de la grossesse. États nauséux, Douleurs gastriques, Troubles digestifs, Indigestions.

Mode d'emploi et Doses. — 15 à 20 gouttes en une fois dans un peu d'eau sucrée. Jusqu'à 200 gouttes par 24 heures.

Laboratoires du Dr André GIGON
7, rue Coq-Héron — PARIS (1^{er})

CHARBON FRAUDIN

Granulé
avec ou sans Naphtol.

Absorbe, neutralise et transforme les produits inutiles ou dangereux, tout en sauvé-gardant l'intégrité de la muqueuse gastro-intestinale, dans tous les cas où il y a douleur, inflammation ou infection de l'estomac ou de l'intestin.

Indications. — Toutes les affections de l'estomac et de l'intestin, Infections, Intoxications, Empoisonnements, etc.

Doses. — 3 à 6 cuillerées à café par jour et plus par voies buccale ou rectale.

Laboratoire FRAUDIN
BOULOGNE (près Paris)

CHARBON TISSOT

(Grains anisés de)

Forme. — Charbon de peuplier aggloméré au gluten mucogène, aromatisé à l'anis, très légèrement additionné de benzo-naphtol, ou simple.

Le mode d'agglomération en gros grains glutinisés en fait la meilleure forme d'administration du charbon de peuplier en même temps que la plus agréable. Divisent et expulsent mieux que les laxatifs.

Indications. — Dyspepsie, Gastralgie, Flatulence, Digestions difficiles, Nausées, Hoquet, Renvoi, Embarras et Fermentations intestinales.

Dose. — 1 cuillerée à café soit après chaque repas soit le soir en se couchant, ce qui suffit habituellement.

Nota. — Avaler comme des graines de lin avec une gorgée d'eau si possible.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, Boulevard de Clichy — PARIS

CHELOÏDINE

Pommade résolutive et calmante à base de Thiosinamine, salicylate de soude et stovaine.

Dépourvue de toute toxicité

Indic. Thérap. — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

Mode d'emploi. — Deux fois par jour, appliquer, gros comme une noisette, sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

Laboratoires DORANTOWICZ

17^{bis}, Avenue Parmentier — PARIS (XI^e)

Tél. Roquette 14-12

CHENANTHOL

(Vers intestinaux)

(*Ascaris*. *Ankylostome*, *Anguillule*, *Oxyures*, *Trichocéphale*. etc.)

Seule présentation officinale, définitive et parfaite, inoffensive et sûre, de l'essence pure de *Chenopode*.

Posologie et mode d'emploi. — Capsules dosées en *volume* et non en gouttes ($\frac{1}{4}$ de cent. cube par capsule). On donne une capsule par 3 années d'âge ; maximum : 6 capsules en 3 doses, heure par heure. Purge saline : 1 heure $\frac{1}{2}$ après la dernière.

Régime. — Pas de régime préparatoire. *Diète de rigueur* pendant le traitement jusqu'à effet complet de la purge.

Renouveler le traitement au bout de 10 jours si on juge à propos, comme cure radicale.

Laboratoire L. HINGLAIS

ÉPERNAY (Marne)

CHLOCCI

(Le chlore occit les cocci.)

Antiseptique, non toxique, à base de chlore naissant.

Composition. — Poudre ou comprimés de paratoluène sulfochloramine sodique (0,25.)

Indications. — Petite et grande chirurgie. Pansement humides, lavages. Gynécologie, Urologie.

Doses. — 5 comprimés par litre d'eau pour lavages, injections. 10 comprimés par litre d'eau pour lavage de plaies, pansements humides, goutte à goutte.

Aucune toxicité. — Aucune causticité.

Laboratoire ADAM Docteur en pharm.
à Granville (MANCHE).

CHLORAMINE FREYSSINGE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

Forme. — Pilules à enrobage de gluten recouvert d'un enduit inattaquable par le suc gastrique.

Compos. — Chloramine T 0 gr. 05. Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10.

Indic. thér. — Dysenteries, Entérites, Paratyphoïdes, Porteurs de germes, Colibacillose, etc.

D'une innocuité absolue, elles permettent *réellement* de réaliser la désinfection intestinale ; (Fétidité des selles, etc.).

Posologie. — 2 à 8 pilules par jour au commencement des principaux repas.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS

CHLORÉTHYLE BENGUÉ

Chloréthyle Bengué. — Anesthésie locale, névralgies.

Flacons en métal et en verre. Fermeture à clapet très pratique.

Anestile Bengué. — Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle volatil à 2°.

Anesthésie locale, névralgies.

Narcotile Bengué. — Chlorure d'éthyle pur pour anesthésie générale.

Flacon de 50 gr. gradué à gros jet, fermeture à clapet. — Tubes scellés 3, 5, 10 cc. pour anesthésie générale.

Chlorure de méthyle pur. — Bidons de 250, 500 gr. et 1 kilo.

Docteur BENGUÉ

Pharmacien

16, rue Ballu — PARIS (IX^e)

CHLORAL BROMURÉ DUBOIS

Médicament spécifique du système nerveux, dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas l'estomac. — Liquide sucré, de consistance sirupeuse, contenant les principes des écorces d'oranges amères, représentant 40 cgr. chloral et 60 gr. bromure par cuillerée de 20 gr.

1 à 4 cuillerées, à café ou à soupe, selon l'âge dans les 24 heures.

Flacons et demi-flacons.

Insomnies, Menstruations douloureuses,

Névralgies, Névroses, Psychoses.

Coqueluche, Épilepsie,

Malaises des Hypertendus.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS

CHLORAL-GÉRANIE

Composition. — Solution concentrée de chloral cristallisé (2 grammes par cuillerée à café) désodorisé par l'essence de géranium distillé sur roses.

Forme. — Délivré en flacon de 60 cm³.

Propriétés. — Calmant, décongestif, antiseptique.

Indications. — Angines, laryngites, pharyngites, amygdalites, stomatites, gingivites.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau tiède en gargarismes et bains de bouche.

Laboratoires GROSJEAN

8, rue Lafayette, PARIS (9^e).

CHLORINOL INHALANT

Forme pharmaceutique et composition. — Huile végétale neutre et stérile avec chlorétone, orthoforme, camphre et essences.

Propriétés. — Sédatif, décongestionnant et antiseptique des voies respiratoires.

Avantages. — Huile de qualité *exceptionnelle* très *diffusible*, très *agréable*, associant à des médicaments actifs des essences dont le *choix* a été déterminé d'après leur *pouvoir antiseptique* et leur action *non irritante*.

Indications. — Toutes affections du rhinopharynx.

Présentation et mode d'emploi. — 2 formes: 1^o liquide 3 à 4 gouttes, 3 à 4 fois par jour en instillations nasales ou en pulvérisations et en *injections intratracheales*.

2^o *Capsules* pour instillations nasales, 3 à 4 fois par jour.

Prescription. — 1 flacon Chlorinol Falvy, ou 1 boîte capsules Chlorinol Falvy.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié es-sciences, ex-interne lauréat des
Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias PARIS (XVII^e)

CHLORO-CALCION

Forme : Solution.

Composition :

Solution titrée de *Chlorure de calcium* cristallisé, chimiquement pur, stabilisé.

LXXX gouttes (ou 1/2 cuiller à café) 1 gr. Ca Cl^2 .

Indications :

Récalcifiant Croissance, Tuberculose, Entérites, Carie dentaire, Spasmophilie, Accidents sériques, Grossesse, Allaitement.

Hémostatique : Toutes hémorragies ; et comme *préventif* des hémorragies post-opératoires.

Diurétique déchlorurant : Albuminuries, Néphrites, Pleurésies, Ascite.

Mode d'emploi et Doses :

Dans de l'eau sucrée de préférence avant les repas.

Chez les enfants au-dessous de 10 ans :

IV gouttes par année comme *récalcifiant* ;

XX gouttes par année comme *hémostatique* ;

L à CC gouttes dans les *accidents sériques* ;

3 à 6 fois LXXX gouttes dans la *spasmophilie* ;

Chez les adultes :

XL gouttes 2 fois par jour comme *récalcifiant* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *hémostatique*

3 à 10 cuillers à café comme *diurétique* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *antianaphylactique* ;

Laboratoires MICHÉLS

9, rue Casteix — PARIS

CHLOROBYL**Composition :**

Tochlorine.....	0 gr. 05
Bile purifiée.....	0 gr. 10
Charbon.....	0 gr. 10

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Prop. Thér. — Désinfection intestinale.

Indications. — Entérite, Dysenterie,
Affections cutanées

Mode d'emploi. — 2 à 3 pilules avant
chaque repas.

Laboratoires " Lobica "

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e)

CHLORO-MAGNESION

Composition. — Solution titrée et stabilisée
de Chlorure de magnésium pur sec, et de
Chlorure de calcium pur cristallisé.

XXX gouttes = 1 gr 20 $MgCl^2$ + 0 gr 50 $CaCl^2$.

Indications. — Médication anticancéreuse,
Dermatologie, Verrues, Papillômes, Régula-
tion de la Sécrétion biliaire, Asthénie ner-
veuse, Tremblements séniles ou pathologi-
ques.

Emploi. — XV gouttes avant chacun des deux
principaux repas, pendant vingt jours, suivis
d'un repos d'une semaine, le traitement étant
continue pendant deux ou trois mois, et repris
au besoin après une période égale.

Prix : 12 fr.

Laboratoires VÉDÈS

52, boulevard du Temple, PARIS

Descouraux et Fils, Pharmaciens.

Docteur en Pharmacie.

CHLOROSULFOL VIGIER

Chute des cheveux.

Antiséborrhéique.

Composition. — Solution soufrée à 3 0/0 dans un mélange de sulfure et de tétrachlorure de carbone.

Action. — « Le soufre est le médicament spécifique de toutes les lésions du follicule pilo-sébacé. » (Sabouraud.)

Avantages. — Le soufre n'est habituellement solubilisé que dans le sulfure de carbone — odeur très désagréable — très inflammable, application douloureuse.

Le CHLOROSULFOL est désodorisé — moins inflammable — peu douloureux.

Indications. — Folliculites, acnés, hypersécrétion sébacée, séborrhée, alopecies, et surtout chute des cheveux banale d'origine séborrhéique.

Mode d'emploi — Imbiber de liquide une boulette de coton hydrophile et frictionner rapidement et énergiquement le cuir chevelu.

Deux ou trois frictions par semaine, loin d'une flamme, dans un local largement aéré.

Laboratoire F. VIGIER et R. HUERRE

12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

CHOLÉCYSTINE

Pilules kératinisées de sulfate de magnésie.

*Réalisation en thérapeutique journalière
de l'épreuve de Meltzer-Lyon.*

Forme. — Pilules kératinisées de sulfate de magnésie dosées à 0,30 cgr. *La variété peptonée renferme en plus 0,05 cgr. de peptone.*

Indications. — Cholécystites aiguës et chroniques, Ictères, Migraines, Entéro-colites muco-membraneuses.

Doses. — 6 à 10 pilules par jour, en une fois, le matin à jeun, ou en plusieurs fois, trois quarts d'heure avant les repas.

VINCENT, pharmacien

14, Avenue Mac-Mahon — PARIS

CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

Composition. — Extrait de Combretum. Extraits biliaires. Boldo boldinisé.

Propriétés. — Opothérapie et Phytothérapie associées : Cholagogue, Diurétique Eupeptique, Anti-toxique, Laxatif.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire. Cirrhoses, Ictères, Cholécystites, Cholémie, Constipation, Entéro-Colite muco-membraneuse, Fièvre bilieuse hématurique et toutes intoxications.

Dose. — Prescrire 1 à 3 pilules après chacun des deux grands repas. Dose moyenne 4 pilules par jour.

Prix : le flacon 10 francs.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e)

Téléphone : Invalides 12-63

CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase
Dragées ovoïdes kératinisées dosées
à 0 gr. 25 d'extrait

Doses et mode d'emploi. — 6 à 12 ovoïdes par jour en 3 doses égales : à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

Prop. Thér. — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

Indications. — Spécifique de l'entérococolite muco-membraneuse.

Prix : 14 francs.

Laboratoires DURET & REMY
ASNIÈRES (Seine)

CHOLÉO-LACTOL DAGUIN

Formule du D^r L.-G. MARY

Forme. — Comprimés à enrobage de Kératine soluble dans l'intestin seulement.

Composition. — Boldine 1/2 milligr., incorporée avec :

Extraits biliaires dépigmentés.....	} aa 0,10
Pancréatine extractive.....	
Ferments lactiques purs.....	

par comprimé.

Dose. — Adultes : 4 à 6 par jour, aux repas.
Enfants : 1/2 dose Avaler sans croquer.

Indications. — Infections intestinales et auto-intoxications. Toutes affections hépatiques. Diarrhées estivales. Troubles de la peau.

Échantillons sur demande aux
Établissements DAGUIN
à SAINT-MAUR (Seine)

CHOLERGINE

Médication Antitoxique, Colloïdes et Lipoides
Principes définis du foie et de la bile de taureau
dissous dans l'huile végétale.

Société de Thérapeutique (Janvier 1911)

Académie de Médecine (Avril 1911)

Académie des Sciences (Juin 1911)

Forme. — Ampoules injectables de 2 cm³.

Mode d'emploi. — Injections au-dessus de la fosse retro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 % de profondeur et injecter très lentement. Piqure indolore. 20 à 30 injections avec arrêt de 5 à 10 jours entre chaque dizaine. Léger massage après piqure.

Prop. — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique. — Convalescence des maladies infectieuses.

Préparation sans similaires employée journellement dans les hôpitaux.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, rue de la Source, PARIS (XVI^e)

Téléph. : Aut. 11.86.

CHOPHYTOL

(Pilules)

à base d'extrait total de feuilles d'artichaut.

Composition :

Chaque pilule contient : Extr. total. Cynaro Scolymus 0 gr. 15. Extr. Hépa. 0 gr. 02, Extr. Bil. 0 gr. 02. Barbaloine 0,005, Excipinet Q. S. Pour 1 pilule de 0 gr. 25.

Propriétés thérapeutiques

Stimulant et tonique de la cellule hépatique, cholagogue.

Diurétique puissant, Décongestionnant de choix.

Indications :

Insuffisance hépatique, Jaunisse, Infection de la vésicule biliaire, Hypertrophie ou atrophie du foie (cirrhose) rhumatismes, Maladies des pays chauds (à titre préventif) comme adjuvant des traitements spécifiques habituels. Cure de convalescence après maladies infectieuses (fièvre typhoïde, pneumonie, grippe, etc.).

Mode d'emploi :

4 à 12 pilules par jour au milieu des repas suivant prescription du médecin :

N. B. Le Chophytol peut s'associer à tout autre traitement hépatique.

Littérature et Échantillons (modèle vente)

Laboratoires Q. Edgard ROSA.

1, place de la Porte Champerret — PARIS (XVII^e)

Tél. : Carnot 67-75

CHRYSEMINE

(Pyréthrine hémisynthétique)

Forme. — Liquide.

Propriétés thérapeutiques. — Vermicide et Anthelminitique sans aucune toxicité.

Indications. — Oxyures, Ascaris, Tæ-nias, Tricocéphales, etc.

Posologie. — C gouttes en une seule dose quotidienne, le matin à jeun. XX à LX gouttes pour les enfants.

Pour les tæ-nias et les oxyurases rebelles, doubler et tripler la dose en renouvelant les cures de 3 à 5 jours consécutifs, deux à trois fois par mois.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1^{er})

CIBALGINE

Analgésique, sédatif

(sans aucune substance du tableau B.)

Diallylmalonylurée - diméthylaminophényldiméthylpyrazolone.

Indications. Les algies d'une façon générale : migraine, névralgies, courbature, torticolis, sciaticques, douleurs dentaires, angines, otites, mastoïdites, sinusites, etc.

Comprimés. Gouttes. Ampoules.

Doses. — 1 à 4 comprimés par 24 heures.

20 à 60 gouttes

1 à 2 ampoules

Le flacon de 15 comprimés : 9 francs.

Le flacon de 15 cmc (gouttes) : 13 francs.

La boîte de 5 ampoules : 13 francs.

La boîte de 20 ampoules : 40 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

CIMATRYL

Composition. — Saccharose, Jaborandi, Prêle, Acide borique, Borate de soude.

Propriétés. — Action remarquable sur les plaies atones, grâce au pouvoir osmotique considérable du saccharose qui provoque une diapédèse favorable à la réparation des tissus; celle-ci est aidée par la silice, le Jaborandi favorisant lui-même leur action grâce à son pouvoir vasodilatateur périphérique.

Indications. — Affections aiguës et chroniques des fosses nasales, polypes récidivants, rhinites atrophiques, etc.

Formes. — Poudre impalpable en prises, 5 à 6 fois par jour.

Laboratoire du CIMATRYL

M. LE BONZEC

4, place Royale — NANTES

CINNOZYL

Composition :

Cinnamate de benzyle pur	5 centigr.
Cholestérine pure	10 —
Camphre	125 —
Huile d'olives pure lavée à l'alcool	5 cc.

Propriétés. — Cette formule concourt à l'immunisation artificielle de l'organisme vis-à-vis du bacille de Koch, grâce aux actions biochimiques associées du cinnamate de benzyle et de la cholestérine.

Applications. — Le Cinnozyl doit être employé dans tous les cas de *tuberculose pulmonaire*, même dans les formes évolutives à la période cavitaire.

Formes. — Ampoules de 5 c. c. Boîte de 8 amp.

CINNOZYL U. V. — Même formule que celle du Cinnozyl, la Cholestérine est irradiée aux rayons ultra-violet.

Applications. — Prétuberculose, Imprégnation bacillaire au début, Rachitisme, Asthénie.

Formes. — Ampoules de 5 cc. Boîte de 8 amp.

Laboratoires CLIN — PARIS

CIPROMAROL

Composition. — Cupressus semperv., Equisetum, Capsel a Burs. Past., Æsculus arvip., etc.

Indications. — Toutes affections caractérisées par une dilatation temporaire ou permanente des veines.

Mode d'emploi. — 50 à 75 gouttes et plus par jour, ou 2 à 3 mesures en aluminium, (données avec le flacon).

LANDRIN et C^{ie}

20, rue de La Rochefoucauld

PARIS (IX^e)

CITRASE

Composition. — Sérums antianémiques selon les formules du D^r Normet, à base de citrates et de tartrates (communications à l'Académie de Médecine).

Propriétés. — *Hématopoiétique* puissant.
Antirhumatismal.
Antihémorragique.

Indications. — Anémies pernicieuses. Etats leucémiques, lymphoïdes. Pneumonies, Rhumatismes, Hémorragies.

Formes. — *Citrased V* = Injections intra-veineuses 20 cc. (traitement héroïque).
Citrased C = Injections sous-cutanées 5 cc. (indolores).

Laboratoires

ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS

CITROCARBINE

Antiseptie digestive

Composition. — Granulé fondant de goût agréable, répondant à la formule :

Citrate acide de soude. 10 Charbon animal. 90

Action. — Eupeptique, cholagogue par le citrate de soude, fixateur, antifermentescible par le charbon.

Avantages. — Stabilité du citrate acide non détruit dans l'estomac comme le citrate alcalin. Hyperactivité du charbon animal plus fin que le charbon végétal. Action constipante du charbon corrigée par le citrate.

Indications. — Dyspepsies. Aérophagie. Insuffisance et infections biliaires. Entérites aiguës et chroniques. Diarrhées. Fermentations intestinales. Auto-intoxication. Artério-sclérose.

Mode d'emploi. — Une à deux cuillerées à café à la fin des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Se fait aussi en cachets.

Prix : 12 fr. 50

Laboratoires WARIN

4, Chaussée de la Muette, PARIS (XVI^e).

CITROFLUYL

citrate monosodique pur

Forme. — Granulés à saveur agréable.

Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 de citrate monosodique, comprimés pour diabétiques à 0 gr. 50 de citrate monosodique pur.

Dose. — Par jour, 2 à 6 cuillerées ou comprimés dissous, avant ou entre les repas, selon l'avis du médecin et l'effet désiré.

Indications. — Hypertension artérielle, Insuffisance hépatique, Rhumatismes, Goutte, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements.

Prix : 12 fr. 50

Laboratoires G. Warin

4, Chaussée de la Muette, PARIS (XVI^e)

CITROPAÏNE DU D^r FONTAL

Composition.

Phosphocitrate manganéo-sodique associé à un ferment végétal.

Propriétés.

Eupeptique, Cholagogue, anti-acide, décongestive, régulatrice des fonctions digestives et circulatoires.

Indications.

Dyspepsies, hyperchlorhydries, gastro-entérites, mauvaises circulations, congestions veineuses, maladies d'estomac, foie, intestin.

Forme et Posologie.

Granulé. — de 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Comprimés. — de 6 à 9 par jour,

Cachets. — de 2 à 3 par jour,

Laboratoires JICEM

304, rue Saint-Jacques, Paris (V^e).

CITROSODINE LONGUET

Hyperacidité (douleurs gastriques).

Antémétique (vomissements des nourrissons).

Eupeptique (dyspepsies, gastro-entérites).

Action lithotriptique et diurétique.

Action sur la viscosité du sang.

(*Pneumonies — Broncho-pneumonies
Gangrènes séniles.*)

Comprimés de 0 gr. 25 citrate trisodique.

Dose et mode d'emploi :

Nourrissons : 1 comprimé à chaque tétée

Enfants : 3 à 4 comprimés.

Adultes : 3 à 4 comprimés (2 ou 3 fois par jour).

Pneumonies : 4 comprimés toutes les heures ou 8 comprimés toutes les deux heures, dans un demi-verre d'eau ; la médication étant continuée jour et nuit, jusqu'au 2^e au 3^e jour qui suit la crise.

Le flacon des comprimés : 11 fr.

Le flacon de granulé : 11 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e)

CLISÉMINE LONGUET

Médication citratée injectable.

Indications. — HÉMORRAGIES.

Cancers (M. RENAUD).

Tuberculose, Hémoptysies.

Gynécologie.

Interventions chirurgicales
(NEUHOF et HIRSCHFELD).

Ampoules de 20 cc. de solution stabilisée renfermant 30% de citrate de soude et 10 % de chlorure de magnésium.

Dose et mode d'emploi. — Injection intraveineuse de 15 à 30 cc. (20 cc en moyenne), selon le poids du sujet.

Enfants : Injection intraveineuse de 10 cc.

La boîte de 2 ampoules de 20 cc. : 16 fr.

Laboratoires LONGUET

34, Rue Sedaine — PARIS (XI^e)

CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré
non toxique

(Méthode de Carrel)

Composition. — Chloramine sodique du toluène en poudre cristalline ou comprimés dosés à 0 gr. 25.

Indications. — Gynécologie et obstétrique, urologie, angines, petite et grande chirurgie.

Posologie. — *Usages médicaux* : 2 à 5 comprimés par litre d'eau pour gargarismes, lavages de gorge et du nez, irrigations vaginales.

Usages chirurgicaux : 10 comprimés par litre d'eau, pour pansements humides, tamponnements, irrigation des plaies suivant la technique de Carrel.

Cette solution à 10 comprimés est d'un emploi et d'une action identiques à ceux de la solution de Dakin.

Sterilisation instantanée de l'eau sans ébullition : 1 comprimé par litre.

Avantages. — Action antiseptique puissante et rapide, sans phénomènes d'irritation.

Deux formes :

Comprimés : tubes de 25 et 60 comprimés à 0 gr. 25.

Poudre : tubes de 20 gr. avec cuiller-mesure correspondant à 0 gr. 25 comme les comprimés.

Conditionnements vrac pour cliniques et hôpitaux.

Echantillons médicaux sur demande.

**LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES
CHLORÉS**

40, rue Thiers, Le Havre.

CLUPEYL

Reconstituant général sans équivalent ni similaire.

Forme. — Comprimés dragéifiés faciles à avaler.

Composition. — Poudre intégrale de laitances de harengs, fraîches, desséchées dans le vide et à froid.

Propriétés thérapeutiques. — Par sa richesse en phosphore organique (acide nucléinique, lécithine, cérébrine), le Clupeyl est un reconstituant général de tout premier ordre et un excellent stimulant du système nerveux, sur lequel il agit sans le surexciter.

Indications. — Anorexie, Amaigrissement. Surmenage physique et intellectuel, Neurasthénie, Asthénie post-grippale, Tuberculose, Rachitisme et toutes adynamies et débilités.

Posologie. — *Adultes* : 6 à 8 comprimés par jour.

Enfants : à partir de 7 ans, 3 à 4. A prendre aux repas. Avaler sans croquer ni sucer.

Laboratoire du CLUPEYL

69, avenue Faidherbe — MALO-LES-BAINS (Nord.)

COCAÏNE MIDY

(Chloroborates)

Chaque pastille contient :

0,002 mgr. de Chlorhydrate de Cocaïne.

0,075 mgr. de Chlorate de Potasse.

0,025 mgr. de Biborate de Soude.

Dose et mode d'emploi. — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

Indications. — Affections de la bouche, gorge, larynx; Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines. Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge (avocats, chanteurs, orateurs, prédicateurs).

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e)

CODOFORME

Compos. — Comprimés enrobés constitués par une nouv. combinaison bromoformique solide associée à la codéine ; se dissolvent d. l'intestin seulement où ils libèrent sans fatigue pour l'estomac une quantité rigoureusement constante de bromoforme pur.

Chaque comprimé représente ; Codéine, 1 cgr ; bromoforme IV gttes ; teinture d'aconit et belladone aa. V gttes ; terpine et benzoate de soude comme excipient.

Indic. — Spécifique des toux sèches (spasmodiques, laryngo-trachéales, post-grippales, névropath.). Sédatif remarquable de la toux des tuberculeux, assurant calme et repos sans irritation gastrique ou inappétence.

Posol. — 5 compr. p. j. ; 6 à 8 d. toux rebelles. Grands enf. (à part. de 5 ans) 2 à 3 compr. p. 24 h. Avaler s. sucer ni croquer.

Laboratoires BOTTU

35, r. Pergolèse. — PARIS (xvr^e) - Tél. Passy 43-89

COLCHI-SAL MIDY

(Colchicine — Ess. de Wintergreen)

Chaque capsule contient :

1/4 de mgr colchicine pure dissoute dans 0,20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel (Ess. de Wintergreen) obtenu par fermentation et distillation et équivalent à 0,25 cgr. Salicylate de Soude.

Dose. — 4 à 16 capsules par jour par prises fractionnées.

Prop. Thér. de l'Ess. de Wintergreen

Augmente l'élimination de l'acide urique et des autres éléments solides de l'urine. — 2^e Calme la douleur. —

3^e Liquéfie et augmente la sécrétion biliaire. — 4^e Légèrement diurétique. — 5^e Diaphorétique. — 6^e Diminue la fièvre. — 7^e Combat la congestion et facilite la résolution des inflammations (G. Séc.). — 8^e Action antiseptique sur le sang.

Prop. Thérap. de la Colchicine

Diminue la production d'acide urique. — 2^e Augmente rapidement l'élimination de tous les produits brûlés et pousse à l'oxydation. — 3^e Soulage la douleur. — 4^e Augmente la sécrétion biliaire. — 5^e Légèrement diurétique. — 6^e Diaphorétique. — 7^e Purgatif.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS. XVII^e

COLITIQUE

Vaccin curatif anti-colibacillaire
(D'après la technique du Dr Fisch)

Indications. — Toutes les manifestations du syndrome provoqué uniquement par le colibacille.

Double supériorité : Action directe sur le microbe, pas de réaction fébrile.

Formes. — Buccale, *la plus logique et la plus active* (10 ampoules de 3 cc.).
Injectable, (10 ampoules de 1 cc.).
Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts. (6 ampoules de 3 cc.).

Prix : 25 fr.

Laboratoires P. ASTIER

41 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS

COLLOBIASE D'OR

Or colloïdal bleu Dausse.

Formes. — Ampoules de 2 cc. pour injections intramusculaires ou intraveineuses, titrées à 25 centièmes de milligr. d'Or colloïdal bleu par cc.

Indications et mode d'emploi.

AMPOULES DE COLLOBIASE D'OR. Médicament anti-toxi-infectieux dans toutes les septicémies : *Pneumonie, fièvre typhoïde, érysipèle, fièvres éruptives, méningites, endo-cardites, etc.*

ADULTES : 4 à 6 cent. cubes par voie intramusculaire et par 24 heures.

1/2 cc. à 1 cc. 1/2 par voie intraveineuse.

ENFANTS : 1/4 à 1 cc. par voie intramusculaire.

Pour éviter la réaction consécutive à l'injection intra-veineuse, prendre X gouttes de solution à 1 p. 1000 d'adrénaline dans un peu de café.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

COLLOBIASE DE SOUFRE

Médicament anti-rhumatismal ;
spécifique des jointures :

Formes. — Ampoules de 2 cc. contenant 33 centièmes de milligr. de soufre colloïdal par cc.

Fondant de soufre, titré à 15 milligr. de collobiase de soufre par dose ou 5 grammes.

Indications. — Rhumatismes chronique, déformant, goutteux. Rhumatisme articulaire aigu. Localisations rhumatismales. Sclérites, iritis. Affections du larynx et des bronches, dermatoses.

Posologie. — Ampoules de collobiase de soufre : Une injection tous les jours ou tous les deux jours par voie *intra-veineuse* (de préférence) ou *intramusculaire*. Débuter par 1/2 cc. et augmenter chaque jour de 1/2 cc. jusqu'à atteindre 2 cc. Faire des séries de 10 piqûres successives, entrecoupées de périodes de repos de 15 jours ou 1 mois.

Fondant de soufre. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

COLLOBIASE DE SULFHYDRARGYRE

Complexe colloïdal de soufre et de mercure.

Médicament *anti-syphilitique* et *anti-rhumatismal*.

Formes. — Ampoules de 2 cc. contenant 1/4 de milligr. de soufre et 1 milligr. d'Hydrargyre par ampoules de 2 cc.

Fondant de Sulfhydrargyre titré à 0 gr. 02 de sulfhydrargyre par dose ou 5 grammes de saccharolé fondant.

Pilules de Sulfhydrargyre dosées à 0 gr. 0054 de sulfhydrargyre par pilule.

Indications. — *Syphilis nerveuse*, *Hérédosyphilis*, *Rhumatisme chronique déformant*.

Posologie. — Ampoules en injection *intra-musculaire* ou *intra-veineuse*, tous les jours ou tous les deux jours.

Fondant. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café par jour. — *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café selon l'âge.

Pilules. — 3 pilules par jour.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

COLLOÏDES AMICROS

Le Laboratoire des Produits Amicros est spécialisé dans la préparation des formules à base de métaux colloïdaux simples ou complexes : (v. Orargol), et des colloïdes radio-actifs « Radiamicros ». — Solutions injectables : boîte de 6 amp. de 5 cc ou 1 amp. de 10 cc. Solutions non inject. ; voie buccale : gouttes Amicros. Pansements et Ovules Amicros et Radiamicros.

Gouttes Amicros : métaux colloïdaux électriques en solution concentrée. Présentation : flacon de 60 gr. avec compte-gouttes. Indications : 3 indications principales. Gouttes d'Orargol Amicros : Etats infectieux, fièvres, gripes. Gouttes d'Etain Amicros : Staphylococcies, furonculoses. Gouttes de Fer Manganèse Amicros ; Anémie, chlorose.

Posologie. — Enfants, 20 à 100 gttes suivant âge ; adultes, 1 à 2 cuil. à café par jour à prendre en plusieurs fois dans une boisson quelconque.

Laboratoire des PRODUITS AMICROS

5, rue Clauzel — PARIS (IX°)

Tél. Trudaine 00-47

COLLOÏDINE LALEUF

Dragées

Composition :

Extrait total pluriglandulaire associé à l'*Iodalbumine*.

Propriétés et indications thérapeutiques :

Remédie à la viciation fonctionnelle des glandes endocrines et, grâce à la présence de l'*Iodalbumine*, favorise la combustion intra-organique.

Est tout spécialement indiquée dans le traitement de l'*Obésité* considérée comme maladie par carence diastasique. Convient aux deux sexes.

Doses et Mode d'emploi :

De 2 à 4 dragées par jour suivant le cas, à prendre de préférence au début des repas. Les avaler en même temps qu'une gorgée d'eau.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos, PARIS (XV°)

COLLOÏDOGENINE

DU D^r BAYLE

Nature. — Extrait de rate de porc.

Formes. — 1° Colloïdogénine injectable (ampoule de 5 cc.). La boîte de 6 ampoules : 20 fr.

2° Colloïdogénine sirop (cruchons). Le cruchon : 20 fr.

3° Colloïdogénine (flacons-ampoules pour voie buccale). La boîte de 6 flacons-ampoules : 20 fr.

Indications. — Tuberculose (toutes localisations et formes) ;

Prétuberculose. Anémies de toutes natures.

Action. — Augmentation rapide des hématies (50 %) ; augmentation des leucocytes (40 %) ; augmentation de l'hémoglobine (40 %) ; raréfaction puis disparition des bacilles de Koch ; progression rapide des forces et du poids ; cicatrisation des lésions.

Emploi et doses. — Série de 12 injections (intrafessières ou sous-cutanées abdominales) en 22 jours. Chaque série est séparée de la suivante par 8 jours de repos. Le sirop de colloïdogénine est donné dans le même temps (4 cuill. à soupe par jour aux repas). Dans les cas légers ou comme prophylaxie le sirop suffit.

Doses chez l'enfant. — Colloïdogénine injectable au-dessous de 5 ans 1 cc. par année d'âge ; au-dessus de 5 ans l'injection sera de 5 cc.

Colloïdogénine sirop, 1 cuill. à café par jour jusqu'à 3 ans, 2 jusqu'à 5 ans, 1 cuill. à soupe jusqu'à 7 ans, 2 jusqu'à 10 ans, 3 jusqu'à 14 ans.

Laboratoire CHAIX

10, rue de l'Orne — PARIS (XV^e)

COLLUBORINE DUPUY

Traitements des affections de la Cavité buccale
et des **maladies de la gorge.**

Forme. — Collutoire stérilisé et gargarisme aseptique renfermés dans un tube.

Composition. — Borate de soude neutre peroxygéné-Résorcine Stovaine et Trichloréthanal.

Avantages. — Préparation qui remplit le double rôle de Collutoire et de Gargarisme.

Indications. — Stomatites diverses : Angines aiguës, Amygdalites, etc.

Mode d'emploi. — A. En pressant sur le tube, imprégner le Colluborine le coton fixé à l'extrémité d'un porte-tampon et badigeonner la gorge comme avec un Collutoire.

B. En pressant sur le tube, une cuill. à café dissoute dans un verre d'eau chaude donne instantanément un Gargarisme.

**LABORATOIRE de THÉRAPEUTIQUE
des VOIES DIGESTIVES J. LAUMONIER,
PHARMACIEN-DIRECTEUR**

223, rue Saint-Martin, Paris.

COMITOL

Comprimés composés de Phényléthyl-malonylurée et Tartrate Boricopotassique chimiquement pur (Gardéna-Luminal).

1^o Phényléthyl-malonylurée : Comprimés B 0 gr. 01 ; Comprimés C gr. 02 ; Comprimés D 0 gr. 03. — **2^o Tartrate Boricopotassique** 0 gr. 50 pour les comprimés A, B, C, D.

Indications. — 1^o Principale : Epilepsie. — 2^o Accessoires : Convulsions, Tétanie, Parkinson, Chorée, Angor pectoralis.

Avantages. — Action aussi grande que celle des hautes doses de Phényléthyl-malonylurée, sans leurs inconvénients. Tolerance parfaite. Accoutumance nulle.

Conduite du traitement. — 6 Pastilles formule C par jour.

Si cette formule se montre insuffisante prescrire comprimés D. Après trois mois de traitement intensif intercaler des périodes de repos relatif en donnant 6 comprimés B par jour durant 10 jours.

Doses infantiles. — 1/3 comprimé par année d'âge et par jour.

Prix : Grandes boîtes B : 30 fr. — C : 40 fr. — D : 50 fr.

PHARMACIE GRORICHARD

12, Place Labourey, Besançon (Doubs).

COMPLEXES COLLOIDAUX DU Dr RIQUOIR

Néoplalysine

Arrêt rapide des hémorragies dans le *Cancer* et le *Fibrome*, cicatrisation dans l'*Ulcère d'estomac*, vérifiée par la radiographie.

Colloïxol antibacillaire

Abaissement de la température et cicatrisation dans la *tuberculose pulmonaire* — guérison rapide des aiénites et des fistules dans la *tuberculose ganglionnaire, osseuse, et génitale*.

Colloïxol antiarthritique

Sciatique, Goutte, Rhumatisme déformant.

Colloïxol antipyosique

Salpingite, Furonculose.

Colloïxol antientéritique

Entérite, Diarrhée infantile.

Mode d'emploi :

Ampoules : 1 par jour. — Cachets : 3 par jour.

MERMINOD et C^{ie}

49, rue de Paradis, PARIS (X^e)

COMPLEXTRAITS

Médicaments à prendre par gouttes.

Cœur. — Complextrait de Digitale.

Estomac. — Complextrait de Condu-rango.

Utérus. — Complextrait de Gossypium.
— Piscidia — Viburnum.

Circulation. — Complextrait de Marron d'Inde.

Nerfs. — Complextrait de Cratægus.

Muscles. — Complextrait de Kola.

Pour tous renseignements, littérature, et échantillons, écrire :

Laboratoire des Complextraits
à HÉRICOURT (Haute-Saône)

COMPRIMÉS ADRIAN

- a) Comprimés d'hydrate de magnésie Adrian.
b) Comprimés de carbonate de chaux Adrian.

Action. — Médicament saturant de l'hyperacidité gastrique.

Avantages. — *Ne neutralise que l'excès d'acide*, comprimés très friables, se délitant facilement, grâce à leur constitution presque spongieuse.

Indications. — Hyperchlorhydrie, pyrosis, fermentations acides, gastralgies, etc.

Mode d'emploi. — 4 comprimés une heure avant les repas, et au moment des douleurs.

ADRIAN & C^{ie}

9 et 11, rue de la Perle — PARIS

COMPRIMÉS D'ALIBOUR

Composition. — Association de sulfate de zinc et sulfate de cuivre.

Indications. — Traitement des plaies, des inflammations des yeux, des fleurs blanches.

Action. — Antiseptique idéal d'usage courant prophylactique, hygiénique, anticatarrhale.

Dose. — Deux comprimés dans deux litres d'eau bouillie chaude pour injection vaginale, lotion pour les yeux et les muqueuses. Quatre comprimés par litre d'eau pour traiter les plaies superficielles infectées, l'impétigo, l'ecthyma.

Prix : 10 fr.

Laboratoires DURET et RÉMY
ASNIÈRES (Seine)

COMPRIMÉS AQUA PURA

Pour la stérilisation rigoureuse de l'eau.

Principe :

Iode naissant parfaitement éliminé après action.

Indications :

1^o Pour la *Boisson* : stérilisation immédiate de l'eau suspecte ;

2^o) Pour tous *lavages aseptiques* : buccaux, gynécologiques, intestinaux.

Avantages :

Sécurité absolue. — Saveur agréable.

Mode d'emploi :

3 comprimés par litre d'eau suivant l'ordre indiqué par la notice.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne, Paris.

COMPRIMÉS CHÉRALYS

Composition. — Nickel catalytique Dufayard. Peroxyde de manganèse colloïdal. Cobalt catalytique.

Carbonate de calcium léger. Silicate d'alumine et de magnésie. (En comprimés agréables à croquer).

Propriétés. — Basées sur les principes scientifiques les plus modernes. Activateurs des ferments digestifs normaux. Neutralisants. Antifermentescibles.

Indications. — Maladies de l'estomac, du foie, des intestins, Diabète.

2 comprimés après les repas et 2 autres ou plus 3 à 4 heures après.

Prix : 10 francs

Laboratoires DUFAYARD

12, Rue des Saints-Pères — PARIS (VII^e).

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre

Composition. — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50.

Propriétés. — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments nickelés.

Indications. — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, fluxeurs blanches, vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

COMPRIMÉS KLÉOS

Indications. — Maladies nerveuses infantiles (épilepsie, convulsions, douleurs de dentition, terreurs nocturnes).

Comprimés Kléos aux polybromures. N° 1.

Comprimés Kléos à la phényléthylmalonylurée. N° 2.

Comprimés Kléos aux tartrates borico-potassiques et sodiques. N° 3.

Forme. — Comprimés solubles.

Posologie. — Un comprimé par jour et par année d'âge.

Avantages. — Dosage rigoureux, produits purs et stables.

Littérature et échantillons :

Laboratoires GUÉRET

2, Rue des Cordeliers.

MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret)

COMPRIMÉS MAVER

Composition. — Comprimés enrobés de sucre et à noyau glutinisé.

Chaque comprimé contient : Codéine 2 milligr.; Terpène 5 cgr.; Extrait d'aconit titré 1 milligr.; Extrait mou de grindélia 5 cgr.; Extrait mou de pavot blanc 5 cgr.

Indications. — Toutes les *toux rebelles* et fatigantes. aucune contre-indication.

Avantages. — Tolérance parfaite : *glutinisé*. Action rapide : Association nouvelle très active.

Prix modique : 11 fr. la boîte de 36 comprimés, pour 10 jours de traitement environ.

Posologie. — 5 à 6 comprimés par jour loin des repas. 6 à 8 dans les toux rebelles.

Enfants au-dessus de 5 ans : demi-dose.

Établissements M. A. WOLLACKER

31, rue Saint-Georges — PARIS (IX^e)

COMPRIMÉS DE PANTOLAXINE

du Docteur BOVEIL

Traitement de la Constipation.

Ainsi que leur nom l'indique, ces comprimés renferment tous les principes actifs de tous les laxatifs reconnus les plus efficaces et doivent, par conséquent, agir dans tous les cas de constipation.

Composition. — Bourdaine, Cuscuté, Chardon-Marie, Cascara, Rhubarbe, Aloïne, Evonymine, Belladone, Extraits biliaires.

Indications. — Constipation et ses conséquences (vertige, tension artérielle, éruptions, démangeaisons, haleine fétide, etc.)

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés pris au repas du soir, tous les jours, ou deux à trois fois par semaine suivant les besoins. Demi-dose pour les enfants.

Échantillon et littérature sur demande.

Prix 6 fr. la boîte de 40 comprimés,

M. PARIS, Pharmacien de 1^{re} Classe.

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle).

COMPRIMÉS " ROCHE " DE THIOLCOL

1 comprimé " Roche " de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol " Roche "

1 gr. Thiocol " Roche " = 0,52 cgr. galacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 par jour et plus.

Prop. thér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocyto-gène, Eupeptique et Orexique.

Indic. thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, tuberculose, coqueluche, rachitisme, dyspepsies, entérites, etc.

Avie très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

Comprimés " Roche " de Thiocol.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, place des Vosges — PARIS.

COMPRIMÉS ROY

Composition :

Comprimés dosés chacun à 0 gr. 005 de *lactate* d'Hg chimiquement pur, spécialement préparé et uni aux principes essentiels du lait.

C'est la seule préparation mercurielle bien supportée *per os* et où le *lactate* d'Hg., sel instable, soit de conservation indéfinie.

Indications :

Syphilis (adultes ou enfants).

Doses moyennes :

Adultes : 4 comprimés (soit 0 gr. 02 de *lactate*) à prendre aux repas.

Enfants : par 1/2 comprimé au moins (1/2 comprimé = 0 gr. 0025 de *lactate*.)

N. B. — Les boîtes de vente ne renferment aucun indice rappelant la composition ou la destination.

Laboratoires A. ROY

81, boulevard Suchet — PARIS (XVI^e)

Tél. : Auteuil 05-46

CONJONCTOL

Collyre nouveau à base de :

1° *Borosalicyl* (acide salicylique dissimulé et naissant). Antiseptique puissant ;

2° *Hamamelis virginica* (200 grammes pour 1000). A haute dose est un vaso-constricteur qui (différence avec l'adrénaline) ne donne pas de vaso-dilatation réactionnelle. De plus, l'*hamamelis virginica* est un topique de tout premier ordre et sans danger (différence avec cocaïne).

Indications. — Toutes les conjonctivites (aiguës ou chroniques). Adulte ou nourrisson. Se prescrit également dans le cas de : surmenage des yeux.

Présentation. — 1° Ampoule collyre de 5 centimètres cubes. En lavage de l'œil (œillette ou coton imbibé du contenu). Une ou deux fois par jour ; 2° Flacon compte-gouttes, soit en lavage (comme avec ampoule), soit en collyre (II à III gouttes dans l'œil matin et soir).

Littérature et échantillons au Corps médical.

Laboratoires H. SALLE

4, rue Elzévir, Paris (III^e).

CORAMINE CIBA

Toni-cardiaque eupnéique

Stimulant du système nerveux, de la respiration et de la circulation. Produit synthétique (diéthylamide de l'acide pyrimine-B-carbonique) soluble dans l'eau et pouvant être administré par voie buccale, sous-cutanée ou intra-veineuse. Se substitue toujours à l'huile camphrée et parfois aux autres toniques du cœur avec de grands avantages. Pas de contre-indications. Aucune toxicité.

Indications. — Collapsus cardiaque, syncope, états lipothymiques. Faiblesse du cœur au cours des maladies aiguës, des infections, des intoxications, de la période post-opératoire. Hypo-systolie des vieillards, etc.

Gouttes — Ampoules

Doses. — 25 à 100 gouttes par 24 heures.

1 à 5 ampoules par 24 heures.

Le flacon de 15 cmc : 12 francs.

La boîte de 5 ampoules : 12 francs.

La boîte de 20 ampoules : 36 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

CORÉÏNE

Mucilage rigoureusement pur, sans l'adjonction d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal.

(Procédé Taillandier.)

La **Coréïne** n'est pas de l'agar-agar.

La **Coréïne** n'est pas extraite de l'agar-agar. C'est du mucilage pur, indigestible.

Propriété unique. — Absorbe et retient 50 fois son poids d'eau.

Indications. — Constipation simple, Colite muqueuse. Colite muco-membraneuse.

La **Coréïne** constitue un traitement remarquable souvent le seul, de la constipation et de certaines formes diarrhéiques.

Forme. — Granulé et paillettes.

“La Coréïne est admise par l'Assistance publique”.

Pour absorber la Coréïne.

Mettre la Coréïne en paillettes à sec dans la bouche ou la mélanger avec de l'eau, constituent des moyens sans inconvénient thérapeutique, mais peu agréables.

La Coréïne en paillettes est très facile à absorber, à la condition de tenir compte des indications suivantes :

Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à soupe pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas du midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes, ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréïne à la dose de 1 à 2 cuillerées à café au petit déjeuner du matin.

Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréïne, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées..., Bledine...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote. Quant aux nourrissons et aux bébés une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

Le **Granulé de Coréïne** se prend comme tous les granulés : mettre directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avaler un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

Bibliographie. — Pathologie gastro-intestinale, A. Mathieu et J.-C. Roux, etc.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, Rue de la Source — PARIS (XVI^e)

Téléphone : Aut. 11.86.

CRATÆGINE

A base de fleurs fraîches d'aubépine stabilisées (non toxique)

Prop. thérap. — **Tonique et régulateur cardiovasculaire.** Si elle ne peut être considérée comme un succédané de la digitale, elle maintient utilement l'action obtenue avec ce médicament cardiaque comme elle doit maintenir celle que l'on obtient avec l'ouabaine. — **Vasodilatateur** Hypotenseur par action vasculaire périphérique.

Indic. thérap. — Eréthisme cardiaque. Palpitations des nerveux et des neurasthéniques. Troubles congestifs de la ménopause. Tachycardie paroxystique essentielle. Goitre exophtalmique.

Doses et mode d'emploi. — XV à XX gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée. — Dose maxima : XXX gouttes 3 fois par jour.

Prix : 12 francs.

P. BOUSQUET et E. LEROUX,

Anciens internes des Hôpitaux.

46, rue de la Barrière — ELBEUF

CRÉDONE " DEHAUSSY "

Acétylsalicylate de dioxy-diméthyl-aminophényl-diméthylpyrazolone.

Nouveau dérivé de la série des Pyrazolones associé équimoléculairement à l'acide acétyl-salicylique. Analgésique et Hypnotique léger. Composé soluble. Six fois moins toxique que le pyramidon. Sans retentissement cardio-rénal ou digestif.

Indications. — *Toutes les algies* : Migraine, Névralgies dentaires, Névralgies périphériques, Douleurs des tuberculeux, Algies cataméniales, Douleurs rhumatoïdes, Douleurs fulgurantes, etc., etc.).

Les états infectieux : Grippe, Rhumatisme articulaire aigu, Angines.

L'excitation nerveuse : Insomnie, Agitation, Anxiété.

Présentation et posologie. — La Crédone se présente en cachets de 0 centigrammes,

Adultes. — 1 à 6 cachets par jour, pris dans un demi-verre d'eau ou une tasse d'infusion, une demi-heure avant les repas ou une heure après.

Enfants. — 10 ans : 1 à 2 cachets par jour. — 5 ans : 1 cachet par jour en deux fois. — 2 ans : délayer la moitié d'un cachet dans un demi-verre d'eau sucrée, et donner de cette solution 1 cuillère à café toutes les demi-heures jusqu'à effet obtenu.

Laboratoires DEHAUSSY
66, rue Nationale — LILLE

CRÈME RÉSOLUTIVE du D^r RAP

Composition. — Produit onctueux sans corps gras, à base de principes à action fortement vaso-constrictive et analgésique :

(Hamamelis, Arnica, Noix vomique, etc.)

Propriétés. — Calme la Phlébalgie, décongestionne, facilite la résorption des œdèmes.

Indications. — Varices, phlébites, insuffisances veineuses. Stase post-traumatique.

Mode d'emploi. — En massage matin et soir. S'il existe une contre-indication au massage, employer la « Friction Rap » en lotion ou en pulvérisation.

Prix : 10 fr. et 15 fr.

Laboratoire du D^r R. CAVAILLES
34, rue de Turin — PARIS (VIII^e)

CREOLINE PEARSON

Après quarante ans d'existence la Creoline Pearson reste un antiseptique moderne. La Creoline Pearson donne avec l'eau une émulsion colloïdale ni toxique, ni caustique, ni oxydante, d'une grande puissance microbicide et antiparasitaire.

Présentation. — En flacon de verre de 60, 125, 500 et 1000 gr.

Indications. — Toutes désinfections et lavages antiseptiques en émulsion dans l'eau de 1 à 4 %. Traitement de la gale et toutes maladies parasitaires.

Prix : 60 gr., 4 fr. 80 ; 125 gr., 7 fr. 20 ; 500 gr., 12 fr. ; 1000 gr., 18 fr.

**LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES
WILLIAM PEARSON**

5, rue Clauzel, Paris (IX^e)

CRÉOSAL DUBOIS

Sirop, Comprimés, Solution.

Composition :

Le CRÉOSAL réunit dans sa composition le *Gaiaccol*, l'*Acide Phosphorique* et le *Calcium* que la Thérapeutique a toujours associés.

Propriétés et indications thérapeutiques :

Recalcifiant puissant, antibacillaire, accélérateur de la nutrition. Employé avec succès dans : la Tuberculose pulmonaire, osseuse ou cutanée, les Bronchites aiguës ou chroniques, les Toux rebelles, le Lymphatisme, la Scrofule, le Rachitisme, etc., etc.

Laboratoires LALEUF
20, rue du Laos, PARIS (XV^e)

CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

Combinaison d'aldéhyde formique (4 %) et de créosote (96 %). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique.

Supérieur à l'iodoforme dans tous ses emplois.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

Indications. — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Fistules, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, Gynécologie, hémorroïdes et toutes autres affections anales, etc.

Mode d'emploi. — Existe sous quatre formes :

- 1° *Créosoforme-Poudre*, présenté en flacons poudreux, pour stupo drage des plaies.
- 2° *Créosoforme-Onguent*, présenté en tubes d'étain.
- 3° *Créosoforme-Ovules*, pour pansements gynécologiques.
- 4° *Créosoforme-Suppositoires*, 1 ou 2 par jour.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e)

124, avenue Rogier, BRUXELLES

CRESCOL

(Produit non irradié)

Contient :

- 1° Tous les éléments minéraux qui existent dans l'organisme et dans les mêmes proportions que chez l'individu normal.
- 2° Les traces de minéraux catalyseurs nécessaires à la fixation des sels (manganèse, zinc, etc.)
- 3° L'insaponifiable de l'huile de foie de morue, avec la vitamine de croissance A. et la vitamine antirachitique D.

Propriété thérapeutique. — Médication anticarcinogénique.

Indications. — Rachitisme, Ostéomalacie, Déminéralisation de la grossesse, de l'allaitement, États tuberculeux et pré-tuberculeux, Avitaminoses.

Forme. — Granulé.

Posologie. — Nourrissons et enfants : 2 à 4 mesures délayées dans un peu d'eau.

Adultes : 4 à 8 cuillerées à café par jour.

Établissements A. BUISSON,


F. JALOT et C^{ie}

157, rue de Sèvres — PARIS

CRÉSOPIRINE

DE G. CARRIÈRE & E. GÉRARD

Acide Acétyl Crésotinique Ortho



Produit synthétique défini et pur.

Indications. — Traitement du rhumatisme aigu et chronique et de la douleur sous toutes ses formes.

Posologie. — Douleurs rhumatismales, névralgies : Prendre de 1 à 4 comprimés ou cachets dans la journée.

Insomnie : Le soir en se couchant, prendre 1 ou 2 comprimés ou cachets dans une tasse d'infusion de tilleul.

Rhumatisme articulaire aigu, fébrile : Se conformer à l'avis du médecin, qui, selon les cas, peut prescrire d'emblée 4 à 5 grammes par jour.

Grippe : 2 ou 4 comprimés ou cachets par jour.

Laboratoires " STÉNÉ "
2, place des Vosges — PARIS (IV^e)

CRÉSYL JEYES

Le seul *Crésyl véritable*. Puissant désinfectant antiseptique ; le premier des *Crésols associés et saponifiés*.

Exiger du « **Jeyes** » pour éviter toute substitution.

Le « *Jeyes* » donne des émulsions stables et colloïdales qui enrobent les bactéries et les détruisent à coup sûr.

Dose antiseptique. — 1/2 pour 100 (une cuill. à café par litre d'eau).

Dose bactéricide. — 2 pour 100 (une cuill. à bouche par litre d'eau).

Livré en flacons de 150 et 250 grammes.

Désinfection et lavages antiseptiques.

CRÉSYL-JEYES

Echantillons et rapports scientifiques :

35, Rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV^e)

CRISALBINE

Thiocrysrine.

(Thiosulfate double d'or et de sodium.)

Complexe chimique défini ; teneur en or : 37-43 p. 100 ; le moins toxique des sels d'or actuellement connus. Injectable par voie intraveineuse.

Indications :

Tuberculose pulmonaire.

(Poussées évolutives récentes et des malades jeunes).

Posologie et mode d'emploi. — Injections hebdomadaires, en débutant par 0 gr. 05 ou 0 gr. 10. Augmenter progressivement, selon la tolérance du malade. Les doses élevées sont à déconseiller.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

CRISTOLAX WANDER

Nouvelle formule.

Huile de paraffine.....	50 p. 100
Extrait de malt.....	40 p. 100
Agar-Agar.....	10 p. 100

Le plus efficace parmi les laxatifs doux, sans action drastique.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Tous les cas de constipation : nourrissons, femmes en couches, vieillards, opérés, grabataires et personnes délicates en général.

Doses. — *Nourrissons* : 1 cuillerée à café 3-4 fois par jour dans le lait ou la bouillie. *Enfants* : 2 cuillerées à café 3-4 fois par jour. *Adultes* : 1 cuillerée à soupe 3-4 fois par jour aux repas, tel quel ou dissous dans un liquide.

Le résultat atteint, continuer un traitement à faible dose : 1 cuillerée à café ou à soupe aux repas principaux.

Etablissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

adoptée par les Ministères de la Guerre. de la Marine et par l'Assistance publique.

Constitution. — La *Cryogénine* a été découverte par MM. Lumière et Chevrotier, sa formule est la suivante : $C^7 H^9 Az^1 O$

Poudre cristalline blanche, inodore, presque insipide, peu soluble dans l'eau (1 p. 100 à 20°), soluble dans la glycérine (5 p. 100) et dans l'alcool (11,50 p. 100).

Propriétés. — La *Cryogénine* représente le médicament antipyrétique, analgésique type. Elle agit avec une égale sûreté contre les températures fébriles et contre les phénomènes douloureux.

Posologie. — De 0 gr. 50 à 4 gr. *pro die* chez l'adulte.

Formes. — Poudre ; Comprimés ; Cachets. En raison de fréquentes substitutions, causes d'échecs ou d'accidents, préférer les formes spécialisées. Comprimés et cachets, doses à 0 gr. 50 et 0 gr. 25 de *cryogénine*.

Produits spéciaux des
LABORATOIRES LUMIÈRE
9, Cours de la Liberté — LYON

CRYPTARGOL LUMIÈRE

Argentothioglycérine Sulfonate de Sodium

renferme 35 % d'argent métallique

Il se présente sous forme d'une poudre jaune très soluble dans l'eau ; sa solution est neutre et ne noircit pas à la lumière.

A. — Antisepsie GASTRO-INTESTINALE

Le *Cryptargol Lumière* a donné comme antiseptique intestinale des résultats remarquables, infiniment supérieurs à ceux obtenus avec les autres méthodes utilisées jusqu'ici.

Mode d'emploi et Doses :

Adultes. — Pilules : 4 à 6 par jour aux repas.

Enfants. — Granulés : 1 à 4 cuillères à café par jour selon l'âge.

B. — GYNÉCOLOGIE

Ovules au *Cryptargol*.

Pansement gynécologique idéal.

C. — OCULISTIQUE

Collyre à 1 % et 5 % au lieu et place du « CREDE » et dans les diverses formes de conjonctivites infectieuses,

Produits Spéciaux des **LABORATOIRES LUMIÈRE**
9, Cours de la Liberté — LY

CRYSIODAL

du Docteur Et. MAIGRE

Complexe organo-métallique à base d'or et d'iode, associé au cadmium.

Indications. — Pré-tuberculose et tuberculose.

Présentation. — Deux sortes de solutions réparées en ampoules de 5 cc. :

1^o Pour injections intraveineuses (7 gr. d'iode et 0 gr. 0545 d'or pour 100 cc.) ;

2^o Pour injections intramusculaires (3 gr. 50 d'iode et 0 gr. 027 d'or pour 100 cc.).

Doses et mode d'emploi. — Deux séries au moins de 25 ou 30 injections, à raison de deux injections par semaine, avec repos de un ou deux mois entre les séries.

Prix : intraveineux 30 fr. la boîte de 6 amp. intramusculaire 25 fr. la boîte de 6 amp.

LA BIOTHÉRAPIE

131, rue Cambronne, PARIS—Tél. : Vaug. 41-20

CUPRESSUS DAUSSE

(extrait fluide à poids égal)
succédané de l'Hamamélis

Vaso-constricteur décongestif et
Hémostatique.

Indications. — Hémorragies viscérales ou utérines, hémoptysies, varices, hémorroïdes.

Posologie. — XXV à XXX gouttes, 5 à 6 fois dans le courant de la journée.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

CURATINE BRUNET

Analgésique.

Spécifique de l'élément douleur.

Composition :

Pyrazoline : 0 gr. 50 ; phénacétine : 0 gr. 10 ; théine : 0 gr. 06 ; carbonate acide de sodium : 0 gr. 25 ; borate de soude : 0 gr 06 ; colorant inerte : traces.

Indications :

Grippe. Migraines. Névralgies diverses. Rhumatismes. Règles douloureuses. Algies dentaires, etc.

Posologie :

1 à 4 cachets par jour, de préférence loin des repas, pris à sec ou mieux dans un verre d'eau ou de tisane ; n'a pas de goût désagréable.

Se vend en boîtes de 1 cachet et boîtes de 6 cachets.

Prix réglementé de la boîte :

1 cachet : 0 fr. 90. — 6 cachets : 5 fr.

Laboratoire

de la CURATINE BRUNET

23, rue des Ecouffles, PARIS (4^e).

CURATOXINE

Médication anti-infectieuse par voie buccale.

Présentation et posologie. — 1° Granulé soluble : 2 cuillerées à dessert par jour. 2° Cachets : 2 par jour.

Formule. — *Urotrolithine*. (0,25 par cuillerée à dessert) en combinaison *Benzo-Salicylée-Sodique*, *Iode combiné* (0,01 par cuil. à dessert). *Extraits* et *Sels* laxatifs et diurétiques *Bolde*, extrait hépatique, glycérophosphates.

Action. — Anti-toxique. Antiseptique, Emonctorial " La Curatoxine élimine les toxines ".

Indications. — *Tous les états infectieux aigus ou chroniques.*

Infection des voies biliaires, Ictères, Infections vésico-Pyélo-rénales, Maladies infectieuses.

Septicémies, Suppurations chroniques.

Rhumatismes goutteux. Arthritisme.

Laboratoires HOURQUET ET VIENNE

144, rue du Temple — PARIS (III^e)

CURIODE

Composition. — Combinaison organique d'iode et d'un dérivé protéique d'origine animale.

Avantages. — Entièrement assimilable, plus efficace que les iodures alcalins et jamais aucun phénomène d'intolérance ou d'iodisme. — Elimination régulière.

Propriétés. — Le *Curiode* est :

- a) *Vaso-Dilatateur* (Artériosclérose, Hypertension, etc.).
- b) *Stimulateur des organes lymphoïdes et des Séreuses.* (Adénopathies, Gourme, Végétations adénoïdes, Goitre, Arthropathie).
- c) *Donne de la fluidité au sang et aux sécrétions.* (Asthme, Emphysème, Toux spasmodiques, Coqueluche).
- d) *Indispensable au traitement de la Syphilis.*

Indications :

- 1° *Affections cardio-vasculaires.* (Artériosclérose, Hypertension, Angine de poitrine, Péricardite).
- 2° *Affections respiratoires :* Asthme, Emphysème, Toux spasmodiques, Coqueluche, Laryngite chronique, Bronchites anciennes.
- 3° *Affections des organes lymphoïdes :* Adénopathies de la scrofula et de la tuberculose, Gourme, Végétations adénoïdes, Goitre, Arthropathies, Hydarthroses.
- 4° *Syphilis et toutes ses complications.*

Posologie. — XX gouttes correspondent à : 1 gramme de KI ou à 4 centigr. d'iode métalloïdique. Doses moyennes : 20 à 40 gouttes par jour, à prendre en deux fois (aux repas).

Remarque. — Quand les doses atteignent LX gouttes, il est préférable de commencer par X gouttes à chaque repas (XX gouttes par jour) et d'augmenter d'une goutte par repas tous les jours jusqu'à XXX gouttes par repas. Repos une semaine par mois.

CURIODE ARSÉNIÉ

Composition. — Combinaison organique d'iode d'arsenic et d'un dérivé protéique d'origine animale.

Indications. — Les mêmes que celles du *Curiode* et de l'arsenic. Recommandé chez les enfants et les adultes atteints d'affections pré-tuberculeuses et d'adénopathies simples ou trachéo-bronchiques.

Posologie. — XX gouttes correspondent à : 1 gramme d'iode de potassium ; 5 miligr. d'acide arsénieux ; 5 centigr. de méthylarsinate de soude (arrhénil) ; 2 cuill. à soupe de sirop iodotannique.

Doses moyennes. — *Adultes* : XX à L gouttes par jour. *Enfants* : II à III gouttes par année d'âge.

Mode d'emploi. — A prendre en 2 fois pendant les repas. Commencer par des doses faibles et augmenter tous les jours d'une goutte par repas. Repos une semaine par mois.

TOLÉRANCE ET INNOCUITÉ ABSOLUES

Prix : 12 francs.

Échantillon gratuit à MM. les Docteurs

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS

CURIOSAN

Forme. — liquide.

Composition. — Mercurerythrosine
(Sel nouveau ayant fait l'objet d'une
thèse soutenue à la Faculté de médecine
de Paris, 6 juillet 1926).

Indications. — Affections des voies
génito-urinaires, Métrites aiguës et
chroniques.

Posologie. — S'emploie :

1° en attouchements.

2° en instillations intracervicales.

MARONNEAU-MOREL

156, rue des Fauvelles COURBEVOIE
(Seine)

CUROXYURE

Traitement efficace des oxyures.

Forme. — Pommade en tube muni d'une
canule en os.

Composition. — Acide thymique, naph-
taline ; savon médicinal ; extraits d'ab-
sinthe et de tanaïsie.

S'applique aussi bien aux enfants
qu'aux grandes personnes, *sans aucun
danger.*

Laboratoires B. E. A.

Ch. BEHA, Pharmacien de 1^{re} classe
BELFORT

CUSCUTINE FOULON

Action par l'anthraglucoside des cuscutes.

Propriétés thérapeutiques :

Laxatif doux, à effet constant, sans coliques. Pas d'accoutumance, même par plusieurs années d'usage.

Dose. — 1 ou 2 pilules au repas du soir, effet 12 heures après.

Indications. — Constipation habituelle par atonie intestinale. Convient beaucoup dans la grossesse, pendant les couches et l'allaitement.

L'étui de 50 pilules : 4 fr. 50 net.

Échantillons sur demande.

Laboratoire FOULON

ERMONT (Seine-et-Oise)

CYANHERMINE

pour traitements antisyphilitiques
à base de Cyanure de mercure.

Ampoules pour injections intraveineuses pouvant être employées en injections intramusculaires.

Composition :

Cyanure de mercure (chimiquement pur).....	0 gr. 01 cgr.
Arséniate de sodium.....	0 gr. 005 mill.
Sérum isotonique.....	2 cc.

Propriétés :

La Cyanhermine étant une solution à 1/200 en sérum isotonique réalise le maximum de tolérance. L'Arséniate de soude associé au mercure lutte contre l'anémie ou l'asthénie syphilitique.

Mode d'emploi :

Voie intraveineuse de préférence, et posologie habituelle du Cyanure de mercure.

La boîte de 12 ampoules : 10 fr.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération - PARIS (XV^e).

Tél. : Invalides 12-63.

CYTOBIASE**EXTRAIT OPOTHÉRAPIQUE
FOIES FRAIS DÉGRAISSÉS DE MORUE**

Composition — Renferme sous un faible volume tous les éléments actifs des cellules hépatiques, **complètement dégraissées** du gadus morrhua (Ethers cholestériques, vitamines liposolubles. Acide morrhuique.) Sans goût désagréable. Digestion parfaite. Se prend en toutes saisons.

Formes pharmaceutiques :

Gouttes (20 gouttes représentant les éléments actifs de 2 verres d'huile de foie de morue) le flacon 40 fr.

Ampoules, la boîte 44 fr.

Indications thérapeutiques :

Affections des voies respiratoires.

Affections du système osseux.

Affections lymphatiques.

Tous les cas d'amaigrissement et de déchéance.

Posologie :

Gouttes : Enfants jusqu'à 7 ans, 8 à 10 gouttes.

De 7 à 15 ans, 12 à 20 gouttes.

Adultes, 25 à 30 gouttes.

A prendre 2 fois par jour avant les repas dans une gorgée de liquide quelconque.

Ampoules de 2 cc. inject. intra-trachéales : bacilloses pulmonaires. Ampoules 4 cc. injections sous-cutanées : bacilloses ganglionnaires et osseuses.

Laboratoires du CYTOBIASE

24, rue de Charenton — PARIS (XII^e)

Reg. Comm. Seine : 49-513

CYTO-MANGANOL CORBIÈRE

Médication mangano-calcique arseniée.

Le CYTO-MANGANOL constitue la médication hypodermique la plus active dans les cas d'asthénie, les états de dénutrition, la convalescence des maladies infectieuses et les troubles endocriniens.

Indications. — Déminéralisation en général et en particulier : décalcification ; dénutrition ; asthénies ; surmenage ; amaigrissement ; adénopathies ; lymphatisme ; tuberculose.

Mode d'emploi. — En injection intramusculaire au niveau de la région fessière supérieure, en plein muscle.

Dose. — Une ampoule de 5 centicubes tous les jours ou tous les deux jours pour les adultes ; une ampoule de 2 centicubes pour les enfants.

Présentation. — En boîte de 12 ampoules : ampoules de cinq centicubes pour les adultes (CYTO-MANGANOL). Ampoules de deux centicubes pour les enfants (CYTO-MANGANOL infantile).

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue, Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

Téléphone : Carnot 78-11

CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Composition :

<i>Cacodylate de soude chimiquement pur.....</i>	<i>Trente centigr.</i>
<i>Sulfate de strychnine.....</i>	<i>Un milligram.</i>
<i>Sérum isotonisant chloruré.....</i>	<i>Cinq centicub.</i>

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée ou intra-musculaire, tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, stimule l'activité cellulaire et accroît la résistance de l'organisme.

Indications. — Lymphatisme. Anémies. Tuberculose. Neurasthénie. Asthénie post-grippale. Convalescences.

Présentation. — Cyto-Sérum pour adultes 12 ampoules de 5 centicubes.

Cyto-Sérum infantile 12 ampoules de 2 centicubes.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e)

Tél. : Carnot 78-11

CYTOTROPINES**Associations**

lipôido - mono - métalliques.

Sn et **Ag** : ampoules et pilules.

Ag : traitement de la blennorrhagie,
chronique (méthode de Tansard).

Laboratoires FOURNIER frères

7, Rue Biscornet — PARIS

DÉCLONAL

Diéthylchloracétamide.

Médicament hypnotique, ne contient ni brome, ni acide barbiturique.

Indications :

Insomnies causées par le surmenage, les soucis ou les états névropathiques légers.

Posologie et mode d'emploi :

Prendre au coucher, trois heures après le repas, deux cachets à 25 centigr. et encore un ou deux cachets au cours de la nuit, si l'insomnie persiste.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

DECORPA

Mucilage spécial contre la faim.

Mucilage pur, sans adjonction médicamenteuse, gonflant en milieu acide, indigestible, inassimilable, infermentescible; “ faux repas ”, remplissant l'estomac (après gonflement), illusionnant le tube digestif, assurant ses fonctions mécanique, sécrétoire et éliminatoire; ne nourrissant pas.

Action. — Supprime la sensation de faim. — Maintient l'équilibre du tube digestif. — Evite la constipation des hypoalimentés — Ne nourrit pas, mais rend tolérables les régimes de restriction alimentaire, même le jeûne complet.

Indications. — Adjuvant indispensable de toutes les cures de régime avec restriction alimentaire prescrites chez : Obèses, Hypertendus, Pléthoriques, Urémiques, Uricémiqes, Artério-Scléreux, Boulimiques, etc.

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café, 1 heure avant le repas (pour que le sujet se mette à table sans appétit), ou quand la faim se fait sentir.

Laboratoires NORGAN.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome, Paris (VIII^e). Tél. : Lab. 08-00

DELBIASE

Comprimés de sels halogénés de magnésium

Stimulant biologique général

par hyperminéralisation magnésienne.

Méthode cytophylactique du professeur Pierre Delbet.

Indications thérapeutiques particulières. — Asthénie et fatigue générale, Surmenage, Convalescence des maladies infectieuses, Dépression de certains malades devant être opérés.

Entérite chronique (désodorisation des selles), Constipation habituelle, Cholécystites, Angiocholites et toutes infections des voies biliaires.

Tremblement séniles ou autres : Maladies de Parkinson, Sclérose en plaques, Contractures et Crampes.

Troubles cardiaques par hypervagotonie.

Affection de la peau, Prurits, Eczéma chronique, Psoriasis, Acné chronique, Verrues.

Lésions de type précancéreux et prophylaxie du cancer

Mode d'emploi et doses. — De 2 à 4 comprimés par jour, selon qu'il s'agit d'obtenir une simple action stimulante, ou que l'on désire, au contraire, lutter énergiquement contre un état pathologique déjà institué, surtout s'il revêt un caractère un peu menaçant. Faire dissoudre les comprimés dans un demi-verre d'eau, à prendre immédiatement avant le petit déjeuner.

Laboratoire de PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE.
8, rue Vivienne. PARIS

DÉPURATIF KROMELINCK

Essence de salsepareille rouge
composée et concentrée.

Indications. — Artério-sclérose et toutes affections de l'appareil circulatoire. Affections du tube digestif productrices de toxines. Obésité.

Posologie. — 3 cuillerées à soupe (pur ou dilué dans une eau légère), par jour, pendant un mois.

Le fl. : 7 fr. 85. — La cure de 5 fl. : 38 fr. 25

**Salsepareille rouge iodurée
du Docteur Kromelinck**

Recommandée pour le traitement des spécifiques.

Mêmes indications. — Même posologie.

Le flacon : 9 fr. 25

Laboratoires BELIERES
49, Rue Drouot. — PARIS (IX^e)

DÉPURATIF-ROB LECHAUX

aux sucs végétaux concentrés et KI.

Publicité, uniquement médicale. Le Rob Lechaux est prescrit par le médecin.

Indications. — *Cure de désintoxication générale.* Printemps et automne.

Action. — Immédiate. Augmentation de toutes les sécrétions des glandes externes et internes. Abaissement de la tension sanguine. Désintoxication.

Dose. — Une cuillerée à soupe le matin à jeun pendant 2 mois. Une autre cuillerée à soupe le soir si nécessaire.

Le flacon : 14 fr.

Dépôt général :

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e)

Échantillons sur demande.

DÉPURIODE

du Dr Roger Weber

Dépuratif diurétique, ioduré, sans sucre ni alcool.

Une cuillerée à soupe contient
0 gr. 25 d'iodure de potassium.

Formule. — Extraits de bardane stabilisée, de fumeterre, de patience, de salsepareille, de pensée sauvage, de guaco, de stigmates de maïs, de noyer stabilisée, aa 2 gr. Réglisse : 5 gr. Iodure de potassium : 16 gr. 70. Benzoate de soude : 10 gr. Gycérine : 50 gr. Eau q. s. p. 1000 cmc.

Indications. — Furunculose, clous, anthrax, orgelets, éruptions, boutons, rougeurs, eczémas, impétigo, gourme, dartres, herpès, aphtes, scorbut, acné, psoriasis, urticaire, démangeaisons, dermatoses,

Arthritisme, uricémie, rhumatisme chronique, goutte, douleurs, névralgies, lumbago, sciatique, obésité,

Artériosclérose, athérome, hypertension, étourdissement, vertiges, mouches volantes, bourdonnements, céphalée, troubles cérébraux, pouls fort et tendu, signe de la temporale, crampes musculaires, refroidissement et engourdissement des extrémités, sensation de doigt mort, congestion, couperose, âge critique, scléroses, myocardite chronique, aortite, asthme cardiaque, angine de poitrine, bronchite chronique, emphysème, asthme, cirrhoses, ictère spécifique, néphrite interstitielle, albuminurie spécifique, oligurie, myélites, tabès, névrites, paralysies, infections et intoxications, spécificité, bacillose, lymphatisme, scrofule, adénites, mycoses, actinomyose, alcoolisme, tabagisme, saturnisme, grippe, goître, abcès, suppurations, etc.

Mode d'emploi et posologie. — 20 jours par mois, au milieu de chacun des deux principaux repas, dans un demi-verre d'eau.

Adultes : (dose moyenne). 1 cuillerée à soupe. Contre artériosclérose et hypertension 1 cuillerée à dessert.

Enfants : au-dessus de 5 ans : (dose moyenne), 1 cuillerée à café.

Prix du flacon : 18 francs.

Laboratoire du DÉPURIODE

61, rue de Seine — PARIS (VI^e)

Téléphone : Littré 47-76.

Angelini, Pharmacien

DERMO-PLASTOL DUMESNIL

(Plastols Dumesnil)

Forme avec le *Zébo-Plastol* et le *Crémo-Plastol* le groupe des Plastols Dumesnil, pâtes poreuses composées, très homogènes et destinées à être appliquées sur la peau, à la manière des pommades, dans toutes les dermatoses et dont le type est l'eczéma sous toutes ses formes.

Propriétés. — Le Dermo-Plastol calme immédiatement les démangeaisons et assure la réparation intégrale des tissus malades.

Indications. — Les *Plastols* peuvent être appliqués sur toutes les parties du corps ou des membres; eczémas de la vulve ou du rectum, psoriasis, parakératoses psoriasiformes de Brocq, eczémas séborrhéiques de Unna, prurits avec lichénification et eczématisation, pityriasis, impétigo, prurigo, etc.

Laboratoires DUMESNIL
10, Rue du Plâtre — PARIS

DERMO-STALYS

du Docteur Wagon

(Pommade renfermant du Bactériophage).

But et principe :

Application pratique aux affections cutanées des propriétés d'un Bactériophage antistaphylococcique multivalent.

Composition :

Filtrat bactériophage antistaphylococcique : 100 centimètres cubes ; Orthoquinoléine sulfonate de potasse : 0^{sr},25 ; Excipient 1 kilogramme.

Indications :

Toutes *Staphylococcies* cutanées. Furoncles, Anthrax, Acné, Sycosis, Impétigo, et affections ou lésions aggravées par le *Staphylocoque* : Eczémas suintants, Intertrigo, Pyodermites, Ulcères, Plaies suppurées atones, Otites externes, Crevasses, Fissures anales. Emploi sans danger.

Contre-indications. — Néant.

Mode d'emploi :

Pour Furoncles, Anthrax, Pyodermites, Plaies, étaler une mince couche sur la zone malade, enflammée, suintante ou purulente ; compresse stérile, bande ou bandelettes agglutinatives. Sur la face (acné, sycosis), appliquer une mince couche matin et soir avec léger massage, sans pansement.

Éviter l'emploi concomitant de tout antiseptique.

Résultats :

Disparition des phénomènes inflammatoires en 2-4 jours.

Remarques :

- a. Pour l'acné et le sycosis, faire suivre les premières applications d'un traitement d'entretien durant plusieurs jours en utilisant la pommade à la manière d'une crème de beauté.
- b. Pour les vastes placards eczémateux, tâter la susceptibilité des malades en n'appliquant au début le produit que sur une surface de la dimension d'une pièce de 2 francs et augmenter ensuite progressivement.

Prix : tube de 25 grammes : 15 francs.

Échantillons et littérature sur demande :

SOCIÉTÉ DES PRODUITS STALYS

Laboratoire SIDEPAI

64, rue La Boétie — PARIS

Téléph. : Élysées 98-82

DÉSENSIBILYSINE

Traitement de l'asthme et de l'emphyseme. (Méthode du D^r Paul Cantonnet).

Traitement principal d'attaque :

Soluté de polypeptone iodée et de chlorure de calcium jaborandique injectable.

La boîte d'ampoules : 35 francs.

Traitements adjuvants et de maintien :

1° Pulvérisations huileuses (aérol, trachéol).

Aérol le flacon avec pulvérisateur : 60 francs

Le flacon de rechange : 20 francs.

Trachéol, le flacon : 15 francs.

2° Pilules de Pilocularine.

Pilochlorine, le flacon : 18 francs.

Traitement forme bronchitique :

Stock-vaccin bronchitique Beauvy-Cantonnet.

La boîte : 35 francs.

LABORATOIRES BÉLIÈRES

19, rue Drouot, PARIS (IX^e)

DESITIN

au chlore et à l'huile de foie de morue.

Pommade : 1/2 tube (25 gr.). — 1/1 tube (65 gr.). —

Pour les cliniques, emballages de 1/2, 5 et 10 kg.

Indications. — Acné, Dartres, Décubitus, Eczéma, Fistules, Hémorroïdes, Herpès, Inflammations, Intertrigo, Prurit, Séborrhée Soins de la face, Sudation, Transplantation, Transpiration, Ulcus, Cruris, etc.

Traitement de différentes plaies.

Suppositoires : Spécifique contre les hémorroïdes.

Boîtes de 6. Boîtes de 0.

Ovules : Pour affections des annexes. Pertes blanches. Boîtes de 6.

Poudre : Assèchement des plaies et emploi général en dermatologie, en pédiatrie et dans la vie sportive.

Boîte poudreuse (100 gr.)

Sac avec poudre de rechange (100 gr.).

Boîtes pour cliniques.

Établissements MERMINOD

49, rue de Paradis, PARIS (X^e) Provence 30 32

DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique à base de bioxyde de manganèse, de bicarbonate de soude, de chlorhydro-méthylarsinate de lithine, d'antipyrine, de nitrate d'urane et de santonine.

Médication complémentaire
de l'Insuline.

Doses. — 1 cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours : diminuer s'il y a lieu, après analyse du sucre ; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, rue Chaptal — PARIS

DIADERMINE

Excipient pour pommade.

Définition. — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau et les sérums et pénétrant très rapidement l'épiderme.

Indications. — Remplace la vaseline, l'axonge et la lanoline dans la préparation des pommades médicamenteuses, *éteint le mercure. Touchers*, ne graisse pas et n'abîme pas les gants.

Massages, Soins de la peau, Brulûres, Engellures, Gerçures du sein. Prévient et guérit l'érythème fessier du nouveau-né.

BONETTI Frères

42, rue Vavin — PARIS (VI^e)

DIAL CIBA

Hypnotique anti-nerveux

Diallylmalonylurée. Hypnotique actif et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétude. Procure un sommeil calme et réparateur et, à dose modérée, n'a jamais d'action nocive, son usage étant même prolongé.

Indicat. — Insomnie nerveuse en général et chez les agités, les émotifs, les surmenés. États démentiels.

Trois formes : Comprimés, Gouttes et Ampoules (*Dial soluble*).

Doses. — 1 ou 2 comprimés au coucher pour les insomnies du soir, au réveil pour celles du cours de la nuit. Adultes : 1 à 2 comprimés, XXX à LX gouttes, 1 ou 2 ampoules.

Prix : le tube de 12 comprimés, 8 frs. — Le flacon Dial Soluble 11 francs. — La boîte de 5 ampoules, 10 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

DIALACETINE CIBA

Sédatif, Antipyrétique, Analgésique

Diallylmalonylurée, plus éther allylique du paracétaminophénol. Action sédatif, analgésique et antipyrétique permettant d'instituer une thérapeutique efficace et sûre dans l'ensemble des cas où l'irritabilité nerveuse compte parmi les symptômes dominants.

Indications. — Agitation et délire au cours des maladies aiguës. Épilepsie, Hystérie, Névroses diverses. Angine de poitrine, Névralgies, lumbago, Insomnie des tuberculeux.

Doses. — Dose sédatif : 1 à 3 comprimés par 24 heures par 1/2 ou 1 comprimé, avec intervalle de 2 à 5 heures. Dose hypnotique et analgésique. 1/2 à 2 comprimés au maximum.

Le tube de 15 comprimés : 13 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, Place Morand — LYON

DIALYL

Dissolvant urique

Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle, Calculs, Coliques néphrétiques et hépatiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

Forme. — Granulé effervescent.

Posologie. — Deux cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 fr. le flacon.

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT

46, Rue de Boulainvilliers — PARIS

Téléphone: Auteuil 20-21.

DIASCLÉROL

Composition. — Association Sédobenzyl (C^6H^5 CH^2 SO^2 K) (antispasmodique, hypotenseur), hydrate de pipérazine, salicylate de lithine et hexaméthylène tétramine en milieu citaté.

Indications. — Diathèse urique, Hypertension, Artério-sclérose, Arthritisme, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Coliques hépatiques et néphrétiques, Obésité, Diabète.

Dose et mode d'emploi. — Granulé effervescent, 3 à 6 cuil. à café par jour, dans un peu d'eau, quelques minutes avant les repas.

Le **DIASCLÉROL** n'étant pas toxique son emploi peut être prolongé.

LABORATOIRE ODILIA

E. LACOMBE, pharmacien,

2, Rue Neuve Popincourt — PARIS (XI°).

DIASES PROGIL

Composition. — Farines fraîches diastasées de céréales et de légumineuses renfermant toutes leurs vitamines.

Propriétés. — Elles réduisent au minimum le volume alimentaire à absorber. Grâce à une pré-digestion s'opérant pendant la cuisson, elles permettent l'obtention de bouillies très concentrées possédant une agréable fluidité.

Sans aucun surmenage des organes digestifs, elles assurent une suralimentation rationnelle.

Indications. — Nourrissons (particulièrement au moment difficile du sevrage), Enfants, Malades, Convalescents, Vieillards. Tous les malades à régime: Cardiaques brightiques, Rhumatisants, Dyspeptiques, Tuberculeux. Cachectiques.

Mode d'emploi. — Délayer parfaitement et à froid, 3 cuillerées à soupe (soit 50 grammes environ) de Diase dans environ 10 à 15 cuillerées à soupe d'eau, de lait, de bouillon de légumes ou de viande. Chauffer à *feu très doux*, en remuant; la préparation s'épaissit d'abord, puis s'éclaircit. Elle est prête alors à recevoir tous les condiments (sel, beurre, épices) qu'on désire lui ajouter, selon les recettes culinaires pour Diases dont une brochure spéciale est jointe à chaque boîte.

Nomenclature.

DIASE CACAO: Déjeuners et goûters pour adultes et enfants.

DIASE CÉRÉALE sans sucre: Bouillies très fluides pour bébés au biberon, enfants et adultes délicats.

DIASE CÉRÉALE sucrée: Diase complète aromatisée, recommandée pour les enfants en bas âge.

DIASE LÉGUMINEUSE: Potages excellents, instantanés.

PROGIL

Société anonyme au capital de 50.000.000 de francs

6, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e)

40, Quai de Serin — LYON (IV^e)

DIASTOGÈNE DEHAUSSY

Reconstituant puissant en même temps qu'agent dépuratif.

Composition et propriétés. — Par ses **Arsines**, stimule puissamment la nutrition.

Par sa **Nucléine manganésifère**, favorise la réaction du sang et du système nerveux et accélère les oxydations ralenties par la maladie.

Par sa **Kola fraîche stabilisée**, agit comme un tonique cardiaque précieux et comme un diurétique éliminant les déchets mal oxydés et les toxines.

Indications thérapeutiques. — Tous les états de déchéance organique; chaque fois qu'il faut stimuler puissamment un organisme affaibli, incapable de revenir par lui-même à un meilleur état de nutrition. Très utile médication préparatoire à la cure de reminéralisation.

Posologie et mode d'emploi. — **Dia-stogène élixir** (orme la plus active et la plus agréable), légèrement alcoolisée. Adultes : 2 verres liqueur par jour, pur ou dans un peu d'eau.

Dia-stogène granulé (Dyspepsies et Entérites) : Enfants : 2 ans : 1 cuillerée à café par jour; 4 ans : 2 cuillerées à café; 8 ans : 3 cuillerées à café; 12 ans : 4 cuillerées à café; 16 ans et au-dessus : 6 cuillerée à café par jour.

Dia-stogène comprimés (p. diabétiques) : 6 par jour.

Laboratoires E. DEHAUSSY
66, rue Nationale — LILLE (Nord).

DICALIODE

Complexe colloïdal d'iode

Médicament de choix pour l'administration de doses massives d'*iode libre*.

Composition et forme. — Suspension aqueuse titrant 4 % d'iode total dont 3 % d'*iode libre, métallique*, en petits grains.

Avantages. — Beaucoup plus rapidement qu'avec la teinture d'iode, on peut arriver à des doses importantes d'*iode libre* (0,50 à 1 gr. par jour). On institue pour cela une posologie par progression arithmétique.

Mode d'emploi. — Prescrire toujours le dicaliodé en cc. (une mesure graduée accompagne chaque flacon) et *dans du lait froid* (de préférence avant les repas).

Indications. — *Dicaliodé à petites doses* : 1 à 2 cc. par jour. Goitre. *Enfants* : perte d'appétit, ganglions, grosses amygdales, rachitisme.

Dicaliodé à doses moyennes : 2 à 5 cc. par jour. Affections du cœur et des *vaisseaux*, de l'*appareil respiratoire* (bronchite, bronchite chronique, asthme, emphyseme, coqueluche, tuberculose). *Affections de la peau* : eczéma, psoriasis.

Dicaliodé à hautes doses : 10 à 30 cc. par jour. Tuberculoses localisées, adénites, ostéites, iritis, rhumatisme chronique, mycoses, septicémies, syphilis tertiaire.

Labres MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e)
A Bruxelles : LE MARINEL, pharmacien
273, rue Victor Rauter.

DIDIAL CIBA

Hypnotique analgésique.

Diallylmalonylurée et diallylmalonylurate d'éthylmorphine, chaque comprimé étant formé de 0 gr. 075 de Dial pur, plus 0 gr. 025 de diallylmalonylurate. Pouvoir narcotique plus prononcé que le Dial, et action nettement analgésique, d'où indication toutes les fois que l'insomnie est sous la dépendance de la douleur.

Indic. — Toutes les insomnies relevant de la douleur : névralgies, traumatismes, tabes, cancers, etc. Agitation maniaque, excitation psychique. Calmant pré et post-anesthésique.

Doses. — 1 à 3 comprimés à 0 gr. 10 par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie due à la douleur; par doses réfractées, aux repas dans les autres cas.

Le tube de 12 comprimés : 14 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

DIENOL

Indications. — Broncho-pneumonie, Infections septicémiques.

Composition. — Métaux colloïdaux, Fe Mn, obtenus par électrolyse.

Forme. — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules.

Mode d'emploi. — *Adultes.* Une ampoule toutes les 12 heures, en injection hypodermique indolente ou intra-veineuse.

Très jeunes enfants. — Une demi-ampoule de 10 cc. par jour (soit 5 cc.). Ne pas utiliser le reste. On peut aussi employer la voie rectale : le contenu d'une ampoule de 10 cc. additionné d'une quantité égale d'eau tiède est administré par voie rectale deux fois par jour. Mais l'injection hypodermique reste, cependant, le moyen le plus rapide et le plus sûr.

Prix de la boîte : 14 francs.

J. DEPRUNEAUX,

Pharmacien de 1^{re} classe

18, rue de Beaune et 31, rue de Vernueil
PARIS (VII^e).

DIGALÈNE "ROCHE"

Digitale injectable

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables.

Posologie et mode d'emploi :

Ampoules, Solution, Comprimés.

1 cc., ou XXX gouttes, ou 2 comprimés
= 0,15 cgr. poudre feuilles de digitale.

Doses très faibles ou d'entretien cardio-tonique :

Adultes : XX gouttes. — Enfants : I à X gouttes (voies buccale ou rectale).

Doses faibles ou sédatives :

Adultes : XXX à LX gouttes (voies buccale ou rectale) : 2 à 4 comprimés (voie buccale) ; 1 à 2 cc. (voie intramusculaire indolore). — Enfants : V à XV gouttes, selon l'âge.

Doses fortes ou antiasystoliques :

Adultes : XC à CLXXX gouttes (voies buccale ou rectale) ; 3 à 6 cc. (voies intramusculaire ou *endoveineuse*). — Enfants : V à XX gouttes et même 1 à 2 cc. (*cas désespérés*).

Prop. Thér. — Action très rapide, tolérance parfaite, pas d'accumulation.

Indic. Thér. — Chaque fois que le cœur faiblit.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

DIGESTIF HARVEY

Composition :

Benzonaphtol	50	centigr.
Carbonate de chaux.....	25	—
Salicylate de bismuth....	25	—
Hydrate de magnésie....	50	—
Pepsine extractive.....	10	—
Maltine	05	—
Sucre anisé.....	6	grammes

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de l'acidité gastrique et des fonctions digestives.

Formes. — Granulé d'un goût agréable, pouvant être croqué.

Indic. — Dyspepsies, Gastralgies, Gastrites, hyperchlorhydrie, fermentations acides. Entérites.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau, après chaque repas. Avant d'absorber le granulé, le laisser pendant vingt minutes en contact avec l'eau.

Prix au public : 9 francs la boîte.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien. Docteur ès-sciences,
101, avenue de Paris.

RUEIL-MALMAISON (S.-et-O.)

DIGIBAÏNE

Complexe tonicardiaque
Association digitale-ouabaïne

Présentation et posologie. — 1^o *Voie buccale.* — Solution glycéro-alcoolique titrée de telle sorte que XV gouttes = 1/10 millig. : Digit line crist. pure + 2/10 millig. ouabaïne crist. pure.

Doses faibles (cures prolongées d'entretien) X à XV gouttes par jour.

Doses moyennes : XXX gouttes par jour en 2 fois (pendant 6 à 7 jours).

Doses fortes : XL à L gouttes par jour en 3 fois (pendant 4 ou 5 jours).

2^o *Voie intraveineuse* (Méthode exceptionnelle.) Ampoules titrées à XV gouttes de solution par cc. 1 cc. par injection et par jour pendant 6 à 7 jours.

Indications. — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres tonocardiaques ont échoué.

Remarques importantes. — La Digibaïne est la première association digitaline-ouabaïne préconisée en thérapeutique cardiaque (MM. Ch. Laubry, D. Routier et R. Giroux, C. R. Soc. méd. hôpitaux de Paris ; 26 janvier 1923).

La Digibaïne est préparée *uniquement* par les Laboratoires Deglaude.

Laboratoires DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

(Cardibaïne, Spasmosédine, Théoxanthine etc.)

6, rue d'Assas, Paris (6^e). Tel. : Littré 34-85.

Belgique : *Agent général* : **L. Prunières.**

19, rue Louis-Hap. — BRUXELLES

DIGIFOLINE CIBA

Préparation digitalique totale contenant, sous une forme optima, l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale. *Stable, d'action constante, toujours bien tolérée, rigoureusement dosée.*

Indic. — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules) et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

Posologie. — Celle de la poudre de feuille de digitale, à laquelle elle correspond poids pour poids.

Formes pharm. — Comprimés de 10 cgr. — 10 cgr. poudre de feuilles. — Ampoules de 1 cm³ — 10 cgr. poudre de feuille.

Le tube de 25 comprimés, 14 francs.

La boîte de 5 ampoules, 15 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

DIGIMIALBAÏNE

Composition :

L gouttes contiennent :

1/3 de mmgr. de digitaline Mialhe,

2/3 de mmgr. d'ouabaine Mialhe.

Posologie :

Cardiotonique. — X à XV gouttes par 24 heures.

Sédatif. — XXX gouttes, 2 fois par 24 heures, pendant 7 jours.

Antisystolique. — XL à L gouttes, 2 fois par 24 heures, pendant 5 jours.

Pharmacie du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS

DIGITALINE CRISTALLISÉE

MIALHE-PETIT

La plus fidèle
de toutes les préparations de digitale.

Titration chimique rigoureux.

1 cc. = 50 gouttes = 0.001 digitaline cristallisée.

Effets thérapeutiques toujours identiques
à eux-mêmes.

Effets physiologiques constants et contrôlés.

(Employée dans les hôpitaux depuis 1889).

Dose. — Cardiotonique : 3 à 4 gouttes par
jour. — Sédatif : 5 à 10 gouttes. — Anti-
asystolique jusqu'à 50 gouttes dans les
24 heures.

Pharmacie du Docteur MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

DIGITALINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le
plus rigoureux ; donne les plus sûres garan-
ties de *pureté chimique* et d'*activité cons-
tante*.

Action :

Toni-cardiaque, régularise et stimule les
contractions cardiaques, diurétique cardio-
vasculaire.

Indications:

Insuffisance aortique, rétrécissement mitral,
affections pulmonaires, œdème, hydropisie.

Formes:

Ampoules 1 c. c. au 1/10^e de milligr., boîtes de
6 et 12. Granules roses au 1/10^e de milligr.,
flacons de 50. Solution au 1/1000^e, flacons
de 10 c. c. et 5 c. c.

Pharmacie Centrale de France

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV^e)

DIGITALINE NATIVELLE

Prix Orfila (1872) — Prix Desportes (1904)
Décernés par l'Académie de Médecine de Paris.

La Digitaline Nativelle agit plus sûrement que toutes les autres préparations de Digitale. Elle est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Indications. — 1° Asystolie ; 2° Insuffisance cardiaque ; 3° Troubles du rythme cardiaque, etc.

Formes. — *Granules* au 1/10 et au 1/4 de mill. — *Solution* au 1/1000. — *Ampoules* au 1/4 de mill. pour injection intra-musculaire. *Ampoules* au 1/5 de mil. pour injection intra-veineuse.

Spécifier sur les ordonnances ; Granules,
Solution ou Ampoules **Nativelle**

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e)

DIORADIN

Combinaison radio-active
Médication antibacillaire

Composition. — Sels d'iode, camphre mentholé, terpènes et Bromure de Radium.

Présentation. — Ampoules de 1 cc. 12 ampoules.

Propriétés. — Bactéricide, exaltant la phagocytose.

Indication. — Tuberculose. Tous états infectieux.

Mode d'emploi et doses — En injections intra-musculaires ou sous-cutanées, région supérieure du bras et de préférence dans la région musculaire des fesses. — On injectera aux adultes une ampoule de 1 cc. et aux enfants au-dessous de 10 ans 1/2 ampoule de 1/2 cc. 30 injections quotidiennes consécutives ; continuer jusqu'à la 40^e, avec une injection tous les deux jours. On peut recommencer une seconde série après un intervalle de 15 jours à 3 semaines.

La boîte de 12 ampoules : **22 francs.**

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e)

Téléphone : Invalides 12-63

DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine).

Mode de Présentation. — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0,25 cgr

Mode d'action. — La " Dioséine Prunier " diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

Indications. — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

Chassaing, Le Coq & C^{ie}

(Anc. M^{son} Chassaing-Prunier)

1, quai Aulaguier — ASNIÈRES (Seine).

DIURÈNE

(Extrait total d'adonis vernalis)

Formes. — Liquide. Pilules.

Prop. Thér. — Tonique cardiaque et diurétique. A juvant inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle. Contient tous les principes actifs de l'Adonis.

Indications. — Indiqué dans tous les cas d'Arythmie, d'Asystolie, d'Œdème, dans toutes les Affections du foie, Néphrites, Artério-Sclérose.

Posologie. — 2 à 6 cuill. à café ou 4 à 12 pilules par 24 heures.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS

DIUROCALCINE GROS

Composition. — Salicylate de Calcium et Théobromine.

Indication. — Diurétique cardio-rénal.

Forme. — Comprimés dosés à 0 gr. 50.

Propriétés. — 1^o Action diurétique de la Théobromine exaltée par la présence du radical salicylique;
2^o Tonique du Myocarde par l'ion Calcium.

Posologie. — 3 à 6 comprimés par jour.

Prix : 10 fr. le tube de 24 comprimés.

Laboratoires GROS

43, Place Delille

CLERMONT-FERRAND

DMELCOS

Stock-vaccin anti-chancrelleux

Émulsion de cultures de bacille de Ducrey, tuées par le fluorure de sodium, injectable exclusivement par la voie veineuse.

Indications :

Chancrelle (chancre mou) et ses complications : Bubon, Phagédénisme, Diagnostic de l'affection par cuti-réaction, Paralyse générale (pyrothérapie).

Posologie et mode d'emploi :

Série de 6 ampoules à doses croissantes.

Une injection intra-veineuse tous les trois ou quatre jours.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

DOLOMA

Professeurs Dubard et Voisenet, de Dijon

Composition. — Carbono-Fluophosphate-Magnésien-Mangano-Calcique.

Formes. — Poudre et granulé.

Propriétés. — Antidyspeptique. Spécifique des états hyperacides, reconstituant puissant des réserves minérales.

Indications. — Dyspepsies. Entérites chroniques. Tous états déminéralisants et leurs conséquences: *Cancer et Tuberculose*.

Cure antidyspeptique. — Entre et loin des repas. *Doloma*, 2 à 3 sachets de poudre, ou 2 à 3 cuillérées à café de granulé.

Cures reminéralisantes, simple ou intensive. — Voir fiche *Cenophos*.

DOLOMA INJECTABLE

Composition. — Citrophosphite Magnésien. Mangano-calcique. Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. sans toxiques. Injections hypodermiques indolores.

Propriétés. — Névrosthénique idéal. Agent le plus actif de reconstitution des réserves minérales: Ph. Mg. Ca., de la cellule nerveuse.

Indications. — Épuisement du système nerveux déminéralisation phospho-terreuse. Prétuberculose, *Cancer*, Prophylaxie de la récurrence post-opératoire. 1 à 2 ampoules de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour, par période de 10 jours.

Prix.

La boîte de poudre <i>Doloma</i>	12.
» granulé ».....	13.50
» 40 ampoules <i>Doloma</i>	13.50

Communications: à l'Académie de Médecine, avril 1918; à la Société française pour l'étude du cancer juin 1919 — décembre 1920; Concours médical, mars 1920; Journal des Praticiens, mai 1920, etc., etc.

Littérature et échantillons sur demande à
Laboratoire général d'Études Biologiques
 S. A., 29, Place Bossuet — DIJON

DOLYSINE

Goutte, Rhumatismes, Névralgies.

1° Cachets. — Acide phénylcinchoninique en cachets dosés à 0 gr. 50.

Propriétés thérapeutiques :

Puissant dissolvant de l'acide urique.

Doses :

1 à 4 gr. par vingt-quatre heures, puis doses décroissantes. Ni intolérance, ni accoutumance.

Mode d'emploi :

Aux repas ou en même temps qu'une boisson alcaline ou sucrée abondante. — La boîte : 8 francs.

2° Liniment. — Chloral-chloroforme-menthol, éther amyli-salicylique en solution éthérée aromatisée, odeur agréable.

Mode d'emploi :

Badigeonnages suivis d'enveloppement.

Le flacon : 9 francs.

M. ROCHEREAU, pharmacien,
ancien interne des hôpitaux de Paris.
SALBRIS (L.-et-C.).

DRAGÉE ADRIAN

au

CHLORURE DE MAGNÉSIUM

Préventive des Néoplasmes.

Dragées dosées à 121 milligr. de Chlorure de Magnésium Anhydre correspondant à 259 milligr. de Chlorure de Magnésium cristallisé.

ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle
PARIS (III^e)

DRAGÉES BENGUÉ AU MENTHOL

Composition. — Menthol, cocaïne et borate de soude ou menthol-borate de soude (sans cocaïne).

Indications. — Affections de la gorge, pharyngites, laryngites, angines, faiblesse de la voix, antiseptie de la bouche.

Mode d'emploi. — 8 à 10 dragées par jour. Laisser fondre dans la bouche.

Docteur BENGUÉ

pharmacien

16, Rue Ballu — PARIS (IX^e)

DRAGÉES ELKIN

GRANULES ELKIN

Bile, soufre, pancréatine
(sans aucun drastique)

Composition des dragées

Chaque dragée renferme :
0,05 de bile, 0,05 de soufre, 0,05 de pancréatine.

Composition des granules

Chaque granule renferme :
0,001 milligr. de bile, 0,001 de soufre, 0,001 de pancréatine.

Indications :

1. **Dermatoses d'origine gastro-hépatointestinales** : acné, eczémas, dartres, furonculoses, anthrax, etc.
2. **Insuffisances digestives, hépatiques et pancréatiques fonctionnelles ou lésionnelles** : embarras gastriques : constipation, diarrhées entériques, gastro-entérites, etc. (Désodorisant des selles fétides.) Arthritisme, artériosclérose.
3. **Affections dues à toutes intoxications** : urticaire, érythèmes, migraines, céphalées, malaises divers.
4. **Affections gastriques dues à des troubles de fonctionnement du réflexe pylorique** : digestions lentes, évacuations gastriques retardées, somnolence après les repas, fermentations intestinales et, en général, tous troubles des sécrétions gastro-intestinales, etc.

Mode d'emploi :

Pour les adultes. Pilules dragéifiées solubles dans l'estomac. Une ou deux dragées pendant ou après les repas avaler sans croquer).

Pour les enfants. Granules dragéifiées solubles dans l'estomac. 20 à 30 granules par repas (à prendre dans un dessert : compotes, confitures etc.)

Le flacon : 10 francs.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue du Beaune — PARIS (VII^e).

DRAGÉES FERRO-ERGOTÉES MANNET

Composition :

Ergot de Seigle.... 5 centigr.,
Fer..... 10 —

Par dragée.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause. Ménorrhagies de la puberté. Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 dragées par jour avant les repas.

Laboratoire MANNET

LOUDUN (Vienne)

DRAGÉES DU D^r GELINEAU

Flacons de 100 et de 50 dragées.

Composition :

Bromure de potassium associé à l'arsenic et à la Picrotoxine.

Indications thérapeutiques.

Epilepsie. Affections nerveuses.

Posologie :

De 2 à 6 dragées par jour au milieu des repas.

Littérature et échantillons sur demande

Laboratoire J. MOUSNIER

9, bd Carnot, Bourg-la-Reine (Seine)

DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer)

Propriétés. — Associent les qualités anti-spasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui répond à cette indication :

Calmer sans affaiblir,

Reconstituer sans exciter.

Indications. — Chloro-Anémie, Nervosisme.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour.

(Se fait également sous forme de " Sirop ".)

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

DRAGÉES LE BRUN TONI-CARDIAQUES

Composition.

Strophantus.....	0.01	pour une dragée
Sparteïne.....	0.01	— —
Caféine.. ..	0.06	— —
Ext. de Scille.....	0.04	— —

Propr. therap. — Cardiotonique, sédatif de la dyspnée cardiaque. Regulatrices et renforçatrices, elles tonifient le myocarde et activent la diurèse.

Indications. — Insuffisance cardiaque. Asystolie, Maladies mitrales. Œdèmes cardiaques, Myocardites.

Posologie. — 6 dragées par jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

Le flacon de 50 dragées : 12 francs.

Laboratoire LEBRUN

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX^e)

DRAGÉES LUMEVAL

Sédatives, antispasmodiques.

Composition. — Pilules glutinées renfermant :

Extrait stab. de Valériane.....	{	āā 0 gr. 03
— — Passiflore.....		
— — Crataegus.....		

Buthyléthymalonylurée (Syn. Soneryl).

Indications. — Troubles d'origine nerveuse, Insomnies, Agitation, Anxiété, Syndromes, Neurasthéniques en général, Palpitations et Troubles cardiaques spasmodiques.

Posologie. — Jusqu'à 7 dragées par jour ; dose moyenne 2 à 4 par jour. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Prix : 15 fr. le flacon de 40 pilules.

Laboratoires VÈDÈS

52, boulevard du Temple, PARIS

Descouraux et Fils, Pharmaciens.

Docteur en Pharmacie.

DRAGÉES NÉVROSTHÉNIQUES "YSE"

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée) Nux vomica - Kola - Guarana.

Indications et propriétés thérapeutiques.

— Spécifique de la Neurasthénie, *du surmenage intellectuel, des dépressions physique, cérébrale* et des états adynamiques et asthéniques.

Mode d'emploi (sauf avis du médecin). —

Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

Les dragées névrosthéniques "Yse" *se font sans sucre* pour les diabétiques. *Formule B.*

Laboratoire « YSE »

H. Chatelut, pharmacien

65, Rue Louis-Blanc — PARIS (X^e)

DRYCO, LAIT SEC ANTIRACHITIQUE

Activé par les rayons ultra-violet.

Analyse approximative :

Matières grasses.....	12 %
Sucre de lait.....	46 %
Protéine.....	32 %
Sels.....	7 %
Eau.....	3 %

Indications. — Lait spécial pour nourrissons; digestibilité et assimilation parfaites; supprime vomissements et troubles intestinaux.

Doses. — *Nourrissons*: sur indication du médecin (dose de base, 2 cuillerées à soupe nivelées pour 90 gr. d'eau); sucre comme pour le lait de vache ordinaire.

Adultes: régime de suralimentation; affections du foie et de l'estomac.

Préparer sans cuisson.

R. DUHAMEL.

3, rue Saint-Roch, Paris.

DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique physiologique pur,
extrait de porc vivant.

Procédé du Docteur HEPP

Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

Indications. — Hypopepsie. Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

Doses. — *Adultes*: 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.

Enfants: 1/2 cuillerée à café avant chaque tétée ou prise d'aliments.

Adresser toutes demandes :

Laboratoire

de Physiologie du Puits d'Angle

Le Puits d'Angle, LE CHESNAY (S.-et-O.).

Représentants pour la Belgique :

M. MICHAUD

23, rue Plantin — BRUXELLES

ÉATAN

Hydrolysats provenant d'albumines animales, du sang, des tissus conjonctifs, des os, des articulations, des glandes endocrines et d'autres organes sécrétoires et hémoplastiques.

Forme. — Flacons de 140, 460 et 1140 gram.

Indications. — Hypotrophies. Perturbations du métabolisme biologique et chimique, Anémies, Asthénie, Lassitude, Suites de couches, Tuberculoses, Cachexies cancéreuses.

Action thérapeutique. — Restauration remarquable de l'assimilation déficitaire, Stimulation de l'appétit, Amélioration de l'état général, Augmentation du poids. Adjuvant précieux dans la guérison de la phthisie pulmonaire, les tuberculoses locales, articulaires, osseuses et glandulaires.

Mode d'emploi. — La dose journalière est déterminée par la gravité et l'importance de la maladie. Pour les adultes, prendre à midi et le soir : soit le tiers, la moitié ou une cuillère à café d'Eatan dans un potage, du bouillon, de l'eau : chaud et peu assaisonné. Pour les enfants, III à IV gouttes par 10 livres du poids du corps, selon l'avis du médecin traitant. Pour être efficace et complet, le traitement par l'Eatan doit être suivi pendant plusieurs mois et continué encore pendant quelques semaines après la disparition des symptômes morbides.

En vente dans les pharmacies.

Littérature et échantillons par :

MATHYS et SCHAAFF,

34, rue Vignon, PARIS (IX^e)

Dépôt général :

Office Commercial Pharmaceutique,

71, rue du Temple — PARIS (III^e)

ECZÉDA

ZnO — Ichthyosulfosalicylée.

Excipient spécial très absorbant, procure un soulagement immédiat, même en cas de dermatose aiguë et suintante.

Mode d'emploi. — Application renouvelée aussi souvent que nécessaire pour couvrir en permanence la lésion d'une couche protectrice épaisse.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les dermatoses et en particulier les dermatoses prurigineuses qui sont améliorées presque immédiatement.

Indications. — Eczéma sec et suintant, eczéma séborrhéique, érythèmes, dartres, acné, éruptions des nourrissons, engelures, intertrigo, prurits.

Laboratoires GOBEY

21, rue d'Aumale — PARIS

EDISTOL

Composition. — Acides borique, tartrique, citrique : menthol, huile de Pinus sylv., gaiacol, terpinéol, cinéol, Styrax benz.

Indications. — Toutes affections et antiseptie des muqueuses rhino-bucco-pharyngo-laryngées.

Mode d'emploi. — Gargarismes et bains de gorge : 1 cuillerée à café par verre d'eau bouillie chaude.

Fumigations : 1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau bouillante.

Vaporisations : 1 cuillerée à café dans le verre d'eau d'un pulvérisateur à vapeur.

Bain nasal : 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie tiède, au moyen de la pipette nasale.

Échantillon sur demande.

Prix : G. M., 13 fr. ; P. M. 8 fr. 75
(exempt d'impôt).

Laboratoire Henri DUFOUR

40, Rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret)

ÉDO-VACCINS

Préparés d'après les mêmes principes que les vaccins atoxiques stabilisés, les Edo-vaccins s'administrent par la *voie buccale*, sous la forme de comprimés souples, dits "Gélo-disques".

Indications :

Prophylaxie des maladies infectieuses.

Nomenclature :

Tabedo : Fièvre typhoïde et para A et B. — *Dysedo* : Dysentérie bacillaire. — *Meledo* : Méliococcie (M. Melitensis). — *Choledo* : Choléra. — *Pestedo* : Peste.

Mode d'emploi. — Absorber 21 gélo-disques en 3 ou en 7 jours.

" SPÉCIA "

Société parisienne d'Expansion chimique.
83, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

EKTOGAN BOCQUILLON

Poudre composée à base de $Zn\ O^2$ *traité*, sans odeur ni couleur, se prêtant à toutes les formes de pansements.

Sa formule est : $2(Zn^9O^{12}H^{22})$.

Propriété. — Dégage d'une façon lente et continue de l'oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec un ferment ou un acide organique quelconque (sang, pus, transpiration, moiteur, salive, etc.).

Indications. — En chirurgie. Gynécologie. Obstétrique. Dermatologie. Brûlures. Crevasses.

Formes. — Poudre. Pommade. Pâte. Emplâtre. Gazes. *Méchettes* pour Nez et pour Oreilles. *Ovules* et *Plura-bandes* pour gynécologie.

Laboratoires des
PEROXYDES MEDICINAUX
12-18, rue Lamartine — PARIS

ÉLATINE BOUIN

Dérivé du Sapin de Norvège (Gomme et Goudron)
Liquide limpide et de conservation indéfinie.

Dose et mode d'emploi. — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuil. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. — 1 à 2 cuil. à café pour les enfants.

A titre préventif. — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'Élatine peut être prise additionnée à la boisson habituelle au repas, à raison d'une cuil. à cesser par verre de liquide.

Indic. thér. — Affections des bronches, (toux rebelles, catarrhes, emphyseme, asthme) ; de la vessie et des reins (cystites, pyélites, gravelle)

Laboratoire FAGARD

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-sur-SEINE
Pharmacie Derneville, 66, Boulevard de Waterloo
BRUXELLES

ELBON CIBA

Cinnamoyl-*p*-oxyphénylurée.

Antipyrétique doux, d'action durable, pour le traitement des pyrexies tuberculeuses et des catarrhes infectieux des voies respiratoires. Se décompose avec mise en liberté d'acide benzoïque qui réalise la benzoïsation continue de l'arbre broncho-pulmonaire.

Indications. — Tuberculose pulmonaire fébrile. Catarrhes pulmonaires et toutes affections bronchiques fébriles.

Doses. — 2 à 4 comprimés par jour. Commencer par la dose forte pour l'abaisser ensuite progressivement à mesure que la courbe thermique descend.

Le tube de 20 comprimés : 18 francs.

Laboratoires CIBA

O. Rolland, 1, Place Morand — LYON

ÉLECTRARGOL

Composition. — Argent colloïdal électrique à petits grains, stable, d'une pureté, d'une activité supérieures à celles de l'argent colloïdal chimique.

Applications. — L'Électrargol est employé dans toutes les maladies infectieuses sans spécificité pour l'agent pathogène.

Formes. — Ampoules de 1, 2, 5, 10, et 25 cc.; flacons de 50, 100 et 250 cc.; Collyres d'Électrargol et d'Électrargol radio-actif; Pommade, Ovules.

Laboratoires CLIN, PARIS

ÉLECTROCUPROL

Composition. — Oxyde de cuivre colloïdal à petits grains, obtenu par pulvérisation électrique. L'Électrocuprol se présente sous l'aspect d'un liquide brun clair, dichroïque, possédant toutes les propriétés générales des métaux colloïdaux, savoir: pouvoir fermentaire, catalytique, etc.

Formes. — Ampoules de 5 et 10 c. c.

Applications thérapeutiques. — L'Électrocuprol est employé dans le cancer, dans la tuberculose et dans les maladies infectieuses.

Dose et mode d'administration. — L'Électrocuprol est délivré en ampoules de 5 centimètres cubes et de 10 centimètres cubes. L'isotonie de la solution est assurée au moment même de l'usage. On l'injecte dans les muscles, à la dose de 5 ou 10 centimètres cubes tous les jours ou tous les deux jours, dans les veines à la dose quotidienne de 5 à 20 centimètres cubes selon l'urgence, la gravité de l'affection et la résistance du malade.

Laboratoires CLIN — PARIS

ÉLECTROMARTIOL

Composition. — Fer colloïdal à grains très fins et uniformes obtenu par voie électrique. Se présente sous l'aspect d'un liquide brun ambré, légèrement dichroïque, titrant 1 gr. de fer p. 1000.

Formes. — Boîtes de 12 ampoules de 2 cm³
6 ampoules de 5 cm³.

Applications thérapeutiques et posologie. —

Permet de réaliser une médication ferrugineuse, hypodermique ou intra-veineuse modèle. Unit aux propriétés spécifiques du fer les propriétés générales des métaux colloïdaux. Injection complètement indolore et ne déterminant jamais de nodosité. Relève rapidement le chiffre des globules rouges et la valeur globulaire; améliore la nutrition générale. Formellement indiqué dans tous les cas de syndrome anémique: anémie essentielle, chlorose (injection quotidienne de 2 centimètres cubes), anémies post-hémorragiques, anémies toxiques et anémies infectieuses (5 à 10 centimètres cubes en injection intra-veineuse tous les jours ou tous les deux jours).

Laboratoires CLIN — PARIS

ÉLECTROSÉLÉNium

Compos. — Sélénium colloïdal à grains ultra-microscopiques extrêmement fins et uniformes, obtenu par la voie électrique. Se présente sous l'aspect d'un liquide rouge corail, transparent, fortement trouble par réflexion.

Formes. — Ampoules de 5 cm³.

Applications thérapeutiques. — Affections cancéreuses.

L'Electrosélénium a été substitué au sélénium simple à cause de sa très faible toxicité, liée à une activité remarquable. Les travaux de Cade et Girard, Girard, Bougeant et Galliot, Blumenthal, Trinkler, Szecsi, etc., ont montré que, sous l'action des injections d'Electrosélénium chez les cancéreux, on observait régulièrement la diminution, puis la disparition des douleurs, le relèvement du poids, l'amélioration de l'état général, le ramollissement des tumeurs ganglionnaires, la régression des lésions néoplasiques, et parfois leur cicatrisation, ou tout au moins la suppression des sécrétions fétides et des hémorragies.

Posologie et mode d'administration. — L'Electrosélénium s'administre à la dose moyenne de 5 cm³ à la fois tous les deux jours ou tous les jours suivant les cas. On peut doubler cette dose. Pour retirer du traitement tout le bénéfice possible il faut administrer le Sélénium, de préférence par voie intra-veineuse.

**Laboratoires CLIN
PARIS**

ÉLÉODERMINE

Traitement des différentes dermatoses et de certaines maladies des muqueuses. Grâce à la nature de ses composants et à leur dosage scientifiquement réalisé, ÉLÉODERMINE est toujours employée avec succès.

Indications. — Maladies de la peau : Eczéma, Impétigo, Acné, Psoriasis. Engelures, Lupus, Sycois, Furoncles, Anthrax. Plaies infectées ou alones, fistules, Ostéite, Brûlures graves. Affections du système circulatoire : Ulcères variqueux. Métrites, Rhinites, Ozène.

Prix :

En France : 11 fr. 20 — A l'Étranger : 20 fr.

Laboratoires de l'ÉLÉODERMINE

38, rue Soult — TARBES (H.-P.)

ELGINE JULIEN

Comprimés

Composition :

Collargol argent colloïdal... 0,05 cent.

Benzoate de soude..... 0,40 —

Urotropine française..... 0,20 —

En comprimés se dissolvant rapidement

Dissolution réalisable in situ.

Indications. — Maladies infectieuses aiguës. Intoxications, Voies urinaires (urétrites, cystites, pyélites, prostatites), Diathèse urique, (rhumatismes, goutte, lithiase).

Posologie. — *Adultes* : 3 à 6 comprimés par jour. *Enfants* : 1/2 dose. Avaler avec une infusion ou dissoudre dans de l'eau.

Prix : 12 fr. 50. — Boîte gratuite sur demande.

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie

105, rue de Rennes — PARIS

ÉLIXIR BONJEAN

à base d'éther et de plantes aromatiques,
Tonique puissant des voies digestives.

INDIGESTIONS

DIGESTIONS DIFFICILES

Diarrhée, Cholérine, Vomissements
 nerveux, Choléra des enfants.

INCOMPARABLE et MERVEILLEUX
dans les cas de GRIPPE INTESTINALE

DUSSUEL et FAURE

AIX-LES-BAINS (Savoie).

ÉLIXIR DÉRET

Iodure double de Tanin et de Mercure.

Solution vineuse titrée d'Iodure de Tanin et de Mercure en combinaison stable. Teneur en iode 35 milligr. et en mercure 5 milligr. par cuillerée à soupe. Dépourvu d'arrière-goût métallique.

Prop. thérap. — Antisypilitique 1° Absence d'accidents d'hydrargyrisme, grâce à l'action spéciale du tanin ; 2° innocuité sur les voies digestives (jamais de diarrhée). Des faits cliniques montrent l'Élixir Déret souvent toléré par des malades qui ne pouvaient antérieurement supporter un autre traitement mercuriel.

Doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe ; *enfants* : 1/2 à 1 cuillerée à café ; à prendre 2 fois par jour dans un verre gradué pour éviter le contact du médicament avec le métal de la cuillère. Ces doses peuvent être doublées.

Nota. — Aucune indication de la nature mercurielle de la préparation n'est faite sur l'étiquette ni sur l'enveloppe. L'Élixir Déret peut donc être pris aussi discrètement qu'on le désire.

Laboratoires CLIN — PARIS

ELIXIR DUCHAMP

Composition. — Extrait de Foie de Morue.

Quinquina arsénisé et phosphaté. Cacao vanillé.

Propriétés thérapeutiques. — D'un goût exquis, apéritif puissant, tonique, reconstituant et hématopoïétique, l'Elixir Duchamp remplace avantageusement l'huile de foie de morue, les amers et les fortifiants.

Indication. — Tous états de faiblesse physique ou intellectuelle. Manque d'appétit. Grippe. Tuberculose. Rachitisme. Convalescence. Lymphatisme. Scrofule, etc.

Dose. — 1 verre à liqueur (enfants 1 cuillère à soupe) un quart d'heure avant les repas. Pur ou avec de l'eau.

Prix : 20 fr. le flacon de 350 cc.

Laboratoires

O^{ie} RENÉ de GRAUWE 

Pharmacien de 1^{re} classe

16, rue de Rocroy — PARIS. Usine à St-Denis.

ÉLIXIR DUCRO

Préparation aromatique et sucrée, très agréable, contenant les principes des écorces d'oranges amères et 10 centigr. d'hypophosphite par 15 gr. d'élixir,

Asthénie, Anorexie, Convalescences : Un verre à liqueur ou une cuiller à soupe selon l'âge, pur (après le repas) ou étendu d'un peu d'eau (avant).

Pneumonie et maladies infectieuses adynamiques : Une cuiller à café ou à soupe, selon l'âge, toutes les deux heures.

Il exerce alors, plus et mieux que la potion de Todd, une action d'épargne très favorable aux malades.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS

ÉLIXIR DUSSAUD

Véritable suc digestif.

Composition. — Pepsine, diastase, pancréatine, *en milieu alcalin* de lactates et de sels de Vichy.

Propriétés. — Transforme les albuminoïdes en peptones assimilables, les matières amylacées en glucoses ; émulsionne et saponifie les corps gras.

Indications. — *Eupeptique puissant*, réveille l'appétit et facilite la digestion. *Régulateur parfait* des fonctions intestinales, combat la constipation et la diarrhée, même chez les enfants. *Agent d'une assimilation intégrale*, se prescrit dans tous les états de carence ; anémie, convalescences, athrepsie infantile, hypogalactie.

Mode d'emploi. — 1° *Premier âge* : 1, 2 ou 3 cuillerées à café (dans un peu d'eau bouillie sucrée). — 2° *Enfants* : 2 ou 3 demi-verres à liqueur. — 3° *Adultes* : 4 à 5 verres à liqueur.

Par jour et après le repas ou les tétées.

Prix du flacon : 15 francs.

Laboratoire de l'ÉLIXIR DUSSAUD

52, rue de Rome — MARSEILLE

ELIXIR EUPEPTIQUE TISY

Composition. — Pancréatine, diastase et pepsine additionnées de sécrétine et d'entérokinase.

Avantages. — Digère les corps gras, amylacés et protéiques.

Contient à l'état de pureté tous les ferments de l'estomac et de l'intestin. De goût très agréable. Se conserve pendant de longues années.

Indications therap. — Embarras gastriques, dyspepsie, gastro-entéralgie, douleurs et dilatations d'estomac, manque d'appétit, digestions difficiles, diarrhée, atrepsie, vomissements.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur au début ou à la fin de chaque repas.

Laboratoires VAUDIN et GUILLAUMIN

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS

ÉLIXIR FERRO-ERGOTÉ MANNET

Composition :

Ergot de Seigle.... 5 centigr.
Fer..... 10 —

Par cuillerée à café.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorrhagies consécutives à l'Avortement, et à l'Accouchement et à la Ménopause, Ménorrhagies de la puberté. Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 cuillerées à café par jour avant les repas.

Laboratoires MANNET
LOUDUN (Vienne)

ELIXIR GREZ

chlorhydropepsique

spécialement préparé pour combattre l'insuffisance gastrique sous toutes ses formes.

A base de chlorhydropepsine unie aux amers digestifs, son action doit être recherchée dans tous les cas où les fonctions sécrétrices de l'estomac sont déficientes, depuis la simple dyspepsie due à une mastication insuffisante ou trop rapide (mauvaise dentition, repas précipités, etc.) jusqu'aux plus graves troubles sécrétoires.

Joignant l'utile à l'agréable

Il est employé dans le monde entier et universellement apprécié par le corps médical. Le nombre des Docteurs qui emploient l'Elixir Grez *chlorhydropepsique* pour leur usage personnel augmente de jour en jour. C'est pour nous la meilleure preuve de la qualité de notre produit et de son efficacité.

Posologie. — Un verre à liqueur après chaque repas.

Prix : 18 francs.

Dépôt général :

Laboratoire de l'ELIXIR GREZ

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e)

ÉLIXIR HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

Titrage. — Par cuillerée à soupe : 0,007 Bi-iodure de Mercure. — 0,05 Iodure de Potassium.

Originalité. — Excipient spécial à base de Miel, lui procurant un *goût très agréable*, et une parfaite tolérance pour l'estomac.

Présentation dissimulée. — Aucune indication de maladie, ni de nature de médicament.

Posologie. — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe au début ou au milieu des repas.

Enfants de 9 à 14 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

— de 5 à 8 — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

— de 2 à 4 — 1 à 2 — — —

A prescrire. — Par périodes de 20 jours, intercalées de préférence entre deux périodes de 20 jours de suppositoires Hymel.

Indications. — Traitement d'entretien de la Syphilis, entre les séries de piqûres. Hérédosyphilis.

Laboratoires A. DUTEIL

38, rue de Bondy, PARIS.

ÉLIXIR du D^r MIALHE

Préparation. — Suc gastrique complet.

— Un procédé particulier lui conserve toute son activité plusieurs années.

(*Journal de Pharmacie et de Chimie.*)

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas où le suc gastrique fait défaut : Dyspepsies ; douleurs nerveuses ; digestions lentes et difficiles ; vomissements incoercibles de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à bouche immédiatement après le repas ; demi-dose pour les enfants.

Pharmacie du D^r MIALHE

8, rue Favart — PARIS

ELIXIR SPARK

Composition. — Liquide composé d'espèces amères stomachiques et digest ves. Au complexe végétal obtenu par des lixiviations successives, il est ajouté une quantité de glycérine et d'alcool strictement suffisante pour assurer une stabilité et une conservation parfaites; le produit final, d'une amertume aromatique, possède une saveur agréable et franchement apéritive.

Propriétés thérapeutiques. — *Affections du foie*: gastro-hépatite, insuffisance biliaire, congestion du foie, lithiase biliaire.

Affections de l'estomac: dyspepsies, hypo ou hyperchlorhydries, stases gastrique, dilatations stomacales; atonie des voies digestives;

Affections de l'intestin: entérites, ballonnement abdominal: constipation et ses conséquences.

Pas de contre-indications.

Doses. — Une cuillerée à café, dans un peu d'eau pure ou sucrée, avant ou après les deux principaux repas.

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE:

LABORATOIRES NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ÉLIXIR SPES du D^r GUIRAUD

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

Iodure double d'Arsenic et de Mercure

Préparation moins alcoolique qu'un vin et posologique ment assimilable au Siroc de Gibert.

Composition de l'Elixir. — Une cuillerée à soupe contient exactement:

I... 0,008)

Hg.. 0,006) correspondant à (0,01 Biiiodure Hg

As.. 0,001) (0,005 Iodure As

Très agréable à prendre

Indications. — Syphilis et Héredo-syphilis. Bien toléré, son emploi n'occasionne ni hydrargyrisme, ni stomatite, ni érythème, ni diarrhée.

Doses. — *Adultes*: 2 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents: 2 cuillerées à café par jour.

Enfants: 2 cuillerées à café par jour, au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau.

Verré mesure gradué accompagnant le flacon

Observation importante. — Présenté comme tonique et modificateur, l'Elixir Spes ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure.

Susceptible de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophtalmologie Oto-Rhino-Laryngologie.

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). — Tél. Marc. 37-98.

ELIXIR THIOGAIACOLÉ ARQUEVAUX

Composition. Thiogaiacol crist. pur ; Extrait Thébaïque total ; Codéine complémentaire ; Bromoforme ; Teint. Rac. Aconit, titre internat ; Teint. Belladone titre int. ; Benz. Sodique ; E. d. Laur.-Cerise t. int. ; véhicule : Elixir de Polygala au Garus.

Forme. — Liquide.

Indications. — Antiseptique antituberculeux cicatrisant des voies respiratoires. Enrouement, Bronchite et Toux chroniques. Tuberculose. Asthme. Catarrhes.

Posologie. — *Adultes seulement.* Sauf indications médicales contraires, 3 à 5 cuil. à dessert par jour, entre les repas, pures, suivies d'une tasse de tisane très chaude, pectorale ou autre.

Prix du flacon : 11 fr. 20

L. ARQUEVAUX ♂, pharm. à Étampes (S.-et-O.)

Dépôt : O.C.P. 71 Rue du Temple — PARIS (III^e)

ÉLIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

Composition. — Hamamelis virg., Caspium bras., Æsculus hip.

Indications. — Dilatation des veines, Varices, Varicocèles, Hémorroïdes, Phlébites, Accidents congestifs de la puberté et de la ménopause.

Mode d'emploi. — 1 petit verre à liqueur après chaque repas.

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld
PARIS (IX^e)

ELZÉVIR-DENTITION

Collutoire spécifique et puissant de la première dentition.

Composition. — 1° Borate de soude (antiseptique et astringent), drosera et safran (sédatif locaux) ;

2° *Hamamélis virginica*. Base de l'Elzévir-dentition (1/5 du poids total). A cette dose l'*Hamamélis Virginica* est un *vaso-constricteur puissant* (muqueuse congestionnée) et un topique remarquable (douleurs de la poussée dentaire).

Mode d'emploi. — En frictions douces avec la pulpe du doigt sur les gencives douloureuses. Adopté dans les hôpitaux aux services d'enfants.

Littérature et échantillons au Corps médical et à M^{mes} les sage-femmes.

Laboratoire H. SALLE

4, rue Elzévir- Paris (III^e).

EMERSON'S BROMO-SELTZER

(The Emerson drug Company, Baltimore)

Indications :

Céphalalgies, Névralgies, Action rapide.

Composition :

Citrate de soude, Acétanilide, Bromure de Sodium, Caféine.

Posologie :

Une cuillerée à café dans un verre d'eau, et boire de préférence quand le liquide est en effervescence.

Littérature et échantillons au Dépôt général.

PHARMACIE ANGLAISE DES [CHAMPS-ÉLYSÉES

62, avenue des Champs-Élysées,
PARIS (VIII^e)

Téléph. Élysées 22-52

EMPLATRES R. CAVAILLÈS

Caoutchoutés, adhésifs (formules de l'hôpital Saint-Louis). Dermatoses subaiguës et chroniques: Oxyde de zinc. Rouge de Vidal. Vigo. Huile de Cade. Ichtyol, etc.

Prix : 8 fr. 50

Coloplastre pour pansements. Emplâtre caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc, en bobines de 1, 2, 3, 5 $\frac{1}{2}$, etc.

Coloplastre perforé, toutes dimensions.

Gaze anadhère. Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies. Simple. Baume du Pérou. Ichtyol.

La boîte de 25 compresses : Prix : 17 fr.

Laboratoire du D^r R. CAVAILLÈS

34, rue de Turin — PARIS (VIII)

Détail : 116, bd Haussmann et toutes pharmacies.

EMULSION MARCHAIS

Médication des voies respiratoires.

Composition. — Préparation émulsive à base de créosote de hêtre, de baume de Tolu, glycérophosphate de chaux.

Action thérapeutique. — Aseptise l'appareil respiratoire, modifie les sécrétions bronchiques, sclérose les lésions pulmonaires, récalcifie l'organisme.

Avantages. — Tous les éléments de l'EMULSION MARCHAIS sont solubilisés ou émulsionnés. Activité considérablement augmentée. Pas de troubles digestifs. Créosote partiellement désodorisée, ne provoquant jamais d'intolérance.

Indications. — Trachéites, bronchites, pleurites, tuberculose pulmonaire, et en général toutes les maladies du poumon, des bronches et de la plèvre.

Mode d'emploi. — 3 à 6 cuillerées à café, par jour, dans un liquide quelconque.

L'EMULSION MARCHAIS peut être également administrée en inhalations (2 cuillerées à soupe dans un bol d'eau bouillante) et en lavements (1 à 2 cuillerées à soupe dans 500 grammes d'eau tiède).

LABORATOIRE
de l'EMULSION MARCHAIS

11, rue Mission-de-France, Marseille.

ENDOCALCASE

Médication spécifique de toutes les déminéralisations.

Composition. — Sels insolubles de chaux, de manganèse, de fluor et de silice. *Poudre d'os frais. Extraits secs de surrénale et de thymus. Rate. Foie.*

Présentation. — Deux formes : Dragée et granulé onduleux.

Prop. therap. — L'addition de poudre d'os frais (aliments minéraux *vitalisés*) et de surrénale et de thymus (dont la déficience est une des causes déterminantes de la déminéralisation) aux sels de chaux, rendus assimilables selon la formule de Ferrier, assure leur fixation rapide et définitive dans l'organisme.

Indications. — Tuberculose. Toutes les affections osseuses : troubles de la dentition, carie dentaire, rachitisme, consolidation de fractures. Retard de croissance. Grossesse. Surmenage. Débilité. Convalescences. Anémie. Neurasthénie. Lymphatisme. Blessés et Intoxiqués de guerre.

Doses et mode d'empl. i. — Toujours au début des repas;

Granulé : Par jour : Adultes : 2 cuillerées à café.
enfants : une cuillerée à café.

Dragées : Par jour : Adultes : 4 à 5 dragées.

Enfants : 1 à 2 dragées.

LE GARREC, Pharmacien

74, rue des Jacobins — AMIENS

ENDOPANCRINE

Forme et composition. — INSULINE FRANÇAISE, présentée en tube de 6 cc.

Chaque cc. correspond à 20 unités cliniques.

Avantages. — La présentation spéciale permet de prélever dans le tube le nombre exact d'unités que l'on désire, le reste du tube conservant toutes ses propriétés.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, intra-musculaires ou intra-veineuses.

Dose de début. — un cc. La conduite du traitement ultérieur sera dictée par les dosages du sucre dans les urines ou éventuellement dans le sang.

Demandez notre notice.

“ La Thérapeutique par l'Insuline ”

Laboratoire de Thérapeutique générale

48, rue de la Procession — PARIS (XV°)

ENERGÉTÈNES BYLA

Sucs purs de Plantes fraîches inaltérables,

Chimiquement dosés, stabilisés.

Physiologiquement titrés.

Unification de leur posologie :

AUSÉPINE BYLA, régulateur cardiaque.

Genêt Byla, diurétique.

GUI BYLA, vaso-dilatateur. (Voir page 351).

Muguet Byla, toni-cardiaque.

Sauge Byla, anhydrotique.

Cassis Byla, antirhumatismal.

MARRON D'INDE BYLA, toni-vasculaire.

VALÉRIANE BYLA, sédatif. (Voir page 871).

3 cuillerées à café par jour.

Médication héroïque :

Colchique Byla, antigoutteux.

Digitale Byla, toni-cardiaque.

X à XXX gouttes par jour.

Les ETABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire, PARIS

R. C. Seine 71895.

ENÉSOL

Composition. — Salicylarsinate de mercure, à arsenic et mercure dissimulés. Renferme 38, 46 p. 100 de Hg métal, et 14,4 p. 100 de As sous forme dissimulée. Les solutions sont incolores et ne coagulent pas l'albumine.

Formes. — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. contenant 0^{gr},03 de salicylarsinate de mercure par cc. correspondant à 0^{gr},0115 de Hg métal et à 0^{gr},0043 de As métalloïde par cc. Ampoules compte-gouttes (collyre) de 10 cc. dosées à 0^{gr},03 par cc.

Propriétés thérapeutiques. — Agent antisypilitique (agissant à la fois par son arsenic et par son mercure). Action analeptique par l'arsenic.

Psoriasis, lichen plan.

Doses et mode d'emploi. — Dose moyenne : injection intramusculaire d'une ampoule (2 cc.) par jour. Dose massive : injection intramusculaire ou intraveineuse de 4 à 8 cc. tous les deux ou trois jours.

Laboratoires CLIN
PARIS

ENIODE LEFEBVRE

Composition. — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

Forme. — Comprimés kératinisés contenant chacun *Un centigramme* d'iode en combinaison organique.

Prop. therap. — L'*Eniode* possède toutes les propriétés de l'iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour ; *Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

Pharmacie GRIGNON

2, Rue Duphot — PARIS

ENNEGO

Extrait dragéifié de Lawsonia Inermis

Propriétés. — Antiseptique urinaire parfait. Diurétique et sédatif.

Avantages. — Ne fatigue pas l'estomac, ni les reins comme le santal. Assure la désinfection urinaire mieux que l'Hexaméthylènetétramine.

Indications. — Pyélonéphrites, Blennorrhagies, Cystites, Néphrites, Albuminuries, Lithiase rénale.

Posologie. — 6 à 8 dragées par jour.

Laboratoires ROBERT & CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS

ENTÉRIODE

Comprimés combinés d'iode et d'amidon donnant naissance dans l'intestin seulement à de l'iode-misant.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant désinfectant intestinal.

Facile à absorber ne provoquant ni irritations ni iatrogénie.

Spécifique des entérites infantiles.

Posologie :

Nourrissons : 3 fois par jour : un comprimé écrasé dans un peu d'eau, de bouillon de légumes ou de lait.

Enfants : 3 fois par jour : 2 comprimés à la fin des repas.

Adultes : 3 fois par jour : 3 comprimés à la fin des repas.

Cures de trois semaines à un mois renouvelées aussi souvent qu'il sera nécessaire.

Laboratoires de l'ENTÉRIODE

39 rue de Clichy (9^e) Téléph. Louvre 19-87

ENTÉRO-ANTIGÈNES

préparés d'après la méthode et selon les procédés de M. le Professeur DANYSZ de l'Institut Pasteur.

Prop. therap. Anti-anaphylaxie curative des maladies chroniques non contagieuses.

Indications. — Intestin (Constipation chronique, Colites, Entérocolites, Diarrhées chroniques, Dysenterie microbienne (Shiga Fleixner, etc.).

Asthme. Rhume des foies. Migraines, Neurasthénies. Insuffisances hépatiques et polyglandulaires.

Peau Eczémas chroniques, Urticaires, Prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal), Prurigo, Psoriasis, Furonculose, etc.

Rhumatismes chroniques. Troubles de la ménopause, dysménorrhées.

Tous les cas de dysharmonie endocrinienne.

Deux formes. — 1^o Ampoules à injecter.

2^o Ampoules à boire.

Boîtes de 10 ampoules. Littérature sur demande.

LABORATOIRES F. DUCATTE

31, Rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV^e)

ENTÉROBYL DEHAUSSY

Médication entéro-hépatique rationnelle
assurant :

1^o) Le drainage physiologique des voies biliaires.

Extrait hépatique total. Peptone.

(*Stimulant des sécrétions endo-cellulaires.*)

Sulfate de magnésie anhydre. Comb. étum.

(*Fluidifiants biliaires.*)

2^o) La désinfection atoxique de l'intestin.

Charbon animal pur. Agent antitoxique
s'opposant à la putréfaction intestinale
par *adsorption*.

Indications :

Cholécystite chronique, Lithiase biliaire,
Congestion hépatique, Cirrhoses (alcool,
paludisme), Ictère, Cholémie, Consti-
pation, Diarrhées par insuffisance hépa-
tique, Colites infectieuses, Migraines,
Vertiges d'origine digestive, Urticaire,
Prurit.

Posologie :

Drainage biliaire : 2 à 3 cachets, le matin
à jeun, dans un peu d'eau tiède, en une
fois.

Cure d'entretien : 1 à 3 cachets, dans
la journée, une demi-heure avant les repas.

Échantillons et Littératures

Laboratoire DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE (Nord)

ENTÉROHÉPATINE

Rééducateur opo-physiologique de l'Intestin.

Composition. — Proteolysine, Peptolysine, Amylolysine. Hépatolysine. Extrait salicaire, Teinture Belladone, Acide lactique.

Indications. — Toutes formes d'Entérites, Diarrhées, Dysentéries indigènes ou exotiques. Atonie intestinale.

Mode d'emploi et présentation :

Flacon pour *adultes* : 3 cuillères-mesure par jour.

Flacon pour *enfants* (compte-gouttes) : 2 gouttes par année d'âge, 3 fois par jour.

ENTÉROHÉPATINE SB.

Même formule moins la Teinture de Belladone. Mêmes indications, mêmes doses.

Laboratoires Henri FOUCHER

77, boulevard de Grenelle — PARIS (XV^e)

ENTEROSEPTYL CLÉRAMBOURG

Composition :

Phosphate de β Trinaphtyle P O — $\left| \begin{array}{l} \text{C}^{10} \text{H}^7 \text{O} \\ \text{C}^{10} \text{H}^7 \text{O} \\ \text{C}^{10} \text{H}^7 \text{O} \end{array} \right.$

Forme. — Comprimés.

Propriétés. — Poudre blanche, cristalline inodore et sans saveur, insol. ble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, fondant à 108-110°.

Indications thérapeutiques. — Toutes les fois que l'intestin est le siège de fermentations, qu'il s'agisse de *Diarrhée* ou de *Constipation*. Entéro colite muco-membraneuse. Entérite. Colite, Dyspepsie gastro-intestinales. Fétidité d'haleine. Auto-intoxications : Ictère, Albuminurie hépatique, Eczéma et Dermatoses diverses. — Antiseptique de choix dans les localisations intestinales des diverses *Malaies infectieuses* : Fièvre typhoïde, Affections cholériformes.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour, à jeun ou 1 heure avant les repas.

Laboratoire CLÉRAMBOURG-DELONDRE

Fondé en 1598

10, rue Saint-Antoine — PARIS

ENTEROVACCIN LUMIÈRE

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

Antitypho-colique polyvalent (I.A.B.C.)
Vaccination Antityphoïdique. Antiparatyphique,
Anticolibacillaire.

Constitution. — Masse pilulaire constituée par des corps bacillaires (éberth. coli-bacille, paratyphique A et B) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants.

Indications. — L'Entérovaccin antitypho-colique Lumière possède à la fois des propriétés immunisantes très actives, capables d'assurer une protection efficace contre les affections typhiques, paratyphiques et colibacillaires. Il agit également très efficacement comme vaccin curatif, en particulier chez les malades atteints de fièvre typhoïde. L'affection évolue alors très rapidement et de façon tout à fait anodine.

Mode d'emploi. — Administrer 4 pilules par jour, pendant 7 jours consécutifs, loin des repas.

Produits spéciaux des

LABORATOIRES LUMIÈRE

9, cours de la Liberté — LYON

ENTÉROXIN LECLERC

Vaccin buccal polyvalent contre l'infection intestinale.

Composition :

Mélange de cultures atténuées de B. Coli, Enterocoque, Staphylocoque, autrement dit, "bouillon vacciné" tenant en suspension les corps microbiens ci-dessus :

Présentation :

Ampoules de 10 cc. (boîtes de 8 ampoules).

Mode d'emploi et Dose :

Le matin à jeun, trois quarts d'heure avant toute alimentation, bien agiter une ampoule et en absorber le contenu dans un demi-verre d'eau *fr. tie* sucrée.

Aucune réaction à craindre. On peut donner une ampoule à un nourrisson, 2 à 3 ampoules à un adulte pour agir plus énergiquement, sans aucun inconvénient.

Durée du traitement : 10 à 20 jours parmois, à renouveler plusieurs mois de suite.

Il est recommandé de faire précéder l'Entéroxin d'un cholagogue léger. (Magnétone).

(Voir, ce mot. p. 469)

ENTÉROCHIR LECLERC

L'ENTÉROCHIR LECLERC est obtenu de l'Entéroxin Leclerc, filtré sur bougie, débarrassé des corps microbiens. Il est constitué par un bouillon vacciné polyvalent (Staphylocoque, B. Coli, Entéocoque et est réservé aux usages chirurgicaux, Instillations, Lavages, etc.

Littérature, Échantillon sur demande

Pr. x : 25 fr. chacun

Pharmacie LECLERC

Docteur P. Lemeland, successeur
10, rue Vignon — PARIS (IX^e)

EPILEPTIQUE (ANTI) DE LIÈGE

Elixir bromuré d'une action puissante évitant les inconvénients du bromisme. En 4 numéros.
Epilepsie, crises nerveuses, neurasthénie.

EPILEPSIE. POSOLOGIE

1° *Enfants au-dessous de 7 ans.* — Seulement le n° 1 :

Moins de 5 mois :	1/4 mes. par j.	
5 mois à 1 an :	1/2 mes. —	
1 à 3 ans :	1 à 2 mes. par j.	} en augm. } graduel.
4 à 7 ans :	2 à 3 mes. —	

2° *De 7 à 10 ans.* — Seulement le n° 1.

3° *De 10 à 14 ans.*

N° 1. 1 ^{re} bouteille.....	2 1/2 mesures par jour.
" 2 ^e "	3 " "
" 3 ^e "	3 1/2 " "
N° 2. 1 ^{re} bouteille.....	3 " "
" 2 ^e "	3 1/2 " "
" 3 ^e "	4 " "

4° *Adultes.* — Le choix du numéro de début dépend de l'intensité de la maladie et de la constitution du malade. Les personnes faibles et celles qui n'ont d'accès qu'à un mois d'intervalle commenceront par le N° 1. Les bonnes constitutions victimes d'accès fréquents commenceront par le N° 2.

N° 1. 1 ^{re} bouteille.....	3 mesures par jour.
" 2 ^e "	3 1/2 " "
N° 2. 1 ^{re} "	3 " "
" 2 ^e "	3 1/2 " "
N° 3. 1 ^{re} "	3 " "
" 2 ^e "	3 1/2 " "
N° 4. 1 ^{re} "	3 " "
" 2 ^e "	3 1/2 " "

La mesure dont nous nous servons jauge 15 cc (soit une cuillère à soupe).

Les doses indiquées plus haut sont toujours prises en trois fois diluées dans une infusion de thé diurétique de Liège.

Laboratoires FANYAU

46, rue Claude-Lorrain — LILLE

ERANOL

Iode colloïdal en suspension aqueuse.

L'Eranol ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, ni aux iodures alcalins, tous produits dans lesquels l'iode se trouve à l'état de combinaison stable, difficilement dissociable. C'est un iode libre, à l'état colloïdal, en milieu aqueux, non caustique, ni toxique, même aux doses thérapeutiques élevées.

Propriétés. — Grâce à l'état particulier sous lequel se présente cette iode vitalisé, l'Eranol, de beaucoup plus actif que l'iode métalloïdique dans ses indications habituelles, possède une action catalytique très nette, due à ses ions métalloïdiques qui augmente, par excitation, le pouvoir thérapeutique de l'iode. Son hyperactivité, sa faible teneur relative en iode (10 %) sa parfaite tolérance et sa forme aqueuse en font la préparation d'iode la plus maniable, la plus active et la moins toxique.

Indications. — Lymphatisme, Hypertension, Rhumatismes, Pré-tuberculose, Tuberculoses torpides, mycoses, etc.

Formes et posologie. — Gouttes, en flacon pour l'usage interne, à prendre indifféremment au moment des repas ou entre les repas, dans une boisson quelconque : eau, vin, bière, etc.

Adultes : XX à L gouttes et plus deux fois par jour.

Enfants : V gouttes par année d'âge et par jour en deux fois.

Ampoules de 1, de 2 et de 5 cc pour injections intramusculaires et intraveineuses, une tous les un, deux ou trois jours, pendant 12 jours et repos 8 jours.

Prix au public : 13 fr. 75.

Laboratoire de L'ÉRANOL

45, rue de l'Echiquier — PARIS

ERCERHINOL

Ampoule nasale à l'Argent Colloïdal

Avantages. — Bactéricide puissant, Traitement *pratique*, rapide et propre.

Indications. — Grippe, Infections broncho-pulmonaires, Catarrhe nasopharyngien, Coryza, Sinusite, etc.

Mode d'emploi. — Verser quelques gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour, la tête inclinée en arrière.

Laboratoires

ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS

ERGOTINE LAMANTE

Traitement des hémorragies.

Forme. — Gouttes, et ampoules pour injections hypodermiques

Composition. — Solution stabilisée et inaltérable de tous les alcaloïdes de l'ergot de seigle, obtenue par le procédé de fabrication spéciale de Lamante.

Indications. — Hémorragies de toutes nature, Hémorragies utérines, Accouchements, Fausses couches, Fibromes, Accidents de la Ménopause, Hémorroïdes, Crachements de sang, Saignements de nez, Leucorrhée, Troubles de la Puberté, Incontinence d'urine chez les enfants. Contre l'Asthme bronchique et la Toux quinteuse, en injections hypodermiques.

Dose et mode d'emploi. — XXX à XL gouttes par 24 heures chez les adultes en deux fois dans un peu d'eau sucrée. XXX gouttes à la fois, 3 à 4 fois dans les 24 heures dans les très fortes hémorragies. *Enfants*: 1/3 des doses ci dessus.

Ampoules. — En injections hypodermiques: 1 ampoule comme préventif d'hémorragie après l'accouchement, ou dans les hémorragies légères. 11 ampoules consécutives dans les hémorragies abondantes. A répéter au besoin 2 à 3 fois dans les 24 heures.

Echantillon et littérature sur demande.

Le flacon gouttes 6 fr. — la boîte 6 Ampoules 8 fr.

M. PARIS Pharmacien de 1^{re} classe.

1, rue Lassalle, LYON (La Boucle).

ESCULEOL

Composition. — Acoolé concentré de Marron d'Inde frais et stabilisé.

Indication. — Action vaso-constrictive sur le système nerveux périphérique et en particulier dans les cas d'hémorroïdes, varices, varicocèles, phlébites, stase veineuse, etc.

Supériorité aux préparat. médicinales par ce que conceit, stable et d'action constante.

Méthode d'emploi. — **Hémorroïdes :** Administrer 2 fois p. j. dans l'intervalle des repas 15 gouttes d'Esculéol dans un peu d'eau. Dans les cas rebelles, graduer la dose suivant l'intensité des douleurs, en augmentant de 5 gouttes par jour. **Varices, varicocèles, etc.,** toutes les fois que la médication devra être continuée pendant un certain temps administrer 15 gouttes 2 fois p. j. dans l'intervalle des repas, 20 jours par mois.

Prix : 13 fr.

MICHEL DELALANDE

13, Rue Lacharrière — PARIS (XI^e)

EUCALCIUM

Reminéralisateur manganéo-calcaïque.

Formule la plus active
de la mélication récalcifiante.

Composition :

Calcium, manganèse, magnésie, phosphate, fluorure.

Les cachets opothérapiques et les granulés contiennent en plus : parathyroïde, surrénale, thymus.

Trois formes :

POUDRE, de goût agréable.

CACHETS { d'Eucalcium pur.
de 3 sortes : { d'Eucalcium méthylarsiné.
 { d'Eucalcium opothérapique.

GRANULÉS fondants opothérapiques
(forme de choix pour enfants).

Indications :

Débilité. — Anémie. — Tuberculoses. — Grossesse. — Allaitement. — Rachitisme. — Croissance. — Stréptococcose. — Lymphatisme. — Convalescence. — Consolidation des fractures. — Caries dentaires et évolution de la dentition.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 cuillerée à café de poudre, ou 1 cachet ou 1 cuillerée à dessert de granulés, à la fin de chaque repas (3 fois par jour).

Enfants de 5 à 10 ans : 1 cuillerée à café de poudre ou de granulés ou 1 cachet à la fin des repas (2 fois par jour).

Enfants au-dessous de 5 ans et nourrissons : donner la poudre ou les granulés par demi-cuillerée à café, ou par pincée, suivant l'âge, (2 fois par jour).

Aucune contre-indication

A. BASTIDE

Pharmacien de 1^{re} Classe,
50, boulevard de Paris, Marseille.

EUCALYPTINE LE BRUN

(Antiseptique pulmonaire)

Composition. — Eucalyptol 0,15 cgr. ; Gaïacol, 0,05 cgr ; Acide phénique, 0,02 cgr. ; Camphre, 0,05 cgr. ; pour une ampoule de 1 cc. le tout dans une décoction huileuse de plantes balsamiques calmantes, spécialement étudiée et rendant *l'injection absolument indolore.*

Formes. — Amp. de 1 cc. — Caps. glutinisées.

Prop. thér. — Antiseptique pulmonaire. Antioxydant. Antithermique. Sédatif de la toux. Diminue et facilite l'expectoration.

Indications. — Toutes les affections aiguës des voies respiratoires : Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Maladies infectieuses.

Posologie et mode d'emploi. — Sous la forme capsules : 6 par jour, 2 chaque repas. En injections intra-musculaires. Adultes : 1 à 3 amp. de 1 cc. par jour. Enfants de 5 à 12 ans : 3/4 de cc. 2 mois à 5 ans, 1/2 de cc. Le flacon de 42 capsules : 11 francs. La boîte de 12 amp. : 15 francs.

Laboratoire LEBRUN

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX°)

EUCHOL

Tonique Hépatique

Composition : Extrait stabilisé et total des feuilles de la tige du *Cynara Scolymus* (Artichaut).

Forme Pharmaceut. : COMPRIMÉS DRAGÉIFIÉS.

Propriétés :

Tonique du foie.

Diurétique puissant.

Cholagogue.

Excitant des glandes digestives.

Aucune contre-indication.

Innocuité absolue.

Emploi dans les hôpitaux de Paris.

Posologie 4 à 6 COMPRIMÉS par jour.

État chronique : **4 comprimés** (2 au moment des principaux repas).

État de crise : **6 comprimés** (2 au moment des 3 repas).

Durée moyenne du traitement : 3 semaines.

Indications :

Toute insuffisance hépatique.

Ictère catarrhal.

Paludisme, Cirrhose.

Cholémie familiale.

Coliques

Congestions

Migraine

Constipation

Intoxication

Urticaire

} d'origine hépatique.

Prix au public : **15 francs.**

J. MORELLET

Pharmacien, ex-interne des hôpitaux de Paris, 95, Boulevard Magenta, Paris

EUCYTOL

Composition. — Combinaison d'extraits végétaux et de sels phospharsenicaux organiques, 25 cc = 3 centigr. d'iode + 2 milligr. d'arsenic.

Forme. — Liquide à base de vins de liqueur.

Avantages et propriétés thérapeutiques. — Réménérat, lisa eur et stimulant dans toutes les déchéances organiques. Plus assimilable que l'huile de foie de morue et plus actif que les sirops iodotanniques.

Indications. — *Enfants* Affections des os et de la nutrition. Affections des glandes et des voies respiratoires. Etats pré-tuberculeux et tuberculose sous toutes ses formes. Anémie et troubles nerveux.

Adultes : Convalescence des maladies infectieuses, affections des voies respiratoires, troubles de la circulation.

Posologie. — *Enfants* : de 2 à 5 ans, 2 cuillerées à soupe par jour ; de 5 à 10 ans, 2 verres à liqueur par jour ; de 10 à 15 ans, 3 à 4 verres à liqueur par jour.

Adultes : 1 à 2 verres à liqueur à chaque repas.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e)

A Bruxelles :

LE MARINEL, pharmacien, 273, rue Victor Rauter.

EUDYNOL

Composition. — Arsenic, phosphore, strychnine.

Formes. — Ampoules, gouttes, perlules.

Indications. — Asthénie, pré-tuberculose, surmenage, dépressions nerveuses, convalescence, paludisme.

Dosage, Prix et Posologie.

Ampoules, 14 fr. la boîte de 12. Arsenic : 0 gr. 015 ; Phosphore : 0 gr. 008 ; Strychnine : 0 gr. 002 pour 1 c. c. Une injection par jour.

Gouttes, 12 fr. le flacon. Arsenic : 0 gr. 02 ; Phosphore : 0 gr. 01 ; Strychnine : 0 gr. 002, pour 1 c. c. soit 34 gouttes. 10 à 12 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Perlules, 14 fr. le flacon. Arsenic : 0 gr. 005 ; Phosphore : 0 gr. 007 ; Strychnine : 0 gr. 0005 par perlule. 2 perlules à chacun des principaux repas.

Échantillons François CARTIER,

1, rue de la Martinière — LYON

Préparé par Dr ROGER, pharmacien.

EUGYNOL GRANDVAL

Composition :

Association d'extraits d'Hydrastis, Hamamelis-Viburnum-Gos ypium.

Propriétés thérapeutiques :

Il favorise la formation chez les jeunes filles, évite les Palpitations et provoque l'élimination des Toxines. Vaso-constricteur par excellence; il régularise la circulation du sang, décongestionne les organes, et apporte toujours un soulagement à la souffrance produite par la moindre affection des organes de la Femme. *Eugynol* permet d'enrayer la formation des Varices; soit au moment de la grossesse, soit, à l'Retour d'Age. Il rétablit la régularité des Règles. Son usage à dose modérée finit par supprimer les douleurs qui accompagnent ou qui précèdent si souvent ce moment désagréable.

Indications thérapeutiques :

Complications du retour d'âge, telles que Varices, Hémorroïdes, Hémorrhagies, Flux sanguins de toute nature, Éruptions diverses, etc.

Dose :

XV à XX gouttes avant chaque repas.
On peut aller jusqu'à XXX gouttes.

Le flacon : 7 fr. 50 (toutes pharmacies).

LABORATOIRES GRANDVAL

1214 rue Féry, Reims.

EUMICTINE

Indic. Thér. :

Antigonococcique diurétique, antiseptique etc.

Affections des voies urinaires :

Blennorrhagie, Urétrite, Cystite, Pyélite, Catarrhe, Prostatisme, etc.

Traitement complet, sans aucun retentissement sur les organes, estomac en particulier.

Doses et mode d'emploi :

Capsules enrobées au gluten pur, contenant chacune 0.20 Santalol, 0.05 Salol et 0.05 Hexaméthylène — Tétramine : 8 à 12 par jour aux repas, ce qui constitue un traitement complet des affections urogénitales et prostatites.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

EUONYMINE PAUL THIBAUT

Pilules d'Euonymine purifiée, procédé Paul Thibault, licence es sciences Physiques, ancien président de la Société de Pharmacie de Paris. Le plus actif cholagogue d'origine strictement végétale. Stimulant par excellence de la cellule hépatique.

Indications :

Affections du foie, Insuffisance biliaire, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystites, Céphalée, Migraines et Constipation chronique d'origine hépato-biliaire.

Posologie :

1 à 3 pilules dosées à 0,06 de produit actif, soit avant le dîner, soit au coucher.

Laboratoires des Produits PAUL THIBAUT

6, rue Rosenwald — PARIS (XV^e)

Nota. — Afin d'éviter les mécomptes donnés par de nombreux évonymines du commerce, prescrire toujours : *Pilules d'Euonymine Paul Thibault*.

EUPHON

Sirop et Pastilles contre l'enrouement.

Composition et forme. — Sirop à base d'extraits de plantes et de produits organiques : extrait fluide de coca I + Teinture rac. *aconit* 10, 20 formiate sodique 5 + sirop d'erysimum et d'aunée 100.

Prop. thérapeut. — Tonique par excellence des cordes vocales (tant chez l'adulte que chez l'enfant), calme complètement les picotements de la gorge qui accompagnent souvent un rhume ou une bronchite. Son emploi s'associe à tous les sirops pectoraux sans aucune contre-indication.

Indic. therap. et posol. — Entretien de la voix : 3 cuill. à café par jour. — Enrouements, toux laryngées : 3 cuill. à dessert par jour. — Aphonie, trachéite, laryngite (simple ou chronique) 3 cuill. à potage par jour. — Chez les enfants ne pas dépasser 3 cuill. à café par jour.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e)

A Bruxelles : LE MARINEL, pharmacien,
273, rue Victor Rauter.

EUPHORYL

Méthode de désensibilisation polyvalente. Traitement des dermatoses prurigineuses et affections anaphylactiques.

Formule. — Hyposulfite de soude et chlorure de calcium en combinaison bromurée silicatée.

Présentation. — 1° *Cachets*; 2° *ampoules* pour injections intraveineuses.

Indications. — a) *Dermatoses prurigineuses*: Eczémas secs et suintants. Prurits, érythrodermies, dermites médicamenteuses et professionnelles, psoriasis.

b) *Manifestations anaphylactiques*: Urticaire, migraines, Œdème de Quincke, maladie sérique.

c) *Affections à tendance suppurative des voies respiratoires.*

Posologie. — *Cas moyens*: 3 cachets par 24 heures, combinés à un traitement local approprié.

Cas aigus: une injection intraveineuse bi-hebdomadaire, avec prise de 2 cachets les jours intercalaires.

Not: Il est recommandé de pratiquer simultanément l'injection intraveineuse d'Euphoryl et une autohémothérapie de 10 c c.

Laboratoires HOURQUET et VIENNE

114, rue du Temple — PARIS (III^e)

EUPHYTOSE

Traitement phytotériaplique des états anxieux et des Dystonies du sympathique.

Forme. — Solution.

Composition :

Une cuillerée à café contient :

Cratægus oxyacantha.....	31	centigr.
Extrait fluide passiflora incarnata..	50	—
Alcoolature Ballota marrubium nigrum.....	98	—
Extrait fluide de Paulinia sorbilis..	16	—
Extrait mou de Valeriana officinalis.	12	—

Posologie :

De une à trois cuillerées à café en 24 heures dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

Indications :

Angoisse et états anxieux, Insomnie anxieuse, Érétisme cardio-vasculaire, Palpitations, Tachycardie, Angoisse précordiale, Vertiges, Spasmes viscéraux.

Propriétés thérapeutiques :

L'Euphytose n'est pas toxique aux doses thérapeutiques. Elle est très bien tolérée par les voies digestives. Elle n'a pas d'effets secondaires sur le foie et le rein. Les artérioscléreux, les cardiopéniques, les angineux n'ont rien à redouter de son usage prolongé ; elle n'élève pas la pression artérielle.

La présence du Paulinia Sorbilis (Guarana), son action tonique et euphorique s'oppose victorieusement à cette dépression secondaire si fréquente chez les nerveux insomniaques ou algiques qui font usage de calmants, toxiques pour la plupart, et que le médecin hésite à prescrire dans la crainte de ne plus pouvoir les interrompre à son gré.

L'Euphytose n'est pas un hypnotique au sens habituel du mot : c'est le type du régulateur du système nerveux, du médicament euphorique.

Prix de vente au public : 15 francs.

Laboratoire M^ADY^L

14, rue de Miromesnil — PARIS

EUPNOGÉNOL

Forme. — Élixir.

Indications. — Asthme, Emphysème, Oppressions et toutes affections des voies respiratoires.

Doses. — 4 cuillerées à café par 24 heures pour les Adultes et suivant avis du médecin pour les enfants.

Prix du flacon : 16 fr.

Préparé par **C. DAVID et ses fils.**

Dr en Ph^{ie} — Pharmaciens Ex-Int^{es}.
des Hôpitaux de Paris.

49, rue de Bitché - Courbevoie (Seine).

EURONAL

Composition et Forme. — Comprimés.

Di thy malonylurée.....	0,15
Intrait de Valériane.....	0,10

Propriétés Thérap. — Analgésique et Antispasmodique, Hypnotique léger des surmenés et neuropathes, Sédatif nerveux des excités et neurasthéniques.

Indications. — Insomnies rebelles et nerveuses, Épilepsie. Névralgies, Traumatisme, Toxicomanies.

Posologie. — *Dose sédatif* : Un comprimé avant chaque repas.

Dose hypnotique : 2 ou 3 comprimés avant le repas du soir.

Laboratoires CARTERET

15, Rue d'Argenteuil — PARIS (I^{er})

EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée)

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Hypnotique, sédatif, antialgique.

Indications. — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphinisation. Dyspepsie nerveuse.

Mode d'emploi et dose : *Comme sédatif :* Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.

Comme hypnotique : Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, oranger, thé léger.

Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/6 ou 1/4 de comprimé.

L'étui : 6 fr.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e)

EUTENSYL GRÉMY

Traitement de l'hypertension artérielle

Formule. — Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais.

Corps thyroïde.....	0 gr. 02
Muscle cardiaque....	0 gr. 50
Parenchyme rénal...	0 gr. 50
Iodotyrosine	0 gr. 05
Scille	0 gr. 06
Scammonée	0 gr. 04

pour une pilule.

Dose et mode d'emploi. — Deux à quatre pilules par jour à prendre une demi-heure ou une heure avant les repas.

Indications. — Artériosclérose au début, hypertension artérielle, obésité avec hypertension. Athéromateux, Néphrite chronique hypertensive, Cardiopathies avec hypertension.

L'Eutensyl provoque une hypotension mesurable au Sphygmomanomètre, et il compense cette hypotension en excitant le rein, en favorisant les évacuations intestinales, en rassurant le cœur.

Le médecin peut associer à l'Eutensyl la digitale.

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e)

EVINE

Antiseptique gynécologique, soluble.

Son originalité. — La Sénégine, hémolytique, détersif puissant et onctueux.

Son principe. — Réalisation du maximum d'antiseptie par association d'antiseptiques alcalins, en solution alcaline isotonique, sur une membrane muqueuse préalablement détergée (par la Sénégine).

Composition. — Sénégine, Borate de soude, Fluosilicate de soude, acide salicylique, carbasone, huiles essentielles, parfums.

Forme. — Poudre parfumée, entièrement soluble, en paquets et boîte métal.

Propriétés. — Antiseptique, alcaline, adoucissante, cicatrisante, désodorisante, détersive, tonique, sédative. Non caustique, non toxique, ne tache pas, parfume.

Indications. — Hygiène et prophylaxie féminines, leucorrhées, vaginites, vulvites, prurits, etc.

Gynécologie : précieux adjuvant aux pansements. Obétrique.

Posologie. — *Hygiène :* 1 paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède en injections ou lotions.

Gynécologie et obstétrique : 2 à 3 paquets pour 2 litres d'eau bouillie, à l'empêchement voulu, en injections et lotions. Prix de la boîte : 12 fr.

LABORATOIRES DE L'ÉVINE

3, rue de la Perle, Paris.

ÉVOLAXINE

(Le Laxatif de la Femme)

Traitement physiologique de la constipation habituelle de la femme.

Pas d'accoutumance. Pas de coliques.

Par ses ipoides ovariens stabilise et régularise la sécrétion endocrinienne en général, la sécrétion intestinale en particulier.

Par son mucilage lubrifie les parois intestinales.

Par son rhamnus frangula excite le péristaltisme.

Par sa duodenase augmente les sécrétions biliaire, pancréatique et intestinale.

Par ses sels biliaires désinfecte le tube digestif.

Indications. — Constipation habituelle de la femme.

Entéro-colite chronique. Dermatoses, Acné, furonculose, auto-intoxication intestinale.

Doses. — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant (action rapide). 1 comprimé par jour pendant 30 jours (cure de régularisation intestinale).

Laboratoires du Dr LAURENT-GÉRARD

Docteur ès sciences,

Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris,
40, rue de Bellechasse, Paris.

Tél. : Litté 97-95.

EVONYL

tablettes dragéifiées

à base d'extraits biliaires, de l'indes intestinales, de fucus, agar-agar, ferments lactiques, podophyllin, etc. en milieu ergostérique irradié suivant notre méthode de validation des végétaux), donnant à la synergie des composants un coefficient supérieur de valeur thérapeutique.

Propriétés. — Laxatif doux, régulier sans accoutumance, dont l'usage prolongé rétablit les fonctions normales du foie et de l'intestin. (Cholagogue idéal)

Indications. — Toutes les formes de la constipation et toutes les affections hépato-biliaires.

Mode d'emploi. — 1 à 2 tablettes au repas du soir (à avaler sans mâcher).

Prix au public : 15 fr. pour un mois.

Laboratoires BONTHOUX
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

Composition. — Extrait aqueux obtenu dans le vide, à basse température, contenant les principes solubles et assimilables des céréales, orge, seigle, avoine, très riche en sucres, sels, oxydases, vitamines.

Action. — Reminéralisant, tonique général, apport de vitamines.

Indications. — Anémie, Chlorose, Troubles dyspeptiques prolongés, Hémorragies, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc...

Formes et mode d'emploi :

Liquide : 4 cuillerées à soupe dans un peu d'eau.

Granulé : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
Demi-dose pour les enfants.

ADRIAN et C^{ie}

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e)

EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indic. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés, Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes* : Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Établissements DÉJARDIN

10. rue Parent de Rosan. — PARIS (XVI^e)

FACMINE LONGUET

Agent puissant et facilement maniable de désinfection et désintoxication intestinales

Indications thérapeutiques. — Entérites glaireuses et muco-membraneuses ; constipation chronique et toutes maladies et troubles fonctionnels reconnaissant pour cause

L'AUTO-INTOXICATION intestinale.
principalement dans les maladies de la peau :
Eczémas, Furunculose, Acnés, Urticaires
Herpès, etc.

Doses et mode d'emploi. — 3 à 4 comprimés après les repas du matin, de midi et du soir. Chaque comprimé correspond à 0 gr. 30 d'alumine lactique et 0 gr. 05 phosphate de chaux. Pour les enfants ; 1/2 dose.

Les comprimés peuvent être avalés à la façon d'une pilule ou délayés dans un peu d'eau.

Le flacon : 11 fr. 50

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e)

FANGO FISCH & CIE

Forme. — Boue volcanique radioactive en poudre.

Mode d'emploi. — Application sous forme de cataplasme de 44 % à 54 %.

Indications. — Affections chroniques douloureuses, musculaires, tendineuses, nerveuses, articulaires, gynécologiques, urogénitales et des organes internes.

Contre-indications. — Fièvre et insuffisance fonctionnelle circulatoire.

Prix : paquet de 1 kg. 500 : 12 fr. 50

— 4 — : 32 fr.

Pour hôpitaux : prix sur demande, par 100, 1000 kilos et par wagon-

Laboratoires FISCH et C^{te}

4, rue d'Ilizach — MULHOUSE

Dépôt à Paris :

49, rue de Paradis — PARIS

Tél. : Provence 30-32.

FANTINE

Composition. — Farine fraîche et vivante, non étuvée non conservée, possédant ses vitamines intactes.

Indications. — Alimentation normale : bébés, enfants, femmes enceintes et nourrices, vieillards, etc. Mineralisation, accélération de la nutrition, carence de phosphore, de chaux et de vitamines.

Formes :

1^o Sans cacao.

2^o Légèrement cacaotée.

Prix : 9 fr. 50.

Envoyer cette somme au compte de chèques-postaux Bo deaux 16-437, FANTINE ADOUE, Pauillac Gironde. Réception du produit le lendemain même de sa préparation.

Établissements ADOUE

PAUILLAC (Gironde)

Dans le sud-ouest : Toutes pharmacies et maisons de régime.

FARINES BÉNÉDICTUS

L'aliment simple de Vitalité

(pour sevrage, entérite, estomac).

Bénédictus chocolaté

au lin grillé

(pour constipation, anémie).

Le Digest aliment

ux levures de fruits (dyspepsie, foie, rhumatismes, goutte, acidité).

Neigia Mousseline

(névrose, rachitisme, arthritisme).

La Pastanita

(grand reconstituant, anémie).

La Manne Christus

(sans sucre) aliment des diabétiques.

Le Graminosa

(Nourriture infantile granulée).

Léguminus

(Tapioca spécial pour diabétiques et pour les anémiques nerveux).

Dépôt : Benedictus Marigay,

74, rue Lamarck, à PARIS (XVIII^e).

Échantillons gratuits
à MM. les Médecins.

FARINE LACTÉE DIASTASÉE " SALVY "

Composition. — Produit français : farine de céréales sélectionnées, additionnée de sucre et de lait, effectivement diastasée sous un contrôle scientifique rigoureux.

Dose. — De une cuillerée à café à deux cuillerées à soupe par prise, suivant l'âge.

Propriétés. — Aliment diastasé, prédigéré, homogène, entièrement digestible et assimilable.

Indications. — Aliment spécial du premier âge, avant, pendant et après le sevrage.

Préparation. — La préparation des bouillies diastasées ne comporte aucune précaution spéciale : délayer soigneusement, cuire à feu doux pendant 8 à 10 minutes, en remuant, faire bouillir et ajouter la proportion de lait convenable selon l'âge et l'état digestif de l'enfant.

Farine SALVY

4, rue Lambrechts. — COURBEVOIE (Seine)

FARINE DE MALT HEUDEBERT

Compos. — La Farine de malt HEUDEBERT, produit de la mouture de l'orge germée, est à la fois riche en diastases et en vitamines.

Avantages. — Une bouillie bien maltée est à moitié digérée. La farine de malt doit être employée de préférence aux extraits liquides, pâteux ou secs, dont une partie importante des ferments est détruite pendant la fabrication.

Indicat. — Troubles de la nutrition et tous désordres du tube digestif amenant un ralentissement de l'assimilation des substances amylacées.

Mode d'emploi. — On peut en saupoudrer tous les aliments. Les bouillies ou purées, préparées avec une cuillerée à soupe de farine (de céréales ou de légumineuses), seront maltées, avec une cuillerée à café de farine de malt, 2 à 3 minutes après cuisson. Laisser un quart d'heure en contact et faire suivre d'une courte ébullition.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, Rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)
2 et 4, chemin Feuillat — LYON

FARINES MALTÉES JAMMET

Farines maltées de céréales et de légumineuses, préparées avec des grains sélectionnés, moulus et blutés, de manière à conserver l'intégralité des éléments minéraux combinés, des céréalophosphates et des vitamines.

Propriétés. — D'une digestibilité parfaite, grâce aux diastases actives que la germination développe dans les grains, elles sont très facilement assimilables, très nutritives sous un volume réduit, et très reconstituantes. Leur diversité permet de répondre à toutes les exigences et d'éviter l'inappétence résultant, de l'emploi d'un seul et même aliment.

Indications. — *Enfants* : Elles sont parfaitement adaptées aux besoins de l'enfant, dont elles facilitent le sevrage. Elles suppléent à son insuffisance digestive naturelle tout en laissant aux organes la participation nécessaire à toute bonne assimilation. Elles permettent de graduer et varier son alimentation, lui procurant, à chaque âge, tous les éléments nécessaires à son parfait développement.

Adultes : Elles se recommandent aux adultes, dont la nutrition est viciée ou ralentie, leur offrant une alimentation rationnelle et une suralimentation effective, sans fatigue ni surcharge gastriques.

Nomenclature. — D'après leur composition et leurs propriétés, on peut les classer en 4 catégories :

¹⁰ *Farines très légères* (enfants à partir du 6^e mois) : Arrow-root, Crème de Sagose, Féculose, Rizine, Aristose (à base de blé et d'avoine).

²⁰ *Farines légères* (enfants à partir du 9^e mois) : Cérémaline (arrow-root, blé, maïs, orge). Cacaose, Orgéose, Gramenose, (avoine, blé, maïs, orge). Bléose.

³⁰ *Farines plus substantielles* (enfants à partir du 13^e mois) : Avenose, Zéose, Castanose, Bananose, Seiglose.

⁴⁰ *Farines très riches en matières azotées* (enfants à partir du 18^e mois) : Crème de Pois, Aricose, Lentilose et Nucléose.

Mode d'emploi. — Elles se préparent au lait, au bouillon de céréales Jammet, de Légumocéréral, s'utilisent en bouillies, potages, purées, crèmes, gâteaux.

Établissements JAMMET

POUILLARD et ses Fils,

Docteurs en Médecine et Pharmaciens,

47, rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

FARINES DE RÉGIME BLOCH

Riches en Phosphates. — Variées. — Identiques à elles-mêmes. — Pures.

Farines de Céréales :

Crème de riz, Crème d'orge, Crème d'Avoine, Crème de blé vert.

Farines de Légumes :

Farine de pois, Farine de lentilles, Farine de haricots.

Farines de Fruits :

Châtaignes. — Bananes.

FLOCONS : d'Orge, d'Avoine.

SEMOULES : de Blé, de Riz, d'Avoine.

" BLOKAO "

Le Déjeuner de suralimentation
à base de Farine de Bananes et Hydrates de Carbone parfumés au cacao.

TAPIOCAS. — FÉCULES. ARROW ROOT.

Indications thérapeutiques. — Alimentation des enfants.

Régime des Dyspeptiques et Entéritiques
Constipés, Nerveux, Neurasthéniques, Anémiques et Surmenés.

Échantillonnage gratuit sur demande :
aux Établissements Aug. Bloch et Fils, à Tomblaine près Nancy (M.-M.)

Maison fondée en 1811

Diplômes d'honneur : Hors Concours Épinal 1881-1888. Exposition Internationale de Bruxelles 1897.

Médailles d'or : Paris, Épinal, Nancy, 1867
1878, 1885, 1888, Bruxelles, 1888.

FÉLAMINE " SANDOZ "

Association de l'acide cholique cristallisé pur
et de l'hexaméthylène tétramine

Forme. — Comprimés dragéifiés à 0 gr. 30.

Prop. therap. — Opothérapie biliaire. Cholagogue, désinfectant des voies biliaires, dissolvant de la cholestérine.

Indications. — Cholélithiase et cholécystites, ictères, constipation par hypochole, insuffisances hépatiques.

Posologie. — Après les repas, avaler les dragées sans les mâcher.

1° Cas aigus : 2 à 6 comprimés. — 2° Cas chroniques : 3 à 4 comprimés par jour.

Traitement : 15 jours par mois et pendant plusieurs mois de suite (cholélithiase).

PRODUITS SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X°)

Dépôt général et vente :

USINE des PHARMACIENS de FRANCE

125, rue de Turenne — PARIS (III°)

FER BRAVAIS

Nouvelle formule

Formule. — Ions de Fer catalysé actifs.

Composition. — Solution colloïdale de Fer à 30,00 % et de Manganèse catalyseur à 0,50 %.

Propriétés thérapeutiques. — Fer pur (infiniment divisé, puisque colloïdal), accompagné de son catalyseur naturel, le Manganèse (mêmes proportions que dans le sang); donc Fer assimilable sans nécessiter de réactions internes.

Indications. — Appauvrissement du Sang et toutes ses conséquences : Anémie. Chlorose. Débilité. Dysménorrhée. Fièvre des pays chauds. Formation de la jeune fille. Incontinence d'urine. Leucorrhée. Neurasthénie, etc.

Dose. — X à XX gouttes (une goutte par année d'âge) à chaque repas dans de l'eau sucrée.

Examen du Sang avant et après le traitement par le Fer Bravais.

(moyenne de très nombreux cas).

	Avant.	Après.	Augmen- tation.	Diminution.
Globules rouges.	3.500.000	4.500.000	30 %	
Globules blancs.	7.150	6.500		10 %
Hémoglobine . .	60 %	85 %	40 %	

Prix : 20 fr. le flacon pour un mois.

14 fr. le 1/2 flacon pour 15 jours.

Laboratoires

C^{te} René de GRAUWE 藥 房 主

Pharmacien de 1^{re} classe,

16, rue de Rocroy — PARIS, Usine à St-Denis.

FER LARCADE

Composition. — Combinaison d'hydrate ferrique et d'acide organique, associée aux principes toniques et aromatiques des oranges amères.

Forme. — Liqueur d'un goût agréable et d'une très faible teneur en alcool.

Action. — Favorise la formation des hématies, augmente leur richesse en hémoglobine.

Indications. — Spécifique de tous les états anémiques, des cachexies chroniques.

Mode d'emploi. — Un verre à liqueur (2 cuillerées à soupe) au commencement des deux repas.

Paul ROUX

151, rue Lafayette — PARIS

FER OVARINE VITALIS

Composition. — Pilules composées, à base d'extrait d'ovaire, de fer et de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Excitant de la sécrétion interne de l'ovaire déficient, régénérateur des globules rouges.

Indications. — Anémies, Puberté, Ménopause, Asthénie nerveuse, Obésité, Dysménorrhée. 2 pilules avant les 2 principaux repas, 20 jours par mois.

*Échantillons et Notice documentaire
sur demande*

Prix de la boîte : 42 fr. 50

Laboratoire de la **FER-OVARINE VITALIS**

38, Boulevard de Charonne — PARIS

BEAULIEU, pharmacien,

Ancien Interne des Hôpitaux

FEROXAL BUISSON

Granulé de protoxalate de fer
(0 gr. 10 par cuillerée à café)
associé à des phosphates alcalins.

Prop. théor. — Hyperglobulise et minéralise.
Tolérance absolue par le tube digestif.
Action rapide, ne constipe pas, ne noircit pas les dents.

Indications. — Celles des ferrugineux Anémies diverses. Prétuberculose. Chlorose. Anémie des jeunes enfants. Grossesse. Allaitement. Convalescence.

Dose. — Une à deux cuillerées à café à chaque repas.

Etablissements Albert BUISSON

F. JALOT & Cie

157, rue de Sèvres — PARIS

R. C. Seine 222.705 B

FERROCODILE ET FERRICODILE

Cacodylate Ferreux — Cacodylate Ferrique

Indic. therap. — Spécifiques de l'Anémie et de la Chlorose, Malaria, Anémie palustre, etc... Tous les avantages des sels ferreux et ceux de l'arsenic organique. Le Cacodylate Ferrique est le seul sel de fer agissant très bien en injections hypodermiques, qui, faites intra-musculaires, ne sont pas douloureuses.

Préparations réellement supérieures dans les infections des pays chauds.

Doses et mode d'emploi. — *Ferrocodile* :

Pilules à 0,025 : 4 par jour aux repas.

Ferricodile : Ampoules à 0,01. Une injection par jour pendant huit jours : repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

FERROPHYTINE CIBA

Phosphate de fer colloïdal

Sel ferrique neutre de l'acide inosito-phosphorique, contenant 7,50 % de fer et 6 % de phosphore, ces deux éléments sous forme très assimilable. — Stimulant de l'hématopoïèse et excitant des fonctions cellulaires, c'est le médicament type des états anémiques et chloro-anémiques accompagnés de dénutrition.

Médicament toujours bien toléré.

Indic. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofuleuse, Croissance défectueuse.

Doses. — Adultes : 3 cachets ou 3 cuillerées à café de granulé. Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café de granulé.

La boîte de 30 cachets : 14 francs

Le flacon de granulé : 16 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

FLUDIOSE **à l'Iodure de Manganèse**

Composition.

Iode, Tanin, Lactophosphate de chaux, Fer, Iodure de manganèse, Méthylarsinate de soude, Vanille et Cacao.

Forme pharmaceutique.

Sirop de goût très agréable, Infermentescible, ne constipe pas.

Indications.

Lymphatisme, Rachitisme, Prétuberculose, Scrofulose, Mal de Pott, Cyphose, Lordose, Scoliose, Chétivité, Troubles de la croissance, Paresse, Glandes, Ganglions, Impétigo, Engelures.

Mode d'emploi et doses.

En plus des autres éléments constitutifs, chaque cuillerée à café contient : 1 cg. 25 d'Iodure de Manganèse pur et 2 mmgr. 5 de Méthylarsinate de soude.

Enfants de 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

3 à 6 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

6 à 12 ans : 2 cuillerées à potage par jour.

12 à 16 ans : 3 cuillerées à potage par jour.

Se prend pur ou dans un peu d'eau avant ou pendant les repas.

La **Fludiose** est le plus puissant succédané de l'huile de Foie de Morue.

Par son Iodure de Manganèse, la Fludiose dépasse toutes les préparations iodotanniques.

Prescrire.

Fludiose : 1 flacon.

Prix, le flacon : 14 francs.

**LABORATOIRE DE MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue de Malherbe, Beauvais (Oise).

FLUOBYL

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire.

Le *Fluobyl*, dépourvu de toute action irritante sur l'épithélium intestinal, provoque une chasse biliaire importante sans effet drastique fâcheux.

Granulé de goût agréable à base de Lacto-sérum, Citrate de magnésie, Peptone sèche purifiée, Sucre aromatisé.

Le *Fluobyl* réalise le « drainage » des voies biliaires en stimulant le flux de la bile. Il favorise la migration du bol fécal, en rendant ainsi à l'intestin son excitant normal.

Il exerce également une action excito-sécrétoire sur le parenchyme rénal, provoquant la diurèse et l'accroissement de la sécrétion des sels et de l'urée.

Indications.

Maladies du Foie : Ictères, Cholécystites, Coliques hépatiques.

Dyspepsies réflexes : Nausées, vertiges, constipation d'origine hépatique.

Maladies rénales.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun ; se coucher 10 minutes sur le côté droit ; attendre une demi-heure avant de prendre le petit déjeuner.

Le traitement doit être suivi environ deux semaines par mois.

Laboratoires LICARDY

38, boul. Bourdon, NEUILLY — PARIS
Téléph. : Maillot 47-75

FLUODYLE

Forme : Ampoules

Chaque ampoule renferme :

Fluorure de sodium	0,001
Hypophosphite de manganèse.....	0,001
Cacodylate de soude	0,15
Sulfate de strychnine	0,002
Sérum physiologique.....	2 cmc.

Mode d'emploi. — Pendant dix jours consécutifs, faire une injection sous-cutanée. Repos de dix jours. Puis recommencer une nouvelle série de piqûres.

Forme : Granulé

Contient tous les minéraux indispensables à l'organisme: Chaux, Phosphore, Fer, Manganèse, Fluor, Silicium, Zinc, Soufre et Magnésie.

Doses. — 1 ou 2 cuillerées à café, 3 fois par jour.

Indications. — Déminéralisation, Convalescence, Affections pulmonaires, Anémie, Surmenage,

Établissements SABATIER

A. Emptoz, pharmacien.

10, rue Pierre-Ducreux, PARIS (XVI^e).

FONDANT DE COLA DAUSSE

(Saccharolé-Fondant) titré à 0 gr. 50 d'Extrait de Cola stabilisée par dos (ou 5 gr. de saccharolé).

Toni-nervin et toni-musculaire présentant l'activité entière de la noix de cola fraîche (stabilisée par le procédé **PERROT-GORIS**).

Indications. — *Adynamie, asthénie, surmenage physique et intellectuel, convalescence des maladies infectieuses.*

Posologie. — **ADULTES** : 1 à 4 cuillerées à café par jour en moyenne et davantage si nécessaire. En cas d'effort à exécuter, ingérer la cola une heure au préalable et répéter la dose si l'effort doit durer.

FONDANT IODOTANNIQUE DAUSSE

Granulé à base de *Tormentillo-tanin*, tanin physiologique essentiellement assimilable. Remplace avantageusement l'huile de foie de morue et les préparations antiscorbutiques.

Indications. — *Lymphatisme, scrofule, arthritisme, emphyseme, rhumatismes, obésité, eczéma, impétigo.*

Posologie. — La teneur en iode dissimulé du Fondant Iodotannique étant la même que celle du sirop iodotannique du Codex, sa posologie est la même.

ADULTES : 5 à 6 cuillerées à café par jour.

ENFANTS : jusqu'à 15 mois $\frac{1}{2}$ à 1 cuil. à café p^r jour.

3 ans	1 à 2	—	—	—
5 ans	2 à 3	—	—	—
12 ans	4 à 5	—	—	—

FONDANT MANGANO FERREUX

Puissant excitant cytoplasmique et nucléaire par le *Manganèse*, vecteur d'oxygène et stimulant de l'hématopoïèse par le *fer*, ce saccharolé active les phénomènes de nutrition et favorise la régénération du sang.

Indications. — Tous les états anémiques : *anémie, chlorose, convalescences, pertes sanguines.*

Posologie. — **ADULTES** : 1 à 3 cuill. à café p^r jour.

ENFANTS : de $\frac{1}{2}$ à 2 cuillerées à café par jour suivant l'âge

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot ; PARIS (VI^e).

FORCIVAL

Aliment nutritif et fortifiant

Composition. — Concentration des meilleurs aliments naturels : farines de céréales et de légumineuses maltées, sucre, cacao. Aucun médicament surajouté.

Forme. — Farine d'un goût très agréable.

Mode d'emploi. — Bouillie délicate à l'eau ou au lait

Propriétés. — Aliment léger et substantiel, reconstituant, reminéralisateur, d'une grande digestibilité.

Indications. — Suralimentation chez les enfants, les adultes et les vieillards.

Laboratoires du FORCIVAL

6, rue Bridaine — PARIS

FORIOD

Tétra-iodo-phénol-phtaléinate de Sodium.
Matière colorante, opaque aux rayons X,
s'éliminant par les voies biliaires.

Indications :

Cholécystographie, Examen radiologique de la région vésiculo-duodénale.

Posologie et mode d'emploi. —

Employer l'une des méthodes suivantes :

1° *Injection intra-veineuse* d'une solution aqueuse titrée à 0 gr, 04 par kilog. de poids.

2° *Prise par voie buccale* de 15 pilules, pour un adulte de poids moyen.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e).

FORMADERMINE

Éther méthylique du Gaïacol.

Spécifique des plaies atones ; action kératoplastique, antiseptique, anti-prurigineuse et désodorisante.

Indications :

**Brûlures, Ulcères, Eschares,
Dermatite fessière des nourrissons.**

Mode d'emploi. — *Plaies* : Saupoudrer de Formadermine pure après décapage.
Toilette du nourrisson : Employer la poudre diluée à 5 p. 100.

Petites lésions épidermiques : Émulsion huileuse ou glycinée à 5 et à 10 p. 100.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e).

FORMINE ADRIAN

Composition. — Hexaméthylène tétramme rigoureusement pure.

Mode d'action. — Antiseptique urinaire, hépatique et intestinal.

Indications. — Néphrites, cystites, prostatites, urétrites, phosphaturies, calculs. — Hépatites, cholécystites, angiocholécystites, fermentations intestinales, entérite chronique, etc...

Formes.

Comprimés : dosés à 50 centigr., deux à quatre par jour.

Ampoules : dosées à 0 gr. 50 et 1 gr. une à deux par jour.

Sel cristallisé : flacons de 50 gr., 100 gr. 250 gr. pour formules.

ADRIAN & C^{ie}.

9 et 11, rue de la Perle. — PARIS.

FORMOCARBINE

Composition :

Association du Charbon Animal pur, ultradivisé, absolument privé de Cyanogène, à la Formine (Hexaméthylènetétramine cristallisée).

Forme pharmaceutique :

Granulé friable, aromatisé, agréable au goût, avec ou sans addition de Benzonaphtol :

Formocarbine simple.

Formocarbine naphtolée.

Les granulés de Formocarbine ne sont pas durs à la dent, fondent très bien dans la bouche, se désagrègent instantanément dans l'eau.

Propriétés :

Antiseptique Interne de choix. Pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

Indications thérapeutiques :

Infections Gastro-Intestinales. — Dyspepsie, Fermentations, Entérites, Flatulences, Putréfactions intestinales. Stase intestinale, Auto-intoxication, Maladies Infectieuses, Colibacillose.

Infections Biliaires. — Désinfecte par la Formine la Vésicule et les canaux en même temps que son **Charbon animal** absorbe les bactéries intestinales montant au foie par la Veine porte en ses diverses origines.

Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiase biliaire, Tuberculose des voies biliaires, Hépatisme.

Infections Urinaires. — Toutes les infections urinaires, rénales, vésicales, cystite, Pyelonephrites, Urétérites, Prostatites.

Posologie :

1 à 2 cuillerées à café après les repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau. Par demi-cuillerées à café chez les enfants.

Prescrire :

Formocarbine simple ou Formocarbine naphtolée :
1 flacon.

Il est à remarquer que la Forme Naphtolée ne provoque jamais de constipation.

Prix, le flacon : 12 francs.

**Laboratoire de MÉDECINE
EXPERIMENTALE**

1 et 3 rue Malherbe. Beauvais (Oise)

Echantillons et littérature à la disposition de
MM. les docteurs.

FORMO-VACCINS OU VACCINS LUCINIA

préparés d'après la méthode du Professeur Costa.

Les Formo-vaccins sont des suspensions dans du sérum physiologique d'éléments bactériens cultivés sur milieux spéciaux et fixés par la Formaldéhyde.

Ce qui assure : 1° une activité toujours égale ; 2° une conservation indéfinie ; 3° la neutralisation complète des toxines ; 4° la lyse très lente des cellules dans l'organisme.

Il en résulte les avantages suivants : 1° vaccins atoxiques ; 2° vaccins indolores ; 3° ni réaction, ni choc colloïdal ; 4° maximum de puissance d'immunisation.

Toutes variétés de Vaccins.

Prix de vente : 25 francs.

Laboratoires LUCINIA

154 bis, rue Breteuil — MARSEILLE

FORMYL

Composition. — Solution alcoolique incolore de formol et de menthol.

Propriétés. — Bactéricide, désinfectant, anti-prurigineux, anesthésiant, non toxique, d'odeur agréable et de conservation indéfinie.

Mode d'emploi. — Vaginites, métrites, leucorrhées, salpingites, plaies de toute nature, hygiène intime de la femme : 1 cuillerée à café dans un litre d'eau. Laryngites, pharyngites, plaies buccales, hygiène de la bouche, 30 gouttes dans 1 verre d'eau bouillie.

Laboratoire du FORMYL

23, Rue Valéry-Meunier — PAU

FORTOSSAN CIBA

Phytine spéciale pour les nourrissons

Sel sodique neutre de l'acide inosito-diphosphorique (principe phospho-organique végétal). Médicament phosphoré très assimilable, spécialement préparé pour la pratique infantile.

Indicat. — Rachitisme, ostéomalacie, retard du développement et de la dentition scrofuleuse et tuberculose infantile. Convalescence des maladies infectieuses, etc.

Doses. — Poudre s'administrant avec le lait du biberon ou les bouillies; à la dose de une à deux cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

La boîte : 8 fr. 50

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

FORTOSSAN IRRADIÉ

Même composition que le Fortossan ordinaire mais avec, en plus, 0,027 p. 100 d'ergostérine irradiée, ce qui correspond à une dose quotidienne de $\frac{1}{5}$ ou $\frac{1}{4}$ de milligr.

Le Fortossan irradié est soumis à un contrôle chimique et biologique lui assurant une activité maximum constante. L'ergostérine irradiée s'y trouve sous une forme protégée, absolument inoffensive et, unie à l'élément phosphoré végétal, elle donne son maximum d'action thérapeutique.

Indications. — Celles du Fortossan chez l'enfant et chez l'adulte : Tuberculose, Prétuberculose, États de dépression liés à une insuffisante assimilation de la chaux et du phosphore. Fractures etc.

Doses. — Chez l'enfant : celles du Fortossan ordinaire; chez l'adulte : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

La boîte : 12 fr.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

FORXOL

Forme. — Solution.

Composition. — Acide glycérophosphorique, Nucléinate de Manganèse de Fe et de Ca., Méthylarsinates de soude et potasse.

Propriétés pharmacodynamiques. — Reconstituant complet pour tout organisme, Dynamogénique, Stimulant hémato-gène, Antidépendeur, Régulateur des échanges cellulaires.

Indications. — États de dépression. — Faiblesse générale. — Troubles de croissance et de formation. — Neurasthénie. — Anémie. — Débilité sénile. — Convalescences.

Mode d'emploi. — Une à deux cuillerées à café, suivant l'âge, au milieu des deux principaux repas, dans un peu d'eau, de vin ou de liquide quelconque autre que le lait.

Laboratoires A. BAILLY et C^{ie}
15 et 17, rue de Rome — PARIS (8^e)

FOSFOXYL CARRON

PHOSPHORE COLLOIDAL

A l'état de terpénol hypophosphite de sodium.

Formes. — Fosfoxyll *sirop* : sirop opalin anisé, goût agréable.

Fosfoxyll *pilules* : petits grains couleur de jais, très faciles à avaler.

Fosfoxyll *liqueur* : liquide opalin glycéro-menthé spécialement destiné aux diabétiques.

Dosage. — 10 cmc de formes liquides (soit une cuillerée à dessert) ou 4 pilules contiennent 0 gr. 10 de colloïde chimique exprimé en terpénol hypophosphite sodique et équivalent à 13 milligrammes de phosphore blanc.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale, stimulant des glandes endocrines et tonique du système nerveux central. Modificateur de la nutrition et de l'assimilation. Apéritif créateur d'énergie physique et mentale. Fixateur de l'ion calcium.

Indications. — Maladies du système nerveux, maladies de la nutrition. Dépressions nerveuses et mentales, Impuissance, Surmenage, Neurasthénie, Psychasthénies, Convalescence, Anémie, Tuberculose, Diabète, Rachitisme, Arthritisme, Rhumatisme, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Périodes d'entraînement, de préparation à des examens ou concours.

Contre-Indication. — Etat congestif aigu.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : une cuillerée à dessert (10 cmc) de liqueur ou sirop, étendue d'eau ou d'un liquide froid quelconque ou 4 pilules, avant les deux principaux repas. Si le malade est très excité ou dans le cas d'insomnie nerveuse, commencer par une cuillerée à café ou 2 pilules.

Dans le cas de dépression accentuée, doubler la dose moyenne.

Prescrire :

Sirop de FOSFOXYL CARRON 12 fr.
ou **Pilules de FOSFOXYL CARRON** 10 fr.
ou **FOSFOXYL LIQUEUR** 11 fr.

afin d'éviter les substitutions.

Laboratoire du FOSFOXYL

69, rue de St-Cloud — CLAMART (Seine)

CARRON, Pharmacien de 1^{re} classe,
ancien Pharmacien-Chimiste de la Marine.

FOSYLS CARRON

Terpénolhypophosphites minéraux.

Reminéralisateurs chimiques physiologiques assimilables directement.

Modificateurs de la Nutrition
et de la Composition chimique des Tissus.

Tous ces nouveaux corps — création des Laboratoires CARRON — possèdent les propriétés dynamiques et trophiques du phosphore sur le système nerveux et sur la nutrition générale, mais chacun d'eux, en raison de la base qu'il contient, présente en outre une électivité d'action particulière qui conditionne sa prescription dans les diverses affections. Ils ne sont ni toxiques ni irritants et ont été reconnus parfaitement assimilables.

Les corps de cette série actuellement à la disposition du Corps médical sont :

Les Terpénolhypophosphites de Calcium, de Magnésium, de Manganèse et de Cuivre. Tous sont présentés sous forme de comprimés lenticulaires dosés à cinq centigrammes (1).

Dénomination	Titre	Mode d'emploi
CALCOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) ² Ca	13,19 % de Phos. hore.	4 à 8 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Calcium.	8,51 % de Calcium.	(Sirop pour enfants).
MAGNÉSOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) ² Mg	13,65 % de Phosphore.	4 à 8 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Magnésium.	5,28 % de Magnésium.	
MANGANOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) ² Mn.	12,57 % de Phosphore.	4 à 6 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Manganèse.	11,34 % de Manganèse.	
CUPROFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) ² Cu	12,57 % de Phosphore.	2 à 4 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Cuivre.	12,77 % de Cuivre.	

Prix de l'unité : 12 francs.

Littérature et échantillons sur demande aux

Laboratoires CARRON

Rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

(1) N. B. — Les Terpénolhypophosphites de Fer, de Lithium, d'Uran, de Plomb et de Quinine ont été également obtenus dans les Laboratoires CARRON; ils sont actuellement à l'étude.

FRANCOPLASTE

Composition. — Sparadrap caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc.

Avantages. — Adhérence parfaite. Ne sèche pas, ne poisse pas. Garantie de conservation minima 2 ans.

Indications. — Fixation des pansements.

Dimensions. — 1 m. sur 1-2-3-4-5-10-18 cm. de larg. 5 m. sur 1 1/4, 2 1/2, 3 3/4, 5, 6 1/4, 7 1/2, 10 cm. de largeur, sur cretonne rose ou blanche; uni ou perforé. Réduction de 50 % au Corps médical.

A. KRAUS, Pharm^{ien} de 1^{re} Classe
Fournisseur des Hôpitaux, du Service de Santé, de la Croix Rouge.

37, rue Godot-de-Mauroy — Usine à Courbevoie.

FREINIX

Association Chlorh. de Papavérine et Adrénaline en solution isotonique (Ampoules de 1 cent. cube) pour injections sous-cutanées.

Propriétés thérap. — Freine le Pneumogastrique. Excite le Sympathique.

Indications. — Asthme, Emphysème, Asthme et Rhume des foins. Spasmes viscéraux. Tous les phénomènes liés à l'hypervagotonie.

Mode d'emploi et Doses. — Une injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc. suffit à juguler une crise d'asthme en quelques minutes.

Le *Freinix* peut également être employé en pulvérisations nasales dans le rhume des foins, en particulier.

Établissements Albert BUISSON

F. JALOT & C^{ie}

157, Rue de Sèvres — PARIS (XV^e)

FUCOBILINE

(comprimés)

le médicament du foie insuffisant

Composition. — Extrait biliaire dépigmenté et décholestériné, associé aux cholagogues végétaux et à l'agar-agar.

Forme. — Comprimés glutinisés et dragéifiés.

Posologie. — Avaler sans croquer 1 ou 2 comprimés à chaque repas (dose moyenne).

Indications. — Tous les cas d'insuffisance Hépatique et Biliaire, toutes les manifestations de l'Hépatisme.

Laboratoire L. PROTHIÈRE

55, Rue Auguste-Comte — LYON

FUCOSINE

Traitement efficace de la Constipation habituelle.

Compos. — Agar-agar, extrait de rhamnées.

Propriétés. — Mucilagineux, émollient, cholagogue ; véritable aliment du constipé ; innocuité absolue.

Formes et Posologie :

Paillettes. 1 à 3 cuillerées à café

Poudres.. 1 à 3 mesures

Cachets .. 1 à 3 cachets

à chaque repas régulièrement

Indications. — Constipation habituelle, quelle qu'en soit l'origine.

Laboratoire L. PROTHIÈRE

55, Rue Auguste-Comte — LYON

FURONCULASE

Médication interne actuellement la plus efficace contre toutes les suppurations à staphylocoques dont elle empêche les récidives.

Composition. — Combinaison de chloro-lactate de potassium ferrique associé à une forte proportion de *coculus palmatus* (colombo). Pilules enrobées dans une mince enveloppe de gluten, de manière à assurer la désagrégation de la masse dans le milieu intestinal sans provoquer la moindre action irritante sur une portion quelconque du tube digestif.

Propriétés thérapeutiques. — Agit :
1° par une action spécifique sur le foie.
2° par son pouvoir oxygénant sur les globules en activant l'action phagocytaire. — 3° par une action nettement antiputride sur le tube digestif.

Indications. — Anthrax, Acnés, Orgelets, Abcès, Furoncles, Phlegmons, certaines Dermatoses, toutes les Staphylococcies et les diverses intoxications d'origine gastro-intestinale.

Posologie. — Dose journalière : Adultes, 6 pilules, 2 avant chaque repas ; enfants, 2 à 3 pilules, 1 avant chaque repas.

Complément indispensable à la méthode des vaccins, la Furonculase ne présente aucune contre-indication : Elle ne contient ni sucre, ni alcool, ni produit toxique.

Laboratoires DALET

94, boul. des Batignolles — PARIS (XVII^e)

GADUAMINE

Composition.

Extrait total opothérapique de foie frais de morue (avec sa vésicule biliaire) obtenu par un procédé spécial.

Action.

Reconstituant, antirachitique, antibacillaire par le phosphore, l'acide morrhuïque, les vitamines A et D. — Antitoxique, antihémolytique et antianémique par la cholestérine et l'extrait hépatique.

Avantages.

Plus actif que l'huile de foie de morue, pas de goût ni d'odeur, pas d'intolérance digestive, volume réduit.

Indications.

Croissance, grossesse, allaitement, anémie, chlorose, rachitisme, convalescence, pré tuberculose, tuberculose, etc...

Mode d'emploi.

Enfants : 10 à 40 gouttes par jour.

Adultes : 50 à 60 gouttes par jour.

Prix : 12 fr. 50

Laboratoires RENARD et C^{ie}

142, Avenue de Clichy — PARIS

GADUASE

Succédané classique de l'huile de foie de morue, très agréable à prendre.

Composition. — Hypophosphites de sodium et de calcium (stabilisés par la glycérine), toniques nervins, anti-rachitiques et reminéralisateurs, stimulants de la nutrition.

Méthylarsinate disodique (0,015 par cuillerée à soupe), reconstituant des tissus nerveux et sanguins

Iode (en combinaison tannique parfaitement stable et inaltérable) régulateur du métabolisme et antiseptique de premier ordre.

Convient à tous les âges, aucune incompatibilité.

Excipient. — Sirop framboisé très agréable, se prend en toute saison.

Indications. — Anémie, anorexie, lymphatisme, affections pulmonaires, asthénie, etc...

Posologie. — Pure ou dans un peu d'eau, avant ou après les repas.

Nourrissons : demi à une cuillerée à café prodie. *Enfants* : deux à trois cuillerées à café. *adolescents et adultes* : deux à trois cuillerées à soupe.

Flacon : 9 fr. — Grand flacon : 15 fr.

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat, Orléans.

GALABACTÉINE

La Galabactéine est une culture de bactéries lactiques sélectionnées en milieu protéino-lacto-sérique.

Forme. — Présentée en tube scellés de 10 c. c.

Indications. — Toutes infections intestinales et autres intoxications d'origine digestives, métrites, vaginites, pansement des plaies.

Mode d'emploi. — 1° Prendre le contenu de 2 tubes, le matin, à jeun, dans une tasse d'eau sucrée.

2° Enfants jusqu'à 3 ans : 1 tube dans de l'eau sucrée par la bouche ou en petit lavement.

3° En pansement lorsqu'il s'agit d'une infection externe.

Prix de vente : 12 francs.

Laboratoires LUCINIA

154 bis, rue de Breteuil — MARSEILLE

GALACTOGIL

Extrait titré maltosé phosphaté de Galéga.
Granulé à base d'extrait de malt, extrait de galéga stabilisé, phosphate tricalcique, cumín, fenouil, etc.

Indications :

Allaitement. — Insuffisance lactée. — Montée laiteuse tardive. — Reprise de l'allaitement. -- Nourrissons déficients.

Mode d'emploi :

Trois fois par jour, une ou deux cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de tisane et persister à donner le sein avec régularité.

Associé aux **Diasés Progil**

Farines fraîches diastasées de céréales et de légumineuses (voir page n° 206) les résultats obtenus sont des plus remarquables.

PROGIL

Société anonyme au capital de 50.000.000 de francs.

6, Boulevard de Strasbourg, Paris (X^e)

10, Quai de Serin, Lyon (IV^e)

GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

Fastilles à l'Aldéhyde Formique

Prop. thérap. — Réalisent l'asepsie du rhinopharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive ; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

Indications. — 1° Prophylaxie des maladies infectieuses ; 2° Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngite ; 3° Hygiène de la voix.

Mode d'emploi. — 1 pastille 4 à 5 fois par jour et, au besoin, toutes les heures ou 1/2 heures. La laisser fondre lentement dans la bouche.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e)

124, avenue Rogier — BRUXELLES

GALYL

Spécifique de la Syphilis

Indications. — Syphilis, Fièvre récurrente, Pian, Maladie du sommeil.

Formes. — Ampoules pour injections intra-veineuses, injections intramusculaires et injections sous-cutanées.

Posologie. — Débuter avec 0 gr. 15 et passer progressivement à 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50 suivant les malades.

Établissements MOUNEYRAT

12, Rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

GAMBÉOL

Principe actif.

Protochlorure de mercure léger et dissociable, nouveau sel mercuriel (Proto-Gambier).

Propriétés.

Se dissocie dès sa mise en contact avec les tissus, en mercure métal et oxyde de mercure à l'état colloïdal, sans formation de sublimé.

S'absorbe très facilement tout en s'éliminant lentement. Donc jamais d'accumulation, jamais de décharge brusque, jamais d'accidents d'intoxication.

Est plus actif que tous les autres composés mercuriels, même que le calomel, et est beaucoup moins toxique.

Est à la fois microbicide, décongestionnant du foie, hypersécréteur biliaire, antiparasitaire.

Indications.

Syphilis acquise ou héréditaire de l'adulte et de l'enfant, à toutes les périodes. Congestions hépatiques. Insuffisance biliaire. Infections intestinales. Ulcères stomacaux spécifiques. Efficace contre les oxyures.

Formes et Posologie.

1° Cachets à 1 cent. 2 ou 3 ch. j.

2° Cartouches de pommade pour frictions à 50 %.

Adultes..... 1 ch. j.

Enfants. Fractions suivant âge

3° Suppositoires adultes à 10 cent. 1 ch. j.

— enfants à 5 cent. 1 ch. j.

Le Gambéol est adopté par le Ministère de l'Hygiène.

J. GAUTIER** Pharmacien de 1^{re} classe.

24. rue de Ponthieu, Paris (VIII^e).

GANDERMA

Pommade renfermant le Protochlorure de mercure léger et dissociable (voir GAMBEOL) associé aux Sulfate de cuivre et de zinc (eau d'Alibour) et à l'Oxyde de zinc.

Formule :

Protochlorure de mercure léger et dissociable	8 gr.
Sulfate de cuivre.....	0 gr. 50
Sulfate de zinc.....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	18 gr.
Excipient (Lanoline et Vaseline).....	72 gr. 50

Indications. Toutes affections cutanées d'origine inflammatoire ou microbienne : Acnés, Dartres, Ecthymas, Eczémas, Erythèmes polymorphes, Furoncles, Herpès, Impétigos, Intertrigos. Pytriass, Prurits, Psoriasis, Pyodermites. etc.

Présentation. — En tubes étain imprimés de 30 gr. environ.

Prix : Le tube, 12 fr. au public.

Littératures et Échantillons, sur demande à

J. GAUTIER,

pharmacien de 1^{ère} classe

24, rue de Ponthieu, Paris (VIII^e) — Tél.: Elysées 22-66.

GARDÉNAL

Phényl-éthyl-malonylurée.

Hypnotique et sédatif du système nerveux.

Indications :

Épilepsie, Chorée, Convulsions, États anxieux, etc.

Posologie et mode d'emploi. —

Comprimés à 10, 5, et 1 centigr.

Doses maxima par 24 heures :

Adultes : 10 à 40 centigr.

Enfants : 2 à 10 centigr.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.

86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

GASTRICINE DU D^r E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait opothérapique, liquide, de muqueuses fraîches, d'estomacs de porcs et de caillettes de veaux.

Renferme tous les éléments naturels du suc gastrique organique, ses ferments lab, pepsine, et toutes les zymases enlevées à la muqueuse gastrique.

Indications. — Affections organiques de l'estomac. Cas de souffrance de l'organe (insuffisance gastrique par excès ou par défaut).

Mode d'emploi. — A un 1/2 verre d'eau ajouter une cuillerée à café de gastricine.

Prendre une gorgée de temps en temps pendant le repas.

Doses. — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

Anciennement, 10, rue de Turenne — PARIS (IV^e).

GASTROCALCINE

Forme. — Granulé.

Composition :

Carbonate de chaux.....	0 gr. 40
Carbonate de magnésie.....	0 gr. 20
Bi-carbonate de soude	0 gr. 20
Sucre anisé, q. s. pour.....	5 gr.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café, immédiatement après les principaux repas, ainsi qu'au moment des crises.

Indications. — Dyspepsies, Dilatations de l'estomac, Hyperchlorhydrie, Pyrosis.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} Classe
de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS.

GASTROCAOL

Pansement gastrique

Composition. — Parties égales de Silicate hydraté pur d'Alumine et de Silicate hydraté, pur de Magnésie, lavés, étuvés, stérilisés-porphyrisés.

Forme. — Poudre insoluble, en sachets de 20 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Réalisant le plus parfait des pansements gastriques, *peut et doit* remplacer dans cet usage les Sels de Bismuth :

Mêmes indications — Plus efficace,
Mêmes doses — Jamais toxique,
Même mode d'emploi — 6 fois moins coûteux.

Indications. — Pansement gastrique. — Hyperchlorhydrie. — Ulcères de l'estomac et du Duodénum — Spasmes du Pylore. — Aérophagie. — Dyspepsies douloureuses. — Hémorragies du Tube digestif. — Diarrhées aiguës. — Diarrhée des tuberculeux. — Dysenteries bacillaires et amibiennes. — Etats cholériformes.

Doses. — 1° Moyennes : 20 gr. par jour (un sachet) en une ou trois fois.

2° D'entretien : 10 grammes par jour en une ou trois fois.

3° Exceptionnelles : 100, 150, 200 grammes par jour dans les états cholériformes.

Mode d'emploi. — En suspension dans de l'eau pure, sucrée ou non, soit le matin à jeun en une fois, soit en 3 fois, avant chacun des repas principaux.

Prix. — 12 fr. pour un minimum de traitement de 12 jours.

Laboratoire de la Sulfoleïne ROZET
BENDERITTER et C^{ie}, à VENDOME
(Loir-et-Cher).

GASTROTHÉRIB

Suc gastrique naturel liquide.
Sans odeur, actif, inoffensif.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les dyspepsies hypopeptiques et hypochlorhydriques, digestions lentes, ballonnements, Inappétence des tuberculeux, des convalescents, des grippés, des coloniaux hépatiques, des neurasthéniques. Vomissements incoercibles de la grossesse. Chez l'enfant et le nourrisson, pendant la période critique de réalimentation, après entérites, diarrhées infantiles, colites.

Doses. — De 4 à 15 cc. chez l'adulte à doses croissantes selon effet, de 1 à 4 cc. chez l'enfant au-dessous de 10 ans et selon effet (un quart d'heure avant le repas). De 40 gouttes à 3 cc. chez le nourrisson (un quart d'heure avant chaque tétée).

Prix : adultes 15 fr. ; enfants (moins de 10 ans) 9 fr.

LA BIOTHÉRAPIE

131, rue Cambronne — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaug. 49-20.

GAUROL

Nouveau sel phosphoré et calcique
entièrement assimilable.

3 formes. — Ampoules injectables de 1 cc.
Comprimés.
Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant. Récalcifiant intensif par autofixation dans les tissus, du phosphate tricalcique naissant et colloïdal.

Indications thérapeutiques. — Tous les états pathologiques médicaux et chirurgicaux, où l'amaigrissement et la déminéralisation très marqués demandent à être rapidement jugulés.

Mode d'emploi. — 1 ampoule par jour, en injections sous-cutanées.

1 à 3 comprimés par jour, suivant l'âge.

1 à 3 cuillerées à café de granulé, par jour, suivant l'âge.

Laboratoires PÉPIN et LÉBOUCQ
Courbevoie (Seine).

GAZE NÉOLÉE

Demi-grasse, antiseptique, non adhésive.

La *Gaze Néolée*, constituée d'un tissu à mailles assez lâches dont les fibres sont imprégnées d'un corps gras rendu stérile par l'adjonction d'essences antiseptiques (Niaouli, Thym, etc.), est à la fois perméable aux liquides aqueux tout en n'adhérant pas aux tissus. Elle réalise les trois conditions du pansement des plaies (brûlures, ulcères, escarres, amputations, etc) :

1° Ne pas coller, de façon à éviter : douleurs, saignement et arrachement des jeunes cicatriciels, cause de réinfection et de retard dans la cicatrisation.

2° Être perméable, de façon à permettre l'évacuation des divers suintements de la plaie et éviter la rétention du pus.

3° Ne pas gêner ou détruire l'action thérapeutique des médicaments utilisés pour les pansements.

Laboratoires BOTTU

35, rue Pergolèse — PARIS (XVI^e). Passy 43.89

GELAGAR

Médication nouvelle des *Gastropathies*.

Composition. — *Agar-Agar*, Gélatine, Silicate de Magnésie.

Forme. — Sachet de 20 gr. de poudre insoluble.

Indications. — Tous les états dérivant de l'hyperacidité et de l'hypersecretion gastrique.

Avantages. — *Ne constipe pas*. Action rapide et durable.

Prix très modique : 12 fr. la boîte de 20 paquets.

Posologie. — Deux paquets par jour dans un 1/4 de verre d'eau, en deux fois, ou au début des crises.

Ulcus constitué : 4 à 5 paquets à la fois dans 1/2 verre d'eau.

Établissements

M. A. WOLLACKER et C^{ie}

31, rue Saint-Georges — PARIS IX^e)

GÉLOBARINE

Sulfate de baryum crémeux.

L'homogénéité de cette préparation non toxique, son opacité, sa bonne conservation et son prix abordable permettent de la substituer aux sels de bismuth.

Indications :

Exploration radiologique du tube digestif.

Posologie et mode d'emploi :

Le contenu d'un flacon (200 gr.) constitue la dose habituelle pour un repas ou un lavement opaque. La Gélobarine peut s'employer pure ou incorporée à un excipient.

" SPÉCIA "

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (11^e)

GÉLOGASTRINE LICARDY

granulé ou tablettes.

A base de Gélose Gélatine et Kaolin purifié. Réalisation pratique de la thérapeutique par le pansement gastrique à l'exclusion de tous narcotiques, alcalins ou astringents.

Posologie. — *Traitement des douleurs de l'estomac*: 1/2 cuillerée à soupe de *granulé*, ou 2 *tablettes*, au moment des crises douloureuses et à n'importe quelle heure de la journée.

Traitement de l'Hyperchlorhydrie et de l'Ulcère gastrique: 1/2 cuillerée à soupe de *granulé*, ou 2 *tablettes*, le matin à jeun, le soir avant de se coucher et une demi-heure avant chacun des principaux repas.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS
Téléphone : Maillot 17-75

GÉLO-PANSEMENT BYLA

(cutané, cutané-muqueux)
suivant la technique de Jausion et Diot.

Composition. — Géloses vaccinées par la culture de germes pyogènes.

Indications thérapeutiques.

Gélo-pansement cutané (ampoules et compresses) : traitement de toutes les plaies septiques ou non, anthrax, furoncles pyodermites, phlegmons, et ...

Gélo-pansement cutané-muqueux : ulcérations génitales, chancres mous, suppuration des muqueuses, etc...

Mode d'emploi. — 1° *Ampoules* : Plonger l'ampoule fermée dans l'eau bouillante, jusqu'à fusion complète de la gelée. Laisser refroidir au voisinage de la température ordinaire. A l'aide de la lime, couper le col de l'ampoule au ras de l'épaullement. Verser le contenu soit sur une compresse stérilisée, soit sur le foyer infecté lui-même. 2° *Compresses* : à appliquer directement sur le lieu de l'infection, après les avoir trempées un instant dans l'eau bouillie chaude.

Les Établissements BYLA,
25, avenue de l'Observatoire, Paris.
C. Seine 71895.

GÉLO-PANSEMENTS GASTRO-INTESTINAUX

1° *Gélo-kroï-belladoné* pour pansements gastriques et intestinaux.

Indications. — *Estomac.* Hyperchlorhydrie avec ses manifestations (brûlures, aigreurs, crampes). *Intestin.* Coliques, Gaz, Tranchées, Diarrhées de fermentations.

2° *Gélo-carbone-bismuthé* pour pansements intestinaux.

Indications. — Spasmes douloureux de l'intestin, Coliques, Gargouillements, Intoxication alimentaire, Fermentations.

Mode d'emploi. — Verser le 1/2 contenu du couvercle mesure dans une 1/2 tasse d'infusion très chaude un quart d'heure avant les 2 grands repas. 1/2 dose pour les enfants.

Dépôt général :

Laboratoire LAMBERT

8, avenue de Grammont — TOURS

GÉLOR

Lubrifiant et régulateur de l'intestin

Composition. — Émulsion solidifiée d'une finesse microscopique et de stabilité parfaite, de 60 p. 100 d'huile de paraffine chimiquement pure et de haute viscosité dans de l'agar-agar et du suc d'oranges douces.

Propriétés. — Gélor cumule les avantages de l'huile de paraffine et du mucilage sans en avoir les inconvénients ; suintements, saveur huileuse, digestion pénible.

Indications. — Traitement de la constipation sous toutes ses formes.

Son goût très agréable, sans aucune saveur huileuse permet au malade d'absorber l'huile de paraffine sans s'en douter (la composition n'étant pas publiée).

Posologie. — Doses quotidiennes à prendre aux repas :

Bébé : 1/2 cuillerée à café.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café selon l'âge.

Adultes : 2 à 6 cuillerées à café.

Prix en France : 13 fr. 50.

Laboratoires A. CESBRON

63, rue de la Faisanderie — PARIS (XVI^e)

GÉLOTANIN

Nature. — Tannate de gélatine.

Poudre blanche, inodore, insipide, insoluble dans l'estomac, dissoluble dans l'intestin en ses éléments antidiarrhéiques : tannin et gélatine.

Indications. — Toutes diarrhées non infectieuses. Aucune contre-indication.

Formes pharmaceutiques et posologie.

— 1^o Pour nourrissons et jeunes enfants :

Paquets de 25 cgr. : 1/2 à 3 paquets par jour en suspension dans du lait ou tout autre liquide tiède, mais non pas chaud ;

2^o Pour adultes : *Cachets* dosés à 50 cgr. : 4 à 8 par jour.

Prix : 8 fr. la boîte de 20 paquets.

10 fr. la boîte de 24 cachets.

Laboratoire CHOAY

48, Rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e)

Téléph. : Auteuil 44-09 et 44-10

GÉLOTUBE 29

(nom, forme et dispositif déposés)
protège contre les maladies vénériennes.

Composition :

Le Gélotube 29 contenant la pommade au cyanure de mercure, — thymol, — calomel (formule de M. le Docteur GAUDUCHEAU) est le désinfectant le plus puissant et le plus efficace que l'on connaisse aujourd'hui pour se protéger à la fois contre la syphilis et la blennorrhagie après qu'on s'y est exposé.

Présentation :

En boîtes contenant 6 GÉLOTUBES 29 (pour 6 applications). Un mode d'emploi accompagne chaque objet.

Prix de la boîte de 6 : 10 fr.

C. DAVID et ses Fils,

Dr. en Ph^{ie}. — Ph^{iens} Ex-Int^{es} des Hôp. de Paris.
49, rue de Bitché, Courbevoie (Seine).

Agent G^l pour la Belgique : **H. CRÉTIN**, Ph^{ien}.
118, rue des Eburons — Bruxelles.

GÉNACIDE

Composition. — Granulé acigène contenant :

Phosphate bi-ammonique 12 gr. 75 %

Chlorure ammonique. . . . 5 gr. %

Ac. phosphorique off. . . 1 gr. 35 %

Cinq grammes représentent comme coefficient d'acidité en N, 150 cc.

$\frac{10}{10}$

Indication. — Alcalose.

Forme. — Granulé.

Dose. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS

GENATROPINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Dyspepsie Hyperacide.
Douleurs intestinales. Sueurs des tuberculeux.

Entérite muco-membran use.

Formes. — Gouttes : XX gouttes
= un mmgr. Granules au 1/2 milligr.
Ampoules à 2 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes
deux fois par jour ou quatre à dix granules par jour. Dose injectable de deux à six milligrammes.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^e)

GÉNÉRGOSINE

Tonique et reconstituant du Système nerveux.
(Phosphure de Zinc, Métavanadate de Soude,
Kola, Caféine, Quassia).

Prop. thérap. — Tonique Nervin, médication phosphorée parfaite par le Phosphure de Zinc. La présence du Métavanadate de Soude complète l'action du médicament en stimulant l'appétit et les fonctions digestives.

Indic. thérap. — États neurasthéniques, dépression nerveuse, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences difficiles, etc.

Forme. — Comprimés-pastilles.

Dose. — 1 à 3 par jour.

Laboratoires JONIDS

DIJON

GENESERINE

Polonovski et Nitzberg
Salicylate de Gènesérine

Formes. — Granules et dragées au 1/2 milligr. Gouttes (Solution au millième). Ampoules.

Indication. — Traitement du syndrome solaire et en particulier des dyspepsies hypochlorhydriques nerveuses. Excitant des sécrétions et de la motilité du tube digestif. Spécifique des troubles sympathiques.

Mode d'emploi. — La dose moyenne est de quatre à six dragées ou granules par jour. Si l'on prescrit les gouttes, on en donnera XX avant chaque repas, LX par jour. Les injections sous-cutanées sont surtout indiquées dans les cas de crises douloureuses intenses, contre l'angoisse et l'insomnie persistante des dyspeptiques.

Injecter une ampoule tous les jours pendant les cinq premiers jours, puis une ampoule tous les deux jours.

LABORATOIRE AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV°)

GENHYOSCYAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Etats spasmodiques en pathologie digestive. Chorée. Tremblement mercuriel et de causes diverses. Delirium tremens.

Formes. — Gouttes: XX gouttes = un mmgr. Granules au 1/2 milligr. Ampoules à 2 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à six granules par jour, ou injecter une ampoule par jour.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV°)

GENOSCOPOLAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications:

ÉTATS PARKINSONIENS Paralyisie Agitante, Syndromes, Post-encéphalitiques, Anesthésie chirurgicale.

Formes: Gouttes : XX gouttes = un mmgr.

Granules au 1/2 milligr.

Ampoules dosées à 3 milligr. et à un mmgr.

Mode d'emploi : XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour. Anesthésie chirurgicale: Quatre granules la veille de l'opération.

Trois quarts d'heure avant l'opération une ampoule de Génoscopopolamine suivie de l'injection d'un centigr. et demi de morphine.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^e)

GENOSTRYCHNINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Système nerveux. Paralysies diphtériques. Paralysies bulbaires. Cœur et circulation. Alcoolisme. Asthénie. Neurasthénie. Affections oculaires.

Formes. — Gouttes : XXX gouttes = 5 mmgr. Granules à 0 gr. 002.

Ampoules à 0,01.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour.

Dose injectable : une ampoule par jour.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^e)

GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme et de Bergénite.
Non toxique. Goût agréable.

Indications. — Employée contre la coqueluche dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émetisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-bronchites, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Grippe pulmonaires, etc., etc.

Propriétés. — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif. Combat efficacement l'infection.

Agit sur le symptôme Toux et sur l'affection qui le provoque. N'est pas toxique et n'a aucune action nuisible sur les fonctions digestives, propriétés précieuses qui permettent de prescrire directement la *Germose* aux nourrissons atteints de bronchites, de coqueluche, etc., etc., dans un peu de lait ou simplement dans de l'eau sucrée ou non.

Forme. — Gouttes concentrées : 1 gr. (46 gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé et 0 gr. 30 de bergénite.

Doses habituelles dans les 24 heures. — Jusqu'à 1 an, 4 fois 10 gouttes ; de 1 à 3 ans, 4 fois 25 gouttes ; de 3 à 12 ans, 4 et 6 fois 30 gouttes ; au-dessus, 4 et 6 fois 40 gouttes. A prendre dans une ou deux cuillerées d'eau ordinaire ou sucrée ou un peu de tisane.

Nota. — Le médecin peut prescrire, sans inconvénient, la *Germose* à des doses plus élevées ; il doit même le faire si les résultats ne lui paraissent pas suffisamment rapides.

Dans tous les cas, les doses doivent être prises aussi régulièrement que possible, toutes les deux ou trois heures par exemple, sans tenir compte des accès de toux ou des quintes.

Aucune contre-indication.

MOREAU, pharmacien
7, rue d'Hauteville — PARIS

Laboratoire et Dépôt

Pharmacie Centrale de France,
21, Rue des Nonnains d'Hyères — Paris (IV°).

GLANDOCALCYL

Récalcifiant — Réminéralisateur

Composition. — Surrénales, fluorure et formiate calciques, carbonate et phosphoglycérate de chaux et de manganèse, di-phosphate tricalcique et poudre d'os frais.

Indications. — Débilité, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, rachitisme, troubles de la croissance, carie dentaire, fractures, maladies des os, lymphatisme, adénites, hérédo et prétuberculose.

Formes. — Pour adultes : cachets ; pour enfants : granulé.

Doses. — 2 ou 3 cachets par jour aux repas. 1 ou 2 cuillerées à café deux fois par jour suivant l'âge de l'enfant. Faire dissoudre dans un peu d'eau ou mieux le croquer comme un bonbon.

Laboratoire moderne d'Opothérapie
et Biologie médicale

40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE

GLOBUGENOL CHANAL

Médication

stimulante néophosphorée type

Composition. — Arrhénal, acide nucléinique, vanadium, fluorure de calcium, glycéros, kola, sels de chaux assimilables, strychnine.

Formes. — Présenté sous quatre formes différentes (formules alternées).

Posologie :

Tubes	1 injection par jour.	
Cachets	2 cachets	—
ELIXIR	2 gobelets	—
Granulé	2 mesures	—

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant énergétique, récalcifiant rationnel, rénovateur cytoplasmique, agent hématopoïétique puissant.

Indications. — Anémies, convalescence, états dépressifs, surmenage, asthénies diverses, neurasthénie, affections pulmonaires, chlorose, diabète, paludisme, phosphaturie, rachitisme, pré-tuberculose, suites opératoires obstétricales.

Observations. — Les cachets ne contenant pas d'arrhénal permettent une médication intercalaire récalcifiante et pratique, le cachet se déboîtant facilement. Enfants : 1/2 dose.

Littérature et échantillons sur demande :

Prix : 14 francs.

Laboratoires COMTOS

FESCHES-LE-CHATEL (Doubs)

LOBULES ROMON

Forme. — Globules glutinisés.

Compos. — Extraits orchitique, prostatique et de moelle épinière joints à la strychnine, à l'Yohimbine et au phosphore de zinc pur.

Indications. — Traitement le plus rationnel de l'impuissance.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Observation. — La même formule existe également en ampoules : *Ampoules Romon.*

Dose. — Une injection tous les 2 jours.

Laboratoires ROMON

6, Rue Bridaine — PARIS

LOTTYL

Composition. — Association d'Erysimum, Euphorbia pilulifera, Coca, Drosera, faibles doses de Belladone et d'Aconit.

Formes pharmaceut. : Gouttes et Dragées.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique, fluidifie et favorise les sécrétions. Eclaircit la voix, arrête la toux, calme la dyspnée.

Indications. — Laryngites, aiguës et chroniques. Trachéites, bronchites. Toux coqueluchoïdes.

Posologie. — *Gouttes* : Enfants : 10 à 20 gouttes, 2 à 3 fois par jour. Adultes : 40 à 60 gouttes, 4 à 6 fois par jour, dans un peu d'eau ou de tisane chaude. *Dragées* : 6 à 12 par jour.

Prix : 11 francs

Laboratoires DENIS

85 bis, rue du Ranelagh — PARIS (XVI^e)

Téléphone : Auteuil 13.89

GLYCÉROPHOSPHATE DALLOZ

Granulé dosé à 0,50 de Glycérophosphate de chaux, chimiquement pur, par cuillerée à café.

Indications. — Reconstituant minéralisateur. Tonique nervin. — Médicament des enfants; des mères pendant la période de l'allaitement; des déprimés.

Dose. — 1 ou 2 cuillerées à café par jour, à croquer ou à dissoudre dans un peu d'eau.

Le flacon : 12 fr. 50

Laboratoire DALLOZ

13, Bd de la Chapelle — PARIS (X^e).

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,25 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,30 centigr. par cuillerée-mesure. Ampoules injections dosées à 0,10 centigr. par ampoule 1 cc.

Doses et mode d'emploi. — Granulé ou comprimés : 1 gr. par jour en 2 fois dans un peu d'eau; ampoules 1 à 2 cc. ou 3 fois par semaine.

Prop. thér. — Reminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

Indications. — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

GLYCOCARPINE

Élément actif. — Nitrate de pilocarpine (2 mmgr. par pilule), associé à de faibles doses d'hamamélis et cimicifuga.

A. — Médication vaso-dilatatrice

Céphalées et vertiges des artérioscléreux, Hypertension artérielle et ses conséquences, Troubles congestifs de la ménopause et de la puberté. Maladie de Raynaud, Claudication intermittente par spasme artériel, Angor par spasme des coronaires, Glaucome, Mouches volantes, Bourdonnements d'origine circulatoire (seulement).

B. — Troubles vago-sympathiques

Insuffisance du vague, Freinage du sympathique, Asthme, Coqueluche, Basedow fruste, Pelade.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 pilules au début des trois repas.

DALIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

49, quai Saint-Vincent — LYON

GLYCO-LACTIMASE

Description. — Association symbiotique de bacille lactique Bulgare et de bacille glycobacter, en comprimés de 0 gr. 50, 40 comprimés par flacon.

Action thérapeutique. — Le bacille glycobacter transforme les matières amylacées en sucres et fournit par conséquent un milieu de culture éminemment favorable au bacille lactique, dont l'activité se trouve ainsi considérablement renforcée.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour, dans les intoxications intestinales, diarrhées, Entérites, affections du foie.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

GLYCTONE PHOSPHATÉE CHARRIÈRE

Zomothérapie

Forme. — Liquide.

Composition :

Ferments musculaires, Corps Immunisants,
Albuminoïdes spécifiques et Vitamines des
muscles frais, Matériaux salins vitalisés
phosphatiques, Hémoglobine, du Plasma
de boeuf additionné de sucs de cerise et de
framboise, Saccharose..... 500 cc.
Arsénite de soude..... 5 centigr.
Glycérophosphate de soude... 5 grammes.
Sulfate de strychnine..... 8 milligr.

Dose. — *Après les repas :*

Enfants : 1 à 6 cuillerées à café ou à dessert
par jour suivant âge.

Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe pure ou non
de préférence dans de l'eau froide gazeuse
ou du lait froid.

Indications :

Anémie, Chlorose, Convalescence, Grossesse
et Allaitement, Épuisement musculaire, Sur-
menage, Rachitisme, Tuberculose, Misère
physiologique et Déchéances physiques ca-
rentielles.

Contre-Indications :

Albuminurie, Diabète et Artério sclérose.

Prix :

Le flacon : 30 fr. — Le 1/2 flacon : 16 fr. 80

L. ARQUEVAUX ☞

Pharmacien à Étampes (S.-et-O.).

Dépôt. — Office commercial pharmaceutique,
74, rue du Temple, et 43, rue des Francs-Bour-
geois, à Paris (III^e), et dans ses succursales
d'Alger, Bordeaux, Lyon, Rennes, Rouen

GLYKOLAINE ROBIN

Association de la kola
aux glycérophosphates.

Granulé.

Dose et mode d'emploi :

1 à 2 cuill. à café par repas.

Indications :

Stimulant du système nerveux, Surmenage, Névralgies, Neurasthénie.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy
PARIS

GLYPHOSPHER

Élixir non sucré, à très faible degré alcoolique, à base de Glycérophosphates chimiquement purs :

Glycérophosphate de Soude cristallisé

—	Fer
—	Quinine
—	Strychnine

Stimulant de la nutrition chez les surmenés, neurasthéniques, convalescents, anémiques. Réminéralise l'organisme, reconstitue la cellule nerveuse :

Asthénie, anémie, chlorose, phosphaturie, névralgies faciales et sciatique, hystérie.

Sa composition permet d'en recommander l'emploi dans le diabète.

GIVAUDAN-LAVIROTTE

56, Chemin de Combe-Blanche — LYON

GOBÉROL

Eau oxygénée en poudre,
Gobérol tarit Leucorrhées.

Présentat. — Poudre, comprimés, sachets, Savon-Suspendu et Ovule.

Compos. — (Perborate de soude, Menthol).

Prop. — Soluble instantanément dans l'eau chaude à 38°, 48° en donnant une solution d' $H^2 O^2$ faible, mais à l'état naissant alcaline et isotonique.

Avantages. — Pas d'intolérance. Ni toxique, ni corrosif, ni salissant, ni acide. Tous les avantages de l' $H^2 O^2$ sans en avoir les inconvénients. *Titre fixe, alcalinité, état naissant* qui donne une suractivité que le Professeur A. Robin évalue de 1 à 5.

Indic. — Injection alcaline, oxygénée, isotonique et analgésique : Toilette journalière, Gynécologie, Leucorrhées, Vulvite, Vaginite, Prurit, etc.

Posologie. — *Solution normale* : une mesure ou un sachet ou 1 comprimé (pour 2 litres d'eau chaude à 38°).

Prix : 10 francs.

A. CHARMAISON

Pharmacien de 1^{re} Classe de l'Université de Paris
35, avenue de Royat, — CLERMONT-FERRAND.

GOMENOL

Essence provenant d'une variété sélectionnée
de *Melaleuca viridiflora*.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, anticatarrhal, désodorisant, hautement diffusible. Toxicité et causticité nulles.

Action thérapeutique et usages. — Préconisé, à l'intérieur, comme balsamique et anticatarrhal. Convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires : Bronchites, bronchectasies, tuberculose. On le prescrit utilement dans l'urétrite et la cystite. — A l'extérieur, il est surtout employé en inhalations et pulvérisations dans le coryza, les laryngites, les bronchites, la coqueluche : en pansements chirurgicaux dans les cas de brûlures, plaies septiques, ulcères, furoncles, phlegmons ; en pansements vaginaux dans les métrites. — Le GOMENOLEO à 5% est un bon antiseptique nasal non irritant. — Sous forme de GOMENOLEO, il est donné en injections intra-musculaires (tuberculose) et intra-trachéales (laryngite tuberculeuse, bronchite fétide, tuberculose pulmonaire) ; en instillations intravésicales (cystites). Contre les infections généralisées, tendre à l'imprégnation goménolée.

Laboratoire du GOMENOL

48, rue des Petites-Écuries, — PARIS (X^e).

GONACRINE

Chlorométhylate de diamino-acridine.

Antiseptique puissant, très diffusible, peu toxique, non irritant. Action élective à l'égard du Gonocoque.

Indications :

Affections gonococcoliques et leurs complications, Septicémies, Désinfection des porteurs de germes, Fièvre ondulante à M. Melitensis.

Posologie et mode d'emploi :

Lavages de l'urèthre ; solution de 1/8000 à 1/1000. Injections intraveineuses : ampoules de solution à 0.50 p. 100 et à 2 p. 100.

" SPÉCIA "

Société parisienne d'Expansion chimique.
26, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

GOSIERINE " DALLOZ "

Formule % :

Cocaine.....	0,05
Menthol.....	0 40
Borate de soude...	4,00

Forme.

Dragées.

Propriétés. — Analgésiques, antiseptiques et antispasmodiques.

Action. — Antisepsie de la bouche et des voies respiratoires, soulagement immédiat et guérison des aphtes, gingivites, amygdalites, laryngites, angines, etc...

Doses. — 6 à 8 dragées par jour, pour les adultes.

La boîte : 6 fr. 25

Laboratoire DALLOZ

43, boulevard de la Chapelle — PARIS

GOUTTES ANTISPAS- MODIQUES DAUSSE

A base de benzoate de benzyle et de Gelsémium.

X gouttes = 0 gr. 04 de Benzoate de Benzyl.
et II gouttes de gelsémium Dausse.

Indications. — Tous les états spasmodiques : *asthme vrai, coqueluche, hoquet persistant, affections spasmodiques du tube digestif, coliques utérines, vomissements de la grossesse, crises vasculaires des hypertendus.*

Posologie. — ADULTES. XX à XL gouttes par prise, répétées suivant les cas, 4 ou 5 fois par jour ; à prendre dans un peu d'eau sucrée ou de lait.

ENFANTS : X gouttes par jour et par année d'âge.

GOUTTES PHOSPHO- STHENIQUES DAUSSE

Administration de la strychnine, par voie gastrique, à doses progressives, en association avec l'acide phosphorique officinal.

XX gouttes renferment :
un milligramme de sulfate de strychnine ;
III gouttes d'acide phosphorique officinal ;
deux centigr. d'extrait de quina ;
deux centigr. d'extrait de Coca.

Indications. — Asthénie, atonie nerveuse, Neurasthénie, adynamie des convalescents. Dépression nerveuse, surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C. et même CC. gouttes par repas. *Eviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

GOUTTES ARSÉNO- STHÉNIQUES DAUSSE

Association de la Strychnine par voie gastrique, à doses progressives, avec le méthylarsinate de soude.

XX gouttes renferment :
un milligramme de sulfate de strychnine ;
cinq milligrammes de méthylarsinate de soude ;
deux centigrammes d'extrait de quina ;
deux centigrammes d'extrait de cola stabilisée.

Indications. — Atonie nerveuse, asthénie, amaigrissement, neurasthénie, adynamie.

Posologie. — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C. et même CC. gouttes par repas. *Eviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriol — Paris (IV*).

GOUTTES FLUXINE

XX gouttes =

0,01 centigr. d'infusé de marron d'Inde Dausse.

IV gouttes d'alcoolat. concentré d'anémone.

IV gouttes de teinture de noix vomique.

en combinaison inaltérable, radio-activée par les rayons ultra-violet.

Propriétés. — Vasoconstricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire, stimulant ovarien, sédatif utérin.

Indications. — Stases sanguines, inflammations de l'utérus et du bassin, inflammations veineuses : métrorragies, dysménorrhée, aménorrhée, hémorragies du retour d'âge, règles douloureuses, varices, hémorroïdes, phlébite, ulcères variqueux, etc.

Mode d'emploi. — Dix gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 2 à 3 fois par jour avant les repas.

Prix au public : 15 fr. pour un mois.

J. BONTHOUX

pharmacien de 1^{re} classe

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône)

GOUTTES HALOGÈNES DU D^r BERN

Titrées exactement d'après la technique de M. M. Delbet et Karajanopoulo (Communication à l'Académie de médecine, novembre 1928). Reminéralisation magnésienne intensive.

Formule. — XL gouttes renferment 1 gr. 21 de sels halogénés du magnésium (chlorure, bromure, iodure, fluorure) chimiquement purs et anhydres.

Indications. — Dépression physique et intellectuelle, — Entérites, Constipation et toutes infections des voies intestinales et biliaires, — Troubles neuro-musculaires (maladie de Parkinson, crampes, etc.) Maladies de la peau, Prurits, Eczéma, Psoriasis, Acné, Vertiges. Lésions précancéreuses, Prophylaxie du cancer.

Posologie. — XL gouttes dans un demi-verre d'eau le matin avant le petit déjeuner. Demi-dose pour les enfants. Ce traitement, dépourvu de toute toxicité, doit être continué très longtemps.

Comme tous les régimes, loin d'exclure un traitement médicamenteux, les gouttes Halogènes du Docteur Bern le complètent et augmentent considérablement son activité.

Prix du flacon : 15 fr.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, place Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE

GOUTTES LIVONIENNES DE TROUETTE-PERRET

Capsules de goudron de Norvège, de Créosote de Hêtre et de Baume de Tolu.

Indications. — Rhumes, toux, bronchites, catarrhes, tuberculose, maladies des voies respiratoires, antiseptie des voies digestives.

Le meilleur moyen de faire tolérer la créosote. Médicament préventif et curatif.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 8 Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret par jour *au milieu des repas*.

Bien spécifier : GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET, pour éviter les contre-façons.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeubles-Industriels
PARIS (XI^e)

GOUTTES NICAN

(sans sucre)

Composition. — Bromoforme et codéine purs
Aconit, belladone, drosera, grindelia, benzoate
de soude, eau de laurier-cerise.

(4 gouttes = 1 goutte de Bromoforme stabilisé),

Caractéristiques. — Effet rapide et persistant,
souvent surprenant. Tolérance parfaite. Pas de
contre-indications.

Incompatibilité. — Tabac dont l'usage retarde
la guérison.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif, décon-
gestif, *antispasmodique* très puissant et fidèle.

Posologie. — A absorber *loin des repas* dans un
liquide tiède, eau, grog ou lait qu'on agitera en
y ajoutant les gouttes.

**1° Toux des tuberculeux, asthme, rhume des
foies, etc.** — (Calme et repos immédiats).

Grippe, Toux spasmodique, — (Succès immé-
diat, jugulation complète en quelques jours,
souvent en quelques heures).

Doses moyennes. — Adultes 240 gouttes.

Enfants. 12 gouttes par année d'âge.

A prendre en 4 fois dans les 24 heures.

2° Coqueluche. — (Amélioration immédiate. Ju-
gulation complète en moins de 15 jours).

Doses initiales. — Adultes, 120 gouttes.

Enfants, 8 gouttes par année.

A prendre en 3-4 fois par jour, après une quinte.
Augmenter progressivement pendant les huit
premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la
notice jointe au flacon.

N. B. — En cas de recrudescence des quintes ou
de somnolence accentuée, cas excessivement
rares, interrompre le traitement pendant
24 heures. Puis continuer la progression ascen-
dante, si nécessaire.

Se méfier des contrefaçons

Échantillons et Littérature

Laboratoires CANTIN

PALAISEAU (S.-et-O.) France

Ch. Schœffer, 34, rue du Canada, Bruxelles.

GOUTTES PILKA

(Pilka Golaz ou Thymipin)

Composition :

Les gouttes *Pilka* sont essentiellement composées des dialysés de thym, grassette et drosera (absolument sans danger pour les nourrissons).

Propriétés :

Action élective spéciale due à des ferments.

Indications :

A recommander dans la *coqueluche* et les *toux convulsives* des enfants et des adultes, ainsi que les *toux des tuberculeux* et les *affections des bronches* en général : bronchite, pneumonie, asthme.

Mode d'emploi :

On donne le matin à jeun et le soir en se couchant : une à deux gouttes de *Pilka* aux nourrissons, deux à quatre gouttes aux enfants au-dessus de cinq ans, et cinq à dix gouttes aux adultes.

Laboratoire "ZYMA"

4, rue Bellart — PARIS (XV^e)

GOUTTES DE SERÛ

Extrait total et concentré des galbules de *cupressus sempervirens*.

Indications. — Vaso-constricteur et tonique puissant du système veineux. — Spécifique efficace sûr et constant des varices, ulcères variqueux, périphlébites, hémorroïdes, varicocèles et des troubles de la ménopause.

Dose moyenne. — 30 gouttes avant chacun des deux principaux repas.

LETTRY

69, rue de Sèvres — PARIS

GOUTTES SCANDINAVES

à l'essence de sève de pin, au gaiacol,
au goudron pur.

Forme. — En capsules gélatineuses légères
et très digestes. *Plus de 30 ans de pratique
et de succès.*

Propriétés. — Antisepsie des voies respira-
toires par l'essence de sève de pin.

Indications. — Toux, rhumes, bronchites à
toutes les périodes, catarrhes, emphysème,
tuberculose chronique.

Dose. — 6 à 8 capsules par jour, dont 3 à 4
avant chaque repas.

Prix au public : 8 fr.

Laboratoire du Dr H. PHILIPPE

14, rue du Palais-Grillet — LYON

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

GRAINS CÉPHALGIFUGES AU JASMIN DE VIRGINIE

CURATIFS DES NÉVRALGIES REBELLES

EN UNE SEMAINE

PAR

MÉDICATION SYNERGIQUE ORGANO-VÉGÉTALE

PRÉPARATION MÉDICINALE FRANÇAISE

rendue inaltérable par un enrobage approprié

COMPOSITION

Poudre de racines de Gelsemium sempervirens	0 gr. 05
Poudre de racines d'aconit des Vosges.....	0 gr. 01
Extrait mou de quinquina jaune.....	0 gr. 05
Cholestérine pure.....	0 gr. 01
Poudre de rac. de piscidia et cimicif ga, ensemble.	0 gr. 02
Extrait mou de colombo, gentiane et quassia, ens.	0 gr. 03
Excipient spécialement étudié. Q. S. pour un grain.	

Nota : Les plantes employées sont garanties stabilisées.

AVANTAGES

Grâce aux procédés scientifiques actuels de stabilisation des végétaux, les poudres et extraits des plantes ont une activité constante et représentent toute l'activité des plantes.

A doses comparables et en utilisant la voie buccale, la thérapeutique par les plantes stabilisées (Phytothérapie moderne) expose beaucoup moins aux risques d'intoxication que la médication par les alcaloïdes, principes actifs cristallisés ou amorphes retirés des végétaux, tels la gelsemine, l'aconitine, etc.

Aussi, après échec des meilleurs produits antinévralgiques, est-il sage de recourir à la Phytothérapie synergique avant de s'adresser par étapes au courant galvanique, à l'ionisation (électrolyse danger use avec les alcaloïdes), aux injections profondes d'alcool rarement curatives et, finalement, à la chirurgie (neurotomie rétro-gassérienne).

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Pouvoir analgésique électif : trijumeau et facial,
Action sédative : syst. cérébro-spinal et sympathique.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Mal de tête : céphalalgie, céphalée, migraine.
Névralgie faciale continue ou paroxystique (tic doul.).
Névralgies dentaires, intercostales, sciatiques.
Nervosisme. Fièvres intermittentes. Rhumatisme.

MODE DE PRÉSENTATION**EN FLACONS DE 21 GRAINS DRAGÉIFIÉS****MODE D'EMPLOI ET DOSES**

Se prennent au cours ou en dehors des repas

ADULTES : 2 GRAINS PAR JOUR

un le matin et un le soir pendant 7 jours consécutifs

*Pour doses supérieures prendre l'avis du médecin.***PRIX DE VENTE OBLIGATOIRE***Le Flacon de 21 Grains : 15 fr.***LABORATOIRE DU MICELLIODE**

Produits médicaux spécialisés.

A. ROLLAND, Pharmacien de 1^{re} classe88, rue de la Villeite — PARIS (XIX^e).**GRAINS DE VALS**

Composition végétale et opothérapique.

Podophyllin 0,01

Cascara et Bourdaine (extr.) aa 0,025

Belladone (ext.) 0,01

Bile, Erepsine, Entérokinase.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 le soir avant ou au milieu du repas.**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif régulateur de l'intestin ne donnant pas de colique., pas d'accoutumance.**Indications.** — Constipation, embarras gastrique.

Pas de contre-indications.

Laboratoire H. NOGUÈS11, Rue Joseph-Bara — PARIS (VI^e)

GRANIONS DE FOUARD

Super-colloïdes organo-métalliques chimiquement purs préparés suivant une méthode entièrement différente de celle de Bredig.

Propriétés essentiellement nouvelles.

- 1° Conservation indéfinie sans altération de l'état colloïdal et des propriétés thérapeutiques.
- 2° Suppression de la réaction du choc.

Communications

Académie des sciences, 7 février 1927

Congrès de Lyon (avancement des sciences), 1926

Granions		
As	Tuberculoses, dermatoses, anémie, dénutrition, etc.	Ampoules de 2 cmc. voie buccale, inject. intramusculaires et intraveineuses.
Argent	Infections générales locales.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.
Cuivre	Cancer, angiocholites, cholécystites.	Ampoules de 2 cmc. voie buccale.
Bismuth	Syphilis.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.
Mercure	Syphilis.	id.
Iode	Hypertension, rhumatismes, syphilis, tuberculose etc.	En ampoules de 2 cmc. pour infections, en solution pour voie buccale.
Soufre	Sciaticque, rhumatismes.	En flacon : voie buccale.
Or	Tuberculose, infections, générales, locales.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.
Sélénium Plomb Magnésium Uranium	Cancer	Ampoules de 2 cmc. injections intraveineuses, intramusculaires, voie buccale.

Littérature et échantillons sur demande

Laboratoires FOUARD

61, rue G. Lauriau à MONTREUIL (Seine)

F. GAUTIER, pharmacien

Téléphone : Avron 01-42

GRANULÉ CARESMEL

Produit contenant le phosphore sous forme végétale, saturé de chaux et de magnésie, associé au carbonate de chaux fluoré et à l'oxyde de magnésium dans les proportions les plus aptes et les plus utiles à la formation du squelette et à la constitution de la cellule nerveuse.

Propriétés thérapeutiques. — D'une assimilation parfaite, stimulant des échanges nutritifs, c'est un puissant reconstituant et reminéralisateur indiqué dans tous les cas de faiblesse constitutionnelle, neurasthénie, névroses, etc., ou dans les maladies amenant l'épuisement : anémie, rachitisme, pré tuberculose, tuberculose, etc.

Doses : Adultes : 1 cuillerée à café à chaque repas.
Enfants : 1/2

Le flacon 12 francs (sans impôt)

Echantillons :

Laboratoires CARESMEL

2, Quai Paul-Bert — TOURS.

Téléphone : 19-42.

GRANULÉ-DÉPURATIF VÉGÉTAL

du Dr A. Künckel.

Le dépuratif classique, sous la forme nouvelle d'un *granulé fondant* permettant d'obtenir extemporanément un sirop toujours frais.
Médicament d'ordonnance.

Composition. — Douce-amère, patience, fumeterre, salsepareille, squine, gaïac en extraits stabilisés plus arséniate de soude.

Indications. — Toutes les altérations du sang.

Posologie. — 3 cuillerées à café par jour dissoutes dans un peu d'eau, soit 0,75 d'extraits dépuratifs et XV gouttes liqueur de Pearson.

Littérature et échantillon médical.

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

3, rue Watteau, Courbevoie (Seine).

GRANULES DE PANTOFORT du Docteur BOVEIL

Composé formé des plus énergiques stimulants, destiné à favoriser l'assimilation, à combattre la reminéralisation, le surmenage, la déchéance organique du système nerveux, la dépression générale.

Composition. — Nucléinate de Manganèse, Sulfate de Strychnine, Quassine cristallisée, Arséniate de soude.

Indications. — Surmenage physique ou intellectuel, asthénie, épuisement nerveux, lymphatisme, neurathénie, suite de grippe convalescence, état pré-tuberculeux.

Dose et mode d'emploi. — Adultes : 3 à 6 granules par jour, 1 avant chacun des 3 repas
Enfants : demi-dose.

Échantillon et littérature sur demande.

Prix : 12 fr. la boîte de 60 granules.

M. PARIS, Pharmacien de 1^{re} classe
1, rue Lassalle — LYON (La Boucle).

GRASSYL

A base de chaton de saule frais.

Antispasmodique d'origine exclusivement végétale, dépourvu de toute toxicité.

Sédatif de l'éréthisme nerveux

Régulateur du déséquilibre neuro-végétatif.

Indications :

États spasmodiques. — Nervosisme. — Angoisses. — Palpitations. — Règles douloureuses. — Troubles de la ménopause et de la puberté. — Insomnies diverses.

Posologie :

Une à deux cuillerées à café trois fois par jour et avant de se coucher, dans un peu d'eau ou une infusion.

Établissements Albert BUISSON

F. JALOT et C^{ie}.

157, rue de Sèvres. 157, Paris (XV^e).

R. C. 222 705 B.

GRIPPOL-FORNET

Vaccin buccal antigrippal

Principe actif. — Différentes souches de microbes isolés du sang d'un grand nombre de malades atteints de Grippe et Influenza. Les microbes sont soigneusement stérilisés et dégraissés par un procédé spécial breveté en France.

Indicat. — Refroidissements, Rhume, Coryza, Grippe, Influenza et leurs complications.

Posologie. — 1 à 3 pilules toutes les 2 heures.

Propriétés therap. — Pris à temps, dès l'apparition des premiers symptômes, il empêche le développement de la maladie ; plus tard, fait disparaître tous les symptômes de la maladie en quelques jours.

Service Commercial et échantillons :

Laboratoires **THAIDELMO**

23, rue du Caire — PARIS (II^e)

Informations scientifiques et échantillons.

**INSTITUT de MICROBIOLOGIE
SARREBRUCK**

GUI BYLA

(Vaso-dilatateur, antiscléreux,
antihémorragique).

Contient l'alcaloïde, les saponines et l'inosite du gui.

Propriétés thérapeutiques. — Hypotenseur par action centrale sur les vaso-dilatateurs. Dépresseur de l'excitabilité exagérée. Toni-cardiaque par action myocardique. Diurétique par action cardio-rénale.

Indications. — Artério-sclérose, hypertension, cardiopathies artérielles, albuminurie, néphro-sclérose, éclampsie, hémoptysies, hémorragies, ménorragies, épistaxis, migraines.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à café par jour.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire, Paris.

R. C. Seine 71895.

GUIPSINE

Principes utiles du Gui

Indic. Thér. :

Véritable régulateur du travail du cœur et de la circulation générale non vasoconstricteur.

Médication hypotensive. — Hypertension, Artério-sclérose, Hémoptysie, Goutte, Troubles de la Ménopause (Spécifique), Néphro-sclérose, Prostatisme.

Doses et Mode d'emploi :

Pilules à 0,05 : 4 à 10 par jour entre les repas.

Ampoules à 0,05 : 1 ou 2 injections par jour (réservées aux cas d'urgence).

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

GUITOSE

Hypotenseur végétal aux principes actifs du *Viscum album*.

Forme et dosage. — Pilules dosées à 0 gr. 05.

Posologie. — 4 à 8 pilules par jour entre les repas.

Indications. — Artériosclérose, hémoptysie, goutte, troubles de la ménopause, néphrosclérose.

Prix. — L'étui de 60 pilules : 10 francs.

Echantillons et vente en gros :

F. CARTIER

1, rue de la Martinière — LYON

MURARD, Pharmacien

GYNERGÈNE SANDOZ

Compos. — Tartrate de l'Ergotamine cristallisée ($C^{22} H^{32} N^4 O^8$), principal alcaloïde isolé de l'ergot de seigle et principe actif spécifique. Produit pur, exactement dosable.

Formes: Ampoule 1 cc. de solution contenant 0 gr. 0005 de tartrate d'ergotamine, pour injection intramusculaire. Solution : 0,1% p. usage interne. Comprimés : 1 mgr. de tartrate d'ergotamine.

Prop. thér. — Le Gynergène Sandoz est le plus puissant des hémostatiques utérins et le sédatif du sympathique. Effets constants.

Indic. — Toutes hémorragies utérines. Atonie de l'utérus. Cancer utérin. Les sympathicotomies. Migraines.

Posol. — 1/2 c.c. à 1 amp. par jour, 15 à 20 gouttes, ou 1 à 2 comprimés deux fois par jour.

PRODUITS SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e)

Dépôt général et vente:

USINE des PHARMACIENS de FRANCE

125, rue de Turenne — PARIS (III^e)

GYNOCALCION

Forme M. — Traitement rationnel des troubles de la ménopause naturelle, chirurgicale ou radiothérapique de la sclérose-utérine.

Forme P. — Traitement des accidents de la Puberté chez la jeune fille.

Propriétés. — Agit sur le tonus du système vago-sympathique par son lactate de calcium et de manganèse; agit par son phosphore sur l'élément douleur; supplée à la déficience glandulaire par ses extraits opothérapiques.

Le *Gynocalcion P* agit en outre par son Hypophyse (lobe antérieur) sur le développement génital de la jeune fille.

Doses. = *Gynocalcion M.* — 12 à 16 dragées par jour, huit à dix jours par mois. En cas de formes rebelles, et surtout dans les ménopauses chirurgicales, deux séries par mois séparées par un repos de huit jours.

Gynocalcion P. — 12 à 16 dragées par 24 heures en série de dix jours par mois.

Effets rapides. Tolérance parfaite.

Echantillons, Littérature :

LABORATOIRES CORTIAL

15, Boulevard Pasteur. — Paris.

GYNOPAUSINE

Composition. — Association pluriglandulaire (thyroïde, ovarine) à un nouveau sel de Benzyle, le Sedobenzyl ($C_6 H_5 CH_2 SO_3 K$) antispasmodique et hypotenseur.

Propriétés thérapeutiques. — Le Sedobenzyl ($C_6 H_5 CH_2 SO_3 K$) est un nouveau sel de benzyle, c'est un produit stable, très soluble dans l'eau, non toxique aux doses habituelles, qui s'élimine aisément et qui peut être employé sans danger pendant un temps prolongé. Il a surtout une action antispasmodique, aussi a-t-il une action sédative dans les règles douloureuses, les coliques utérines et les douleurs de la métrite aiguë ou chronique.

Indication. — Insuffisance ovarienne, troubles de la ménopause et de la puberté, coliques salpingiennes ou utérines, dysménorrhée.

Dose et mode d'emploi. — 2 cachets ou 4 comprimés par jour avant les repas, Il est possible de prescrire, dans certains cas, 3 et même 4 cachets par jour, avant les repas. Le traitement doit être suivi de préférence dans les 8 à 10 jours qui précèdent l'époque des règles.

LABORATOIRE ODILIA

E. LACOMBE, pharmacien,

2, rue Neuve-Popincourt — PARIS (XI°).

HAMAMELINE ROYA

Principe actif aromatique de
l'Hamamélis virginica, en solution aqueuse.

Obtenue directement de la plante, contient en dilution convenable (20 cgr. p. cuill. à soupe) l'Huile Essentielle aromatique, véritable principe actif de la plante, à l'exclusion de l'extractif, inerte au point de vue vasculaire.

Propriétés. — Vasoconstricteur. Tonique des fibres lisses. Sédatif vasculaire. Stimulant circulatoire.

Indications. — Toutes les dilatations, congestions et inflammations veineuses (Varices, varicocèles, hémorroïdes, phlébites aiguës et anciennes). Troubles circulatoires utérins (Ménorragies, Dysménorrhée, Accidents congestifs de la Ménopause).

Dose. — Par cuill. à soupe, 2 à 4 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

Pierre ALEXANDRE Pharmacien

41, Rue de Rome — PARIS (VIII^e) — Lab. 08-00.

HAMAMÉLIODE

Combinaison stable et définie de l'iode métalloïdique aux principes totaux de l'Hamamélis *Virginica*.

Indications :

Maladies du système vasculaire, Varices, Hémorroïdes, Troubles congestifs de la Ménopause, Artério-sclérose.

1° **Gouttes concentrées** renfermant 0 gr. 04 d'iode métal pour L gouttes d'extrait représentant son propre poids de plante.

De XXX à XL gouttes
par 24 heures.

2° **Élixir** (Préparation très agréable au goût). Deux à trois cuillérées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon,

Pharmacien de 1^{re} classe,
de l'École supérieure de Paris
17, rue Cadet — PARIS

HAMAMELIS GRANDVAL

Forme et Composition. — Gouttes renfermant sous le plus petit volume l'activité complète de la feuille d'Hamamélis traitée de façon à fournir un produit soluble dans l'eau, possédant l'arôme tout spécial de la plante et d'une activité incomparable dans tous les cas de :

Indications. — Varices. — Hémorroïdes. — Ulcères variqueux. — Métrites. — Accidents du retour d'âge. — Hémorrhagies. — Œdème chronique. — Congestions etc., etc...

Dose. — XXX à XL gouttes avant chaque repas, 2 ou 3 fois par jour. — Dans les cas aigus, on pourra doubler la dose sans inconvénient, pendant quelques jours.

Le 1/2 flacon : 6 fr. — Le flacon : 11 fr.
(toutes pharmacies).

Laboratoires GRANDVAL

12-14, rue Féry — REIMS

HECTARGYRE

Spécifique de la Syphilis

Indications. — Syphilis, Paludisme.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B.
Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes.* — 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou 40 gouttes par jour pendant les 4 premiers jours ; ensuite 60 à 80 gouttes pendant 15 jours.

Enfants. — Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT

12, Rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine)

HECTINE

Spécifique de la Syphilis
et succédané du cacodylate de soude

Indic. — Syphilis, Paludisme, Fièvre des Foins, Tuberculose, Anémie.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes* : 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou 60 gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite 80 gouttes pendant 15 jours.

Enfants . Moitié doses.

Etablissements MOUNEYRAT

12, Rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine)

HÉLÉNINE DE KORAB

Spécifique de la toux

Composition. — Héléline cristallisée obtenue par le procédé de Korab et codéïne.

Forme. — Pilules.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires. Bronchites. Emphyseme. Asthme. Trachéo-bronchite. Catarrhe.

Doses. — 2 à 6 pilules par jour.

N. B. — Une seconde formule contenant deux centigrammes de créosote de hêtre par pilule est recommandée dans les cas de Bacillose.

Laboratoires CHAPÈS

12, rue de l'Isly, Paris.

HÉLITAL

Médication dynamisante et régénératrice.

Composition :

Arrhénal.....	} chimiquement
Nucléinate disodique. }	
Excipient spécial.	

Forme. — Dragées d'un goût exquis.

Propriétés. — Reconstituant énergétique. Régénérateur physiologique normal de la cellule organique.

Action. — Sûre, rapide et facilement réglable, grâce à une posologie nettement déterminée, qui donne immédiatement : *Appétit, Force, Poids.*

Indications. — Anémie, Convalescence, Dépression, Surmenage, Toutes fatigues, Neurasthénie, Tuberculose.

Doses. — de 2 à 6 dragées par jour aux adultes, de 1 à 3 dragées par jour aux enfants.

Laboratoire de l'HÉLITAL

Directeur : L. Simon,

Docteur en pharmacie.

15-17, place Nationale,

DIEPPE (Seine-Inférieure).

HÉMAGÈNE TAILLEUR

EMMÉNAGOGUE-ANALGÉSIQUE COMPLET

à effet polyvalent et immédiat.

Forme. — Dragées.

Composition. — Folliculine, Principes vaso-dilatateurs, et analgésiques sélectionnés.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant immédiat des douleurs les plus vives de la dysménorrhée et des coliques post-partum.

Indication et posologie.

1° **DYSMÉNORRHÉE** : 2 dragées dès l'apparition des douleurs, une demi-heure après, deux autres. Maximum : 8.

2° **AMÉNORRHÉE** et **MÉNOPAUSE** : 4 à 6 dragées par jour.

3° **COLIQUES POST-PARTUM** : 2 dragées par heure. Maximum : 10.

Petit flacon de 12 dragées : 7 fr. 50

Grand flacon de 30 dragées : 13 fr. 50

Laboratoire SEVENET

10, rue Le Chapelais — PARIS (XVII^e)

HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsénicale
phosphorée-strychnique

Doses et mode d'emploi. — Doses ascendantes et descendantes indiquées sur chaque flacon.

Prop. thér. — Lymphatisme, Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences.

Tonique puissant, antiscrofuleux

Eugène PETIT

Pharmacien de 1^{re} Classe

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)

HÉMAXOL

*Troubles nerveux dysménorrhéiques.
Etats congestifs et douloureux.*

Action. — Sur l'élément congestif utéro-ovarien : Hamamelis. — Vaso-motrice : Marron d'Inde. — Sur l'élément douleur : Anémone.

Indications. — Règles douloureuses, Hémorragies utérines, Etats congestifs des Vieillards, Hémorroïdes, Varices, Métrites et Ovarites.

Formes. — Elixir et comprimés-pastilles.

Dose et Mode d'emploi.

Elixir : 1 à 6 cuillerées à café ou 2 cuillerées à soupe par jour, avant les repas.

Comprimés : 2 à 10 comprimés-pastilles par jour avant les repas.

Laboratoires JONIDS

DIJON

HÉMOANTITOXINE " SOFOS "

de l'Institut du P^r E. Maragliano

Composition. — Sang de bœuf immunisé contre la tuberculose, contenant 20 % d'antitoxine Maragliano

Alcool	25 %
Glycérine	14 %
Eau aromatique	10 %
	51 %

Indications. — Reconstituant spécifique du sang. Remède contre le rachitisme et la scrofule. Préventif immunisant dans la prébacillose. Traitement spécifique de la tuberculose.

Formes et Posologie. — Simple: une cuillerée à potage quatre fois par jour (avant les repas).

Triple: même dose (s'emploie dans les périodes fébriles).

Se prend pure ou mélangée avec de l'eau alcaline ou avec du sirop.

Prix : 18 fr.

Échantillons: François CARTIER

1, rue de la Martinière, LYON.

MURARD, Pharmacien.

HÉMO-CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Composition. — Soluté de cacodylate de sodium chimiquement pur, fer et strychnine.

Mode d'emploi. — Une injection intra-musculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, accroit la valeur globulaire.

Indications. — Anémies de toute origine. Convalescences. Chlorose. Surmenage. Troubles de la croissance et de la puberté.

Présentation. — Hémo-Cyto-Sérum pour adultes 12 ampoules de 5 centicubes.

Hémo-Cyto-Sérum infantile 12 ampoules de 2 centicubes.

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes - PARIS - Tél. : Carnot 78-11

HEMODROME

(Berberis vulgaris. Thlaspi)

Forme. — Extrait fluide à prendre en gouttes.

Avantages. — Action supérieure à l'hémamelis et similaires. Assimilation plus rapide sous sa forme liquide que les produits présentés en pilules ou comprimés.

Indications. — Varices, Hémorroïdes, Troubles de la ménopause. Règles irrégulières, Phlébite.

Posologie. — 15 à 20 gouttes trois ou quatre fois par jour dans un peu d'eau.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III. — PARIS

HÉMODUCTYL

Pilules ou Solution

Extraits d'hamamélis, cupressus, marron d'Inde stabilisé, boldo et condurango associés aux extraits de gui et d'aubépine.

Dose moyenne. — 2 pilules, 1 cuillerée à café de *solution*, matin, midi et soir, avant les repas.

Indications. — Ménopause, Dysménorrhées douloureuses, Varices et Hémorroïdes, Hypertension, Bourdonnements d'oreilles.

Laboratoires LICARDY

38, Boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS

Téléphone : Maillot 17-75.

HÉMOFIXINE BRANCHU

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Nucléinate de manganèse. Lécithine de l'œuf. Oxyhémoglobine. Méthylarsinate de soude. Quassin. Zymases.

Propriétés therap. — Reconstituant. Régénérateur des globules sanguins et des éléments protoplasmiques.

Indications. — Etats anémiques. Chlorose. Convalescences. Surmenage intellectuel et physique. Neurasthénie. Phosphaturie. Diabète. Bacillose.

Posologie :

Adolescents	{	1 comprimé à midi	}	au
		1 — le soir		milieu
Adultes	{	2 comprimés à mi j	}	des
		2 — le soir		repas

Pendant 20 jours par mois. Se reposer 10 jours ayant de reprendre le traitement.

Prix : 12 francs

Laboratoires BRANCHU

4, rue Beaurepaire — PARIS (X^e)

HÉMOGÉNOL DAUSSE

Sérum hémopoïétique de cheval.

Formes. — Ampoules d'Hémogénol contenant 10 cc. d sérum liquide.

Sirop d'Hémogénol à base de sérum hémopoïétique.

Dragées d'Hémogénol contenant chacune 0 gr. 15 de sérum hémopoïétique desséché, enrobé dans le gluten.

Indications. — Tous les états d'adynamie et toutes les cachexies. Puissant stimulant de l'hémopoïèse, particulièrement indiqué dans le traitement des anémies. Hémostatique énergique recommandé dans les affections hémorragiques et l'hémophilie.

Mode d'emploi. — Ampoules d'Hémogénol. — 1 à 3 ampoules par jour prises par la bouche dans un peu d'eau sucrée ou en lavements.

Dragées d'Hémogénol. — Avaler, sans croquer, 4 à 6 dragées par jour.

Sirop d'Hémogénol. — Enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour. — Adultes : 3 cuillerées à soupe par jour.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Abriot, Paris (IV^e).

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE TOTALE

Médication rationnelle des
syndrômes anémiques

Nature. — Le sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine contient :

- 1° Une hémoglobine vivante, préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique ;
 - 2° Les substances minimales globulaires intactes ;
 - 3° Les substances minimales du plasma (Hémo-poïétines, cytopoïétines) non altérées.
- Ces éléments sont incorporés à un excipient dosé avec soin, sorte de sérum aseptique où leur vitalité persiste.

Action.

- 1° Apport d'hémoglobine vivante (fer globulaire).
- 2° Stimulation prudente des organes hémo-poïétiques (Hémocytopoïétines).
- 3° Puissante action tonique par les substances minimales : globulaires et plasmatiques.

Indications :

Anémies.
Chlorose.
Déchéances organiques.
Tuberculose.
Convalescences.
Grossesses.
Suites de couches.
Paludisme.

Posologie. — Une cuillerée à potage au début ou à la fin des 2 principaux repas.

Doubler dans les cas graves.

Pas de contre-indications.

Littérature. Echantillons.

DESCHIENS

Docteur en Pharmacie

9, rue Paul-Ba dry — PARIS (VIII^e)

HÉMOLUOL

Régulateur du système neuro-végétatif et des troubles de la circulation veineuse et génitale.

Composition. — Quinquina, condurango, hamamelis et viburnum. Extraits de choix, combinés judicieusement sans perte de substances actives en un élixir agréable à prendre.

Indications. — Métrorragies, Troubles des fonctions menstruelles : aménorrhée, dysménorrhée, ménopause naturelle et opératoire, varices, hémorroïdes, congestion pelvienne.

Doses. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau avant ou après chaque repas, quinze jours par mois.

Laboratoires de l'HÉMOLUOL

16, rue Cantin — COURBEVOIE (Seine)

HEMOPAUSINE

Composition. — Liqueur à base de : Erydrastis, Viburnum, Hamamélis, Capsicum, Cinéraria, Sels de chaux, Gentiane, Écorce d'oranges amères.

Action. — Vaso-constriction veineuse, décongestive, hémostatique, circulatoire.

Indications. — Troubles de la ménopause et de la puberté, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, règles douloureuses.

Modes d'emploi. — Adultes : 1 à 3 verres à liqueur. Adolescents : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Laboratoire de l'HEMOPAUSINE

16, Rue du Petit-Musc — PARIS

HÉMOPECTAL

(Médication antihémorragique)

Forme pharmaceutique et composition. — Boîte de 3 flacons ampoules de formule :

Solution pectine stabilisée à 2 %.....	10 cc.
Chlorhydrophosphate de calcium.....	0.50
Solution titrée de genêt.....	0.20

(Pour 1 ampoule).

Avantages. — Produit très actif, s'employant par voie buccale, pas de contre-indication, pas de toxicité même pour le très jeune enfant, pas d'accidents sérieux, pas désagréable à absorber.

Indications thérapeutiques. — Toutes hémorragies (métrorragies, hémoptysies, hémorragies post-opératoires). A prescrire à titre *préventif avant et après* toute intervention sanglante.

Mode d'emploi. — 3 (enfants) à 6 (adolescents et adultes) flacons-ampoules par jour dans un peu d'eau sucrée ou gazeuse.

Prescription. — 1 boîte ampoules Hémopectal Falvy.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences, ex-interne lauréat des
Hôpitaux de Paris.
40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e)

HÉMO-PHAGOSTHYL

Phagosthyl ferrugineux
(pour adultes).

Formule :

Cacodylate de soude pur.....	20 centigr.
— de magnésie.....	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Fer colloïdal.....	2 centigr.
Soluté chloruré isotonique...	5 —

Indications :

Chloro-anémie, Anémies de toute origine, Asthénie, Troubles de la puberté, Douleurs périodiques, Surmenage, Convalescences, Leucémies.

Emploi :

Une injection intra-musculaire ou sous-cutanée tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse. Absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 c. c.

Prix au public : 20 fr.

Laboratoires Biologiques André PARIS
4, Rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

HÉMOSTYL du Dr ROUSSEL

Agent d'hémostase
(Voir en outre page suivante)

Sérum frais, hémopoïétique de cheval.

Action.

Hémostatique et Hyperleucocytaire général et local. Hémopoïétique.

Formes pharmaceutiques.

- 1° Boîte de six flacons-ampoules.
- 2° Boîte de quarante-cinq comprimés
- 3° Flacon de sirop.
- 4° Ovules : usage gynécologique.

Le sérum liquide (flac.-ampoules), seul, est hémostatique

Indications :

Syndromes toxi-hémorragiques, hémophilie. Hémorragies (hémoptysies, entérorragies, métrorragies, etc.). Plaies saignantes.

Posologie dans les hémorragies.

Dans les cas aigus : injection de 30 cc. (technique du sérum antidiphthérique).
Dans tous les autres cas : ingestion ou mieux lavement de trois flacons-ampoules. Utiliser, en outre si possible, l'application locale : tamponnements (métrorragies, épistaxis, etc.).

Littérature et échantillons :

Laboratoire de l'HÉMOSTYL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI°)

Téléphone : Littré 68-22, 23, 24.

R. C. 48.000

HÉMOSTYL du D^r ROUSSEL

Agent d'hémopoïèse

Sérum *hémopoïétique* frais de cheval, c'est-à-dire recueilli sur un animal mis, par une saignée préalable, en pleine crise de régénération hématique.

Action. — 1° Hémopoïétique spécifique (Prof. Carnot, Acad. des Sciences 1906) ; 2° Tous les autres emplois du sérum de cheval : Hémostatique, Hyperleucocytaire général et local.

Formes phar. — 1° Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. de sérum pur ; 2° Boîte de 45 comprimés de Sang hémopoïétique total desséché ; 3° Flacon de trois cents grammes de Sirop de Sang hémopoïétique total ; 4° Ovules.

Indications et posologie dans les Anémies. — Toutes les Anémies, quelle qu'en soit la nature, Convalescences, Tuberculose, Paludisme, Suites opératoires et Obstétricales, etc.

Mode d'emploi. — Un ou deux flacons-ampoules de 10 cc. par jour, en ingestion ou lavement, ou 6 à 8 comprimés, ou 2 à 3 cuillerées à potage de Sirop.

Enfants demi-dose.

Littérature et Échantillons :

Laboratoire de l'HÉMOSTYL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e)

Téléphone : Littré 68-22, 23, 24.

R. C. 18.000

HÉMOTONINE

Complexe de Fer-Strychnine, arsenic et phosphore organique.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique sanguin complet.

Indications. — Tous les états anémiques, Convalescence, Asthénie, toutes causes de déchéance organique.

Forme. — Ampoules.

Posologie. — 1 ampoule par jour, par séries de 12 ; injections intra-musculaires profondes.

Injection absolument indolore.

Établissements A. BUISSON,
F. JALOT et C^{ie}

157, rue de Sèvres — PARIS (XV^e)

HÉMYPNAL CIBA

Analgésique obstétrical et urinaire.

Trichloro-butylalcoool-diallylmalonylurate d'éthylmorphine. Analgésique particulièrement propre à atténuer considérablement les douleurs de l'accouchement, sans aucun danger ni pour la mère ni pour l'enfant. Utilisable également pour les petites interventions gynécologiques ou urologiques.

Trois formes : *Cachets, Suppositoires, Ampoules.*

Indic. — Accouchements douloureux (rigidité du col, hypertonie utérine). Curettages, cystoscopies. Cathétérismes, prostactectomies.

Doses. — Pour un accouchement : 2 à 4 suppositoires, 1 à 3 ampoules. Interventions : 1 à 2 cachets ou suppositoires dans l'heure qui précède : 2 à 4 suppositoires par 24 heures après l'opération.

Le tube de 10 cachets.	} 20 francs.
La boîte de 4 suppositoires.	
La boîte de 4 ampoules.	

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

HÉPARMONE

Traitement des Anémies
(méthode de Whipple)

Composition. — Hormone hépatique purifiée, présentée en ampoules de 10 cc. (boîte de 6 et 12 ampoules). *Chaque ampoule correspond à l'activité de 125 gr. de foie frais.*

Indications thérapeutiques. — L'Héparmone trouve son emploi non seulement dans l'anémie pernicieuse cryptogénique, mais encore *dans toutes les anémies* où la méthode de Whipple est indiquée.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 ampoules par jour. *Enfants* : 1 ampoule par jour, à prendre dans une demi-tasse de bouillon tiède ou même d'eau légèrement tiède, une demi-heure avant les repas.

Les Établissements BYLA,
26, avenue de l'Observatoire — PARIS
R. C. Seine 71 895.

HÉPATO-BYL

Opothérapies entérique, hépatique et biliaire
en ovoïdes glutinisés.

Dose. — 4 à 8 ovoïdes par jour, en trois fois, dix minutes avant les repas, avec un demi-verre d'eau, ou le soir, la dose complète en une seule fois avant de se coucher.

Propriétés. — L'extrait biliaire seul est thérapeutiquement insuffisant. Aussi le Corps Médical prescrit de préférence l'extrait total de la glande hépatique (bile et foie) additionné d'extrait intestinal, dans la Constipation, l'Entérocolite et toutes les Affections du foie.

Médication sans similaires.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, rue de la Source, PARIS — (XVI^e)

Tél. Aut. 11.86

HÉPATOLAX

Composition. — Association des opothérapies hépatique et biliaire (extrait de foie, extrait de bile) aux végétaux cholagogues (extraits de boldo, de combretum et de podophylle).

Indications. — Toutes les affections du foie : Ictères, Insuffisance hépatique, Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Cirrhoses atrophiques (augmentation de la diurèse, diminution de l'ascite, atténuation des troubles délirants), Cirrhoses hypertrophiques (diminution de grosseur du foie et de la rate, disparition de l'ictère), Foie cardiaque, Syphilis du foie (acquise ou héréditaire), Maladies des pays chauds.

Forme et posologie. — Comprimés vernis solubles dans l'intestin. 5 par jour (un le matin, deux à midi, deux le soir) avec une gorgée d'eau, 10 minutes avant les repas.

Prix : 15 fr.

E. GAUCHON, Docteur en Pharmacie
83, Boulevard de La Villette — PARIS (X^e)

HÉPATOSODINE

Composition. — Bicarbonate, Phosphate, Sulfate de soude sec, Citrate. Benzoate de soude, Hexaméthylène — Tétramine.

Action. — Sur l'estomac, le foie, le sang, l'intestin.

Indications. — Insuffisance hépatorénale sous toutes ses formes, Angiocholécystites chroniques ou subaiguës. Congestion hépatique, Lithiase biliaire, Ictère, Hypotonie gastrique avec retard à l'évacuation. Constipation avec insuffisance biliaire. Désintoxication pré- ou post-opératoire.

Doses. — *Avant une opération :* Une cuillerée à café dans un verre d'eau au réveil, pendant les huit jours qui précèdent l'intervention.

Troubles gastriques : Une demi-cuillerée à café dans 100 gr. d'eau tiède, à jeun le matin, et le soir à dix-huit heures.

Troubles hépatiques : Une demi-cuillerée à café dans un verre d'eau le matin à jeun, 10 jours chaque mois.

Constipation : Une à trois cuillerées à café dans un verre d'eau au réveil.

Prix : 12 fr.

Laboratoires DURET et RÉMY
ASNIÈRES (Seine)

HÉPATOZYL

Traitement opothérapique
des Fonctions hépatiques.

Composition. — Boldine cristallisée, Hépatine, Extrait Combretum, Fiel de bœuf, Rhamnus purshiana, Rhamnus frangula.

Indications. — Constipation, Entérocolite, Coliques hépatiques, Cirrhoses et Précirrhoses, Ictère, Affections d'origine colonicale.

Forme. — Pilules à enrobage gluten.

Dose :

4 à 8 par jour aux principaux repas.

Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie Médicale.
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE

HÉPATROL

extrait hydro-soluble de foie de veau,

Traitement de Whipple
sans contre-indications, adultes et enfants.

Formes thérapeutiques. — Ampoules
buvables non injectables.

Adultes : 1 ampoule 10 cc. = 125 gr. Foie
(Boîte de 6 ampoules).

Enfants : 1 ampoule 2 cc. = 25 gr. Foie
(Boîte de 12 ampoules).

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour.

Indications thérapeutiques. — Anémies graves. Dans les anémies légères, prescrire : Hépaphos.

Laboratoires A. ROLLAND
31, rue des Francs-Bourgeois
PARIS (IV^e)

HÉRACLÉOL

(Héraclès-Hercule).

Nucléi-arrhénocalcium (procédé Elzévir). Fixe le calcium organique. Active l'hémopoïèse et la phagocytose. Nourrit la cellule nerveuse. Augmente l'appétit et le métabolisme basal. Augmente le coefficient respiratoire et l'assimilation des aliments.

Indications. — *Tuberculose, Rachitisme, Décalcifications, Anémie, Asthénie, Convalescence.*

Posologie :

Granulés Elixir : 2 à 4 cuillerées à café par jour
Enfants : dose moitié.

Ampoules : 1 ampoule sous-cutanée (indolore) tous les jours.

Adopté dans les hôpitaux et cliniques de Paris.
Littérature et échantillons au Corps médical.

Laboratoires H. SALLE

4, rue Elzévir, Paris (III^e)

HERGÉNOL

Coqueluche — Toux spasmodiques.

Composition. — Essences naturelles balsamiques et Carbures halogénés antispasmodiques.

Indication. — Sédatif antispasmodique.

Forme. — Ampoules scellées à briser sur un carré de flanelle et à maintenir en permanence à proximité des voies respiratoires.

Doses :

Bébés et Enfants : 1 le soir, au coucher.
1 le matin, au réveil (1 troisième si nécessaire).

Adultes : 3 à 4 p. r. jour, suivant besoin.
Adjuvant précieux de tout traitement interne.
Prix de vente : 15 fr. la boîte de 12 ampoules.

Laboratoires GROS

13, Place Delille — Clermont-Ferrand.

HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal

Composition. — Citroléate d'Hexaméthylènetétramine; Santatol pur et gluten.

Avantages. — Stabilisation de l'urotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogénèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

Emploi et doses. — *Cas aigus*: 6-12-15 globules par jour, à doses filées.

Cas chroniques: 6-8-10 globules par jour

Indications. — Cystites. Prostatites. Gonococcies. Bactériuries. Pyélites. Pyélonéphrites. Colibacilloses, etc. Phosphaturies. Urines ammoniacales. Coliques hépatiques et néphrétiques. Cholécystites. Diathèse urique. — Échantillons. Littérature. Dépôt — Paris: **Pharmacie P. LOISEAU**

7, Rue du Rocher — PARIS

Laboratoires CAMUSET

18, Rue Ernest-Rousselle — PARIS

HIPPOSARCINE ROY

Suc musculaire total exprimé à froid.

Provenant du cheval vigoureux et reposé.

Supérieur au suc musculaire des bovidés:

par sa plus grande richesse en Azote, en Glycogène, en Hémoglobine, en Phosphate et en Fer:

par l'absence totale de Bacilles tuberculeux, de Cysticerques du Tænia.

Assimilation parfaite.

Aucun inconvénient digestif.

Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades qui en retirent toujours grand profit.

Tuberculoses pulmonaires et chirurgicales. Tout état d'affaiblissement et de Consommation. Maladies de l'estomac et des intestins.

GIVAUDAN-LAVIROTTE

56 Chemin de Combe-Blanche — LYON

HIRUDINASE

Le premier produit spécialisé à base d'extrait de sangsues.

Indications. — Varices, Hémorroïdes, Acrocyanose, Œdèmes trophiques, Artérites aiguës et chroniques, Troubles de la ménopause, Artériosclérose, Phlébites.

Formule :

Extrait de sangsues (procédé spécial).

Iode-citrate de soude.

Extrait d'hypophyse.

Hamamélis-hydrastis, Marron d'Inde.

Extrait hépatique.

Présentations. — a. Dragées ; b. Suppositoires.

Mode d'emploi :

2 dragées au milieu de chacun des principaux repas. (Affections vasculaires).

Un suppositoire le soir au coucher (Hémorroïdes, Fissures anales, Proctites).

Laboratoires HOURQUET et VIENNE

144, rue du Temple — PARIS (III^e)

HISTOCALCINE

Composition. — Association de la médication arsénio-phosphorée (méthylarsinates et nucléinates), avec les sels calciques rendus assimilables (fluorure, hypophosphite et glycérophosphate adrénalinés et poudre d'os frais).

Indications. — Tuberculose pulmonaire, Pré-tuberculose, Bronchites chroniques, Affections dentaire et osseuse, Rachitisme, Lymphatisme, Affections nerveuses, Neurasthénie, Anémies, Croissance, Convalescence, Grossesse et Allaitement.

Forme et posologie. — Comprimés vernis solubles dans l'intestin : 5 par jour (1 le matin, 2 à midi, 2 le soir) avec une gorgée d'eau, 10 minutes avant les repas.

Enfants et adolescents : 1 à 4 par jour.

E. GAUCHON, docteur en pharmacie
83, boulevard de la Villette — PARIS (X^e)

HISTOGÉNOL

Puissant reconstituant général

Indications. — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc...

Formes. — Élixir, Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

Posologie. — *Adultes* : Une cuillerée élixir ou une mesure de granulé avant chaque repas ou un comprimé matin et soir ou une ampoule par jour.

Enfants : Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT

12, Rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

HOLOS

Opothérapie osseuse

Nature. — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moelle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

Indications. — Réminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une prompte reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

Posologie. — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants : se contenter d'une 1/2 mesure.

Littérature — Échantillons

DESCHENS, Docteur en Pharmacie

9, rue Paul-Baudry — PARIS

HOLOVARINE

Forme et composition. — Cachets dosés à 0 gr. 10 et 0 gr. 20 de poudre d'ovaire intégral. Odeur agréable. Assimilation facile.

Avantages. — Desséchée par un procédé nouveau qui, par sa rapidité, permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés. Contient tous les principes actifs de l'ovaire.

Indications. — Toutes les insuffisances ovariennes ; troubles de la puberté, de la ménopause, de la menstruation, de la grossesse, de la sécrétion lactée, stérilité, obésité.

Mode d'emploi. — Adultes : 1 à 2 cachets à 0 gr. 20 par jour.

Adolescentes : 1 à 2 cachets à 0 gr. 10 par jour. Cures successives de 5 à 10 jours.

Laboratoire de Thérapeutique générale

48. rue de la Procession — PARIS

HOPOGAN BOCQUILLON

Composé organo-minéral, à base de Peroxyde de Magnésium retraité pour l'emploi thérapeutique (interne).

Les Sels d'HOPOGAN-BOCQUILLON se désagrègent, entrent en réaction et agissent à volonté (suivant formes médicamenteuses), soit dans l'estomac, soit dans l'intestin, dont ils recouvrent et « tapissent » la paroi, à l'exemple d'un véritable pansement interne chargé de détruire par l'Oxygène et la Magnésie, les fermentations anormales et les acides gastro-intestinaux qu'ils transforment, par réaction lente, en produits d'élimination.

L'emploi de l'Hopogan assure : la désinfection la plus complète, la désintoxication et la vivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires normales.

Formes. — *Estomac* : comprimés, cachets. — *Intestin* : pilules kératinisées, gélacapsules, prise-bébé. — *Arthritisme* : Hopoganase.

Laboratoire des Peroxydes médicaux

12-18, Rue Lamartine — PARIS

HORMOBILINE

Laxatif opothérapique

Médicament héroïque et rationnel de la CONSTIPATION et des affections chroniques du gros intestin.

Composition. — Hormones cœco — appendiculaires et extraits biliaires sélectionnés.

Indications. — Constipation, colopathies, séquelles d'appendicectomie, entéro-colite muco-membraneuse, insuffisances biliaires, ictères, cholémies.

Avantages. — Ne provoque ni dégoût, ni accoutumance — est facilement absorbable et ne présente aucune contre-indication.

Posologie. — *Forme liquide* : 1 à 3 cuillerées à café, diluées dans un peu d'eau naturelle ou gazeuse (Saint-Galmier ou Couzan) avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Clystère : 4 cuillerées à café pour un litre d'eau bouillie.
Forme pilulaire : 2 à 4 pilules avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Echantillons et littérature

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e)

Tél. : Roquette 14-12

HORMOTONE

Composition. — Association des hormones excitantes extraites des glandes thyroïde, pituitaire, surrénales et génitales, exerçant une action directe sur le métabolisme et le processus menstruel.

Indications. — Neurasthénie, dépressions-troubles nerveux, troubles menstruels, insuffisance cardiaque, hypertension, etc.

Présentation. — Flacons de 25 et 50 tablettes.

Mode d'emploi. — une ou deux tablettes, trois fois par jour avant les repas.

G. W. CARNRICK CO.

20 Mt. Pleasant avenue Newark, N. J. U. S. A.

Agent pour la France : **DÉGÉCÉ**

7, rue Princesse — PARIS

Agent en Belgique :

Pharmacie Centrale de Belgique

2, rue du Téléphone. — BRUXELLES

HORMOVARINE BYLA

(Folliculine)

(en ampoules injectables).

Composition. — Folliculine, ou hormone ovarienne spécifique, physiologiquement titrée.

Propriétés thérapeutiques. — L'HORMOVARINE BYLA remplace la sécrétion interne de l'ovaire, supprime l'atrophie de l'utérus, régularise la croissance et rétablit le métabolisme de base.

Indications. — L'HORMOVARINE BYLA peut être utilisée dans tous les cas d'*hypo-fonctionnement ovarien* et donne des résultats très favorables dans l'aménorrhée, la dysménorrhée, l'hypoplasie utérine, les troubles de la ménopause, l'ovariectomie, la stérilité, l'obésité, etc..., et dans certains cas de diabète ovarien résistant à l'insuline.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les deux jours en injection lente, par voie intramusculaire (intra-fessière), avec les précautions d'usage.

Les Établissements BYLA,

26, avenue de l'Observatoire, Paris.

R. C. Seine 71895.

HUILE CROLAS

de Ricin, chimiquement pure

Obtenue par des procédés purement mécaniques, sans l'intervention d'aucun produit chimique.

Absolument sans saveur et sans odeur, ne contient cependant que de l'huile de Ricin.

Le purgatif par excellence des enfants et des personnes délicates.

En flacons spéciaux à bouchage hermétique de 15, 30, 45, 60 grammes et flacon provision de 250 grammes.

GIVAUDAN-LAVIROTTE

56, Chemin de Combe-Blanche — LYON

HUILE GALLINA

Lipoïdes des Galli résistants au Bacille de Koch, Morhuate d'Éthyle, Cinnamate de Benzyle.

Formes :

Ampoules de 5 c. c. (voie parentérale, tissus).

Indications :

Toutes les formes de la tuberculose viscérale.

Prix, 10 ampoules de 5 c. c. : 24 francs.

Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V^e)

HUILE GRISE ERCÉ

Constitution. — Huile grise de formule spéciale, complètement résorbable, sans huiles minérales.

Forme. — Ampoules-seringues auto-injectables.

Avantages : 1^o *Indolore*, neutralité absolue.

2^o Assimilation totale. *Résorption* rapide.

3^o *Dosage* absolument rigoureux.

Posologie. — 0.02 à 0.15 de Hg. complètement injecté.

**LABORATOIRES ROBERT
& CARRIÈRE**

37, rue de Bourgogne — PARIS

HUILES CHOLESTÉRINÉES DAUSSE

Association de la cholestérine à des stimulants diffusibles et à des médicaments antituberculeux éprouvés.

Traitement des états infectieux adynamiques et de la tuberculose pulmonaire.

Premier groupe,

Ampoules de 2 cc. ou de 5 cc.

- I. — Huile camphrée cholestérinée.
 II. — — — — — éthérée.
 III. — — — — — strychninée.
 IV. — — — — — éthérée strychninée,
 Posologie. — 1 ampoule de 2 cc. tous les 2 ou 3 jours ou de 5 cc. tous les 5 jours.

Deuxième groupe.

- I. — Chaulmoogra térébenthiné cholestériné.
 II. — — — — — gaulacolé cholestériné.
 Posologie. — Injection hypodermique ou intramusculaire d'une ampoule tous les 3 jours dans la tuberculose pulmonaire.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

HYDRALIN

antiseptique gynécologique

Composition. — Perborate de soude. Borate de Soude. Bicarbonate de Soude, Fluorure de Sodium. essences aromatiques.

Propriétés. — Est une source d'oxygène naissant. Donne une solution dialytique alcaline. Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

Indications. — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

Présentation. — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

Mode d'emploi. — Prescrire pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 sachets : 10 francs.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e)

Téléphone : Invalides 12-63

HYOSCYAMINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

Hyoscyamine Houdé. — Produit pur cristallisé, extrait de l'*Hyoscyamus Niger*.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, calmant, hypnotique, d'un emploi très répandu dans le traitement des séquelles de l'encéphalite léthargique où elle donne des résultats surprenants.

Produit stable, d'action certaine et constante.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 granules *pro die* ; les prendre avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

HYPERSAN

Médication hypotensive-diurétique

Composition. — Association d'extraits fluides de Gui, cratægus. Stigmates de maïs et cascara.

Action. — Le gui diminue la tension par action vasomotrice périphérique et action excitante sur la sécrétion rénale (Chevalier, Gaultier). Selon Leclerc, le Cratægus équilibre la pression sanguine en diminuant l'éréthisme vasculaire.

Indication. — L'hypertension sous toutes ses formes.

Doses. — XXV gouttes, 3 fois par jour.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

HYPOCHLORINE POURTAL

Composition. — Solution aqueuse d'hypochlorite de magnésium, au titre de 8 gr. de chlore actif par litre.

Action. — Antiseptique, désodorisant, cicatrisant.

N'irrite pas les tissus, indolorité absolue.

Indication. — Plaies, Angines, Hygiène de la femme, Gynécologie, Petite chirurgie.

Mode d'emploi. — 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau.

Crème Hypochlorine Pourtal :
cicatrisations de toutes plaies atones, brûlures, engelures, gerçures, ulcères même variqueux en consolidation.

Prix :

Flacon 1000 gr. : 15 fr. ; 250 gr. : 10 fr.
500 gr. : 3 fr. 50

Crème 50 gr. : 7 fr. 50 ; 25 gr. : 5 fr.

“ L'ANTISEPTIQUE ”

48, rue de Londres — PARIS

Tél. Central 68-82

R. C. Seine 374.586.

HYPOCHLORYL

Composition et Formes :

- 1° Liquide.** — Solution parfumée d'hypochlorite de soude, de borate de soude, de chlorure de sodium, de terpinol et d'eucalyptol ;
- 2° Poudre.** — Combinaison inaltérable et parfumée de Chloramine T stable, de carbonate de sodium, de sel de Perse, de terpinol et d'eucalyptol.

Avantages :

Antiseptique puissant, cytophylactique, non toxique, non caustique et non irritant. Légèrement parfumé.

Indications :

Hygiène sexuelle de l'homme et de la femme. Soins de la bouche et des dents. Traitement des plaies. Antisepsie générale. Accouchements. Stérilisation des eaux.

Posologie :

Liquide : *Injections vaginales :* 1 cuillerée à soupe par litre d'eau.

Injections uréthrales : à titre préventif, une cuillerée à soupe par litre d'eau. Pour traitement : prendre avis du médecin traitant.

Hygiène dentaire : une demi-cuillerée à café dans un grand verre d'eau.

Angines, affections buccales : une cuillerée à café dans un grand verre d'eau chaude.

Antisepsie générale : une cuillerée à soupe par litre d'eau.

Poudre. — La dose de poudre, contenue dans un étui métallique et dissoute dans un litre d'eau, correspond à une cuillerée à soupe de la solution mère indiquée ci-dessus.

Doses habituelles : une à quatre doses de poudre selon les cas (Consulter la notice placée dans la boîte).

La solution, à la dose d'emploi, n'oxyde pas les instruments.

Prix du flacon et de la boîte : 12 fr.

Laboratoires de L'HYPPOCHLORYL

7 bis, rue de Musset, Paris (XVI°)

HYRGANOL

Éthers éthyliques des acides gras
de l'huile de chaulmoogra.

L'absence d'effets irritants à l'égard des tissus
et des organes digestifs, permet d'adminis-
trer l'Hyrganol, soit en injections, soit par
la voie buccale.

Indications :

Traitement de la lèpre.

Posologie et mode d'emploi. — Voie intra-
musculaire, injections hebdomadaires à
doses progressive, de 1 à 6 cc. Voie buccale :
Capsules à 0 gr. 50 (sur prescription médi-
cal).

N. B. — L'Hyrganol iodé comporte l'addi-
tion de 0 gr. 50 p. 100 d'iode.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'expansion chimique,
8, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

ILOGLANDOL " ROCHE "

Solution aqueuse stérilisée des principes actifs des îlots de Langerhans.

un cc. = 15 unités.

Titrage conforme aux décisions prises par la Convention de Genève.

Activité correspondant à l'activité de l'étalon officiel de Londres.

Indications thérapeutiques.

Toutes celles de l'insulinothérapie.

Doses et modes d'emploi.

N. B. — Le médecin traitant est seul juge de la posologie et des modalités d'application de l'ILOGLANDOL " ROCHE ", car le traitement insulinién est toujours conditionné par l'état général (poids) du malade et par les examens systématiques répétés de son sang et de ses urines (glycosurie, glycémie, acidose, réserve alcaline du plasma).

Doses d'urgence (Coma diabétique).

Voie endoveineuse : 1/2 à 3 cc. en 1 fois, puis 1/2 à 1 cc. toutes les heures.

Voie intramusculaire : 2 à 4 cc. en 1 fois, puis 1 cc. toutes les heures.

En même temps : Sérum glucosé, sérum physiologique et bicarbonate de soude (par voies buccale, rectale, intramusculaire, endoveineuse) et tonocardiaques.

Doses habituelles (Tous autres cas).

Voie intramusculaire (intrafessière) : 2 cc. par jour (un quart d'heure à une demi-heure avant les repas pendant 21 jours).

En même temps : Chez les diabétiques, régime alimentaire aussi riche en hydrates de carbone, graisses et albuminoïdes, que le permettra l'état du malade.

Iloglandol " Roche "

Boîtes de 6 ampoules de 1 cc.

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges, Paris (III^e).

IMMUNIZOLS**Vaccins****I. Ampoules**

- 10. Furoneulose, Ostéomyélite.
- 11. Entérite, Appendicite.
- 13. Asthme, Asthme des foin.
- 15. Eczéma, Psoriasis.
- 16. Bronchites chroniques.
- 17. Rhumatismes.
- 18. Urétrites.
- 19. Acné.

II. Bouillon-Vaccins**A. — Non Gélésés.**

- 10. Furoneulose, Toutes staphylococcies.
- 24. Streptococcies.
- 25. Pneumococcies.
- 26. Colibacilloles.
- 31. Abscess chauds.
- 35. Ulcères variqueux.
- 36. Brûlures infectées.
- 41. Métrites.
- 50. Otites, Rhino-Pharyngites.

III. Hibévé —

Concentré polyvalent à diluer pour obtenir

IV. Comprimés

Avec pilules Adjuvantes de bile.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 10. Furoneulose-Ostéomyélite. | 22. Typhoïde. |
| 11. Entérite-Appendicite. | 31. Abscess, plaies infectées. |
| 13. Asthme, Asthme des foin. | 40. Cystites, Pyélonéphrites. |
| 15. Eczéma, Psoriasis. | 41. Métrites. |
| 18. Urétrites. | 70. Pyorrhée alvéolo-dentaire. |

44, rue de Cligny

GRÉMY

Microbiens

Injectables

- 22. Typhoïde.
- 23. Grippe.
- 31. Abscès chauds et froids, plaies suppurées.
- 34. Gangrène.
- 40. Cystites, Pyélonéphrites.
- 41. Métrites, Salpingites.
- 50. Otites, Sinusites, Rhino-Pharyngites.
- 70. Pyorrhée alvéolo-dentaire.

pour pansements

B. — Gélésés.

- 10. Furunculose et toutes staphylococcies.
- 31. Abscès chauds, Plaies infectées.
- 35. Ulcères variqueux.
- 36. Brûlures infectées.
- 41. Métrites. OVULES pour pansements Gynécologiques.

Bouillon-Vaccin.

$\frac{1}{2}$ litre de bouillon-vaccin normal.

V. Immuniperos

(Vaccins liquides pour vaccination buccale simple ou associée au bactériophage).

- 10. Furunculose.
- 11. Infection intestinale.
- 15. Dermatoses.
- 22. Fièvre typhoïde.

PARIS (IX^e).

B. C. S. 48.556.

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

Médications végétale et opothérapique associées.)

Composition.

Principes végétaux de l'Indhaméline Lejeune simple associés aux sucs glandulaires de: Hypophyse, ovaire, surrénale et thyroïde.

Indications.

Cette forme de l'Indhaméline Lejeune est plus particulièrement indiquée dans les troubles de la ménopause et de la puberté, dans les métrites, salpingites non suppurées, ovarites chroniques, sclérose utérine, etc.

Mode d'emploi.

20 à 30 gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Laboratoires A. LEJEUNE

142, Rue de Picpus — PARIS (XII^e)

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)

Composition. — Principes actifs d'Hamamelis, marron d'Inde, cornus virginiana, viburnum, anémone, séneçon, viscaria. (Acalphes et principes vitaux de la plante fraîche stabilisés).

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de la circulation générale. Décongestif par vasoconstriction périphérique. Analgésique par action sur les terminaisons nerveuses sensibles. Tonique vasculaire et sédatif utérin précieux dans la dysménorrhée. Décongestionnant ovarien, régulateur des menstrues.

Indications. — Troubles circulatoires, ménopause, varices, hémorroïdes.

Mode d'emploi. — 20 à 30 gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours p. mois).

LABORATOIRES A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — Paris (XII^e)

INHALATEUR "EXCELSIOR"

Inhalateur ordinaire comportant un récipient à essences à débit réglable.

Dans l'ancien système, les liquides volatils mis en masse dans l'eau chaude donnent au début une bouffée suffocante et s'épuisent rapidement.

Avec l'inhalateur *Excelsior*, l'essence distribuée goutte à goutte permet une inhalation régulière et active jusqu'à la fin.

A l'inverse des anciens systèmes, l'inhalateur *Excelsior* permet de graduer l'arrivée d'essences et l'augmenter à mesure que la muqueuse s'accoutume.

Il permet aussi l'arrêt de l'inhalation si le malade veut prendre un temps de repos.

Produits pour Inhalations

EUCALINHAL. — Inhalation à base d'Eucalyptus. Essence de Pin. Terpinol. benjoin.

Indic. thérap. — Rhinites, laryngites, sinusites, bronchites.

GOUDRINHAL. — Inhalation à base de Goudron de Norvège. Essences de lavande et de Thym.

Indic. thérap. — Affections rhino-pharyngites, bronchites chroniques.

SULFINHAL. — Inhalation à base de Mono Sulfure de Sodium et Engénol.

Indic. thérap. — Catarrhe rhino-pharyngé, rhinite atrophique.

Laboratoire « INHAL »

Directeur L. HÉRIN,

Pharmacien ex-interne des Hôpitaux.

Q.I.P. ☸ ✚ ☉,

228, rue de Lille — LA MADELEINE (Nord).

Adresser la correspondance :

98, rue Jeanné-Maillotte — La Madeleine (Nord).

INHALATION LANCOSME

Composition. — Essences naturelles à pouvoir antiseptique élevé (girofle, citron, thym, etc.) associées à la créosote de hêtre pure.

Forme. — Liquide.

Propriétés. — Aseptise la muqueuse de l'arbre trachéobronchique et des alvéoles pulmonaires, diminue les sécrétions et l'expectoration.

Indications. — Coryza. Rhinite. Ozenie. Laryngites aiguës et chroniques. Trachéite. Bronchite aiguë. Emphysème pulmonaire. Grippe. Tuberculose pulmonaire.

Contre-indications. — Tuberculose aiguë à forme éréthique avec tachycardie et dans les formes congestives et fébriles avec hémoptysies.

Emploi. — Avec un inhalateur; verser la valeur d'une cuillerée à café, goutte à goutte, dans l'eau chaude, mais non bouillante, deux à trois inhalations par jour.

LANCOSME

74 avenue Victor-Emmanuel-III, PARIS (VIII^e).

INHALO-BOL

Cornet pour inhalations

(en papier parcheminé),

Simple,

pratique,

bon marché.

Indications thérapeutiques :

Toutes affections bronchiques ou rhino-laryngologiques nécessitant une inhalation.

Prix : 5 fr.

Laboratoire de l'INHALO-BOL

32, rue de l'Ouest — PARIS

P. TAVERNIER, Dr en pharmacie.

INHALOL

Médication

des voies aériennes supérieures.

Composition. — Association d'essences volatiles (Isopropylmétacrésolmenthol et Cajeputol) sans alcool.

Action thérapeutique. — Antiseptique, anticongestif, analgésique.

Indications. — Coryzas, rhinites, pharyngites, laryngites, sinusites, trachéites, bronchites.

Mode d'emploi. — IV à V gouttes dans un verre d'eau bouillante en inhalations.

Prix : 12 francs.

Laboratoires BOUVELOT

62, rue d'Antibes, Cannes (A.-M.).

INHALONE

Inhalation *solide* à l'état pulvérulent.

Exempt d'alcool.

Formule : de conception inédite :

Cupressol, hydrure de naphthyle, essence de thym, géménol, benjoin.

Donne des résultats surprenants, dans tous les cas d'inflammation des muqueuses buccales et rhinopharyngiennes. Diminue rapidement l'intensité des quintes et leur fréquence, dans la coqueluche.

Modifie nettement les sécrétions nasales. N'irrite jamais, ne dessèche jamais les muqueuses. Jouit vis-à-vis d'elles de propriétés antiseptiques inégalables.

Prix : 11 fr. la boîte.

Echantillons et littérature sur demande.

AUX LABORATOIRES CH. DEHAY

58, rue Saint-Géry, Arras.

INHALO-SEL

Composition. — Comprimés pour inhalations à base de menthol et d'essences volatiles.

Avantages thérapeutiques. — Peu de menthol, pas d'alcool, donc pas d'irritation.

Indication thérapeutique. — Laryngites, bronchites, rhino-pharyngites, sinusites.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 comprimés dans un demi-bol d'eau bouillante en inhalation.

Laboratoire de l'Inhalo-Bol

32, rue de l'Ouest, Paris.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

INHALOXYL

Comprimés pour inhalations. Permet une inhalation complètement exempte d'alcool et pauvre en vapeur d'eau, sans menthol.

Composition. — Les essences ont été choisies en s'inspirant des travaux de Morel et Rochaix sur le pouvoir antiseptique de chacune d'elles vis-à-vis des différentes bactéries pathogènes.

Mode d'emploi. — Dans un demi-bol d'eau tiède, mettre un ou deux comprimés et respirer les gaz qui se dégagent entraînant les vapeurs antiseptiques.

Indications. — Coryza, Laryngites, trachéites, bronchites aiguës et chroniques.

Se fait aussi en huile pour instillations et pulvérisations.

Prix : 10 fr. 75.

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e)

INJECTION ET GOUTTES CLIN

Strychno-phospharsinées.

Composition. — Solution stable renfermant du glycérophosphate de soude, du cacodylate de soude et du sulfate de strychnine à différentes doses.

Cette préparation évite d'allier le glycérophosphate de soude au cacodylate de strychnine, le dosage de la strychnine dans cette association réduisant l'élément arsenical à une proportion trop faible pour lui conserver un rôle thérapeutique. Le cacodylate de strychnine est, en outre, un sel trop instable pour le faire figurer utilement dans une solution qu'on doit pouvoir stériliser et conserver. *L'injection Clin Strychno-Phospharsinée* possède effectivement l'avantage d'une action thérapeutique des trois composants.

Formes. — *L'injection Clin Strychno-Phospharsinée* est délivrée en boîtes de 6 ou 12 ampoules de 1, 2 et 5 cc.

Mode d'emploi et posologie. — L'injection pratiquée en plein muscle n'est pas douloureuse. L'injection sous-cutanée se montre plus souvent indolore. On injectera 1 centimètre cube soit le contenu d'une ampoule, chaque jour ou tous les deux jours selon l'indication et l'urgence.

GOUTTES :

Composition. — XX gouttes de cette formule correspondent à :

Glycérophosphate de soude	} aa 10 centigr.
— de potasse	

Métharsinate Clin.....	4 centigr.
------------------------	------------

Sulfate de strychnine	0 mmgr, 25
-----------------------------	------------

De V à XV gouttes deux fois par jour dans un peu d'eau, dix minutes avant les repas.

Laboratoires CLIN

PARIS

INOLÈNE

Solution concentrée de Coaltar de saveur agréable.

Propriétés. — Antiseptique puissant. Décongestionnant, cicatrisant rapide. Innocuité absolue. Réaction alcalines.

Indications. — Gingivites, stomatites, pharyngites, amygdalites, angines, abcès, fistules dentaires, soins post-opératoires. Hygiène de la bouche, soin de toutes les muqueuses, injection, pansements.

Mode d'emploi :

Lavages : 2 à 4 cuillerées à café par litre d'eau.

Gargarismes : Bains de bouche : XX à XXX gouttes dans un verre d'eau chaude.

Baignonnages : pur ou au demi.

Dentifrice : X à XX gouttes dans un verre d'eau.
Injectons, pansements : une cuillerée à café par litre d'eau.

Laboratoire ODILIA

E. LACOMBE, Pharmacien

2, rue Neuve-Popincourt, 2, Paris (XI^e)

INOTYOL DU D^r DEBAT

Principes actifs. — Sulfo-schistol. Lithol. Extrait distillé d'Hamamelis frais, hydroxyde ortho-titanique.

Indications. — Eczémas, Ulcères. Brûlures. Pruits et toutes lésions ou irritations de la peau.

Formes. — Pommades : 3 grandeurs :

Tube de 50 gr. 9 fr. 50

1/2 tube de 25 gr. 5 fr. 50

Quadruple tube de 200 gr. 25 fr.

Sauf indications spéciales, les pharmaciens délivrent le tube de 50 gr.

Poudre : Complète l'action de la pommade ; calme les érythèmes légers ; indiquée pour la toilette des nouveau-nés. La boîte poudreuse 5 fr. 50

Savon : Traitement de la Séborrhée, le pain, prix : 5 fr. 50

Laboratoires du D^r DEBAT

60, rue de Prony — PARIS (XVII^e).

INSULANOL

Pommade à l'Insulyl du Dr Roussel.

Mode d'action. — Agit en applications locales par l'Insuline qu'elle renferme, que les malades soient ou non diabétiques.

Indications. — 1° Ulcères variqueux et plaies atones ;
2° Prurits de toute nature ;
3° Hémorroïdes ;
4° Brûlures.

Mode d'emploi. — En onctions sur les parties malades.
Recouvrir les plaies d'un pansement aseptique.

Laboratoire des PROXYTASES

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e)

R. C. 18.000.

Téléph : Littré 68-22, 23, 24.

INSULINE

Voir **ENDOPANCRINE**

Page 259

Voir **POUDRE et POMMADE
D'INSULINE PHYLOZE**

Page 637

**Laboratoire
de Thérapeutique générale**

48, rue de la Procension — PARIS (XV^e)

INSULINE-BUCCALE FORNET

Principe actif :

Extrait des îlots de Langerhans du Pancréas.

Indications :

- 1° Le Diabète léger et ses complications.
- 2° L'Anorexie, la Dyspepsie, l'Athrepsie, l'Amaigrissement pathologique, les vomissements de grossesse.
- 3° Dysménorrhées, Malaise menstruel.

Posologie :

3 pilules 3 fois par jour, une demi-heure avant les repas.

Propriétés thérapeutiques :

Abaisse la glycosurie, diminue la polydipsie et la polyphagie, augmente la vitalité du diabétique.

Rend aux autres malades et aux convalescents l'appétit, les fait rapidement gagner en poids.

Service Commercial et

Échantillons :

Laboratoires Thaidelmo 23, Rue du Caire, Paris (II^e).

Informations scientifiques :

Echantillons médicaux et littérature

**INSTITUT DE MICROBIOLOGE
SARREBRUCK**

INSULINE BYLA

*Autorisée par l'Académie de Médecine.
Adoptée dans les hôpitaux.*

Purifiée, débarrassée des matières salines et protéiques de la glande.

Présentée sous deux formes injectables :

1^{re} *Insuline Byla* (poudre) soluble dans l'eau, enfermée dans des ampoules stériles de 15 unités internationales (enfants, 5 unités). Chaque ampoule est accompagnée d'une ampoule de 2 cc. sérum physiologique, dans laquelle on la fait dissoudre.

2^{de} *Insuline Byla liquid*, en flacon de 6 cc. soit 120 unités internationales. Chaque cc. = 20 unités.

Indications. — Traitement du diabète et de toutes ses manifestations.

Posologie. — 1 à 5 ampoule, ou 1 cc. à 6 cc. de solution, par jour, suivant avis du médecin.

Traitement des plaies atones :

Pommade à l'Insuline Byla

Poudre à l'Insuline Byla

L'*Insuline Byla* est titrée en unités internationales, conformément à la décision du Comité d'Hygiène de la Société des Nations.

Envoi sur demande de la notice détaillée,

Les Établissements BYLA,

26, avenue de l'Observatoire, Paris. — R. C. Seine 71895.

INSULINE ROGIER

Principe actif des îlots endocrines du pancréas isolé et unifié.

Forme. — Poudre soluble inaltérable conservée en ampoules stériles.

Titre. — Les ampoules d'INSULINE ROGIER se font en boîtes de 4 ampoules de 3 grandeurs :

Ampoules à 15 unités cliniques.

Ampoules à 30 unités cliniques.

Ampoules à 60 unités cliniques.

Ampoules à 15 unités. Chaque boîte d'INSULINE contient 4 ampoules de Solution isotonique de 1 cmc. de sorte que la solution, une fois effectuée, contient 15 unités par cmc.

Ampoules à 30 et à 60 unités. Chaque boîte d'INSULINE contient 4 ampoules de solution isotonique de 2 cmc. de sorte que la solution, une fois effectuée, contient 15 unités par cmc pour les ampoules à 30 unités et 30 unités par cmc pour les ampoules à 60 unités.

Indications. — Diabète et ses manifestations.

Posologie. — Doses variables selon les cas.

En moyenne 15 à 60 unités par jour. Dans le coma 200 à 300 unités et plus.

Nota Rene. — Voir « Levulose Rogier » et « Vitamine Rogier ».

Littérature sur demande

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie

56, boulevard Péreire — PARIS

INSULYL DU D^r ROUSSEL

Autorisé par l'Académie de Médecine.

Adopté dans les Hôpitaux.

Produit de la sécrétion interne du pancréas

Action. — Abaisse la glycémie, permet l'utilisation des hydrates de carbone ingérés.

Indications. — 1^o Diabète et ses complications ; 2^o Athrepsie des nourrissons ; 3^o Acidose ; 4^o Cure d'engraissement.

Forme. — Boîte de 10 ampoules de 1 cc. environ. Chaque ampoule renferme 20 unités.

Doses. — En moyenne une ampoule en injection intra-musculaire avant chaque repas. Il est nécessaire d'associer la cure diététique à la cure d'Insulyl.

Laboratoire des PROXYTASES

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e)

Téléph. : Littre 68-22, 23, 24.

INTRAIT DE DIGITALE DAUSSE

Préparation conservant intacts tous les principes actifs de la feuille fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). **Toni-cardiaque** à zone maniable très étendue.

Forme. — *Solution d'Intrait de Digitale Dausse*, correspondant comme posologie à la solution de digitaline au 1000° du Codex.

Ampoules d'Intrait de Digitale Dausse dosées à 25 mill. d'Intrait par cc. ; Ampoules de 2 cc.

Indications. — Tous les cas de défaillance cardiaque : *Asystolie*, troubles pulmonaires, *oedèmes*, *oligurie*. Action plus complète que celle de la digitale cristallisée et comparable à celle de la macération de poudre de digitale avec l'avantage d'un titrage rigoureux et constant.

Posologie. — **SOLUTION D'INTRAIT** : Dose d'entretien cardio-tonique : 5 gouttes par jour pendant une quinzaine. Dose anti-asystolique : XXV à L gouttes en une fois ou XX gouttes par jour pendant 3 ou 4 jours.

AMPOULES D'INTRAIT (0,05 d'intrait en 2 c.c.) : 1 à 2 ampoules en une seule dose par voie hypodermique, en cas d'urgence ou en cas d'intolérance gastrique de la digitale. 1 ampoule par voie intraveineuse en cas de collapsus cardiaque imminent.

INTRAIT DE GUI

Préparation conservant intacts tous les principes actifs de la plante fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*).

Médoicament, hypotenseur.

Forme. — *Solution d'Intrait de Gui* titrée à 0 gr. 10 d'intrait par cuillerée à café.

Indications. — *Hypertension artérielle*, artériosclérose, *hémoptysies congestives des tuberculeux*.

Posologie. — *Solution d'Intrait de Gui* : 2 à 3 cuillerées à café par jour ; maximum : 5 cuillerées à café dans les 24 heures.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, PARIS (IV^e).

INTRAIT DE MARRON D'INDE DAUSSE

Préparation conservant intact les principes actifs de la semence fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Vaso-constricteur veineux, spécifique des Hémorroïdes, varices, phlébites.

Forme. — *Solution d'Intrait de marron d'Inde*: X gouttes = 0 gr. 01 d'intrait.

Mode d'emploi. — **USAGE INTERNE**: V gouttes matin et soir de *solution d'Intrait de marron d'Inde Dausse*.

INTRAIT DE STROPHANTHUS

Préparation de *Strophanthus gratus* conservant intacts tous les principes actifs de la semence fraîche. (Stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Tonico-cardiaque puissant.

Formes. — *Solution d'Intrait de Strophanthus*: X gouttes renferment un milligr. d'intrait.

Ampoules d'Intrait de Strophanthus dosées à un milligr. d'intrait par cc.

Indications. — Dans tous les cas d'insuffisance cardiaque, chez les cardiaques vrais, chez les cardiopéniques et toutes les fois que la Digitale ne réussit pas.

Posologie. — **SOLUTION D'INTRAIT**. Dose d'entretien cardiotonique: V gouttes par jour pendant 15 jours.

Dose antiasystolique. — XX à XXX gouttes en une fois. **AMPOULES D'INTRAIT.** — Exclusivement par voie intramusculaire: 1/2 à 1 ampoule, en cas de collapsus cardiaque imminent.

INTRAIT DE VALÉRIANE DAUSSE

Préparation dépourvue d'odeur et conservant intacts les principes actifs de la racine fraîche; stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*.

**Antispasmodique,
sédatif du système nerveux.**

Forme. — *Solution d'Intrait de Valériane Dausse*.

Indications. — *Insomnie* d'origine nerveuse due à un excès d'excitabilité sensorielle ou cérébrale.

Névrosisme, irritabilité nerveuse, affections spasmodiques, dermatoses prurigineuses, choquée, tics, convulsions infantiles.

Posologie. — **SOLUTION D'INTRAIT DE VALÉRIANE**, 2 à 3 cuillerées à café par jour. Doubler la dose si nécessaire.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

IODA

Iode organique entièrement assimilable.

Composition. — Hexosane iodé ($C^6H^{10}O^6$)⁴⁰¹⁵; nouveau composé organique défini, stable, soluble dans l'eau, *assimilable seulement en milieu alcalin* (intestin).

Absolument inoffensif, parfaitement toléré, permet le *traitement iodé intensif sans iodisme*.

Indications. — Celles de l'iode et des iodures.

Posologie : Un comprimé correspond à :

2 centigrammes d'iode métalloïdique.

20 gouttes de teinture d'iode iourée Codex.

Doses quotidiennes à prendre aux repas :

Enfants : 1 à 4 comprimés selon l'âge.

Adultes : 4 à 10 comprimés et plus selon nécessité.

Prix en France : 12 francs.

Laboratoires A. CESBRON

63, rue de la Faisanderie - PARIS (XVI^e).

IODALOSE GALBRUN

Gouttes titrées renfermant cinq centig. d'iode par centim. cube. Première combinaison directe de l'iode avec la peptone. Communication au XIII^e Congrès international de médecine de Paris (1900).

Remplace Iodes et Iodures dans toutes leurs applications internes sans iodisme.

Arthritisme. — Goutte. — Rhumatisme. — Artério-sclérose. — Maladies du cœur et des vaisseaux. — Affections glandulaires. — Rachitisme. — Goitre. Fibrome. — Syphilis. — Obésité.

Pour les adultes : 20 à 60 gouttes par jour.

Pour les enfants : 5 à 20 gouttes par jour.

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e)

IODAMÉLIS LOGEAIS

Formule :

Véritable combinaison définie, en gouttes concentrées, d'*Hamamelidine* (extrait glyceriné total d'hamamélis sans alcool) et d'*Iodo-Iodure de Potassium* (forme la plus active de l'Iode thérapeutique.) Cette combinaison, découverte par M. Logeais, exalte considérablement l'activité pharmacodynamique du produit.

Propriétés :

Spécifique cardio-vasculaire total : par son *Hamamelidine*, chez les hypertendus veineux, cyanotiques, variqueux, par son *Iodo-Iodure de Potassium*, chez les artérioscléreux, uricémiques, hypervisqueux. L'Iodamélis diminue la viscosité sanguine, combat les stases, stimule le tissu lymphoïde, abaisse la tension artérielle, oxyde les toxines organiques, favorise la circulation en retour.

Indications :

Toutes les affections vasculaires, artérielles et veineuses : Arterio-sclérose, Piéthore des hypervisqueux, Cyanose des hypotendus, Obésité, Jambes en poteau, Varices, Hémorroïdes, Asthme, Emphyseme, Troubles circulatoires de la puberté et de la Ménopause.

Posologie :

50 gouttes = { 1 gr. KI.
d'Iodamélis. { 0 gr. 20 Hamamelidine.

Doses :

XXV gouttes aux deux principaux repas, dans un peu d'eau de Vichy, trois semaines par mois.
Tolérance parfaite, pas d'iodisme

Prix : un flacon = 1 mois de traitement = 15 fr.

Laboratoires J. LOGEAIS

22^{bis}, rue de Silly. — BOULOGNE-SUR-SEINE
près PARIS

Auteuil 40-15 — 40-16

IODARSENIC GUIRAUD ou GOUTTES PAIDOPHILES

du Docteur Guiraud

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux

Formule. — Solution stable au centième (procédé spécial) de triiodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

Indications. — Lymphatisme, Rachitisme, Scrofuleuse, Emphysème, Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathie, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impetigo, Psoriasis, Urticaire...) Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

Posologie. — Enf. de 6 mois à 2 ans 2 à 10 gouttes par jour

— 2 ans à 8 ans 4 à 20 —

— 8 ans à 15 ans 4 à 30 —

Adultes 10 à 40 —

à prendre en se conformant à la notice, dans un peu d'eau ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

Présentation. — Flacon compte-gouttes 45 gr.

Échantillons et littérature.

Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). — Tél. Marc. 37-98

IODASEPTINE CORTIAL

Composition. — Iodobenzométhylformine, corps cristallisé, contenant 42 % d'iode, très soluble dans l'eau, dialysable, injectable par voie intraveineuse ou intramusculaire, sans réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

Prop. Thérap. — Dérivées de la nature de ses composants; Iode et antiseptiques (Formol de l'Hexaméthylène tétramine et groupe Phényl des corps benzoylés). Antiseptique général des infections chroniques ou parasitaires: Rhumatismes, Tuberculose (jamais d'hémoptysies), Adénopathies, Paludisme, Spirillose,

Prép. Pharm. Posol. — Ampoules: Solution au 1/10: A, 2 cc., B, 5 cc., C, 10 cc., par voie intraveineuse ou intramusculaire à doses progressives.

Tuberculose: (doses faibles) 2 à 5 cc.

Rhumatismes chroniques (doses fortes) 5 à 20 et même 25 cc. pro-die. Gouttes: 1 cgt. d'Iodaseptine par goutte, XX à C par jour (Enfants X à XXX).

Laboratoires CORTIAL

15, Boulevard Pasteur — PARIS

IODÉINE MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

Propriétés. — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique ; facilite l'expectoration.

Indications. — Toux, Emphysème, Asthme.

Formes pharmaceutiques :

Sirup. — 0,03 cgr. d'Iodéine par cuillerée à soupe.

Dose : 1 à 3 cuillerées par jour.

Gouttes. — X gouttes = 0,01 cgr d'Iodéine crist.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Pilules. — 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

Ampoules (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour.

Laboratoire MONTAGU

49 Boulevard de Port-Royal — PARIS

IODENTÉROL

Iode métalloïdique et iodure de potassium en *solution* alcoolique, et *poudre* iodophile (substances amylacées et calcifiantes) assurant : 1° la tolérance par suite de l'iode pur par la voie stomacale ; 2° la calcification simultanée de l'organisme.

Indications. — Toutes les manifestations de la bacilliose extra-viscérale : adénopathies, synovites, ostéites, etc...

Formes et doses. — *Gouttes* administrées par la voie entérale ou digestive, selon un régime progressif jusqu'à quantités massives.

Prix n° 1 : 20 francs. — N° 2 : 28 francs.

Établissements GALLINA

4, rue Candolle, Paris (V^e).

IODE ORGANIQUE BOISSY

(C⁶ H¹² N⁴ - C² H² I)

Comprimés de 10 centigrs, glutinifiés et dragéifiés.

Propriétés. — L'*Iode organique Boissy* (Iodéthylhexaméthylène-tétramine) est un corps cristallisé, blanc, renfermant 43% d'iode. Très soluble dans l'eau, il donne des solutions neutres, incolores, très dialysables. Ne provoque jamais d'iodisme. Se dissocie dans l'organisme avec mise en liberté d'*iode naissant*, puissamment *antitoxique* et *antiseptique*. Abaisse la tension artérielle et provoque une diurèse surtout manifeste au début de son emploi.

Indications. — Plus actif que l'iode et les iodures les remplace avec avantage. Particulièrement efficace contre l'Hypertension, Angine de poitrine, Artériosclérose, Asthme, Emphyseme, Rhumatisme, Goutte, etc.

Doses moyennes. — 2 à 8 comprimés par jour.

Laboratoire BOISSY

49, rue Hoche, COURBEVOIE près, Paris.

IODEX

Iodex simple. — Pommade renfermant 5 % d'iode éminemment absorbable. Excellent résolutif, exempt d'iodures alcalins et de substances irritantes. Ses principales indications : adénopathies, oreillons, goitres, impétigos, tricophyties, furoncles, petites plaies.

Iodex au Salicylate de Méthyle. — Iodex combiné à 5 % de salicylate de méthyle. Analgésique et résolutif. Préconisé dans les douleurs articulaires, rhumatismes scarlatins, pleurites, points de côté, entorses.

Iodex liquide. — Formule non irritante d'iode à 2 % pour la médication externe. Efficacité et sécurité en oto-rhino-laryngologie (pulvérisations ou badigeonnages), en gynécologie (tamponnements vaginaux, instillations intra-utérines), et en chirurgie (pansements des plaies opératoires, brûlures).

Échantillon et Littérature :

Laboratoires RISSA

46, rue Claude-Lorrain, LILLE.

IODHÉMA

Iodo-alcoylate-méthyle-benzyle d'hexaméthylène tétramine, en solutions aqueuses (43% d'iode assimilable).

Indications :

Toutes les formes du rhumatisme chronique.

Formes :

- 1^o *Ampoules* de 5cc. (16 fr.) et de 10cc. (30 fr.) : 1 ou 2 par jour (veines et tissus), en boîtes de 10 ;
- 2^o *Flacons* (30 fr.) (voie entérale ou digestive). 1 ou 2 cuillerées à café par jour dans de l'eau sucrée, entre les repas.

Mêmes présentation pour :

- 1^o *Iodhéma M* (Méthyle pur) indiqué dans la goutte aiguë et chronique (14 et 28 francs) ;
- 2^o *Iodhéma B* (Benzyle pur) utilisé dans les infections urinaires et hépatiques (20 et 35 francs).

Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V^e)

IODINE MEDOL

Pommade pour pansement : désinfecte et guérit les plaies, les coupures, les brûlures et toutes les affections de la peau.

Composition. — Les principes actifs de l'*Iodine Medol* sont l'*Iode* et la *Creatine* dans un excipient spécial miscible aux sécrétions en donnant une émulsion qui pénètre dans la peau et atteint les tissus profonds.

Indications. — Traitement de toutes les dermatoses et pansement de toutes les plaies.

Présentation. — En tube d'étain.

Prix : 8 fr.

**LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES
WILLIAM PEARSON**

5, rue Clauzel, Paris (IX^e)

iodo-BISMUTH ERCÉ

Iodo-bismuthate de quinine

Forme. — Ampoules-seringues auto-injectables, pour injections intra-musculaires.

Avantages sur les préparations analogues.

- 1° Trois fois *moins* d'excipient à injecter.
- 2° Suspension *stable* permettant d'éviter une agitation longue et pénible.
- 3° Suppression du transvasement toujours difficile d'une suspension huileuse.
- 4° *Résorption parfaite.*

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes.

Laboratoires ROBERT & CARRIÈRE

37. rue de Bourgogne — PARIS

iodo-BISMUTHATE DE QUININE FRAISSE

Composition :

Iodo-Bismuthate de Quinine : 0 gr. 20 ;
huile d'olive : 4 cm³.

Indications :

Dans toutes les formes de la syphilis.

Traitement ordinaire 30 à 35 ampoules, dont une tous les trois jours.

Prix de la boîte de 6 ampoules :

16 francs.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin, 8 — PARIS

IODOGÉNOL PÉPIN

Peptone iodée spéciale.

Gouttes titrées. Supérieur à tous les produits similaires, aux iodures métalliques et aux vins et sirops iodés.

S'en différencie par : 1° L'absence d'acide iodhydrique libre; 2° La grande stabilité des iodures organiques et la nature de leurs bases; 3° La très grande proportion d'iode substitué (25 %) de l'iode total au lieu de 0 à 8 %; 4° La très grande activité pharmacodynamique de l'iode sous cette forme.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Les études clinique et physico-chimique montrent que c'est la meilleure forme d'administration de l'iode et des iodures.

Posologie. — Enfants : 10 à 30 gouttes par jour; adultes : 40 à 60 gouttes par jour, dans un peu d'eau, aux repas; en 2 fois. (Syphilis : 100 à 120 gouttes par jour.)

Laboratoires PÉPIN et LEBOUcq

à COURBEVOIE (Seine)

iodo-MAISINE

Globules.

Combinaison directe de l'Iode et d'une Albumine d'origine strictement végétale.

Propriétés particulières :

Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète de l'iodisme. Aucune désagrégation dans l'estomac. Action directe par voie intestinale sur les organes hématopoïétiques.

Indications :

Maladies infectieuses, tuberculose, affections parasitaires, syphilis, affections cardio-vasculaires, artériosclérose, arthritisme, obésité, carence organique d'iode, tumeurs, insuffisance thyroïdienne, goîtres, asthme, emphyseme, engorgements ganglionnaires, lymphatisme, rhumatisme, goutte. Puissant adjuvant des médications reminéralisantes.

Posologie :

Chaque globule contient un cgr. d'iode actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme d'iodure alcalin. *Enfants* : 4 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 10 globules et au delà par jour. en deux fois, avant les repas.

iodo-MAISINE

Pommade.

Iodo-Maisine incorporée à un excipient spécial totalement exempt de vaseline ou de lanoline inabsorbables.

Propriétés particulières :

Pénétration intradermique complète. Teneur élevée en principe iodé actif. Absence de toxicité. Suppression de l'iodisme et de l'irritation locale. Efficacité 15 à 20 fois plus grande qu'une pommade iodée ou iodurée au même titre. Aucune coloration des téguments.

Indications :

Adénites, engorgements glandulaires, goîtres, sporothricoses, arthrites, lymphangites, ostéites, dermatoses sèches, eczémas secs, psoriasis, affections rhino-pharyngiennes. Toutes affections justiciables d'un traitement iodé ou ioduré local.

Mode d'emploi :

Frictions (ou onctions) matin et soir sur la région choisie pendant deux à trois minutes jusqu'à absorption complète. Aucun pansement consécutif.

L'Iodo-Maisine pommade est présentée en tube. Une section de deux centimètres de longueur sortant du tube correspond à un centigramme d'iode complètement assimilable.

Laboratoires de l'iodo-MAISINE

J SOUDAN, pharmacien ex-interne des hôpitaux de Paris
6, rue Rosenwald — PARIS (XV^e)

IODOMÉTINE

Solution concentrée et titrée d'iodhydrate d'hexaméthylène tétramine.

Combinaison organique d'iode soluble et assimilable, 5 gouttes représentent 1 centigramme d'iode ; 20 gouttes agissent comme 1 gramme d'iodure alcalin.

Propriétés thérapeutiques. — Excitateur puissant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense. Agent antiinfectieux énergique par son radical hexaméthylène tétramine.

Indications. — Toutes affections glandulaires. Adénites. Végétations adénoïdes. Scrofulides, etc. Maladies de la nutrition. Goutte. Rhumatismes chroniques. Sciatique. Asthme. Emphysème, etc.

Posologie. — *Adultes* : 20 à 60 gouttes par jour.
Enfants : 5 à 20 gouttes par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire E. HAUTDIDIER

37, rue Galilée, PARIS (XVI^e).

IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone de viande de bœuf.

Gouttes : dont 20 = 1 gr. d'iodure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — 10 à 40 gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson.

Prop. thérap. — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

Indications. — Maladies par ralentissement de la nutrition ; artério-sclérose ; obésité ; polyurie ; dégénérescence graisseuse ; intoxications chroniques ; asthme ; emphysème rhumatisme ; arthritisme ; goutte ; tertiarisme.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

IODONUCLÉOL

Iode organique soluble (orthoïodo-benzoate de soude).

Forme. — Gouttes.

O leur et saveur agréables. Pas de manifestation d'iodisme.

Indications. — Hypertension, Artériosclérose, Emphyseme, Asthme, Obésité, Arérites, etc.

Doses. — XX gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau, 2 ou 3 fois par jour.

Laboratoire P. MAUCHANT

14, rue de Birague — PARIS (IV^e)

IODOSTARINE "ROCHE"

Acide diiodo 6-7 élaïdique ou tariïque diode du Professeur Arnaud (Communication à l'Académie des Sciences, Paris, CXLIX, page 22), 47,56 % d'iode organique complètement assimilable, sans aucune saveur. Absorbe seulement dans l'intestin.

Indic. Thér.:

Remplace KI aux mêmes doses.

Pharmacologie et mode d'emploi:

Iodostarine "Roche" cachets, dosés à 0,25 cgr. Adultes : 1 à 4 par jour, selon les cas.

Iodostarine "Roche" comprimés, dosés à 0,125 mgr. Adultes : 2 à 8 par jour, selon les cas ; Enfants : 1 à 4 par jour, selon l'âge. Les comprimés peuvent être absorbés très facilement avec un peu de liquide (eau, vin, thé ou café), au choix du malade.

Iodostarine "Roche" granulé, dosé à 0,25 cgr. par mesure (intérieur de la capsule en aluminium). Adultes : 1 à 4 mesures par jour, selon les cas ; Enfants : 1/2 à 2 mesures par jour, selon l'âge.

Toutes ces préparations sont d'une blancheur immaculée.

N. B. — On prend l'Iodostarine "Roche" de préférence à la fin des repas.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, Place des Vosges — PARIS

IDO-THYROÏDINE CATILLON

Forme:

Tablettes de Catillon à 0,25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

Indications:

Obésité, Goitre, Myxœdème, Dermatoses.

Doses:

1 à 2 contre Myxœdème; 2 à 8 contre Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse.

Laboratoire CATILLON

3, Boulevard Saint-Martin — PARIS

IDO-VITASINE

Iodo-protéine à formule organique nettement définie. Attaquée en milieu *intestinal* par la *trypsine* (digestion). Libère son iode naissant seulement à ce niveau. Pas de troubles gastriques, pas d'iodisme (iode naissant à dégagement constant mais *non brutal*).

Avantages de l'iode et des iodures sans leurs inconvénients. Cinq fois plus actifs.

Posologie. — 1° Solution: XX à XXX gouttes par jour;

2° Pilules: 4 à 8 par jour.

Enfants: dose moitié.

Ces doses peuvent être augmentées.

Pommade à l'Iodo-Vitasine (antiseptique et ne tachant pas le linge).

Echantillon et littérature au Corps médical.

Laboratoires H. SALLE

4, rue Elzévir — PARIS (III^e).

IODURASE

Description. — Capsules kératinisées contenant :

Iodure de potassium pur.....	0 gr. 50
Levurine extractive.....	0 gr. 10

Action thérapeutique. — La même que celle de l'iodure, mais sans iodisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facilité d'absorption.

Indications. — 4 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphysème, l'arthritisme, la syphilis, le goitre, l'obésité, le saturnisme.

Laboratoires Ch. COUTURIER

18, Avenue Hoche — PARIS

IODURES PACHAUT

chimiquement purs

Tubes dosés d'Iodure de potassium à faire dissoudre au moment de l'emploi. — Conservation parfaite.

Présentation :

Tubes dosés à 0 gr. 25, 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr.

Laboratoires PACHAUT

130, Bd Haussmann — PARIS

IODURE PHILIPPE

Forme. — En *pilules kératinisées* : elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*

Prière de prescrire :

Pilules Philippe à l'iodure de potassium { à 0,50
à 0,20
à 0,10

Sans indication spéciale, ce sont les **Pilules Philippe** à 0,20 centigr. d'iodure qui sont délivrées.

Pilules Philippe à l'iodure de sodium à 0,20.

Indications. — Artério-sclérose, Adénopathies, Tension artérielle, Goitre. Obésité, Syphilis, etc.

Dose. — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour, en deux ou trois fois.

Prix au public : 12 fr.

Littérature et Echantillons

Laboratoire du Docteur H. PHILIPPE

14, rue Palais Grillet — LYON

IONYL

Médication bio-énergétique complète pour adultes et vieillards.

Composition :

Complexes phospho-marins, Acide phosphorique physiologique, Magnésium et Manganèse glycéro-phosphoriques activés et vitalisés par solution et combinaison en milieu marin.

Action thérapeutiques et Indications :

- 1° Stimulant, réparateur et neurotonique (surmenage physique et intellectuel, Asthénies, Dépressions fonctionnelles, Usure sénile).
- 2° Oxydant et modificateur de la nutrition (Troubles alcalosiques, Arthritisme, Phosphaturie, Scléroses, Anoxémie).

Action immédiate. Innocuité absolue.

Posologie :

XX gouttes (dose moyenne) au milieu des repas, dans un demi-verre d'eau ou de vin.

Littérature et échantillons gratuits.

Laboratoires LA BIOMARINE

DIEPPE (Seine-Inférieure)

IPECA-DIGITALE DAUSSE

Traitement des Hémoptysies
(voie intraveineuse)

Ampoules injectables de 1 cc., correspondant à 0 gr. 20 de poudre d'ipéca titrée et à 25 milligr. d'intrait de digitale.

Action rapide, en injection intraveineuse, sur les hémoptysies tuberculeuses graves.

Mode d'emploi. — Dès le début d'une hémoptysie grave, ou après échec des autres traitements, injecter dans les veines, chaque jour tant que dure l'hémorragie, 1 cc. d'ipéca-digitale Dausse. Dans les cas rebelles ou dans les hémoptysies abondantes, on injectera 2 cc. (soit 2 ampoules). On peut poursuivre cette médication pendant une dizaine de jours sans inconvénient (M. Piéry et A. Michel).

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

L'IRRADIOL

Actinothérapie associée aux Sels organiques vitalisés.

Formes. — Poudre d'un goût agréable, en sachets spéciaux.

Composition. — Vitamines obtenues par irradiation ultra-violet de Phyto-Sterine pure. Sels Phospho-Calciques Manganisés et Magnésies. Extrait thymique purifié.

Propriétés. — Produit stable, complet, de conservation assurée, et dont l'emploi n'offre aucun danger. Régularise le Métabolisme.

Posologie. — 1 sachet par jour et par 5 années d'âge. Se prend délayé dans un peu d'eau.

Indications. — Toutes Décalcifications et Déminéralisations.

Laboratoires C^{te} René de GRAUWE 
Pharmacien de 1^{re} classe.

16, rue de Rocroy, PARIS — Usine à St-Denis.
Prix : 20 fr. la boîte de 24 sachets spéciaux.

IRRASTÉRINE

Vitamine D. Antirachitique

Ergostérine irradiée par les rayons ultra-violet.

Solution au 1/1000

Composition. — Ergostérine pure irradiée aux rayons ultra-violet, en solution dans l'huile d'olives, sans aucune addition de cholestérine.

Propriétés thérapeutiques. — Véritable catalyseur du calcium et du phosphore, l'Irrastérine peut être considérée comme la médication spécifique de toutes les carences de l'organisme. — Cinq milligr. d'ergostérine équivalent à un litre d'huile de foie de morue.

Indications. — Toutes les indications de l'huile de foie de morue. Troubles de l'ossification, Rachitisme, Accidents de carie dentaire, Lésions d'ostéomalacie, Pré-tuberculose et tous états de déminéralisation.

Dose et mode d'emploi. — *Solution huileuse*: Jusqu'à un an : XII à XVI gouttes; de 1 à 3 ans : XVI à XX gouttes; de 3 à 10 ans : XX à XXV gouttes. Adolescents, jusqu'à XL gouttes, *Dose d'entretien* : 5 gouttes par jour. *Dragées* : 2 à 4 par jour.

Les Établissements BYLA,

25, avenue de l'Observatoire, — PARIS

R. C. Seine 71895

ISACÈNE " ROCHE "

Laxatif synthétique nouveau.

Action thérapeutique. — L'Isacène " Roche " est la diacétyldioxyphénylisatine, insoluble dans l'eau et l'acide chlorhydrique, soluble seulement dans le milieu alcalin du côlon, où se constitue la constipation. Il est absolument atoxique, sans odeur, sans saveur, sans aucun effet nocif ; il agit d'une manière douce, constante, certaine, sans coliques, sans épreintes et sans ténésme. Il n'est pas absorbé au niveau de l'intestin, il ne passe pas dans l'organisme et il est éliminé en totalité avec les matières fécales.

Indications thérapeutiques. — Tous les cas de constipation (sans aucune exception), adultes bien portants ou malades, alités, opérés, rénaux, vieillards, intoxiqués, femmes enceintes, enfants, etc.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes.

Dose laxative légère . . .	2 granules.
— moyenne .	2 à 4 granules.
— forte	4 à 8 granules.

Enfants.

1/4 ou 1/2 dose, selon l'âge et le cas.

ISACÈNE " ROCHE "

Flacon de 40 granules.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

21, Place des Vosges, Paris (III^e).

ISOTONYL BOURET

(Poudre de Lausanne)

Action.

L'estomac dilue ou concentre son contenu de façon à lui faire atteindre toujours le point cryoscopique de 0,38, nécessaire pour que le chyme franchisse le pylore.

L'Isotonyl Bouret aide l'estomac à remplir cette condition. Il stimule la fonction sécrétrice des glandes gastriques, neutralise le suc gastrique hyper-acide, assure l'évacuation gastrique.

Formes et mode d'emploi.

Paquets, 1 pour 1 litre.

Discoïdes, 2 pour un verre.

Adultes : 2 à 3 verres par jour.

Enfants : 1/2 verre à Bordeaux à 2 verres par jour.

Après les repas, au moment des douleurs ou pesanteurs et le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

PHARMACIE CHAUMEL

87, rue Lafayette, Paris (IX^e).

IXIUM

Solution isotonique stérilisée de Thorium X pour usage médical.

Principales utilisations et posologie du Thorium X

<i>Affections traitées.</i>	<i>Doses de thorium X employées.</i>	<i>Marche et durée du traitement</i>
Anémie Chlorose Neurasthénie	De 25 à 75 microgrammes, par augmentations successives de 25 microgrammes toutes les deux semaines.	8 à 10 injections, au rythme d'une injection par semaine.
Goutte	Débuter par des doses légères, en dehors des crises douloureuses, — de 25 à 200 micros — par augmentations successives de 25.	10 injections successives, au rythme d'une par semaine.
Rhumatisme Spondylose Sciatique Névrite	Débuter par 100 microgrammes et augmenter progressivement de 25 ou 50 par semaine jusqu'à la dose de 250 micros, dose à maintenir jusqu'à la fin de la série.	8 à 10 injections, au rythme d'une injection par semaine.
Leucémies Tumeurs Cancer Maladie de Hodgkin	Commencer par 100 microgrammes pour arriver à 250 par augmentations successives de 25 microgrammes.	5 à 6 injections, au rythme d'une injection par semaine.
Psychoses Aiguës	Doses variant entre 100 et 350 microgrammes	5 injections, au rythme d'une injection par semaine.
Blennorrhagies chroniques	Solution de 5 cmc. de Thorium X, de 25 à 50 microgrammes.	1 à 2 injections uréthrales par semaine, pendant 3 semaines.

Il est bien entendu que les doses ci-dessus peuvent être modifiées au gré du médecin et que les séries peuvent être renouvelées après un intervalle d'environ 2 mois de repos.

Toutes les doses sont exprimées en microgrammes de bromure de radium.

L'Ixium est préparé à Paris tous les mardis par les

Etablissements ALBERT BUISSON

F. JALOT et C^{ie}, 157, rue de Sèvres. Paris (XV^e)

R. C. 222-705 B.

IXOGYNE

Antiseptique gynécologique.
(Usage externe.)

Composition. — Association de formaldéhyde, aldéhyde trichlorée, excipient spécial au baume benjoin de Siam. Parfum très agréable.

Action. — Antiseptique, antiprurigineux, décongestionnant, cicatrisant, désodorisant.

Indications. — Affections gynécologiques : vaginites, bartholinites, métrites, salpingites, prurit vulvaire, hygiène quotidienne de la femme. Soins obstétricaux.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café dans un litre d'eau chaude pour une injection, deux par jour.

**LABORATOIRE CHIMICO-
THÉRAPIQUE DE PARIS**

12, rue des Apennins — PARIS (XVII^e).

JÉCOL

Régulateur entéro-hépatique.

La déficience du foie étant la cause initiale de nombreux états morbides, l'effort thérapeutique doit porter sur la cellule hépatique qu'il convient de stimuler afin d'en rétablir le délicat fonctionnement.

Par son action progressive et douce, le Jécol se classe au premier rang des médicaments destinés à traiter l'hépatisme sous toutes ses formes :

Congestion et Insuffisance du foie, Gastro-entérite, Entérite mucomembraneuse, Auto-intoxication, etc.

Formule. — *Combretum* (extrait spécialisé de kinkélibah).

Boldo (extrait aqueux).

Evonymus (extrait titré).

Forme. — Petits cachets.

Prescription. — 2 à 4 cachets par jour fin des repas, 3 à 6 semaines.

Cette dose pourra être augmentée ou diminuée chaque semaine, suivant les résultats constatés, par le médecin traitant, chez le malade.

LABORATOIRE DU JÉCOL

3, rue Watteau, Courbevoie (Seine).

JEMALT WANDER

A base d'huile de foie de morue
et d'extrait de malt à l'état de paillettes.

Composition. — Huile de foie de morue 30%, Extrait de malt 64%, Cacao 6%, Essences aromatiques Q. S.

Indications. — Le jemalt réalise la médication à l'huile de foie de morue renforcée des éléments nutritifs et digestifs (diastases) de l'Extrait de malt. Anémie en général, Croissance des enfants.

Doses. — Enfants jusqu'à deux ans, une à deux cuillerées à café par jour.

Enfants plus âgés, adolescents et adultes : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Se prend le matin, le soir, ou entre les repas tel que (il fond rapidement dans la bouche), ou dilué dans du lait tiède ou infusion.

Etablissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

JUGLANE

Composition. — Principe actif du noyer sauvage.

Indications. — Toutes les formes du diabète et ses complications : acidose, acétonémie, en particulier les diabètes gras, arthritiques, hépatiques. Aucune contre-indication, tolérance parfaite, innocuité absolue, aucune incompatibilité.

Mode d'emploi. — Trois à quatre pilules avant chacun des trois repas. Cette dose peut être doublée sans inconvénient. Continuer progressivement le traitement jusqu'à complète disparition du sucre dans les urines.

Prix : 12 fr. la boîte de 150 pilules.

Produits Euthérapiques

C. CONS, Anc. Int. des Hôpitaux de Lyon
12, Rue des Ecoles — CHAMBERY (Savoie)

KALMOBROL

(Spécialité absolument française.)

Composition. — Extrait de bouillon bromuré à base de bromure de sodium très pur.

Doses. — 1 cuillerée à café : 1 gr. de bromure de sodium.

Indications. — Tous les cas les plus divers d'Excitation nerveuse (Insomnie, Neurasthénie, etc. etc.)

Mode d'emploi. — Verser dans une tasse d'eau très chaude le nombre prescrit de cuillerées à café. On obtiendra immédiatement un délicieux bouillon que l'on absorbera bien chaud, soit au début du repas, soit à n'importe quel moment de la journée.

Laboratoires R. NIEL

60, rue Auguste-Comte — LYON (Rhône)

KAOBROL

Composition. — Bromure de sodium et Poudres absorbantes. Kaolin, carbonate de magnésie, carbonate de chaux, gomme pour homogénéiser la poudre.

Poudre blanche de saveur agréable, sucrée et aromatisée à la menthe.

Indications. — Toutes les dyspepsies, plus spécialement hyperchlorhydriques et nerveuses. Troubles digestifs de la femme enceinte. Gastro-entérites,

Dosologie. — Une cuillerée à café après les repas et au moment des crises douloureuses.

Littérature et Echantillons à Messieurs
les Docteurs.

Laboratoire du KAOBROL

J. LAROZE, Pharmacien

54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

KAOLINASE

Pour pansements gastriques.

Kaolin purifié, en poudre fine très adhésive, livré en boîtes de 20 paquets de 10 gr.

Dose et mode d'emploi. — 1 ou 2 paquets le matin à jeun (mode d'emploi sur prospectus).

Prop. thérap. — La KAOLINASE constitue le médicament de choix pour le *plâtrage* de l'estomac (Prof. Hayem, A. M., 13-5-1920).

Indications. — Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Ulcères et ulcérations de l'estomac, Colites, Fermentations gastro-intestinales, etc., etc.

Echantillons gratuits.

Laboratoire G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e)

KERLACTINE

Composition. — Pilules kératines d'acide lactique pur de ferment (principe actif de tous les ferments lactiques comprimés ou liquides), *ne libérant son spécifique que loco dolenti.*

Indications. — Médicament le plus sûr, pratique et scientifique des **entérites** et de toutes les infections intestinales ou d'origine intestinale avec leurs répercussions *cutanées, rénales, hépatiques et colibacillaires.*

Posologie. — 6 à 10 pil. pro. die, à la fin des repas.
(pas de contre-indication et rigoureusement *atoxique*).

Le tube : 12 francs.

Echantillons.: « **KERLACTINE** »

71, avenue de Saxe, Lyon (VI^e)

KIDOLINE

Huile adrénalinée au millième.

Indications.

- 1) Coryza aigu du nourrisson chez lequel la hido. line permet l'alimentation en rétablissant ne partie la perméabilité nasale.
- 2) Adénoidite aiguë de l'enfance; décongestionne puissamment les muqueuses, modifie la nature des sécrétions et permet l'usage utile de sels argentiques qui sans cela pénètrent trop insuffisamment.
- 3) Accès de faux croup.
- 4) Rhinites aiguës avec menace de sinusite.

Mode d'emploi.

Chez les nourrissons instiller à la fois V à VI gouttes dans chaque narine 5 minutes avant la tétée.
Chez l'enfant : 4 fois par jour instiller VI à X gouttes en pulvérisations.

Tolérance parfaite. Aucune contre indication.

Flacon de 20 centilitres.

LABORATOIRE R. GALLIER

38, Boulevard Montparnasse, Paris.

KINECTINE

Spécifique de la Fièvre des Foins
et du Coryza aigu

Indications :

Fièvre des Foins, Coryza aigu.

Forme :

Comprimés.

Posologie :

Adultes. — 3 comprimés par jour.

Enfants. — Moitié dose.

Établissements MOUNEYRAT

12, Rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

KIPSOL

(en pilules)

Cacao pulv. et tannates actifs d'alcaloïdes.

(Avantages curatifs des préparations belladonnées et opiacées, à l'exclusion de leurs inconvénients.)

Dose et Mode d'emploi. — 2 à 7 pilules par jour, espacées au moins de deux heures. — Ces pilules, très petites, s'avalent facilement avec une gorgée d'eau et même sans aucun véhicule liquide.

Prop. Thér. — Spécifique des Coryzas accidentels ou chroniques, des toux, bronchites, coryza des iodures, grippe, etc.

Indications. — Préservatif et curatif des rhumes.

Prix : 5 francs.

BERTAUT-BLANCARD Frères

64, rue de La Rochefoucauld — PARIS

KLUCHOL REMEAUD

à base de Benzoate d'Anéthol Solubilisé.

Forme. — Sirop d'un goût très agréable, bien accepté des enfants. — Non toxique.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique puissant, calmant et curatif de la coqueluche, des toux coqueluchoïdes ou nerveuses, asthme, etc...

Posologie. — Adultes 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Enfants.

Moins d'un an.....	2 à 4	cuill. à café par jour.	
1 à 5 ans.....	4 à 8	—	—
5 à 10 ans.....	5 à 10	—	—
au-dessus de 10 ans.	8 à 10	—	—

Nota.

L'innocuité absolue permet d'augmenter progressivement, et même de doubler les doses ci-dessus, jusqu'à l'obtention rapide de l'effet désiré.

LABORATOIRE REMEAUD

38, Avenue J. Baptiste Clément, Boulogne sur-Seine.

Téléphone : Molitor 04-59.

KOLA GRANULÉE ASTIER

Composition. — Extrait de Kola granulé contenant tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tannocaféiniques, rouge de Kola et tanins actifs.

Prop. théér. — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

Indications. — Neurasthénie, dépression mentale, adynamie cardiaque, troubles fonctionnels cardiaques, grippe, convalescence des maladies infectieuses et maladies graves, asthénie, surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — Dose moyenne : 2 cuill. à café par jour, à prendre tel que dans le creux de la main, ou en dissolution dans tout liquide aqueux.

Prix : 10 francs.

Laboratoires P. ASTIER

41 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e)

KOLATINÉS

Tonique sédatif.

Kola à Kolatine inaltérée, traitée vivante sur place avant toute formation de caféine par oxydation diastasique, et solubilisée avec élimination de tout agent excitant.

Action. — Active la nutrition et les échanges cellulaires. Augmente l'énergie nerveuse sans coup de fouet ni dépression consécutive. Calme l'irritabilité de dépression par effet toni-nervin. Renforce les réactions de défense contre l'infection.

Avantages. — Tolérance parfaite à tout âge (nourrissons, vieillards) ainsi que chez les nerveux, les cardiaques, les hypertendus et tous ceux qui ne peuvent supporter les excitants. Action rapide et continue sans accoutumance ni nécessité d'interruption. Facile à prendre.

Indications. — Toutes asthénies et dépressions irritables : cérébrales, nerveuses, cardiaques, digestives. Insomnies, inappétence, états dyspeptiques, entéritiques, infectieux. Diarrhées infantiles, grippe, pneumonie, tuberculose, etc. anémie, lymphatisme, suites de couches, allaitement, convalescences, infectieuses : traumatiques, post-opératoires.

Présentation et emploi. — Poudre soluble en sachets. Boîte simple : 10 sachets ; boîte triple : 30 sachets, avec réduction de prix sensible (cure).

Adultes et enfants : 1 à 3 sachets par jour.

Nourrissons : 1/4 à 1/2, en plusieurs tétées.

Dissoudre à chaud, dans aliments liquides à prendre en rations normales : lait, cacao, café, thé léger, infusions, bouillons, tisanes, eau sucrée.

Littérature et échantillons

PRODUITS & PROCÉDÉS CHALAS, S. A.

12, rue du Helder — PARIS (IX^e)

Tél. Provence 81.44 et 75.45.

KYDALOSE

Iode organique non caustique

Salicylate de Soude

Priser cinq à six fois par jour.

Coryza aigu et chronique, Obstruction nasale et ses conséquences, Sinusites, Otites, Hypertrophie des cornets. Ozène.

N. B. — Par le salicylate de soude que contient la Kydalose, ce médicament convient aussi au coryza aigu et l'enraye si l'on s'en sert dès le début de la crise.

Il est de plus en plus avéré que le coryza aigu n'est autre chose qu'une fluxion rhumatismale *a frigore* par conséquent justiciable du salicylate de soude employé localement. Son effet *préventif* n'est pas douteux.

DALIN, Pharmacien de 1^{re} classe,
49, quai Saint-Vincent — LYON

KYMOSINE ROGIER

(Anciennement Pegnine)

A base de Ferment lab et sucre de lait purifiés. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

Dose. — Une cuillerée-mesure dans 200 cm³ de lait tiède à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon, 12 fr. 50

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie

56, boulevard Péreire — PARIS

KOCH-I-CIDE LEYSIN

Médicament nouveau

Complexe métallo-organo-végétal pour la Chimiothérapie super-intensive des Tuberculoses.

Composition. — Métaux précieux, Hg, Terres rares (exempt de néodyme et de praséodyme), Organates, thymolates, Terpènes et Sulfonates polyvalents, Choléobornéine, Chlorure de tétraméthylaminodiphénylpentthiazimium, Benzyle. Cristal violet.

Action. — Médication extrêmement diffusible dissolvant l'enveloppe cirrograisseuse du B. K. et créant autour du bacille un milieu où il ne peut subsister Hyperantiseptique à l'égard du B. K.

Indications. — Tuberculoses fermées T. ouvertes des 2^e et 3^e degrés même présentant des cavernes très étendues. T. caséeuses, intestinales, ganglionnaires, cutanées, osseuses. Aucune contre-indication même dans les cas fébriles ou hémoptoïques.

Présentation. — Pilules kératinisées (3 à 15 prodie) ampoules de 2 cc. 1/2 environ pour injections intra-musculaires (3 à 6 par semaine).

Important : En raison de la rapidité et de la sûreté des résultats qu'il permet d'obtenir dans les cas les plus avancés, le Koch-I-Cide Leysin est *Le Seul* médicamenteusement utilisé par les Cliniques et médecins traitant la Tuberculose à forfait.

Prix :

Le Koch-I-Cide est uniquement délivré par flacons ou boîtes pour un mois de traitement au prix de 200 fr. en France (6 fr. 60 par jour) et de 250 fr. français pour les autres pays (sans engagements).

Remise médicale 20 p. 100.

Notice et mode d'emploi franco.

Le prix élevé du médicament ne permet pas l'échantillonnage gratuit.

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor
PARIS (XVI^e)

LAB LACTO FERMENT MIALHE

Digestion du lait.

Indications. — Diarrhées vertes des nourrissons et dans tous les cas de mauvaise digestion du lait, troubles gastro-intestinaux, régime lacté où le malade doit absorber une forte quantité de lait.

Dose. — Pour adultes et enfants: une cuillère-mesure par verre de lait. Nourrissons: une demi-cuillère-mesure par biberon ou par tétée.

Mode d'emploi. — Mettre la dose indiquée dans une à deux cuillerées d'eau, puis ajouter le lait, froid ou tiède.

Pharmacie du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS

LACCODERMES

Vernis pour le traitement des
Dermatoses. — Pansement Médicamenteux

Laccoderme à l'oxyde de zinc. — Rougeurs.
— Boutons. — Dartres.

Laccoderme Sulfocadique. — Séborrhées. —
Impétigo. — Folliculites. — Acné.

Laccoderme au Goudron de Houille. —
Eczémas aigus et chroniques.

Laccoderme à l'Ichthyol. — Eczéma. —
Ecthyma. — Brûlures.

Laccoderme Ichthyol Stovaine. — Prurits.
— Zona.

Mode d'emploi. — Nettoyer la peau au
savon. Denisol. Étendre le laccoderme.
Laisser sécher et saupoudrer avec l'Anytal
Brisson.

Laboratoires P. BRISSON et C^{ie}.

114, Avenue Michelet Saint-Ouen, Seine.

LACHÉSINE

Extrait du venin
du *Trigonocephalus lachesis*.

Forme. — Comprimés solubles dans l'eau.

Mode d'emploi. — Deux à quatre comprimés par jour en dehors des repas. Résultat rapide.

Indications. — *Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.* (Bouffées de chaleur, sueurs, vertiges, congestion céphalique, dyspepsie, mélancolie, etc.)
S'abstenir pendant les règles.

Laboratoire RENAUD

2, rue Demours, Paris (XVII^e).
Téléphone Wag. 83-97.

LACTIMASE

Description. — Comprimés de ferment lactique de 0 gr. 50 ; par flacons de 40 comprimés.

Action thérapeutique. — La *Lactimase* détruit les microbes pathogènes de l'intestin par accaparement du milieu, action renforcée par la symbiose du bacille Bulgare et d'une levure spéciale.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dans les intoxications intestinales, diarrhées vertes de nourrissons, constipation, dysenteries, entérites.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

LACTOBYL

Composition :

Sels Biliaires.

Extrait total de glandes intestinales.

Charbon poreux hyperactivé.

Ferments lactiques sélectionnés.

Extrait Cytoplasmique de *Laminaria flex.*
(Pancréine).

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Prop. Thér. — Rééducateur intestinal.

Indication. — Constipation. Stase intestinale chronique.

Dose et mode d'emploi. — Commencer le traitement par deux comprimés 10 minutes avant ou après les repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

LE " LACTOBYL "

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e)

LACTOCHOL

Composition. — Ferments lactiques. Sels biliaires.

Forme. — Comprimés et granulés (enfants et nourrissons).

Propriétés thérapeutiques. — Infections intestinales, entérite, dermatoses.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : (comprimés) 4 à 12 par jour avant les repas dans de l'eau sucrée (avalé sans mâcher).

Enfants : 2 à 6 comprimés par jour dans miel, confiture 1 cuillerée à café avant les repas.

Nourrissons : Une cuillerée à café de granulé avant une tétée, ou un biberon, matin et soir.

LABORATOIRES " LOBICA "

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

Compos. — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, ph-phthaléine.

Forme. — Comprimés.

Prop. thér. — Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin sans la moindre irritation.

Doses. — 1 à 3 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau sucrée.

Enfants, 1/2 comprimé suffit.

Se vend par boîtes de six tubes de six comprimés.

Prix au public : 14 fr.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e)

LAIT EN POUDRE GUIGOZ

Préparé avec le lait pur de la Gruyère. Est mis à la disposition du corps médical sous trois formes :

Lait complet, lait demi-écrémé, lait complètement écrémé.

Traité par un procédé tout à fait spécial, à une température n'excédant jamais 50°, conserve toutes ses vitamines et peut alimenter un nourrisson *sans adjonction de jus de fruit*.

Par sa coagulation, par la petitesse de ses globules gras, par sa facilité de digestion, se rapproche du lait maternel.

Indications. — Lait sucré spécialement préparé pour l'alimentation des nourrissons et des personnes ne supportant pas le lait frais.

Dose. — Une partie du lait Guigoz pour six parties d'eau. Ne pas ajouter de sucre.

Littérature et échantillons

Bureau du lait GUIGOZ

14, rue J.-J. Rousseau, PARIS — (1^{er})

Tél : Central 67-55

LAIT MONT BLANC

Concentré sucré.

Composition moyenne :

Eau	24 p. 100	Lactose	13,4 p. 100
Beurre	10,5 —	Sucre raffiné ..	40,75 —
Matières azotées ..	9,5 —	Cendres	1,85 —

Indications. — Allaitement mixte ou artificiel des enfants du premier âge. Évite diarrhées et vomissements.

Particularités. — Conserve intactes toutes les vitamines, ainsi que toute la crème et l'arôme du lait frais des Alpes de Savoie — reconnu le meilleur de France — avec lequel il est préparé, car il est pasteurisé et concentré sous le vide et à basse température.

Doses et mod. d'emploi. — Table de dilution pour la préparation des biberons :

Age du nourrisson.	Quantités de lait concentré sucré exprimées en cuillerées à café.	Quantités d'eau bouillie exprimées.		Nombre de biberons par 24 heures.
		1 ^{re} en cuillerées à café.	2 ^o en grammes.	
1 ^{re} semaine	1/2	4	20	7
2 ^e —	3/4	9	45	7
3 ^e et 4 ^e semaines ..	1 1/4	13	65	7
5 ^e et 6 ^e —	1 3/4	17	85	7
7 ^e et 8 ^e —	2	19	95	7
3 ^e mois	2 3/4	24	120	6
4 ^e —	1/4	20	130	6
5 ^e —	1/2	28	140	6
6 ^e —	1/2	28	140	6
7 ^e —	3/4	30	150	6

1 cuillerée à café = 10 gr. de lait = 5 gr. d'eau.

Mettre la quantité de lait concentré nécessaire dans le biberon, ajouter ensuite l'eau préalablement bouillie et agiter le tout. Au besoin, réchauffer au bain-marie, jusqu'à la température d'absorption. Éviter de faire bouillir le lait concentré.

Remarques importantes :

- 1^o Les proportions indiquées ci-dessus sont des moyennes et n'ont rien d'absolu ; elles peuvent être modifiées suivant les prescriptions du médecin ou de la sage-femme.
- 2^o La boîte, aussitôt après emploi, devra être recouverte (demander l'ouvre-boîtes et le couvercle "Mont Blanc"). Ainsi, le lait concentré sucré se conservera parfaitement plusieurs jours.

Boîtages : Boîtes de 400 et 200 grammes net.

Lait "Mont Blanc" concentré non sucré : Boîtes de 170 et 450 grammes net, remplace avantageusement le lait frais dans tous ses usages.

Prix, échantillons et littérature sur demande :

COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LAIT

Siège social et usines : RUMILLY (Haute-Savoie).
R. C. Annecy 2946-G. Chèques postaux Lyon 106-83.

LAIT SEC GLAXO

Provient d'animaux parfaitement sains au pâturage toute l'année. Desséché par le procédé des cylindres qui conserve au produit toutes les vitamines du lait naturel. Composition uniforme et très voisine de celle du lait humain. Contrôle chimique et bactériologique rigoureux : par sa pureté Glaxo est supérieur à tous les autres laits (1000 fois plus pur que le lait cru aseptique, 100 000 fois plus pur que le lait ordinaire de consommation). Digestibilité parfaite. Conservation de longue durée.

Trois formes : trois quarts crème (degré normal), demi-crème, tout-crème.

Les deux formes, trois-quarts crème (degré normal) et demi-crème, sont additionnées de vitamine D, ce qui assure une assimilation maximale de la chaux et évite toute intolérance des graisses et tout trouble digestif.

Indications. — Alimentation exclusive ou allaitement mixte du nourrisson. Toutes les intolérances lactées. Troubles gastro-intestinaux (entérites, diarrhées, vomissements). Convient particulièrement aux prématurés, aux débiles, aux athrepsiques. Très utile comme aliment de transition entre la diète hydrique et la reprise de l'alimentation habituelle. Sera encore prescrit chez les adultes qui tolèrent mal le lait de vache au cours des maladies nécessitant une alimentation substantielle et de digestion facile. Rendra enfin de grands services en voyage et dans les colonies.

Posologie. — Diluer la quantité voulue de Glaxo dans sept fois son poids d'eau bouillie tiède (une cuiller à café ou une mesure rase de Glaxo pèsent 4 grammes).

Littératures et échantillons.

Laboratoires GLAXO

14, rue Bergère, PARIS (IX^e).

Tel, Provence : 29-98. — R. C. Seine : 210-361 B.

LANSOYL

HUILE DE PARAFFINE ROBERTS

Deux formes. — Liquide et gelée.

Liquide: Huile de paraffine chimiquement pure, très visqueuse et de densité très élevée. Sans goût ni odeur.

Gelée: Contient 90% de Lansoyl liquide et 10% de sucres de fruits et d'agar-agar. Goût, odeur et aspect agréables. Parfait pour enfants, vieillards et personnes à estomac délicat.

Propriétés thérapeutiques. — Lubrifie l'intestin, le décongestionne, régularise ses fonctions.

Indications. — Constipation chronique, Inflammations, Entéro-Colite, Flatulences, Coliques, et en général toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Doses. — **Adultes:** Une cuillerée à soupe le matin et le soir.

Enfants: Une cuillerée à café trois fois par jour.

Nourrissons: Une demi-cuillerée à café trois fois par jour.

ROBERTS & C^{ie} Pharmaciens
5, rue de la Paix — PARIS

LANTOL

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium à 0 gr. 20 par litre; en ampoules de 3 cc. par boîtes de 4 ampoules, et en capsules kératinisées pour la voie gastrique en flacons de 60 capsules.

Action thérapeutique. — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une hyperleucocytose considérable, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

Indications. — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux. Les capsules servent à compléter et achever le traitement tout le temps nécessaire.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX
18, Avenue Hoche — PARIS

LAROSAN " ROCHE "

Caséine-Calcium

Spécifique de la Diarrhée infantile.

Avantages. — Alcalinisation du milieu intestinal. Suppression du petit lait. Apport minimum de sucre. Taux élevé de caséine.

Indications. — Diarrhées infantiles et troubles dyspeptiques des nourrissons (Diarrhée simple, lientérique, verte, infectieuse, cholériforme. Diarrhées de dentition et de sevrage. Athrepsie, etc.

Diarrhées toxiques des enfants et des adultes. États dyspeptiques des adultes. Ulcère de l'estomac, etc.

Mode d'emploi et Doses :

On prépare des mélanges : Eau bouillie, Lait, Larosan contenant 2 cuillerées à soupe et plus de Larosan " Roche " par litre. L'administration de ces mélanges et la conduite de la cure sont variables selon les cas.

Littérature et échantillons sur demande.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE ET C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS

LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, désodorisant, ni toxique, ni caustique.

Indications. — En chirurgie, gynécologie, obstétrique, brûlures, dermatologie, hygiène médecine générale.

Mode d'emploi. — Pansements, injections vaginales. Puissance antiseptique absolue (solution 3^e/a).

Doses. — Suivant les indications.

Le litre : 9 fr. — Le demi-litre : 6 fr. 25

Formes actives. — SAVON LAURÉNOL (antiseptique, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (asepsie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURÉNOL (métrites, vaginites, pertes, etc.). — POMMADE au LAURÉNOL (affections de la peau).

LAURÉNOL n° 2, désinfectant, sans odeur, ni mercure, Savon Laurénol : 4 fr. — Savon dentifrice : 6 fr.

Ovules Laurénol : 9 fr. — Pommade : 8 fr.

Laurénol n° 2 :

Le litre : 4 fr. 50. — Le demi-litre : 3 fr. 50.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e)

LAXAMALT

50 % huile de paraffine, 50 % extrait de Malt.

Poudre cristalline d'un goût très agréable.

Posologie :

Nourrissons : une cuillerée à dessert administrée le soir dans le dernier biberon ou dans un peu d'eau bouillie.

Enfants : Deux cuillerées à soupe par jour avant ou après les repas ou le matin à jeun et le soir avant de se coucher.

Adultes : Trois ou quatre cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin.

Particulièrement indiqué chez les entéritiques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon, NEUILLY, PARIS

Téléphone : Maillot 17-75

LAXAMER

(*laxatif amer*)

Composition. — Extrait fluide sucré à base de : Cascara sagrada, noix vomique, hadiane, gentiane fraîche, écorces fraîches d'oranges amères.

Propriétés therap. — Celles des amers et laxatifs doux n'irritant pas l'intestin ; cholagogue énergique, s'emploie dans la constipation. Il peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices car il n'a pas de contre-indication.

Mode d'emploi. — Une à deux cuillerées à café par jour, avant le repas.

Echantillons :

Laboratoire du Docteur C. LEFÈVRE

52, Rue Decamps — PARIS (XVI^e)

LAXATIFS MIRATON CHATEL-GUYON

Pastilles Miraton Chatel-Guyon. — Laxatif hydrominéral aux sels de la source Miraton Chatel-Guyon, stimulant idéal du peristaltisme intestinal, non irritant.

Dose. — 1 à 2 pastilles le soir au coucher.

Grains Miraton Chatel-Guyon. — Sels de la Source Miraton Chatel-Guyon associés à l'extrait total des glandes intestinales, à l'extrait biliaire et aux ferments lactiques, Régulateur physiologique de l'intestin, non irritant, sans accoutumance.

Dose. — 1 à 2 grains au repas du soir.

Littérature, Echantillons

Etablissements MIRATON

6, rue Rosenwald — PARIS (XV^e)

LAXOPEPTINE GIRARD

Laxatif pour Enfants.

Poudre à base de ferments de céréales, de citrate de soude et d'eupeptiques divers.

Mode d'emploi. — Une ou deux cuill. à café dans du lait ou de l'eau bouillie, le matin au réveil ou le soir au coucher. Doubler la dose pour les enfants de 2 à 7 ans.

Prop. Thér. — La Laxopeptine combat la constipation, régularise les fonctions digestives en assurant une bonne antisepsie intestinale.

Indications. — Gastro-entérites, ballonnement, gros ventre, vomissements, maladies aiguës, fébriles et toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Laboratoire A. GIRARD

48, rue d'Alésia, Paris (XIV^e)

LENICURE-VICHY

Médication préventive et curative des affections hépatiques et biliaires.
Adjuvant précieux de la cure de Vichy.

Composition :

Acides oléique et palmitique associés au combretum R.

Forme :

Pilules enrobées de gluten pour les soustraire à l'action dissolvante des sucs de l'estomac.

Propriétés thérapeutiques :

Le **Lenicure-Vichy** a une action dissolvante remarquable sur les calculs hépatiques. Il empêche la formation des boues biliaires en maintenant en dissolution la cholestérine, désagrége et permet l'élimination de ceux-ci sans douleur, excite et fluidifie la sécrétion biliaire.

Indication :

Coliques hépatiques, Congestions douloureuses du foie et de la vésicule biliaire, Hépatite paludéenne, Cirrhoses, Constipation d'origine hépatique.

Posologie :

- 1° Pendant la cure de Vichy : action adjuvante : de 4 à 8 capsules par jour.
- 2° Action préventive des coliques hépatiques : 8 capsules par jour, 10 jours par mois.
- 3° Action curative des coliques hépatiques : 12 capsules par jour.
- 4° Congestion douloureuse du foie et autres cas, 6 à 8 capsules par jour 10 jours par mois.

L'action du **Lenicure-Vichy** peut être prolongée sans inconvénient.

Laboratoires DALET

94, boulevard des Batignolles, Paris.

LÉNIFORME

Composition. — Huile à 5 ou 10% d'Essences végét. antiseptiques.

Indications. — Coryza, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

Forme et Mode d'emploi. — Se vend en flacons pour instillations par compte-gouttes spécial, ou mieux avec le "Jectolix". (Compte-gouttes spécial).

Est également présenté sous forme de Rhino-Capsules pour auto-injections nasales.

L. E. V. A.

26, rue Pétrelle — PARIS (IX^e)

LEUCAGINE

Médication radioactive et bactéricide des infections utérines aiguës et chroniques.

Application. — Pansements utérins. 2^e formes :

1^{re} — CRAYONS

Présentation. — Crayons stérilisés à base d'organate d'argent et de bromure de radium, dosés à 1, 5 et 10-micros.

Indications. — Métrites, Affections du col et du corps : 2^e applications par semaine (Consulter la Notice).

N.-B. — Utiliser pour l'application notre appareil "Porte-pansement" spécial.

2^e — OVULES

Indications. — Tous les cas d'infections des voies génitales. Un ovule tous les 3 ou 4 jours.

Le crayon à 1 micro : 12 fr. ; à 5 micros : 25 fr. ;

à 10 micros : 35 fr.

La boîte de 5 ovules : 40 fr.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE O. * O. I. U

Docteur en Pharmacie. Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e)

LEUCOSEPTYL

Thérapeutique anti-infectieuse rationnelle.

Composition. — Le *Leucoseptyl* est un extrait leucocytaire total injectable de l'Institut biologique Mérieux de Lyon. Il est obtenu à l'aide des globules blancs de cheval éclatés par congélation. C'est une véritable préparation opothérapique spécifique, contenant les endo-ferments, les exo-ferments et le stroma leucocytaires.

Propriétés thérapeutiques. — Le *Leucoseptyl* stimule la leucopoièse, active la phagocytose, exalte les moyens de défense de l'organisme contre les infections, constitue la base biologique de toute thérapeutique anti-infectieuse.

Indications. — Toutes les infections aiguës ou chroniques, localisées ou généralisées, attribuables à des agents pathogènes identifiés ou méconnus.

Forme. — Le *Leucoseptyl* se présente en boîtes d'ampoules de 2 centimètres cubes.

Emploi. — Injection sous-cutanée ou intramusculaire. Ne jamais recourir à l'injection intra-veineuse. L'injection n'est pas douloureuse et ne provoque pas de choc.

Le *Leucoseptyl* peut être employé seul ou en association avec la Vaccinothérapie, la Sérothérapie ou la Chimiothérapie.

Injecté en même temps que les vaccins, il en décuple l'action.

Doses. — *Adultes et enfants* de plus de 3 ans.
Infections aiguës: 1 à 3 ampoules par 24 heures.
Infections chroniques: 1 ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

Enfants en bas âge ou nourrissons. — 1 à 2 centimètres cubes par jour,

Littérature et échantillon sur demande.

Dépositaire exclusif.

Laboratoires de spécialités scientifiques.

73, rue Orfila. — PARIS (XX^e)

LEVULOSE ROGIER

Aliment hydrocarboné assimilable par le diabétique,
Remplace le sucre ordinaire dans ses emplois.

Indications. — Diabète.

Forme et Dose. — Solution 2 à 4 cuillerées à dessert
par 24 heures.

« L'influence passagère de l'Insuline peut être prolongée
par un régime équilibré.

D'autre part l'adjonction à ce régime, soit de Vitamine B,
soit de Lévulose ou du mélange de ces deux corps
permet d'espacer les injections d'Insuline et de rendre
mieux opérante une même dose de cette substance. »

(Communication faite à l'Académie des Sciences, séance
du 22 Octobre 1923).

Littérature et échantillon sur demande.

HENRY ROGIER

Docteur en pharmacie.

56 boulevard Péreire — PARIS

LEVURE B-17

de H. Boulard

Levure *vivante, rigoureusement pure* de fer-
ments étrangers. *Isothermique* (vit et se
développe à 37° C.)

Livrée en boîtes de 6 ampoules de 2 c. c.
contenant la levure en *milieu isotonique* où
elle reste *vivante* plusieurs années.

Propriétés. — Élimine les ferments patho-
gènes de l'intestin par concurrence vitale.

Indications. — Diarrhée infantile, Diarrhée
banale des adultes, Dysenterie amybbienne
ou bacillaire, Entérites, Furunculose d'ori-
gine intestinale, Constipation.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour dans
un liquide sucré et tiède.

R. CHANTEREAU, Pharmacien

8, rue de Constantinople — PARIS (VIII^e)
et tous grossistes.

LEVURE FRAICHE MYCÉTA

Composition :

La levure fraîche Mycéta est une levure pure fraîchement essorée, appartenant au type *Saccharomyces cerevisiae* ; sélectionnée et très active, sans aucune addition de matières étrangères.

Propriétés :

Par son action fermentaire, ses diastases et ses vitamines la levure Mycéta régularise les fonctions digestives, enlève le développement des putréfactions intestinales, agit sur les troubles de la nutrition, désintoxique le sang et augmente la résistance de l'organisme aux infections microbiennes.

Indications :

Infections microbiennes, troubles digestifs et maladies de la nutrition, en particulier : états arthritiques, insuffisance hépatique, goutte, diabète et maladies de peau (urticaires, furoncles, orgelets, etc...)

Mode d'emploi :

Une dose par jour de 15 gr. environ, en une ou deux fois, une demi-heure au moins ou une heure avant les repas. La livraison est faite par le Laboratoire tous les deux jours.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV^e)

LEVURINE EXTRACTIVE

Description. — Comprimés de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme poisons vis-à-vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

Indications. — 4 à 12 comprimés par jour dans les cas d'abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

Laboratoires CH. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

LIMOL CHURCHILL

(Hypophosphite de chaux : 0 gr. 20 par dose.)
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Préparation de *chaux* et de *phosphore* au minimum d'oxydation et, de ce fait, complètement assimilable.
Récalfifiant idéal.

Indications. — Recalcification, phosphaturie, tuberculose, asthénie, bronchites, rachitisme, dentition, allaitement,

Mode d'emploi. — *Adultes* :

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intra-musculaire chaque deux jours.

Enfants :

Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indication du médecin traitant.
Exiger la signature du docteur Churchill.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 15 fr.

Laboratoire CHURCHILL

12, rue Castiglione — PARIS (Ier)

LIMONADE GODFRIN

Limonade purgative concentrée
au *Citrate basique de Magnésie*

Avantages. — Seule limonade liquide au citrate de Magnésie, pouvant être conservée. De saveur agréable, elle ne possède aucun arrière-goût médicamenteux et n'occasionne ni nausées ni coliques.

Formes. — Flacon pour *adultes* de 100 c. c.;
Flacon pour *enfants* de 50 c. c.

Mode d'emploi. — Vu sa concentration, elle ne doit pas être prise pure, mais étendue de une à deux fois son volume d'eau. A dose réduite (1 cuillerée à café ou à soupe, suivant le cas, dans un demi-verre d'eau) elle constitue un parfait laxatif salin.

Laboratoires P. GODFRIN

5, avenue Watteau — NOGENT-SUR-MARNE
(Seine)

LIPOCÉRÉBRINE CHEVRETIN

Extrait éthéré de substance cérébrale
Ampoules de 2 cc. contenant 0,20 d'extrait.

Dragées dosées à 0,05 cg. d'extrait.

Propriétés thérapeutiques. — Agit par ses phosphatides, lipoides et antitoxines. Contient 50 % de lécithines, (soit 2% de phosphore actif) et 25 % de cholestérine. Anti-toxique, Sédatif, Anti-convulsivant, Tonique.

Indications. — *États dépressifs du système nerveux, Neurasthénie, Anémie cérébrale, Convalescences, Hystérie, Psychoses.*

Dose. — Une injection sous-cutanée de 2 cc. tous les jours pendant 12 jours ou 2 dragées avant chaque repas. Dans les cas graves doubler les doses.

Laboratoires LEMATTE & BOINOT
52, rue La Bruyère — PARIS

LIPODÉTERPÉNOL

Composition :

Le Lipodéterpénol est un composé d'huiles essentielles d'essences déterpénées, de lipoides et d'huiles purifiées. Il est utilisé sous deux formes en *pommade* et en *injections* sous-cutanées.

Propriétés :

Le Lipodéterpénol injectable possède une action à la fois antigénique, antihémolytique, antitoxique, leucogénétique et auto-protecteur de l'organisme.

Indications :

Toutes les *infections graves chroniques*: larges phlegmons, septicémies, pleurésies purulentes, hématomes infectés, etc., spécialement chez les malades manquant de réaction (37° 5 à 38° de température). On obtiendra des résultats encore plus nets notamment dans le traitement des affections graves et de l'ostéomyélite en associant le traitement par la *Themsaline* au Lipodéterpénol. Il n'y a guère de contre-indications que dans l'hypercholestérinémie.

Mode d'emploi :

Une *injection* sous-cutanée tous les deux jours dans la région du flanc ou de la cuisse. Frictions journalières de 10 minutes avec la *pommade*, alternativement sur la poitrine, le dos, l'abdomen, les reins et les membres.

Laboratoire ZYMA
4, rue Bellart — PARIS (XV°)

LIPOGYRE CIBA

(Lipiodine Hg)

Médicament iodo-mercuriel

Combinaison iodo-mercurielle de l'éther éthyldiiodobrassique (lipiodine), réalisant l'association et la synergie médicamenteuse de l'iode et du mercure avec exaltation de l'activité thérapeutique de chacun de ses composants.

Indicat. — La syphilis dans ses diverses manifestations et particulièrement dans ses accidents tertiaires et secundo-tertiaires. (Cures d'entretien et de sécurité.)

Doses. — 1 à 4 comprimés par jour aux repas. Chaque comprimé contient 0 gr. 15 d'iode et 0 gr. 02 d'Hg.

Le tube de 20 comprimés : 14 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1. Place Morand — LYON

LIPOÏDES ISCOVESCO

Extraits Galéniques purifiés (Imputrescibles)
de tous les organes.

Les Lipoïdes H. I. par eux-mêmes, ainsi que par les vitamines lipo-solubles qu'ils contiennent, représentent la totalité ou la partie la plus importante des substances actives des organes dont ils proviennent.

Formes :

- 1^o Ampoules huileuses, stérilisées à 110° pour injections hypodermiques, indolores.
- 2^o Pilules.

Posologie :

6 à 8 pilules par jour ou une injection hypodermique.

Adrénol Cortex

(Partie corticale des glandes surrénales).

Adrénol total

(Glande surrénale totale) sans adrénaline.

Androcrinol (Testicule).

Cérébrocrinol (Cerveau).

Gynocrinol (contient la folliculine).

Gynolutéol (Corps jaune).

Hépatocrinol (Foie).

Mammol (Mammelle).

Néphrocrinol (Rein).

Splénocrinol (Rate).

Afatyl (Thyroïde iodée).

etc .. etc... Lipoïdes de tous les autres organes.

LIPOÏDES ASSOCIÉS

Andro-Polycrinol

(Testicule, Thyroïde, Hypophyse, Surrénale)

Gyno-Polycrinol

(Folliculine, Thyroïde, Hypophyse, Surrénale).

Gyno-Hypophysol

(Hormone ovarienne, Hormone hypophysaire associées).

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e)

Téléphone : Galvani 07.90

Adresse télégraphique : Lipoïdes — PARIS, 54

LIPOIODINE CIBA

Iode organique assimilable

Diiodo-brassidate d'éthyle, 41, 1% d'iode. D'une élimination plus lente que les iodures de potassium et de sodium, la lipoiodine remplace avantageusement ces deux médications à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

Indic. — Celles de l'iode et des iodures : Artériosclérose, hypertension artérielle, Angine de poitrine. Affections des voies respiratoires. Rhumatisme chronique, Obésité, Goitre, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

Doses. — Adultes : 1 à 6 comprimés par jour, une ampoule tous les 2 jours. Enfants : 1/2 à 3 comprimés (aux repas principaux).

Le tube de 20 comprimés : 14 francs.

La boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

LIPOSPLÉNINE DU D^r GROC

Opothérapie splénique spécifique (Soula.)

Références scientifiques :

Communications à l'Académie de médecine :
18 janvier 1927 ; 18 juillet 1928.

Communications à la Société de biologie :
22 décembre 1928, 16 février 1929.

Thèses : D^r E. Cauquil, *Rate et Rachitisme* (1928) ; D^r Fau, *Action des Extraits Lipidiques d'organes* (1928) D^r Radji.

Contribution en traitement des Anémies avec splénomégalie.

Composition. — 1^o Lipides contenus dans la pulpe splénique, (cholesteroles et Insaponifiable X : alcools et carbures terpeniques) extraits par un procédé *spécial* (Soula).

2^o Agent cholestérogénique soluble, fourni par la rate et les autres formations réticulo-endothéliales.

Indications. — 1^o *Médication spécifique* des :

a) Anémies (quelles qu'en soient la cause et la nature).

b) Amaigrissements graves et persistants.

c) Grossesses et retours de couches pénibles et difficiles.

d) Retards de croissance, débilité infantile, tous états rachitiques.

Surmenage, Convalescence, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Faiblesse et fatigue générale, tous états de détérioration organique.

Puissant modificateur du terrain dans :
Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, osseuse et viscérale.

Présentations. — 1^o) *Comprimés* dosés à 3 centigr. de principes actifs. Six à huit par jour, en deux fois, *au milieu* de chacun des deux principaux repas. Ne pas croquer les comprimés, les avaler avec une gorgée d'eau. Par séries de 80 (soit une boîte : 10 à 12 jours de traitement, 15 fr.) séparées par un repos de trois jours.

2^o *Ampoules* de deux cc. titrées à 4 centigr de principes actifs. Une injection (*intramusculaire profonde* ; indolore) tous les deux jours. Repos de six jours après la huitième injection. Au moment de l'emploi réchauffer légèrement l'ampoule et l'agiter pour remettre les lipides en émulsion homogène dans le véhicule aqueux. Pour atténuer la réaction thermique que peut provoquer l'injection initiale d'une dose trop forte de lipides chez le tuberculeux fébricitant, tâter la susceptibilité de chaque sujet en commençant par un injection de un cc. En outre, laisser un intervalle de trois jours entre les premières injections. (La boîte de huit ampoules : 20 fr.)

3^o *Sirop*, dosé à 4 cgr. de principes actifs, par cuillerée à café. *Spécialement réservé aux enfants*. Avant un an, 2 cuillerées à café par jour dans l'intervalle des repas ; après un an, 4 cuillerées à café par jour. (Prix : 15 fr.)

**Approvisionnement
médical et littérature :**

**40, rue d'Enghien — PARIS (X^e)
Tél. : Provence 37-13**

Vente en gros : **J. OLIVE, Ph^{ien}.**
16, rue Saint-Gilles — PARIS (III^e)

LIPO-VACCINS

Vaccins hypo-toxiques en suspension huileuse utilisés par l'Armée, la Marine, les Colonies et les Hôpitaux :

N° 1. — Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B Lipo-Vaccin T. A. B.

N° 2. — Vaccin anti-staphylo-strepto-pyocyanique. Lipo Vaccin « Antipyogène ».

N° 3. — Vaccin antigonococcique « Lipogon ».

N° 4. — Lipo-vaccin anti-entéro-colibacillaire.

N° 5. — Lipo-vaccin mixte antipyocyanique.

N° 6. — Lipo-vaccin anti-grippal (pneumo-staphylo-strepto-pyocyanique).

— Lipo-vaccin anti-coli et para-colibacille.

N° 8. — Lipo-tuberculine (solution huileuse de tuberculine au 1/10, 1/5, 1/2, 1 milligr. par centimètre cube).

N° 9. — Lipo-vaccin anti-staphylococcique.

N° 10. — Lipo-vaccin anti-streptococcique.

N° 11. — Lipo-vaccin anti-pesteux.

N° 12. — Lipo-vaccin anti-cholérique.

N° 13. — Lipo-vaccin anti-pyorrhée.

N° 14. — Lipo-vaccin anti-pneumococcique.

N° 15. — Lipo-vaccin anti-pneumococcique et T. A. B.

Dans ces vaccins, les microbes, en suspension dans l'huile, sont pour ainsi dire « embaumés » et conservent durant plusieurs mois (de 12 à 18 mois) leur pouvoir antigénique. La résorption des Lipo-vaccins par l'organisme est beaucoup plus lente que celle des hydro-vaccins; ce qui permet d'injecter des quantités de microbes trois ou quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vaccinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi de certains vaccins en suspension aqueuse dont les corps microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de l'organisme.

Les accidents anaphylactiques, le réveil des foyers tuberculeux et de l'insuffisance de certains organes à l'état latent sont évités grâce à la lente résorption des protéines microbiennes en suspension huileuse.

Laboratoire des LIPO-VACCINS

32, rue de Vouillé et 1, boulevard Chauvelot
PARIS (XV^e)

LIQUEUR LAVILLE

Composition. — Quino-colocynthine et principes actifs de convallaria maialis, gentiane, scille, hermodactyle et fraxinus excelsior.

Propriétés thérapeutiques — Spécifique de l'accès de goutte; exerce une action sédative sur la douleur; augmente l'élimination de l'acide urique.

Forme. — Vin médicamenteux.

Dose et mode d'emploi. — Cas aigus graves : 1 cuillerée à café dans une tasse de thé 2 heures avant ou 4 heures après le repas. Recommander quelques heures après s'il est nécessaire. En cas de douleurs modérées, 1 cuillerée à café le matin à jeun pendant 3 jours.

PILULES LAVILLE

A base de baies d'alkékenge et de silicate de soude, les pilules Laville sont prises dans les périodes intercalaires des accès, à la dose de 6 à 10 pilules par jour.

Laboratoires CLIN — PARIS

LISTOSE VICARIO

Huile de paraffine chimiquement pure
Spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale.

(La première en date en France.)

MANQUAT, Académie de Médecine, 27 janvier 1914.
(Paris-Médical, 25 avril 1914.)

VICARIO. Nouvel emploi pour usage interne. *(Journal de Pharm. et de Chim., 16 février 1914.)*

Laxatif mécanique, doux, inoffensif, non assimilable, non fermentescible.

La **LISTOSE** se présente sous deux formes :

LIQUIDE (légèrement aromatisée)

GELÉE (consistante et sucrée)

Mode d'emploi. — Liquide : Une cuillerée à soupe matin et soir. — Gelée : Une cuillerée à café matin et soir.

Indications. — Constipation, Entérites, Colites, etc. Pendant la grossesse et après les opérations intestinales.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e)

LOBULINE

Insuline per os.

Composition.

Extrait des îlots de Langerhans du pancréas associé à une levure glycolytique pure.

Forme.

Comprimés dragéifiés pour administration *par voie buccale*.

Indications. Diabète.

Avantages.

Innocuité absolue. Simplicité d'emploi. Action très persistante.

Mode d'emploi.

Deux à 6 comprimés par jour, suivant la glycosurie.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne, Paris

LORAGA

Émulsion parfaitement stable et homogène d'huile de paraffine de haute densité et la plus pure, d'agar-agar et de phénolphthaléine (45 mgrs. par cuillerée à café). Goût parfaitement accepté par tous malades et sans saveur artificielle.

Propriétés thérapeutiques :

Lubrifie l'intestin, pénètre le résidu alimentaire, le ramollit, et facilite son passage. Il active ainsi les mouvements de l'intestin et en rétablit les fonctions normales, sans l'irritation et la constipation secondaire qui résultent de l'emploi des purgatifs ordinaires. Il n'intervient nullement dans la digestion. Il n'occasionne ni nausées, ni coliques. Il ne provoque aucun suintement. Il ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalis.

Le Loraga n'entraîne pas l'accoutumance. Il n'exige pas qu'on en augmente la dose, au contraire, bien souvent on peut en diminuer la quantité et la fréquence, grâce à son effet tonifiant sur l'intestin. Le Loraga n'est pas échauffant et ne fait pas engraisser.

Indications :

La *Constipation chronique*, l'*Auto-Intoxication* et toutes les affections nécessitant un lubrifiant intestinal d'action douce mais réellement efficace. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les nourrices se trouveront en chantées de l'usage du Loraga, car il assure des selles-faciles et régulières sans le moindre effort, ni effet débilisant.

Le Loraga est aussi particulièrement bienfaisant dans les cas d'hémorroïdes et d'évacuations douloureuses, en raison de son action amollissante et lubrifiante sur les résidus intestinaux.

Doses et mode d'emploi :

Dose pour adultes : Une demi à une cuillerée à soupe (deux à quatre cuillerées à café) le soir, au moment du coucher ; si c'est nécessaire, répéter la dose le matin en se levant.

Dose pour enfants : Une demi à deux cuillerées à café suivant l'âge, soit pur, soit mélangé avec de l'eau ou du lait.

Composition :

Huile de Paraffine modifiée.....	32.00 p. 100
Phénolphthaléine.....	1.36 —
Émulsion Agar-agar.....	66.64 —

Deux modèles :

210 cc. : 17 frs. 50. — 420 cc. : 30 frs.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux

Laboratoires SUBSTANTIA

GUILLEMOTEAU et C^{ie}

Pharmacien

70, rue de Strasbourg — VINCENNES

LUCHON

Reine des Pyrénées.

Station des Vapeurs sulfurées

Toute la thérapeutique
par le soufre et la radioactivité

Radio-Vaporarium Sulfuré.

Souveraine
dans toutes les affections d'O.R.L.,
les catarrhes bronchiques,
l'asthme humide, les dermatoses,
les arthropathies rhumatismales,
les manifestations de l'arthri-
tisme.

Savons et comprimés aux sels
sulfurés naturels.

Compagnie fermière
de LUCHON

(Haute-Garonne)

LUCODAL

Se présente sous forme de perles, contenant chacune rigoureusement dosés à l'état le plus actif : Bromoforme, Codéine, Aconit, Belladone, Drosera.

Propriétés thérapeutiques. — La perle de Lucodal permet d'administrer son contenu sans aucune intolérance gastrique.

Elles s'adresse à toutes les formes spasmodiques, quinteuses, sèches de la toux. Toux hémétisantes des tuberculeux, Toux des hépatiques, des diabétiques, etc., Toux post-grippales.

Adultes : 3 à 4 perles par 24 heures.

Enfants (Seulement au-dessus de 5 ans) : 1 à 3 perles par 24 heures.

Prix : 10 fr. l'étui (sans impôt).

Echantillons :

Laboratoires CARESMEL

2, quai Paul-Bert — TOURS (Tél. : 19-42)

LUDIN

Traitement Arséno-Mercuriel dissimulé.

Formes

Sirop. — Granules

Composition :

1 cuillerée à soupe de sirop ou 3 granules
= 1 Cgr. Hg. + 1 Milligr. As.
Sans iodure, sans alcool.

Doses moyennes :

Sirop :

Adultes : de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : par cuillerées à café.

Granules :

Adultes : 6 à 12 granules par jour.

Enfants : 2 à 3 granules par jour.

Nota. — Prendre ces doses de préférence pendant les repas.

Propriétés thérapeutiques :

Tolérance parfaite, sécurité absolue. Beaucoup plus actif que le bismuth sans en présenter les inconvénients (stomatites, etc.). Activité égale à celle des arséno-benzols sans en avoir la toxicité.

Indications thérapeutiques :

Enfants hérédos, Prophylaxie pendant la grossesse, Traitement d'épreuve, Syphilis larvée, Dysenterie amibienne relevant des Hématozoaires, Eczémas, Dermatoses, etc.

Peut être prescrit aux enfants en bas âge en diluant le sirop dans eau ou sirop simple.

Prix : granules 11 fr. 10. Sirop : 15 fr. 25.

Laboratoires REY — DIJON

LUSOFORME

Formol saponiné, liquide :

Lusoforme médical. — Antiseptique général de $\frac{1}{4}$ à 1 %.

Lusoforme brut. — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 %.

Le Lusoforme est un savon légèrement alcalin contenant 20 % de formol et fabriqué à l'autoclave.

Indications. — Gynécologie, Obstétrique, Hyperhydroses, Pansements d'urgence.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS

MAGNÉSIE LOURDE DE DUREL

Magnésie anglaise calcinée.

Cette Magnésie présente les avantages suivants : Elle ne possède aucun goût et se mêle facilement à tous les liquides.

Elle est éminemment active et ne provoque jamais de coliques.

Elle agit, suivant la dose, comme un simple laxatif ou comme un purgatif énergique.

Elle ne provoque pas l'accoutumance ni la paresse consécutive intestinale, de sorte qu'elle peut être employée indéfiniment.

Cette qualité la rend précieuse dans toutes les affections hépatiques où son emploi journalier permet l'élimination régulière de la bile.

Posologie. — Une cuillerée à café le soir.

LABORATOIRE DUREL

7, boulevard Denain, Paris.

MAGNÉSIUM HARDY (Sirop de)

Titré à 1 gr, 20 de Chlorure de Magnésium pur anhydre, par cuiller à soupe.

(Dose journalière recommandée par M. le Professeur Delbet).

Propriétés et Indications. — Stimulant biologique général par reminéralisation, Antitoxique, Guérison des prurits (eczéma) et Dermatoses diverses, de l'Acné même rebelle, Régulateur de la fonction hépatique **Laxatif parfait.**
Prophylaxie du cancer.

Laboratoires Paul HARDY

100, rue Montmartre — PARIS

MAGNÉTONE-SÉLAMON

MAGNÉTONE Cholagogue léger.

Composition. — Sulfate de magnésie anhydre. Extrait biliaire. Peptone.

Présentation. — Comprimés glutinisés.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés le matin à jeun. Boire aussitôt une tasse d'un liquide chaud (tisane, eau sucrée).

Agit comme cholagogue léger en provoquant le drainage de la vésicule.

Aide puissamment à l'action de l'Entéroxin avant lequel on doit le prendre à un quart d'heure de distance.

SÉLAMON

Chlorure d'ammonium pur en comprimés à 50 centigr. 3 à 6 comprimés par jour aux repas.

Modificateur de la réaction des urines.

Aide puissamment à l'action de l'Entéroxin dans les coli-bacilluries.

Prix : 15 francs chacun.

Pharmacie LECLERC

Dr P. Lemeland, succ.

10, rue Vignon — PARIS (IX^e)

MAGOL CHURCHILL

(Hypophosphite de manganèse : 0 gr. 20 par dose.)

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Préparation assimilable de *phosphore* et de *manganèse*.
Métal-Ferment grand Catalyseur, Agent et Cause de toutes les oxydations qui régissent le Substratum vital,
Remplace avantageusement le Fer.

Indications. — Anémie, troubles de l'ovulation, croissance difficile, insuffisances hépatique et mitrale, diabète, chlorose.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intra-musculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans, par cuillerée à dessert t. Au dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 15 fr

Laboratoire CHURCHILL

12, rue Castiglione — PARIS (1^{er})

MALARSAN

Sel de quinine de l'acide acétyl-amino-oxyphényl-arsinique.

Propriétés thérapeutiques :

Traitement par **voie buccale** :

du **paludisme** (*Plasmodium vivax* et *Plasmodium malarie*) et des **Parasitoses intestinales** à protozoaires (diarrhées rebelles à amibes spirilles ou lamblias).

Présentation :

Tube de 30 pilules vernies et inaltérables à 0 gr. 20 de sel actif.

Posologie :

3 pilules par jour, pendant 10 jours.

Activité remarquable, tolérance parfaite. Action sur l'état général.

Prix au public : 16 francs.

Laboratoires P. AUBRY

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 15-26.

Belgique : Agent général, Ch. SCHOEFFER

34, rue du Canada — BRUXELLES

MALTEA MOSER CRISTALLISÉE

Extrait de Malt sec, absolument pur.

Aliment-ferment vitaminé. pour tous les âges.

Indications :

Alimentation rationnelle (suralimentation et adjuvant des régimes).

Régulateur des fonctions digestives (entérites, entérococolites infantiles et des adultes).

Galactagogue efficace.

Préparation rapide des bouillies maltosées pour alimentation infantile.

Reconstituant général anticonstipant.

Mode d'emploi :

Se prend pure ou mélangée à toute boisson.

Pour adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Pour enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 fr. le flacon (usage 15 jours).

MOSER et Cie

8, chemin de Montbrillant — LYON (Monplaisir).

MALT FRANÇAIS DEJARDIN

(Extrait de)

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indic. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques. Aliment des faibles, des délicats, des épuisés. Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes* : Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Établissements DÉJARDIN

10, Rue Parent de Rosan — PARIS (16^e)

MALTOSAN

Soupe maltée en poudre

Composition. — Maltose 30 %. Dextrines 25 %, Céréales 40 %, Sels minéraux 2 %, H₂O 3 %, Diastases.

Indications. — Affections gastro-intestinales de la première et seconde enfance : diarrhée estivale, dyspepsies diverses, etc. Réussit dans les cas les plus rebelles. Rend aisé le sevrage et en évite les périls.

Doses. — 2 cuillerées à café par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 cuillerée nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

Cuire rapidement sans cesser de remuer. Retirer du feu avant le premier bouillon.

Établissements WANDER

1 bis, route de Joinville, CHAMPIGNY (Seine)..

MALT PAILLETÉ PROGIL

Extrait de malt cristallin garanti pur.
Reconstituant diastasique vitaminé.

Préparé par évaporation dans le vide des liqueurs extractives du malt. Renferme la totalité de la diastase, du malt, du maltose, des phosphates naturels, de la lécithine, des peptones et des vitamines.

Reconstituant. — Aliment très concentré de digestibilité parfaite.

Indications. — Convalescents, Anémies, Surmenés, Opérés, Dyspeptiques, Cardio-Rénaux, Hépatiques.

Il s'associe très bien aux *Diasés Progil*, farines fraîches diastasées de céréales et de légumineuses (voir page n° 206) et cet ensemble constitue une suralimentation idéale.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour soit tel quel, soit dans de l'eau ou dans une infusion.

Enfants 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, à faire prendre de la même façon.

PROGIL

Sté Anonyme au capital de 50. 000. 000 de francs.
6, Boulevard de Strasbourg, Paris (X^e)
10, Quai de Serin, Lyon (IV^e).



MALT WANDER ou GLOMA

GLOMA PUR

(Extrait de malt sec)

Composition. — Matières azotées 5,87%, Hydrates de Carbone (maltose et dextrine) 89,17 %, Substances minérales 1,56 %, Eau 3,40 %, Acide phosphorique en pour cent des substances minérales 9 %.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Aliment végétal, nutritif et digestif. Asthénie générale, Convalescence, Dyspepsie, Entérocologie chronique par insuffisance amylolytique. Scorbut et maladies par avitaminose. Permet la préparation des bouillies maltées.

iodo-GLOMA

(Gloma à l'iodure de fer)

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0,12 grs. de proto-iodure de fer.

Indications. — Répond aux indications du fer et de l'iodure. Chez les lymphatiques, les chloro-anémiques, les adénoïdiens dans le traitement interne des dermatoses remplace avec avantage et agréablement l'huile de foie de morue. L'extrait de malt évite les inconvénients de la médication ferrugineuse et de l'iodurisme.

GUAYA-GLOMA

(Gloma au carbonate de gaiacol)

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0,35 grs. de Carbonate de gaiacol.

Indications. — Médication de bronchites et pneumopathies diverses, en particulier de la tuberculose. Répond aux nom-

breuses indications de la créosote, sans en avoir ni sur les voies digestives, ni sur la circulation pulmonaire, les inconvénients redoutés.

GLYCERO-GLOMA

(*Gloma aux glycérophosphates*)

Composition. — 1 cuillerée = 0,40 grs. de Glycérophosphates combinés, de chaux, de soude, de fer, de magnésie.

Indications. — Convalescence des maladies aiguës (grippes, bronchites, typhoïdes, etc.) Surmenage, déminéralisation, anémie, tuberculose. L'extrait de malt facilite la digestion et favorise l'assimilation des médicaments qui lui sont, ici, associés.

CALCIO-GLOMA

(*Gloma au Phosphate de chaux*;

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0,15 grs. de chlorhydrophosphate de chaux.

Indications. — Contribue par son phosphore à la nutrition du système nerveux, par sa chaux à celle des tissus osseux (rachitisme, scrofule, etc.) Permet la cure de récalcification dans la tuberculose. Utile aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Doses. — *Enfants* : 1-3 cuill. à café 3-4 fois par jour
Adultes : 1-3 — soupe 3-4 — —

Au début des repas pur ou dissous dans de l'eau ou du lait.

Etablissements WANDER

151 bis, route de Joinville
CHAMPIGNY (Seine).

MANGAÏNE

Peroxyde de Manganèse.
chimiquement pur.

Forme et Dose :

Tablettes 0,10 de Peroxyde de Manganèse.

Propriétés therap. :

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

Indications therap. :

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

Dose :

4 à 6 tablettes par jour.

Pharmacie SCHMIT

71, Rue Sainte-Anne — PARIS

MANGANO PHOSPHAL

Julien

(GOUTTES)

Sans aucun toxique.

XX gouttes contiennent :

Glycérophosphates divers.....	0 gr. 90
Acide phosphorique offic. pur ..	0 gr. 50
Sels de manganèse.....	0 gr. 10

Composition :

Acide phosphorique.....	1000
Glycérophosphate de soude.....	1000
— de potasse.....	500
— de chaux.....	250
— de magnésie.....	100
— de manganèse.....	200
Chlorure de manganèse.....	200

En solution sans alcool et sans sucre.

Propriétés et Indications. — Puissant reconstituant. Sans aucun toxique, convenant à tous. Médication mangano-phosphorée intensive.

Enfants. — Manque d'appétit. Retards de la dentition et de la marche. Rachitisme. Insuffisance du poids et de la taille. Troubles de la nutrition.

Adultes. — Anémie. Faiblesse. Neurasthénie. Surmenage intellectuel et physique. Convalescences. Carie dentaire. Phosphaturie. Grossesse. Allaitement.

Vieillards. — Dépression. Faiblesse. Troubles nerveux. Fatigue avec hypertension.

Posologie. — *Enfants.* — 2 gouttes par jour, par année d'âge dans un peu d'eau sucrée.

Adultes. — 20 gouttes à chacun des repas de midi et du soir dans 1/3 de verre de liquide.

Aucune contre-indication.

Prix : 12 fr. 50. — *Flacon gratuit sur demande.*

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris
105, rue de Rennes (angle de la rue d'Assas)
PARIS (VI)

MARINOL

Reconstituant marin physiologique.
Inaltérable. De goût agréable.

Composition. — Eau de mer captée au large. Iodalgol (iode organique). Phosphates calciques en solution organique. Algues marines iodifères. Méthylarsinate disodique.

Particularités. — Seul succédané naturel de l'huile de foie de morue. Permet seul l'administration de l'iode organique marin dans son véhicule normal, l'eau de mer. Tolérance absolue.

Indications. — Lymphatisme. Anorexie. Tuberculoses. Anémie. Convalescences.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe.
Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café.

Avant ou après les repas. Pur ou dilué.
Littérature et échantillons.

Laboratoires LA BIOMARINE
(Laboratoires spéciaux de thérapeutique marine)
DIEPPE (Seine-Inférieure).

MARRUBIASE

Extrait de plantes " incisives " et surtout de Marrube blanc.

Formes. — Dragées et sirop.

Propriétés. — Diarrhée rapidement jugulée sans constipation. Suppression presque immédiate du sang et des glaires. Retour à bref délai de la selle moulée quotidienne. Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

Indications et Posologie. — *Diarrhée infantile* (nourrissons) : 1 cuillerée à café toutes les 2 heures (pure ou dans un peu d'eau sucrée).

Intoxications, Dysenteries : (selles nombreuses) 2 cuillerées à soupe ou 4 dragées toutes les 2 heures. Réduire dès résultat obtenu.

Entérite chronique : Progressivement, 2 à 5 cuillerées ou 4 à 10 dragées par jour avant les repas et au coucher.

Prix : 14 francs

COMTE, Pharmacien
60-62, Rue Saint-Guilhem — MONTPELLIER

MATÉ DOUGLAS

au Maté du Paraguay

Indications.

Nutritif, fortifiant, stimulant. Développe les facultés intellectuelles. Tonifie le système nerveux. Détermine une sensation de bien-être et de vigueur sans amener de dépression, ni d'inconvénient quelconque après son emploi.

Composition.

Vin : Muscat de Samos et Maté.

Elixir : Crème de Cacao et Maté.

Granulé : Maté glycérophosphaté.

Littérature et échantillons au Dépôt Général :

PHARMACIE ANGLAISE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

62, avenue des Champs-Élysées, Paris (VIII^e)

Téléph. Élysées : 22-52

MÉNATOL

Forme. — Dragées.

Composition. — Ovarine. Marron d'inde, Genêt, Rhamnus, Viburnum, Capsicum, Hydrastis, Hamamélis.

Propriétés pharmacodynamiques. — Vaso-constricteur utérin, Sédatif et hémostatique, Tonique et décongestif du réseau veineux.

Indications. — Troubles de la Ménopause — Règles douloureuses — Régulateur des fonctions utéro-ovariennes.

Mode d'emploi. — Deux à six dragées par jour, au début des repas.

Laboratoires A. BAILLY et C^{ie}

15 et 17, rue de Rome — PARIS (8^e)

MÉNOSÉDINE

Extraits végétaux associés à calmants minéraux et substance protéidique tirée de l'ovaire. Sans toxicité.

Indications. — 1° Sédatif utérin. Calme les phénomènes douloureux et malaises qui accompagnent et précèdent les règles.

2° Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles espacées.

Deux formes. — Comprimés. Liquide

Comprimés. — 3 comprimés dès le début des malaises occasionnés par la menstruation avec une infusion chaude ou dans un peu de confiture. — 3 comprimés une demi-heure après, si besoin est.

Liquide. — Une cuillerée à bouche, une deuxième une demi-heure après, si la première n'a pas suffi. (de préférence dans une infusion chaude).

LABORATOIRES DEMASLES

à Vienne (Isère).

MENOVARINE

Principes extractifs végétaux sélectionnés, renforcés par un catalyseur : le Manganèse.

Deux indications :

Maladies veineuses ; troubles congestifs de la fonction ovarienne.

Posologie :

Deux dragées à chaque principal repas.

Laboratoires MONDOLAN

41, rue Étienne-Marcel — PARIS (1^{er})

MÉRAL

(poudre stomachique.)

A base de natr. bica.; natr. chlor.; cal. carb.; magn. oxyd.; amm. chlor.; cal. phosphor.

Indications :

Gastralgies, Fermentations anormales, Hyperacidité, Dilatation de l'estomac, Nausées, Vomissements, Mauvaise digestion, Troubles gastriques de la grossesse.

Union Chimique Belge S. A.

Division : Produits pharmaceutiques

“ MEURICE ”

68, Rue Berkendael — BRUXELLES
(Belgique)

MÉSOFORME

BACTÉRICIDE PUISSANT

DESODORISANT — ANTISEPTIQUE — DESINFECTANT
non caustique, non irritant, non toxique
(Ne tache pas le linge).

Composition. — Solution saponifiée de thymol et de paraldéhyde, avec adjonction de sels alcalins supprimant toute causticité.

Indications. — *Gynécologie* : Hygiène de la femme. Leucorrhée, Métrite, Salpingite, Accouchements. — *Laryngologie* : Angines, Amygdalites, Absès. — *Stomatologie* : Gingivites, Carie.

Mode d'emploi. — *Action prophylactique* : 1 cuill. à dessert pour 2 litres d'eau bouillie chaude. — *Accouchements et Gynécologie* : 1 ou 2 cuill. à dessert pour 2 litres d'eau bouillie chaude. — *Laryngologie* : 2 cuill. à dessert pour 1 litre d'eau bouillie chaude. — *Stomatologie* : XXX gouttes dans un verre d'eau.

Littérature et échantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Prix : 12 francs

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS

MÉSOTHORIUM BUISSON

Solution de bromure de mésothorium pour injectio s in ramu culaïres, intra-veineuses ou interstitielles.

1° Solution faible (concentration A) : dosée à 1/1 de micr. par cc. Injecter de 1 à 3 cc. par jour, pendant une ou deux semaines. Observer des intervalles de repos d'environ une semaine entre chaque série.

Indications : artério-sclérose, états asthétiques et anémiques, pré-tuberculose.

2° Solution moyenne (concentration B) : dosée à un micr. par cc.

Indications : rhumatisme chronique, rhumatisme blennorrhagique, anémie. Séries de 12 piqûres, au rythme d'une piqûre tous les jours ou tous les deux jours, intervalles de repos d'une semaine entre deux séries. Dans l'adénite tuberculeuse une à deux injections intratumorales par semaine.

3° Solution forte (concentration C) : dosée à 2 micr. par cc.

Indications : rhumatisme chronique, rebelle et déformant, sciatique, névrite, leucémie, cancers inopérables, tumeurs de la prostate et de la vessie. Séries de 12 piqûres, au rythme d'une piqûre tous les jours ou tous les deux jours, intervalles de repos d'une semaine entre deux séries.

4° Solution forte spéciale (concentration D) : 2 micr. par cc. en ampoules de 5 cc.

Indications : tumeurs malignes, cancers de la vessie. — Plus spécialement réservée aux instillations vésicales.

Etablissements ALBERT BUISSON

F. JALOT et C^{ie}.

157, rue de Sèvres, Paris. R. C. Seine 222.705 B

MÉTACUPROL

Puissant antiseptique gynécologique et dermatologique. Ni caustique, ni irritant. Peut s'employer sans eau bouillie.

Propriétés. — Effet acide certain dans toutes, Streptococcies et Staphylococcies.

Indications. — *Gynécologie* : Leucorrhées Mitriles, Démangeaisons, Hygiène intime.
Dermatologie : Furonculose, Impétigo, Eczémas, Brûlures, Affections suintantes.

Forme. — Comprimés effervescents de 1 gramme.

Posologie. — *Gynécologie* : 1 à 2 comprimés par 1 lre d'eau.

Dermatologie : 1 comprimé par litre d'eau.

Laboratoire du MÉTACUPROL

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e)

Téléph. : Auteuil 35-25

MÉTA-TITANE

Pommade introduisant le titane en thérapeutique.

Indications. — *Prurits Erythèmes* : Eczémas, Intertrigo. Brûlures du 1^{er} degré. Cours de soleil, engelures. Piqûres d'insectes, Erythèmes des nourrissons, Croûtes de lait; Gerçures des seins, etc...

Propriétés et Avantages. — Donne des résultats encore jamais atteints jusqu'ici par aucun autre topique (Cf Thèse Delahaye, hôpital de l'Antiquaille, à Lyon, etc..)

Aucune toxicité, Antiseptique, Eridermisant, Anti-prurigineux à action durable. *Absolument aucun similaire.*

Remarque. — Les sels de titane utilisés ne se trouvent pas dans le commerce. D'ailleurs, ils sont obtenus par un procédé tout particulier, qui n'est pas encore publié et sont rigoureusement purs.

Présentation :

En pot : 20 fr. — En tube : 15 fr.

En tube d'essai : 6 fr

Laboratoires METADIER

TOURS

MÉTA-VACCIN

Vaccin en pommade aux anti-virus de Besredka.

Indications. — Toutes les suppurations : Plaies, Furoncles, Anthrax, Impetigo, Abscess, P. fariis, Pyodermites, Sycosis. Ulcères, Ecorchures, Brûlures, Orgelets, Blépharites, tous pansements après accouchement.

Avantages. — 1^o Activité due à l'origine des souches, directement extraites de malades et jamais repiquées. 2^o Polyvalence extrême. 3^o Essai avant mise en vente, d'où, garantie d'activité. 4^o Absorption parfaite. 5^o Commodité. 6^o Aucune réaction. 7^o Innocuité absolue.

Emploi :

1. *Immunitisation locale* : Bien faire pénétrer par un léger massage, si possible ; sinon, mettre sur gaze, et faire pansement habituel. Renouveler deux ou trois par jour.
2. *Immunitisation générale* : Dans les cas de furonculose générale ou de phlegmons avec lymphangite, il est recommandé de faire faire des frictions aux plis des aînes et aux aisselles, et même d'introduire du Méta-Vaccin dans le rectum.

Présentation. — En tubes grand modèle : 18 fr. et en tubes d'essai : 7 fr.

Laboratoires MÉTADIER
TOURS

MÉTRITOLS

Comprimés Gynécologiques effervescents, antiseptiques alcalins, astringents.

Composition. — Acide picrique, oxyquinoléine, oxycyanure de Hg, thymol, bicarbonate, amidon, formaldéhyde. Parfum agréable des essences de labiées alpestres associées à l'essence de cèdre.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, alcalins, astringents, les Métritols donnent des résultats certains dans les leucorrhées de toute nature et les vaginites.

Mode d'emploi. — Injections vaginales. Un comprimé dans un litre d'eau bouillie chaude 40 à 45°. Position couchée, bock très bas.

Laboratoire LEES

Directeur : Dr P. ROLLAND
18, rue Pierre-Gurie — PARIS

MIALBAÏNE

Solution d'ouabaine Mialhe à
1/1000, XXV à C gouttes par
24 heures.

Pharmacie du docteur MIALHE

8, rue Favart — PARIS

MICELLIODE

IODE COLLOÏDAL MICELLAIRE
ÉLECTRO-POSITIF

ÉNERGÉTIQUE ET CATALYSATEUR

à grains ultra-microscopiques de diamètres inégaux
vraies micelles iodées en suspension dans l'eau
animées de vifs mouvements browniens.

PRÉPARATION BIOLOGIQUE FRANÇAISE

rigoureusement scientifique

Hyperactive par un seul de ses éléments

(uniquement par l'iode libre des micelles)

Remarquable par sa très faible teneur en iode.

FORMULE :

Extrait hépatique déprotéiné en pseudo-solution aqueuse.....	1000 cc.
Iode métalloïdique libre en suspension colloïdale.....	1 gr. 50.

soit 0 gr. 0015 ou 1 milligr. 1/2 d'iode pur par cc.

CONSTITUTION

PSEUDO-SOLUTION AQUEUSE

fortement colorée en brun rouge caractéristique

nullement désagréable au goût

exemple de toute substance ce irritante.

PARFAITEMENT STABLE

— (conservation intégrale assurée pendant plus de 6 ans) —

RÉALISÉE PAR ADSORPTION

sans combinaison iodée

d'après une technique particulièrement délicate :

Véritable condensation d'iode métalloïdique soluble chimiquement pur

en minces pellicules adhérentes à la surface de multiples granules solides en suspension dans un

véhicule colloïdal micellaire aqueux défini

d'action thérapeutique négligeable

extrait du foie frais d'animaux sélectionnés

spécialement alimentés avant l'abatage

en vue d'un optimum d'état physiologique.

CARACTÉRISTIQUE ESSENTIELLE

= disproportion entre les effets et les doses =

REMEDE HÉROIQUE

par la voie buccale comme par la voie intravasculaire

à doses infinitésimales d'iode libre
grâce à sa curieuse résistance aux réactifs chimiques.

— **NOTE IMPORTANTE** —

Tous les faits d'observations cliniques et de laboratoire se rapportant à cette caractéristique essentielle du « Micelliodé » s'accorde avec les conceptions modernes formulées par M. Auguste Lumière, le grand savant lyonnais, sur la constitution des colloïdes et les deux propriétés fondamentales des colloïdes micellaires, tant synthétiques que cellulaires et humoraux : la floculation et l'immunité granulaire de la micelle.

AVANTAGES DU MICELLIODE

= conséquences naturelles de sa constitution =
ÉMINEMMENT ASSIMILABLE
TOLÉRANCE INCOMPARABLE A TOUS LES AGES
JAMAIS D'IODISME — JAMAIS DE CHOC

AUCUNE CONTRE-INDICATION PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

PUISSANT RÉNOVATEUR
 cellulaire, tissulaire et humoral
 par action élective sur les glandes endocrines
DÉPURATIF TONIQUE LÉCONGESTIF
ANTI-SCIÉREUX ANTI-INFLÉCTIEUX Antitoxique.
 Antitoxinique

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

REMPLACE IODE ET IODURES
 dans leurs applications courantes
Lymphatisme. - Rachitisme Scroful. - Arthritisme
 Toutes les scléroses Toutes les infections
SURDITÉS REBELLES

FORMES PHARMACEUTIQUES

FLACONS-GOUTTES & AMPOULES INJECTABLES
 (de 50 et 30 cc.) (toutes de 2 cc.)
 pour voies buccale, intraveineuse et intramusculaire.

MODE D'EMPLOI

Les gouttes se prennent dans de l'eau au cours ou en dehors des repas ; pour les nourrissons dans du lait.

— Elles sont bien acceptées par les enfants —
 Les injections intramusculaires sont indolores avec 5 mgr. de novocaïne en solution adrénalinée.

DOSES ET DURÉE DU TRAITEMENT

= GOUTTES =

à fractionner en deux fois dans la journée

ADULTES : 100 GOUTTES PAR JOUR

Enfants au-dessus de 7 ans : 50 à 10 gouttes par jour.

— Jeune âge : 30 à 50 gouttes par jour. —

— Nourrissons : 10 à 30 gouttes par jour. —

Pour être efficaces, les gouttes doivent être prises tous les jours pendant 2 mois de suite au moins 2 fois l'an : printemps et automne.

= AMPOULES =

pour médication iode intensive par injections

ADULTES : 1 AMP. DE 2 cc. TOUS LES 2 JOURS

Enfants (1 cc.) et Nourrissons (1/2 cc.) tous les 2 j.

jusqu'à concurrence de dix injections consécutives.

États graves adultes : 2 à 4 amp. par jour en 2 fois.
 suivant l'avis du médecin.

PRIX DE VENTE OBLIGATOIRE

Gouttes : Grand flacon 30 fr. — Petit flacon 20 fr.

Ampoules : Botte (10 amp.) 20 fr.

1/2 botte (5 amp.) 12 fr. 50.

LABORATOIRE DU MICELLIODE

Produits médicaux spécialisés,
 A. Roland, Pharmacien de 1^{re} classe,
 88, rue de la Villette — PARIS (XIX^e).

MICTASOL

DÉCONGESTIF PELVIEN

Composition

Comprimés : Bromure de Camphre 0.02, Formine 0.05, Noix de Malva Purpurea 0.25.

Suppositoires : Stovaine 0.01, Ext. de Jusquiame 0.05, Ichtyol 0.25 Malva purpurea 0 gr. 50

Propriétés thérapeutiques

Décongestif pelvien, antiseptique urinaire, sédatif génital. Tolérance parfaite. Innocuité absolue. Sans contre-indication.

Indications thérapeutiques

Prostatisme vasculaire. Rétention. Incontinence. Cystites. Séquelles de blennorragie. Néphrites. Pyélonéphrites. Métrites. Salpingites. Vaginites. Hémorroïdes.

Mode d'emploi :

Comprimés : 6 à 10 comprimés par jour, matin, midi, soir avec un peu d'eau.

Suppositoires : 1 ou 2 par jour.

Prix sous les deux formes : 12 fr.

Laboratoires du MICTASOL
COUDERC, Pharmacien de 1^{re} classe
28 et 30, rue du Four — PARIS (VI^e)
Téléphone : Littré 17-42.

MICTOSEPTOL

(Antiseptique urinaire liquide)

Composition. — Synthèse nouvelle diurétique, antiseptique et balsamique de benzoate d'Hexaméthylène-tétramine et d'*Arbutine* dans un excipient légèrement stomachique.

Indications. — Toutes les affections et infections urinaires : Lithiases, Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites, Urétrites, Blennorragie à toutes ses périodes ; maladies infectieuses : Grippe, Rougeole, Scarlatine.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau ou de tisane avant ou entre les repas.

Doses. — *adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour ; *enfants* : Par demi-cuillerée à café.

Laboratoires B. C. L.

29, faubourg Bourgogne — ORLÈANS

MIROXYL

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la Toux, Puissant modificateur des affections des Voies respiratoires, Phagocytogène.

Principe actif. — Action synergique du Méthylarsinate de Codéine et du Galacol inodore.

1 cuillerée à bouche contient :

Méthylarsinate de Codéine.....	3 centigr.
Galacol inodore.....	75 —
Cinammate de Soude.....	2 —
Iodure de Codéine.....	1/2 —

Préparation agréable au goût, aucune intolérance.

Posologie :

Affections aiguës : 3 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures éloignées des repas.

Affections chroniques : 2 cuillerées à soupe par 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Toutes affections des bronches, Tuberculose, Bronchite aiguës ou chroniques, Toux rebelle ou émétisante, Grippe, Asthme, Emphysème.

Prix : 15 frs.

Laboratoires du Dr TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS

MITIGANS ROXELANE

(Phénacéthéinopyrazolone)

Analgésique puissant. anti-rhumatismal. Les propriétés thérapeutiques du Mitigans en font un spécifique de l'Élément Douleur.

Médication aussi inoffensive qu'efficace. Aucune intolérance.

Indications. — Toutes les algies, névralgies, migraines, rhumatismes, etc.

Doses. — 1 à 4 cachets par jour.

**Les laboratoires PHARMACEUTIQUES
de la ROXELANE**

38 bis, rue Raphaël, Vanves-Paris.

MORANYL

309 Poulenc — 205 Bayer

Urée symétrique du Métaminobenzoyl-métaminop raméthylbenzol-1-naphalam no-4-6-8 trisulfonate de sodium.

Produit très soluble dans l'eau, dépourvu d'effets irritants; action tripanocide très énergique.

Indications :

Maladie du Sommeil africain.

Posologie et mode d'emploi. — Injections sous-cutanées ou intraveineuses hebdomadaires à doses progressives à 0 gr. 50 — 1 gr. et 1 gr. 50. Repos de 15 jours entre les séries.

" SPÉCIA "

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

MORÉTHYL DAUSSE

Morrhuate d'Ethyle : solution huileuse à 25%.
(Ampoules de 2 cc.)

Traitement de la tuberculose pulmonaire.

Indications. — L'action du Morhétyl se fait sentir sur toutes les formes de la tuberculose pulmonaire lentement évolutive, où il relève l'état général, fait baisser la courbe thermique en même temps que diminue l'expectoration bacillaire et que s'amendent les lésions. Les formes rapides de la maladie et la granulie ne semblent par contre nullement influencées.

Le Moréthyl ne comporte aucune contre-indication et ne provoque dans aucun cas de réaction locale ou générale.

Posologie. — 20 injections quotidiennes successives par voie sous cutanée ou intra-musculaire. Laisser un repos intercalaire de 10 jours et pratiquer de la sorte plusieurs séries d'injections. Durée du traitement : 3 mois au minimum.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

MORISLAND IRRADIÉ

(Granulé lipoïdique, Ergostérine Vitamine D)

Composition. — Ergostérine irradiée, Lipoïde de Foie de Morue, Iode, Tanin, Lécithine, Cholestérine, Glycogène, Acide nu léin que, Distéaro-glycérophosphate de Choline.

Indications. — Engorgements ganglionnaires, tous états de Faiblesse générale, Rachitisme, Bacillose.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : 2 — à café.

Prix : 48 fr.

Échantillons sur demande.

Laboratoire CHEVILLON

38, rue Rameau — PARIS

Tél. : Nord 85-48

MORRHUALÈNE GAUTIER

Médication. leucogène organique phospho-ferro-iodo-arsénée (entièrement assimilable).

Forme. — Sirop (saveur agréable sans action nocive, ni irritante pour les muqueuses gastro-intestinales).

Compos. — Iode physiologique stable et inaltérable; fer organique d'origine protéique, entièrement assimilable; sel sodique de l'acide phospho-glycérique; méthylarsinate disodique, rhamnus frangula.

Action physiol. — Stimulant des organes lymphoïdes et des séreuses; modificateur vaso-moteur; excitant des organes hématopoïétiques; reminéralisateur puissant; tonique général; excitant de la nutrition.

Indicat. — Lymphatisme (adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, végétations adénoïdes, impétigo), Hypoglobulie (anémie vraie, chlorose, diminution de la proportion d'hémoglobine, débilité générale). Maladies de la nutrition (rhumatisme chronique, artériosclérose, rachitisme, infantilisme). Convalescence de toutes les maladies.

Posologie. — De 2 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour, de 5 à 10 ans 2 à 3 cuillerées à dessert par jour; de 10 à 18 ans, 2 cuillerées à potage par jour; adultes, 2 à 3 cuillerées à potage par jour, (Avant les repas dans un peu d'eau).

Echantillons et littérature.

Laboratoires DORANTOWICZ

Avenue Parmentier — PARIS (XI^e)

Téléphone : Roquette 14-12

MORRHUÉTINE JUNGKEN

Forme et Composition. — Liqueur à base de glycérine pure contenant : Iode métallique 15 mgr. Hypophosphites composés (NaO, CaO, Manganèse) en tout 15 cgr. par cent. Soupe. Phosphate de soude : 15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable; pas d'irritation des muqueuses; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

La Morrhuéline Jungken Vitaminée est le même produit avec, en plus, toutes les Vitamines d'huile de foie de morue.

Propriétés. — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

Indications. — Anémie, Lymphatisme, Tuberculose, Convalescences des maladies infectieuses, d'opérations et blessures.

Doses et Mode d'emploi. — Enfants : 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — Adultes : 1 ou 2 verres à liqueur, après les repas, pure ou étendue d'eau au début des principaux repas.

BRACQUEMOND & C^{ie}

Anciens Établissements J. DUHÈME

105, Rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine)

R. C. Paris 207.767 B

MORRHUOL

Composition. — Principes actifs de l'huile de foie de morue isolés de la matière grasse.

Chaque capsule correspond à 5 grammes d'huile de foie de morue dont le Morrhuol supprime le goût désagréable et la mauvaise digestibilité.

Indications. — Lymphatisme, débilité, scrofule, rachitisme, affections chroniques de l'appareil respiratoire sous toutes leurs formes.

Action. — Reprise rapide de l'appétit et des forces, augmentation du poids, diminution de l'expectoration et de la toux.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 8 capsules par jour, à prendre au début des 2 principaux repas.
— *Enfants* : 2 à 4 capsules par jour.

**LABORATOIRE
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE**
D^r PH. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS

MORRHUXINE

Composition. — Iode organique. — Brome. — Glycérophosphates alcalins et arrhénal à raison de un demi-centigr. par cuillerée à soupe. — Véhicule glyciné et sirop de fruits très agréable au goût et très assimilable.

Propriété. — Apéritif tonique, reconstituant anti-lymphatique.

Indications. — Succédané de l'huile de foie de morue ; est indispensable dans tous les cas où l'huile de foie de morue n'est pas tolérée par le malade.

Doses : Enfants 2 à 3 cuillerées à café par jour, adultes 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

La bouteille pour 12 jours de traitement : 10 francs.

E. VERGELOT, pharmacien.

163, rue de Flandre, Paris (XIX^e).

MORUBIASE

Extrait hépatique total de morue irradiée et sans corps gras.

Principes actifs :

Lipophosphatides, acide mœrrhunique, vitamines.

Formes :

Pilules et granulé. Une pilule ou une cuillère à café de granulé contient les principes actifs de 30 gr. d'huile de foie de morue.

Avantages :

Petit volume, aucun goût, parfaite digestibilité, sans corps gras, se prend l'été comme l'hiver.

Indications :

Celles de l'huile de foie de morue : Anémie, Lymphatisme. Rachitisme. Affections chroniques des voies respiratoires.

Posologie :

Adultes : 6 à 8 pilules, par jour au début ou à la fin des repas.

Enfants : 2 à 6 cuillères à café suivant l'âge.

Arrhéno-Morubiase : Synergie thérapeutique : extrait hépatique et méthylarsinate disodique (0,005 mgr. par pilule).

Galaco-Morubiase : Extrait hépatique et 0,05 carbocinnamate de galacol par pilule,

Laboratoires MEYNET-CROENIER

6, rue Chanoinesse — PARIS

MORUBILINE

Extrait organique concentré, irradié de foie frais de morue.

La Cholestérine irradiée se transforme en Vitamine D. La Morubiline provoque les sécrétions des glandes endocrines. Renforce puissamment la défense de l'organisme.

Vitamines et lumière intégrée :

Le procédé d'obtention de la Morubiline extraite du foie frais de morue comporte un haut degré de concentration des éléments actifs de l'huile de foie de morue intensifiés sans les inconvénients d'indigestibilité avec toutes les propriétés de l'irradiation naturelle de celle-ci. Ses efforts thérapeutiques dépassent tout ce que l'on pouvait espérer jusqu'ici. La puissance et résistance qu'elle donne à l'organisme, se traduit par des résultats rapides et concourants.

Indications. — Affections des voies respiratoires lymphatiques et glandulaires, Adénopathie, Tuberculoses, Anémie, Trouble de croissance, Bronchites, Asthmes, Amaigrissement, Convalescence, Décalcification, Démminéralisation de l'organisme, Dépression nerveuse, Diabète, Défaut d'assimilation, Scrofule, Cachexie générale, Dénutrition azotée, Carence des éléments minéraux de la cellule nerveuse, Calcification, Affections dentaires de la première enfance, nourrices.

Dose. — XV gouttes matin et soir dans un peu de liquide avant le repas. *Enfants*: XI gouttes à 2.

Facile à digérer et agréable au goût.

Echantillons Labratoire de **CHIMIE BIOLOGIQUE**

Ch. BOUTET, 32, rue Joubert — PARIS

Concessionnaires pour l'importation en Amérique

Sud: Biraben et Cie Casilla de Correo, 81, MONTEVIDEO

MORUXASE

Deux formules :

1° Gouttes de Moruxase concentrée : 15 fr.

XX gouttes renferment :

Triiodure d'arsenic.....	5 centigr.
— de manganèse.....	5 —
Extrait iodotannique.....	50 —
Glycérine.....	50 —

Doses : { 2 à 7 ans..... XX gouttes } deux fois
 { 7 à 15 ans..... XL — } par jour.
 { adultes..... L — }

2° Moruxase, sirop : 12 fr.

1 cuillerée à soupe renferme :

Triiodure d'arsenic.....	5 centigr.
— de manganèse.....	5 —
Extrait iodotannique.....	50 —
Lactophosphate de chaux.....	40 —
Sirop au suc naturel de groseilles.....	20 —

Doses : { 2 à 7 ans..... 1 à 2 cuill. à café } deux fois
 { 7 à 15 ans et adultes..... 1 à 2 cuill. à soupe } par jour.

Indications. — Carence physiologique, Anémie, Lymphatisme, Troubles de croissance, Inflammations ganglionnaires.

Action catalytique puissante du manganèse. Le sirop fait à froid contient intactes les vitamines du suc de groseilles.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, place Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE

MUCINUM (Comprimés de)

Composition. — Association de nombreux produits végétaux ou organiques (à l'exclusion de tout drastique), dont chacun à la dose utilisée serait sans action, mais dont l'ensemble réalise une véritable synergie laxative.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux n'irritant jamais l'intestin et ne provoquant pas d'accoutumance. Réussit dans tous les cas de *Constipation* du fait de la pluralité des éléments qui le composent.

Forme. — Petits comprimés très friables, sans saveur, pouvant être croqués ou avalés.

Posologie. — 1/2 à 2 comprimés par jour selon l'âge et la réaction individuelle (généralement au repas du soir).

Prix : 5 fr. 50 la boîte.

Laboratoires **CHANTEREAU**

8, rue de Constantinople
 et 26 bis, rue Dombasle — PARIS

MUCOSODINE

Antisepsie des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles

Composition. — Bicarbonate de soude, Hyperborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

Propriétés. — Donne un sérum boraté, alcalinisé et oxygéné. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, Rhinites, Rhume des Foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites. Otites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.

Bain nasal, douche nasale, Gargarismes. Bains de bouche. Irrigation.

Le flacon : 7 fr. 50

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e)

Téléphone : Invalides 42-63

MUSCULOSINE BYLA

Jus de Viande crue hyperactivé par les oxydases globulaires, les hormones spléniques, le manganol et les vitamines cardio-hépatomusculaires.

Prop. thérap. — Antibacillaire, Toni-nutritif, Excitant physiologique.

Indications. — Convalescence, Anémie, Tuberculose. Neurasthénie.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à bouche aux repas, dans la boisson préférée, toujours froide ou tiède, gazeuse de préférence.

Voir page 902

ZOMO-MUSCULOSINE BYLA

((Sèche))

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS

R. C. Seine 71.895

MUTHANOL

Hydroxyde de Bismuth raffiné porphyrisé.

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes.

Dose normale : Ampoule de 2 centimètres cubes renfermant 13 centigrammes de Bismuth métal.
Boîte de 10 ampoules, 3 francs

Doublé dose : Ampoules de 3 centimètres cubes renfermant 26 centigrammes de Bismuth métal.
Boîte de 10 ampoules, 40 francs.

Dose infantile : ampoule de 1 centimètre cube renfermant 2 gr 6 de bismuth métal.
Boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les deux jours ou 2 ampoules tous les 5 jours. Dans les cas rebelles : 2 ampoules tous les 2 jours.

Traitement de sûreté. Suppositoires Muthanol, adultes et enfants.

Laboratoire du MUTHANOL : G. FERVÉ
55, boulevard de Strashourg — PARIS (X^e)
R. C. Seine 143.981

MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN

Solution colloïdale phagogène polyvalente. — Stimule la phagocytose.

Formes et doses :

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuillerées par jour.

Extrait de Mycolysine 1 à 4 cuillerées par jour.

Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.

Pastilles de Mycolysine, 15 à 20 pastilles par 24 h.

Indications. — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les amygdalites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc. .

Laboratoires LEBEAULT & C^{ie}

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e)

MYRTILLINE DEMASLES

Traitement des diarrhées, des dysenteries, de l'entérite sous toutes ses formes.

Forme. — Liquide, à base de myrtille et de salicaire.

Indications. — Diarrhées infantiles, saisonnières, tuberculeuses, entérites, dysenteries.

Propriétés thérapeutiques. — Action astringentes, sédative, antiseptique, analgésique.

Posologie. — Doses moyennes :

Adultes : Une cuillerée à café au début des deux principaux repas.

Enfants : Une demi-cuillerée à café deux fois par jour.

Nourrissons : 15 gouttes par année d'âge, deux fois par jour.

(Ces doses peuvent être augmentées ou diminuées selon les indications du médecin traitant.)

La *Myrtilline* se prend dans un peu d'eau.

Laboratoires DEMASLES

Vienne — ISÈRE.

NAIODINE LOGEAIS

Formule. — Iodure de Sodium stabilisé en solution aqueuse injectable. Ne contient aucun autre principe actif, toxique ou autre.

Formes. — Se présente en ampoule de 10 cc. et de 5 cc. contenant 0,01 cgr. de sel hyperactif par cc.

Boîte 6 ampoules 10 cc., 23 fr. net.

Boîte 12 ampoules 5 cc., 25 fr. net.

Boîtes-vrac de 50 ou 100 ampoules réservées au Corps médical. Prix spéciaux sur demande.

Propriétés. — *Sédatif-type de l'élément douloureux*, grâce à l'action neurophile intense de NaI stabilisé.

C'est en effet par imprégnation de la cellule nerveuse et du névrilème par l'ion iode de la Naïodine qu'est obtenue la sédation rapide et atoxique des algies les plus rebelles.

La Naïodine est inaltérable, absolument indolore à l'injection, immédiatement assimilable, sans réactions secondaires.

Véritable traitement spécifique de la sciatique, c'est en outre un précieux succédané des stupéfiants (algies rebelles, toxicomanies, etc.). Utilisée comme solvant du novarsénobenzol, elle en permet l'injection intramusculaire et la rend indolore.

Indications. — Tout syndrome douloureux, aigu ou chronique : Sciaticques, Lumbagos, Zonas, Rhumatisme articulaire aigu, Rhumatisme déformant, Névralgies intercostales et lombaires, Névrites, Myalgies, Asthme, Emphysème pulmonaire, Toxicomanies, etc.

Posologie. — S'administre à doses massives : Pour obtenir un résultat rapide ne pas craindre de frapper fort puisqu'on ne redoute ni douleur à l'injection, ni réaction locale ou générale.

10 à 30 cc. par jour jusqu'à sédation, en une seule séance quotidienne (piqûres en série facilement résorbées). Injections intramusculaires lentes, loco dolenti si possible. Aucune incompatibilité ni contre-indication selon l'âge ou l'état du malade. Ni iodisme, ni accumulation.

Laboratoires J. LOGEAIS

22 bis, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine
près Paris. Auteuil 40-15 et 40-16

NARCYL

Médicament spécifique de la Toux.

Laryngites, Bronchites, Coqueluche

En particulier : *Toux de la Tuberculose.*

Sirop dosé à 0 gr. 03 ctg. de Narcyl par cuill. à soupe (chlte d'éthyl-narcéine synt.)

Comprimés dosés à 0 gr. 02 de narcyl et 0 gr. 25 de benzoate de Na.

Doses :

Sirop :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour.

Enfants : 2 à 4 ans : 1 à 3 cuill. à café par jour.

— : 4 à 7 ans : 4 à 5 cuill. à café par jour.

— : 7 à 15 ans : 1 à 2 cuill. à bouche par jour.

Comprimés : Adultes : 4 à 6 comprimés par jour.

Sirop : le flacon : 11 fr. — Comprimés : 12 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e)

NARSENOL

Novarsenobenzol en comprimés.

Le médicament, protégé par un enrobage spécial, conserve pendant un temps fort long ses propriétés et se délite aisément au contact des sucs digestifs.

Indications :

Amibiase, Entérites rebelles, Paludisme, Grippe.

Posologie et mode d'emploi :

Un à quatre comprimés à 10 centigr. par 24 heures, par doses espacées, de préférence à jeun.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

NATIBAÏNE

Seule association de la DIGITALINE
NATIVELLE et de l'OUABAÏNE ARNAUD

Formes. — Solution glycéro-alcoolique au millième renfermant 1/3 de Digitaline Nativelle et 2/3 d'Ouabaine Arnaud.

Indications. — Myocardites av. tachycardie. Hypertendus en voie d'arythmie complète avec diminution manifeste du tonus myocardique.

Doses. — Petites doses prolongées : X à XX gouttes par 24 heures. Doses moyennes : XX à XXX gouttes par 24 heures.

Échantillons et Littérature :

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e)

NATROSYL

Forme pharmaceutique. — Soluté.

Composition :

Soluté alcalin à base de baume du Pérou et d'essences antiseptiques aromatiques.

Action :

Antiseptique, lénitive, décongestionnante.

Indications :

Traitement médical des affections vagino-utérines, leucorrhée, métrite puerpérale, etc.

Doses :

1 à 3 cuillerées à café par litre d'eau bouillie en injections vaginales.

Laboratoires

du Docteur Pierre ROLLAND

18, rue Pierre-Curie PARIS (V^e)

NAZOPHYL DARVA

Composition. — A base de bleu de méthylène huiles volatiles, camphres associés.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique des affections du nez (rhumes de cerveau, grippe, irritations des muqueuses nasales) préventif des affections des voies respiratoires, réalise l'antiseptie du rhino-pharynx.

Mode d'emploi. — 5 à 6 fois par jour, introduire dans chaque narine, en aspirant profondément un peu de **Nazophyl Darva** (conserver le plus longtemps possible).

Emploi facilité par une présentation adéquate.

Littérature et échantillons sur demande adressée aux

LABORATOIRES ANDRÉ NARODETZKI
19, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

NÉOARSITE

(Liquueur de Fowler spéciale.)

Propriétés. — Les composés arsenicaux, tels que cacodylates, méthylars nates, et... ont été adoptés thérapeutiquement pour se placer les sels arsenicaux anions, arseniates, arsenites, mais leur efficacité n'est réelle qu'à des doses importantes, c'est-à-dire à des doses voisines de leur toxicité spécifique.

De tous les arsenicaux, seule la liquueur de Fowler a une valeur thérapeutique bien définie. Aussi le prof^r Roger a-t-il étudié pour ce médicament de toute efficacité les conditions optimales de son absorption, sous des formes nouvelles.

Formes :

1^o *L'Ampoule isovisqueuse de Néoarsite*, grâce à sa viscosité qui est égale à la viscosité moyenne du Myoplasma sanguin, est résorbée presque instantanément et sans réaction.

2^o *Les Perlules de Néoarsite*, solubles seulement dans l'intestin, suppriment les inconvénients de l'absorption gasrique. Chaque perlule correspond à 1/4 gouttes de Liquueur de Fowler et à un milligramme de quassine.

Posologie :

Ampoules : 1 par jour.

Perlules : 1 au réveil du matin et 1 au repas du soir.

Dépôt, Laboratoire **LOUËS**

11, Rue Joseph Bara — PARIS.

NÉO-ARSYCODILE

Méthylarsinate disodique

(Syn. Arrhénal)

Indic. théér. — Tous les avantages de l'arsenic organique. Plus particulièrement destiné à l'usage interne par la voie gastrique. Un long emploi (depuis 1900) a établi la supériorité de cette préparation.

Doses et mode d'emploi. — *Pilules* à 0,01 : 4 à 5 ou plus par jour aux repas, pendant 12 jours, repos 8 jours et reprise.

Ampoules à 0,05, même usage que pour l'ARSYCODILE et spécialement dans le paludisme et l'anémie des pays chauds.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

NÉO-COLLARGOL

Le Néo-Collargol assure au Corps médical la garantie d'un produit à teneur en argent très élevé (80% d'argent métal).

Ni irritant, ni toxique, c'est un bactéricide des plus énergique dont l'emploi est toujours utile pour le traitement des maladies infectieuses et pour le pansement des plaies.

Il s'emploie en :

Pommade Néo-Collargol cocaïne pour le pansement de toutes plaies opératoires, variqueuses, brûlures.

Pommade Néo-Collargol non cocaïnée pour frictions dans maladies infectieuses.

Ovules Néo-Collargol réalisant le pansement continu des vaginites, métrites, ulcérations du col utérin. Les sécrétions diminuent et la guérison suit rapidement.

Suppositoires Néo-Collargol pour hémorroïdes, fissure anale et prostatites.

Pilules Néo-Collargol pour les entérites la coli-bacilliose et l'appendicite chronique.

Compte-Gouttes pour le coryza et la grippe.

Laboratoires du Dr MARTINET
16, rue du Petit-Musc — PARIS

NEOIACOL

Arsenobenzol en solution stable, préparé par l'Institut Sérothérapique de Milan (dirigé par le professeur Beffa) spécialement et exclusivement pour injections intramusculaires.

Activité thérapeutique maxima égale à celle des meilleurs arsenobenzols en injection intraveineuse.

Pratiquement inaltérable.

Indolore grâce à sa construction moléculaire spéciale et bien qu'il ne contienne aucun analgésique.

Toutes les séries de fabrication sont essayées chimiquement.

Dépôt général :

Laboratoires HUGUES

105, Boulevard Malesherbes — PARIS.

Téléph. : Laborde 27-84.

NÉOL

Constitution. — Préparat n aqueuse peroxy-sulfatée, d'origine électrolytique, constituant une solution auto-génératrice d'Ozone naissant.

Propriétés. — Aucune toxicité, antiseptique-cicatrisant, essentiellement cytophytactique, keratoplastique et décongestif.

Indications. — Brûlures par le feu, le radium ou le froid. Ulcérations cutanées et muqueuses. Plaies phagéniques. M trites, angines, pharyngites.

Mode d'emploi. — L'eau néolée (*Néol 1 partie, eau 4 parties*) remplace avantageusement l'eau oxygénée dans toutes ses indications — Attouchements, baigé linages (Angines, Stomatites, Laryngites, M trites et Entométrites *Néol pur*). — Pansements (Brûlures. Plaies diverses) : *Eau néolée*. — Gargarismes : *Une cuill. à soupe par verre d'eau* avec une pincée de bicarbonate de soude. — Injections, grands lavages : *Quatre cuill. à soupe par injection de deux litres d'eau*.

Laboratoires BOTTU

Anciens Laboratoires du Néol.

35, Rue Pergolèse — PARIS (XVI^e)

NÉO-LAXATIF CHAPOTOT

LAXATIF

Composition. — Suc d'orange et manne.

Forme. — Sirop.

Indications. — Laxatif agréable pour les enfants, les dames et les personnes âgées ou affaiblies.

**NE RENFERME
NI PRODUITS CHIMIQUES,
NI PHTALÉINE DU PHÉNOL,
NI DRASTIQUES,
NI STUPÉFIANTS.**

Peut être donné aux enfants,
même nouveaux-nés.

Posologie. — Enfants du premier âge : 1/3 à une cuillerée à café.

Enfants de 3 à 5 ans : une à deux cuillerées à café.

Enfants de 6 à 14 ans : une à deux cuillerées à entremets.

Adultes : une à deux cuillerées à soupe.

S'il y a lieu, augmenter les doses jusqu'à effet actif, pour revenir ensuite à des doses moindres mais suffisantes.

Laboratoires AUBRIOT

56, boulevard Ornano

18 et 21, rue Championnet

PARIS (XVIII^e)

R. C. Paris 20.019

Agent Général pour la Belgique

A. OHOCAT,

86, rue du Méridien — BRUXELLES

NÉOLYSE **et NÉOLYSE RADIOACTIVE**

Préparations à base de sels silico-magnésiens.

Indic. therap. — Traitement des affections cancéreuses par les composés magnésiens.

Prop. therap. — La Néolyse est établie d'après les observations du Prof. Robin et les arguments cliniques de MM. Richet, Delbet et J. Regnault (Acad. Médec., avril 1918).

Formes usuelles.

Néolyse : Cachets (en boîte de 60). — 17 fr.
Ampoules (en boîte de 4). — 10 fr.
Compresses (en boîte de 10). — 15 fr.
Néolyse radio-active : Ampoules (boîtes de 4).
Prix : 20 fr.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (Xe)

NÉO-MÉSARCA « ROCHE »

**Pour injections endoveineuses
dans toutes les formes de la syphilis.**

Le Néo-Mésarca « Roche » est le 4,4'-dioxo-3,3'-diamino-arsénobenzène-N-méthylène-sulfoxylate de sodium. Il correspond en tous points au produit introduit en thérapeutique par le Professeur Ehrlich sous la désignation de 914 ; il se présente sous la forme d'une poudre jaune, renfermant environ 20% d'arsenic, très soluble dans l'eau, en donnant une solution de réaction neutre.

Grâce à sa constitution de véritable sulfoxylate et à la prédominance du dérivé monométhylénique, le Néo-Mésarca « Roche » représente le dérivé arséno-benzénique possédant le coefficient chimico-thérapeutique le plus favorable.

Chaque série de fabrication est l'objet d'un contrôle minutieux, au triple point de vue chimique, physiologique et clinique. Le produit n'est livré au commerce que lorsqu'il est reconnu irréprochable. Le numéro du contrôle est inscrit sur chaque ampoule.

Conditionnements :

Pour nourrissons et jeunes enfants :

Dose 00 (rouge) = 45 milligrammes.

Dose 0 (violet) = 75 milligrammes.

Pour adultes :

Dose I (bleu) = 15 centigrammes

— II (orange) = 30 —

— III (rouge) = 45 —

— IV (vert) = 60 —

— V (violet) = 75 —

— VI (noir) = 90 —

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Co

24, Place des Vosges, Paris (III^e)

NEOPANCARPINE

Extrait total hydro-alcoolique étheré de Jaborandi

Formes. — Gouttes et Granules.

Indications thérapeutiques. — Les altérations de la sensibilité organique et les maladies anahylactiques, *traitement de fond*, ne s'adressant nullement aux manifestations paroxystiques (crises), mais à l'altération permanente qui prépare et détermine ces dernières :

Coqueluche. Toux quinteuses. Asthme. Coryzas spasmodiques. Urticaire. Névro-germites. Eczéma.

La meilleure thérapeutique de désensibilisation.

Mode d'emploi. — *Enfants* jusqu'à 5 ans : 3 à 1 gouttes, 3 à 4 fois par jour.

Adultes : 8 à 20 gouttes, 3 à 4 fois par jour ou 1 ou 2 granules, matin, midi et soir.

A prendre toujours après les repas.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e)

Téléph. : Auteuil 35-25

Admis dans les *Fédéraux de Paris*.

NÉO-PHYSIOSTHÉNINE

Toutes infections de moyenne intensité.

Forme. — Boîtes de 8 ampoules de 5 c. c.

En injections sous-cutanée ou intramusculaires :

Adultes : 2 à 6 ampoules par jour.

Enfant : 2 à 4 ampoules par jour.

En injections intraveineuses :

Adultes : 1 à 6 ampoules par jour.

Enfants : 1 à 4 ampoules par jour.

Prix : 20 francs.

PHYSIOSTHÉNINE

Toutes infections graves.

Formes. — Boîtes *Adultes* : 3 ampoules 20 c. c.

Boîtes *Enfants* : 4 ampoules 10 c. c.

Indications thérapeutiques. — Grippe, Anémie, Broncho-Pneumonie, Fièvre Typhoïde, Fièvre Puerpérale et toutes les infections, quel que soit le siège, quel que soit le microbe, excepté tubercule.

Injections à la seringue, sous la peau, avec ou sans novocaïne, ou profondément dans le muscle sans novocaïne. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

Prix : 40 francs.

Laboratoires DROUET et PLET

Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise).

NÉO-RHOMNOL

Rhomnol Stryclino-Arsénié (Nucléinate de Strychnine délini et Cacodylate de Soude).

Injections hypodermiques et comprimés.

Indic. Thér. — Neurasthénies, Grippe, Convalescences, Intoxications, Dépressions nerveuses, États cachectiques, Suites d'infections, etc. (Spécificité.) Corps nouveau délini, à effets réguliers et constants.

Mode d'emploi. — *Ampoules* : Tous les jours une ampoule (en injections intra-musculaires de préférence) deux dans les cas graves. Habituellement, la boîte de 12 étant terminée, on institue un repos d'une semaine, suivi de la reprise des piqûres, si c'est nécessaire.

Comprimés : Un comprimé à chaque repas, avaler sans croquer.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

NÉO-RIODINE

$C^3 H^6 O^4 I S Na.$

Composition. — Dérivé sodique à 400% d'iode organique en solution aqueuse injectable.

Forme. — Ampoules de 2, 3, 5 cc. En boîtes de 10 et de 50 ampoules.

Propriétés thérapeutiques. — *Résorption certaine et rapide* facilitée par les injections intra-veineuses. *Action immédiate et intensive* sans iodisme.

par voie buccale, voir **Riodine** ; mêmes applications, *action lente et prolongée.*

Indications. — Artério-sclérose, cardio-clérose, myocardites chroniques, hypertension. Emphyse pulmonaire, bronchites chroniques, asthme. Obésité, rhumatisme chronique, maladies spécifiques et dans tous les cas où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Doses. — En injections intra-veineuses ou intra-musculaires de 2, 3, 5 et 10 cc. suivant les cas.

Prix : 16 francs.

LABORATOIRES P. ASTIER

41 à 47, rue du Docteur-Blanche, Paris (XVI^e).

NÉOTHORIUM MILLOT

Traitement des MÉTRITES CHRONIQUES et des Ulcérations du Col.

Les sels de terres rares (Néodyme, Thorium etc.), possèdent, en applications externes, de remarquables qualités antiseptiques, topiques et cicatrisantes. Ces propriétés ont été mises à profit par divers auteurs (A. FROUIN, L. HUDELO, GUENOT, GRÉNET, DROUIN et MUFFAT), dans le pansement des plaies atones, et principalement dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus, et des métrites chroniques.

Les sels de terres rares réalisent la médication idéale de ces affections, en effet :

Énergiquement antiseptiques et antivirulents, ils amènent rapidement le tarissement de la suppuration.

Décongestionnants et astringents, ils suppriment en quelques jours les phénomènes douloureux et fluxionnaires.

Kératoplastiques, ils stimulent énergiquement la cicatrisation des ulcérations les plus tenaces.

Dépourvus de toute toxicité et de toute causticité, ils sont absolument inoffensifs.

Incolores et inodores, leur emploi est aussi discret qu'on peut le souhaiter à un traitement de ce genre.

Soucieux de rendre pratique cette intéressante médication, les **LABORATOIRES MILLOT** mettent à la disposition du Corps Médical les quatre préparations suivantes :

Ovules Néothorium Millot.

Métrites : un tous les jours, puis tous les deux jours.

Prix médical : la boîte de 6 ovules : 9 francs.

Crayons Néothorium Millot.

Endométrites : deux à trois par semaine.

Prix médical : la boîte de 8 crayons : 12 francs.

Comprimés Néothorium Millot.

Leucorrhée et Hygiène quotidienne : un ou deux dans de l'eau chaude en irrigation.

Prix médical : la boîte de 36 comprimés : 8 francs.

Tampons Néothorium Millot.

Ulcérations du col : un tous les jours, puis tous les deux jours. Prix médical : la boîte de 6 tampons : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

LABORATOIRES MILLOT

54, rue de la Bienfaisance, Paris (VIII^e).

Tél. : Laborde 0.69

NÉO-TRÉPOL

Traitement de la syphilis par le bismuth métalloïdique pur.

Médication spirillicide intra-musculaire dosée à environ 96 p. 400 de Bi élément en milieu aqueux isotonique. (Ampoules de 2 centimètre cubes.

Adopté par le Ministère de l'Hygiène et tous les services publics.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 fr.
— 12 — : 36 fr.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Laboratoires pharmaceutiques

L. G. TORAUDE O. * I. Q.

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (Ve).

NÉOVITALYNE

Médicament synergique, Arsénio-Manganophosphorée. Action triple sur les tissus musculaire, osseux, nerveux.

Propriétés thérapeutiques. — Le plus puissant, *stimulant* chaque fois que l'organisme se trouve en état d'infériorité.

Reconstituant de premier ordre pouvant être préféré au meilleur aliment d'épargne.

Présentation. — Sous forme de comprimés d'absorption facile permettant le traitement en voyage. Préférable aux vins liquoreux que tous les estomacs ne peuvent supporter.

Indications. — Asthénie, Surmenage, Dénutrition, Paludisme, Neurasthénie, Pré tuberculose ou Tuberculose pulmonaire ou osseuse, Rachitisme, Cachexie, Convalescence des accouchées et des opérés. Chlorose, Anémie cérébrale, Dépression nerveuse ou musculaire. Toute déchéance organique, Adjuvant de tout effort de travail corporel ou intellectuel. Sénilité précoce.

Posologie. — A utiliser chez l'adulte seulement à la dose de 2 comprimés à la fois... 2 fois par 24 heures ou 3 fois sur avis du médecin.

Chaque comprimé contient :

Arséniate de Strychnine.	4 milligr.
Arrhéнал	6 —
Chlorure de Manganèse.	4 —
Nucléinate de soude....	15 —
Acide phosphorique....	25 —
Phosphate de soude....	25 —
Sucre de lait	174 —

La boîte de 100 comprimés : 16 frs 80. Impôt compris.

Le plus économique des Reconstituants.

Échantillons et Littérature à la disposition de Messieurs les Docteurs.

Vente en gros LÉON DANJOU

28, rue de l'Hôpital militaire — LILLE (Nord)

NEPTAL

Hydroxymercuripropalamide de l'acide orthoacétyloxybenzoïque.

Diurétique mercuriel peu toxique et d'action rapide. Les injections intramusculaires ou hypodermiques sont bien tolérées. Teneur en Hg. : 0 gr. 035 par cent. cube.

Indications :

Oligurie des affections cardio-rénales ou hépatiques, Œdèmes, Anasarque, Ascites, Épanchements pleuraux.

Posologie et mode d'emploi. — Injections hebdomadaires du contenu d'une ampoule (1, 5 cc.) En cas d'épanchement, ponction préalable. S'abstenir chez les cachectiques et les fébricitants.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

NERGINE HEUDEBERT

Composition. — La Nergine apporte le phosphore organique, les éléments minéraux combinés et les vitamines du germe de blé naturel et constitue un reminéralisant précieux et un stimulant des sécrétions glandulaires.

Indications. — A recommander aux enfants en voie de croissance et dans tous les troubles de la nutrition accompagnant les affections aiguës ou chroniques ; neurasthénie, anémie, tuberculose, typhoïde surmenage et convalescence.

Excellent complément des farines lactées préparées à l'eau.

Mode d'emploi — Pour le nourrisson, délayer dans un peu de lait, à la dose d'une à deux cuillérées à café par jour.

Pour les adultes, à prendre en plusieurs fois 4 à 6 fortes cuillérées à café par jour, dans une infusion tiède ou mélangées aux aliments habituels.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, Rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)
2 et 4, chemin Feuillat — LYON

NERVOCITHINE TISSOT

Composition et Formes. — Ampoules et Dragées.

Ampoules :

Fluorure de sodium.....	0,001
Nucléinate de fer.....	0,02
Méthylarsinate de soude.....	0,03
Glyco-phosph. de soude.....	0,07
Sulf. de strychnine.....	0,001

Dragées :

Même composition avec addition de 0 gr. 05 de Nte de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Sérum histogénique. Traitement reconstituant intensif le plus puissant.

Indications thérapeutiques. — Toutes fatigues, Toutes anémies.

Doses. — 1 ou 2 ampoules par jour; 1 ou 2 dragées à chaque repas.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, Boulevard de Clichy — PARIS

NEURÈNE

Solution et comprimés.

Bornéol soluble, principe actif de la valériane, associée au principe actif antispasmodique du serpolet. Deux formes : solution, comprimés.

Chaque cuillerée à café et chaque comprimé contiennent 0^{gr},10 de Bornéol soluble. Une cuillerée à café ou un comprimé de Neurène contiennent donc la partie active de 150 grammes de racine de Valériane.

Doses :

Adultes : 3 à 6 cuillerées à café ou 3 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour, suivant l'âge

Mode d'emploi :

Chaque cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau froide sucrée, ou aromatisée à la fleur d'oranger.

Propriétés thérapeutiques :

Toutes les affections nerveuses.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, rue de la Source — PARIS (XVI^e)

Tél. : Aut. 11-86

NEURÉOL

Présentation et composition. —

Association soluble de Véronal, Pyramidon, Valériane, Crataegus, Extrait de Coca.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique, antispasmodique, sédatif et hypnotique.

Avantages. — En solution aqueuse, bien toléré, pas d'accoutumance, aucune action nuisible sur le cœur, les reins, la mémoire.

Posologie et mode d'emploi. — Deux cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, avant de dîner ou de se coucher.

Laboratoires LAFARGE

6, boulevard Arago — PARIS

NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche renforcée par une faible dose de Diéthylmalonylurée soluble. Renferme 0 gr. 15 de Diéthylmalonylurée par comprimé ou cuill. à café de solution.

A. Dose et mode d'emploi. — 1° Sédatif : 1 cuill. à café, ou 1 comprimé matin, et soir dans de l'eau sucrée. — 2° Hypnotique : De 1 à 4 cuill. à café ou de 1 à 4 comprimés le soir au coucher. Enfants : 1/2 dose.

B. Prop. Thér. — Régulateur du système nerveux contre Insomnies. Mélancolie. Hystérie. Troubles névropathiques de la Ménopause. Maladies de Basedow. Tics. Délires toxiques. Palpitations. Surmenage. Prurit, etc.

Contre-indication : Néant.

Prix : Solution : 14 fr. — Comprimés : 9 fr.

Laboratoire A. GENEVRIER

2, rue du Débarcadère — PARIS

NEUROBORE

PUR. — *Solution.*

Composition. — Solution inaltérable de tartrate borico-potassique pur. — 1 gr. par cuill. à café.

Prop. thérap. — Spécifique des affections nerveuses. Calmant antispasmodique.

Indic. thérap. — Agitation, Insomnies, Convulsions, Troubles névropathiques, Epilepsie, etc.

G. ASSOCIÉ. — *Cachets.*

Composition. — Tartrate borico-potassique, 1 gr. Phénylethyl-malonylurée, 0.05; correctif, par cachets.

Médication d'Attaque.

Après effet obtenu, substituer le *Neurobore pur*.

Laboratoire E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e)

NEURO-MOKA

CAFÉ TONIQUE
DÉCAFÉINÉ ET VITAMINÉ
POUR

NERVEUX — CARDIAQUES — RÉNAUX
DÉPRIMÉS HYPERSENSIBLES

PRODUIT MÉDICINAL FRANÇAIS

MOKA DE CHOIX EN GRAINS TORRÉFIÉS

exempt de toute autre variété de café

REMARQUABLE PAR SON AROME

CONSTITUTION

GRAINS NATURELS DU CAFÉIER

chimiquement décaféinés à l'état vert

et rationnellement vitaminés après torréfaction
par association de

vitamines hydrosolubles d'origine végétale.

GARANTIES SCIENTIFIQUES

Réalisé d'après des données absolument scientifiques.

LE NEURO-MOKA N'EST PAS UN ERSATZ.

(affirmations contrôlables par l'analyse)

Innocuité absolue assurée — Aucune contre-indication.

LE NEURO-MOKA N'EST PAS UN ERSATZ.

AVANTAGES

DÉNUÉ DE TOUTE ACTION EXCITANTE ÉLECTIVE

sur le système nerveux, le cœur et les reins.

Aucune crainte de CAFÉISME aigu ou chronique

Peut être donné aux jeunes enfants et aux vieillards.

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

FAVORISE LA DIGESTION ET L'ASSIMILATION

= conséquence du rôle des vitamines dans l'économie =

par action excito-sécrétoire sur les glandes exocrines

(salivaires, gastriques, pancréatique, intestinales)

et action excito-motrice sur l'appareil digestif.

TONIFIE L'ORGANISME TOUT ENTIER.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Asthénies digestives, physiques, psychiques

et multiples cas où la caféine nuit à la santé.

FORME PHARMACEUTIQUE

D LIVR

SOUS LA SEULE FORME DE GRAINS TORRÉFIÉS

— offrant la meilleure garantie d'origine —

DANS DES FLACONS EN VERRE BIEN FERMÉS

en vue d'une très longue conservation en tous lieux.

MODE D'EMPLOI ET DOSES

Se prend en infusions chaudes très agréables au goût

préparées à l'aide de filtres ordinaires aux doses de

2 à 3 cuillerées à café de Neuro-Moka moulu par tasse.

PRIX DE VENTE OBLIGATOIRE

Grand flacon : 30 fr. ; Petit flacon : 20 fr.

LABORATOIRE DU MICELLIODE

Produits médicaux spécialisés.

A. ROLLAND, Pharmacien de 1^{re} classe.

88, rue de la Villette — PARIS (XIX^e).

NEURO PAX

en ampoules indolores.

Composition. — Manganèse (9 mill. pour 2 cc.), Phosphates cacodylate, Strychnine, Fer.

Propriétés thérapeutiques. — Permet à l'économie d'absorber aisément une grande quantité de Manganèse. D'où son incomparable puissance d'oxygénation qui détruit les Toxines par oxydation. Piqûre indolore, sans suite à redouter.

Stimulant énergique (traitement intensif).

Indications. — Affaiblissement organique et Épuisement nerveux, Asthénie physique et psychique, Déficience des Échanges, Phosphaturie. Troubles nerveux d'origine auto-toxique, etc.

Dose. — Injection profonde (intra musculaire).
Dose moyenne 2 cc. tous les 2 jours.

Prix : 25 fr. la boîte de 12 ampoules de 2 cc.

Laboratoires C^{ie} RENÉ de GRAUWE 藥房
Pharmacien de 1^{re} classe.

16, rue de Rocroy, PARIS. Usine à Saint-Denis.

NEUROPLASMA MASSIF

Composition. — Ampoules de 5 cc. contenant : Cacodylate de soude, 0,25 ; cacodylate de magnésie, 0,05 ; glycérophosphate de soude, 0,10 ; Caféine, 0,01 ; cacodylate de strychnine, 1/2 milligr.

Indications. — États cachectiques, convalescences, tuberculose et prétuberculose, anémie, etc.

Avantages. — Piqûre indolore. Tonique immédiat, relèvement rapide du malade.

Doses. — Une ampoule tous les 2 jours ; après un repos de huit jours une nouvelle série de 12 ampoules.

Emploi. — Injection intramusculaire.

Prix : 20 fr.

MICHEL DELALANDE

13, Rue Lacharrière — PARIS (1^o)

NEUROPLASMA FORT

Composition. — *Ampoules de 1 cc.*

Cacodylate de soude.....	} aa 0.025
— de magnésie.....	
Glycérphos. de soude.....	
Caféine	0.01
Cacodylate de strychnine.....	0.0005

Indications. — Neurasthénie. Dépression physique. Convalescences. Asthénie. Faiblesse circulatoire.

Avantages. — Piqure indolore. Synergie pharmacologique.

Doses. — Une ampoule tous les deux jours.

Emploi. — Injection sous-cutanée ou, de préférence, intra-musculaire.

Prix : 12 fr.

MICHEL DELALANDE

13, rue Lacharrière — PARIS (XI^e)

NEUROPLASMINE FORT

Composition. — Pour une ampoule de 1 cc.. Méthylarsinate de fer, 0,0125; cacodylate de soude 0,025; Glycérphosphate de soude, 0,05.

Indications. — Chloro-anémie. Névrose et insomnies nerveuses. Surmenage. Entraînement sportif. Suites opératoires et anémies post-hémorragiques. Troubles de la circulation.

Doses. — Une ampoule tous les jours pendant les 6 premiers jours, puis une tous les deux jours pour la fin de la série.

Emploi. — Injection *intramusculaire* de préférence.

Prix : 12 fr.

MICHEL DELALANDE

13, Rue Lacharrière — PARIS (XI^e)

NEUROSINE PRUNIER

(*Phospho Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier*).

Propriété thérapeutique. — Reconstituant du Système nerveux.

Mode de présentation. — La " Neurosine Prunier " est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

Indications. — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, etc.

Pesologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour de granulé ; 2 à 3 cachets par jour ; 2 à 3 cuillerées à bouche par jour de sirop. Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet et chaque cuill. à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de chaux (Procédé G. Prunier).

Chassaing, Le Coq & C^{ie}

(Anc. M^{son} Chassaing-Prunier)

1, quai Aulaguier — ASNIÈRES (Seine).

NEUROTROL

(Sérum neurotrophique).

Médication strychno-cacodylique.

Composition. — Cacodylate soude : 0,05, glycérophosphaste soude : 0,10 ; cacodylate strychnine : 0,001 ; sérum isotonique : Q. S. p. 1 c. c.

Indications. — Asthénie, Neurasthénie, Dépression nerveuse, Diabète, Prétuberculose, Paludisme, Convalescence.

Doses. — Deux formes.

- 1° En ampoules de 1 c. c. ; 1 à 3 injections sous-cutanées par jour et progressivement. Les injections sont *absolument indolores*. — 13 fr.
- 2° En gouttes : de 20 à 60 gouttes par jour et progressivement. — 15 fr.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, Place Intérieure-St-Michel — TOULOUSE
(Haute-Garonne). — Tél. : 1306

NEUROTROPHOL BYLA

Elixir, Granulé, Dragées.

A base de nucléorquine Byla, d'acide nucléinique, de glycérophosphate de soude et de méthylarsinate disodique.

Doses et mode d'emploi. — *Elixir* : 1 verre à liqueur *après* chaque repas, pour les adultes ; 1 cuillerée à dessert ou à café pour les enfants. *Granulé* : 1 cuillerée à bouche *avant* chaque repas, pour les adultes ; 1 cuillerée à café pour les enfants. *Dragées* : Adultes : 4 à 8. Enfants : 2 à 4 par jour.

Prop. thérap. — Tonique neuro-musculaire. Excitant de la nutrition.

Indications. — Neurasthénie, Surmenage, Dépression, Sénilité, Asthénie musculaire, Epuisement, Psychoses génitales.

Les ÉTABLISSEMENTS BYLA,

26, avenue de l'Observatoire — PARIS

R. C. Seine 71.895

NEVORAL RAFEY

Le **NEVORAL** est parfaitement toléré par les estomacs délicats ; c'est en même temps un fortifiant, un tonique et un fébrifuge. Il ne contient aucun composé ou dérivé de l'opium, ni aucun hypnotique. Les actions des divers produits pharmaceutiques qui le composent se multipliant l'une par l'autre lui donnent un pouvoir thérapeutique considérable, quelles que soient l'origine et la cause de la douleur.

Indications thérapeutiques. — Névralgies, Rhumatismes, Migraines, Maux de tête et de dents, Courbatures, Fièvre grippale, Sciaticque, Lumbago, Zona.

Le **NEVORAL** supprime la douleur, tandis que d'autres médicaments ne font que l'endormir.

Dose et mode d'emploi. — Adultes, 1, 2 ou 3 cach. p. j. Si 1 cach. n'a pas suffi, en prendre un sec. 1 h. après le prem. Enfants, le $\frac{1}{4}$, le $\frac{1}{3}$ ou la $\frac{1}{2}$ du contenu d'un cachet à prendre dans un liquide sucré, de la confiture ou du miel.

Dépôt général :

Laboratoires RAFEY

Raoul FEIGNOUX, pharm. 1^{re} classe
29, rue des Jardiniers. Montreuil (Seine)

NÉVRALGOL BROSSARD

(Cachets)

Analgésiques — Antithermiques — Fébrifuges

Indications. — Grippe. Toutes Névralgies : faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatiques. Rhumatismes. Migraines.

Doses et mode d'emploi. — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes, à distance des repas.

Prix : 7.85 la boîte de 12 cachets.

— 4.20 — 6 —

Laboratoires SOENEN et BROSSARD
CORNAUD et BROSSARD, Succ^r
 1, Rue des Cordouans — LA ROCHELLE
 Echantillons sur demande des Docteurs.

NEVROSAN

Sédatif du système nerveux.

Action élective sur le système *neuro-végétatif*.

Composition. — Teinture de Cratœgus, Passiflore, Alcoolature de ballote.

Action. — L'action bien connue du Cratœgus et de la Passiflore est renforcée par la Ballote (antispasmodique à action principalement sur l'irritabilité *neuro-végétative*).

Indications. — Insomnies nerveuses, Troubles nerveux de la vie génitale, États spasmodiques, Troubles fonctionnels du cœur, Psychoses fonctionnelles, etc.

Doses. — Action sédative : LX gouttes le soir au coucher. Action antispasmodique : XX gouttes 3 fois par jour avant les repas, dans un verre à vin d'eau pure ou sucrée.

Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.
 2, rue du Téléphone — BRUXELLES

NEVROSOL

Traitement spécifique de la *douleur et de la fièvre.*
Anti-grippal.

Composition. — Association rationnelle de :

Phényl Diméthyl aminopyrazolone; Phénacétine;
Chlorhydrate de quinine; Triméthyl Dioxypurine.

Indications. — Névralgies de toutes natures. Odontalgies.
Migraines. Céphalée de la grippe et des états fébriles,
courbatures, Douleurs rhumatoïdes, Sciatique, Lum-
bago, Zona, Goutte, etc.

Avantages. — Ne déprime pas, ne fatigue pas l'estomac
ni le rein. Son emploi prolongé est inoffensif.

Posologie. — 1 ou 2 cachets, à une heure d'intervalle,
dans les accès de névralgie, de migraine. de maux de
dents.

2 à 3 cachets par jour et pendant plusieurs jours
dans les affections douloureuses fébriles.

LABORATOIRE CHIMICO- THÉRAPIQUE DE PARIS

12, rue des Apennins — PARIS (XVII^e)

Téléphone : Marcadet 20-28

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates alcalins. Ne contient
ni chaux, ni sucre, ni alcool.

Forme. — Gouttes concentrées, 20 gouttes con-
tiennent 0,40 cgr. de glycérophosphate composé
à base de soude, de potasse et de magnésie.

Dose. — XV à XX gouttes à chaque repas dans le
premier verre de boisson.

Propriétés. — Reconstituant rationnel par suite
de sa composition qui est celle même des Tissus
nerveux.

Indications. — Neurasthénie, Paralysie générale,
Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage
Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc
Aucune contre-indication.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS

NIGÉRINE VINCENT

Noir animal pur polyvalent.

Fixateur par excellence des toxines
et alcaloïdes

Forme. — Poudre noire sans odeur ni saveur.

Indications. — Diarrhées, gastro-entérites aiguës et chroniques, intoxications d'origine gastro-intestinale, empoisonnements.

Doses. — 3 cuillerées à café par jour entre les repas dans un peu d'eau. — Dans les empoisonnements, 3 fortes cuillerées à soupe en une ou plusieurs fois.

VINCENT, pharmacien,
14, avenue Mac-Mahon — PARIS

NISAMELINE

de **TROUETTE-PERRET**

Préparation à base d'extrait de Guaco ; doit être employée "INTUS et EXTRA" — action physiologique, à l'intérieur sur les centres nerveux sensitifs et sur la sécrétion rénale ; à l'extérieur sur les terminaisons des nerfs de la sensibilité générale.

Indications. — Prurits, Dermatoses, Névralgies.

Traitement interne :

Pilules Nisaméline "TROUETTE-PERRET" (0 gr. 10 Extrait de Guaco).
2 à 5 pilules à chacun des deux repas.

Sirop Nisaméline "TROUETTE-PERRET" (0 gr. 20 Extrait de Guaco).
1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux repas.

Traitement externe :

Poudre Nisaméline "TROUETTE-PERRET"
1/2 flacon ou 1 flacon, pour un grand bain. — 1 à 4 cuillerées à café pour 1/2 litre d'eau froide ou tiède, pour lotions, compresses, etc.

Pommade Nisaméline "TROUETTE-PERRET".
En onctions pour prurits et dermatoses localisés.

Savon Nisaméline "TROUETTE-PERRET".
Pour lavages et soins hygiéniques.

Bien spécifier : **NISAMÉLINE "TROUETTE-PERRET"** pour avoir le véritable Guaco.

Laboratoire TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeubles-Industriels-PARIS (XI^e)

NITIUM BUISSON

Bromure de radium suractivé enrichi
en rayonnement alpha.

Crayon.

Traitement des métrites chroniques et
hémorragiques. Curettage médical.

Ovules.

Vaginites.

Pommade.

Dermatoses. Bartholinites. Chancre mou.
Lupus érythémateux, ulcérations diverses,
ulcère variqueux, herpès génital.

Bougie : Uréthrites chroniques.

Chaque crayon, ovule, bougie ou tube de
pommade contient 6 microgrammes de bro-
mure de radium suractivé.

Etablissements Albert BUISSON

F. JALOT et C^{ie}.

157, rue de Sèvres — PARIS

R. C. Seine 222.705 B

NITROÏL LEYSIN INJECTABLE

Symbiose de sels de terres rares
traités photolytiquement.

Présentation. — Ampoules pour injections
hypodermiques et intramusculaires, en nombre
proportionné au volume des articulations
(Hanche, Creux cotyloïde 4 à 6 — Épaule,
Genou, Malléoles 4 — Coude, Poignet 3 — Pha-
langes 1 à 2 — par 24 heures).

Indications. — Rhumatismes aigus et chro-
niques, articulaires, et musculaires, Ankyloses,
Arthrites, Sciatiques, Lumbagos, etc., etc...
Amène la disparition extrêmement rapide de la
douleur et des phénomènes morbides ainsi que
la réapparition de la liberté des mouvements.

PRIX. — Au public : 55 fr. — Au Corps médi-
cal : 40 fr.

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI^e).

NOPIRINE VICARIO

Aspirine Phénéidine caféinée

Action antinévralgique plus rapide et plus durable que l'Aspirine.

Mode d'emploi :

Comprimés : 2 à 3 par jour.

Granulés : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Indications. — Névralgies rhumatismales. Migraines arthritiques. Céphalées des neurasthéniques. Grippe, etc.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann—PARIS (IX^e)

NORMACOL

Mucilage Evacuant
puissant, facile à ingérer, actif.

Possède toutes les propriétés à exiger d'un mucilage thérapeutique : pureté, pouvoir de gonflement considérable, infermentescible, inassimilable, extrême division (les grains restant indépendants même après gonflement), ingestion facile, presque agréable.

Action. — Laxatif mécanique.

Augmente le volume du contenu intestinal.

S'oppose à sa dessiccation excessive.

Rend sa surface onctueuse et glissante.

Forme. — Granulé dragéifié très menu.

Dose (moyenne). — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Différentes préparations :

Normacol (ordinaire) : avec bourdaine (constipés habituels)

Normacol pur : sans bourdaine (entéritiques, diarrhéiques).

Normacol sans sucre : avec bourdaine (diabétiques).

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome, Paris (VIII^e). Tél. Laborde 08-00

NOVARGYRE

Ampoules Guillaumin
à l'oxycyanure d'hydrargyre indolore.

Compos. — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxycyanure d'hydrargyre : 1 centigr. ; Stovaine : 1 centigr. ; Eau distillée : 1 cm cube.

Prop. — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

Indicat. — Accidents syphilitiques.

Mode d'emploi. — Injections intra-musculaires tous les deux jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire huit à douze injections et laisser reposer le malade pendant une ou deux semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

113, rue du Cherche-Midi — PARIS

NOVARSENOBENZOL BILLON

Dioxydiaminoarsenobenzol méthylène
sulfoxylate de soude.

Teneur en arsenic ; 19 à 21 p. 100

Donne avec l'eau distillée des solutions *neutres* injectables dans la veine, sans alcalinisation

Indications :

Syphilis, Pian, Protozooses, Symbioses fuso-spirillaires, Charbon, Sodoku.

Posologie et mode d'emploi. — Série d'injections intraveineuses graduées : 0 gr. 15 à 0 gr. 90. Injections sous-cutanées de petites doses répétées. Applications en poudre ou collutoire comme topique local.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

NOVIODE

Comprimés dégageant en solution aqueuse
0 gr. 05 d'Iode naissant, entièrement dissous.

Indications thérapeutiques. — Tous usages de l'iode, Antisepsie générale, traitement curatif des plaies infectées, Préparation des champs opératoires, Injections vaginales, Gargarismes, etc., stérilisation des eaux, etc.

Posologie et Mode d'emploi. — (Voir Notice.)

La boîte de 2 tubes de 12 comprimés : 12 fr.

Laboratoires pharmaceutiques

L. G. TORAUDE O. * I. ®

Docteur en pharmacie, Lauréat de l'Institut
et de l'Académie de Médecine,

. 22, Rue de la Sorbonne — PARIS (Ve)

NOVO-BROL

Bouillon végétal achloruré (en tablettes) à base de Lupulin, Bromure et Phosphates. (Bromure non spécifié.)

Préparation et marque absolument françaises

Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables *vertus* calmantes du *lupulin* (Extr. du houblon) associé au bromure (A.-C. Guillaume et H. Leclerc).

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications. — Hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose — Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante sur les tablettes de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle :

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour.

Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour

Enfants nerveux : 1 à 2 tablettes (Suivant l'âge)

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

2, rue de la Source — PARIS (XVI^e)

Tél. Auteuil : 11-86

NOVOLACTOL DAGUIN

Forme. — Granulé agréable pour les enfants.

Composition. — Papaine extractive, Benzonaphtol, Ferments lactiques, Magnésie hydratée.

Dose. — *Nourrissons* : 3 demi-cuillerées à café délayées dans un peu d'eau dans l'intervalle des tétées.

Enfants de 2 à 3 ans : 3 cuillerées à café dans l'intervalle des repas.

Enfants de 5 à 12 ans : 3 cuillerées à dessert.

Indications. — Affections gastro-intestinales et gastro-entérites des nourrissons. Intoxication alimentaire.

Établissements Daguin
à SAINT-MAUR (Seine).

NUCLEARISITOL ROBIN

Association de la combinaison végétale nucléophosphatée avec le méthylarsinate. Nucléophosphate de chaux et de soude méthylarsiné.

Comprimés. Ampoules injectables.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 4 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

Prop. Thér. — Antituberculeux. Reconstituant puissant.

Indications. — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme.

Laboratoires M. ROBIN

43, rue de Poissy. — PARIS

NUCLÉATOL ROBIN

Combinaison de Nucléophosphates
d'origine végétale

Granulé : Nucléophosphate de chaux et de soude.
Injectable : Nucléophosphate de soude pur.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 4 à 6 cuillerées-mesures de granulé aux repas, ou 1 ou 2 ampoules en injection par 24 heures.

Prop. thér. — Exaltant de la Phagocytose, abaisse la température en quelques heures. Effets analogues à ceux des ferments métalliques ou des colloïdes.

Indications. — S'emploie dans les convalescences, les débilités, les cachexies ; provoque la défervescence dans les fièvres infectieuses, puerpérales, érysipèles, typhoïdes, etc. ; s'emploie aussi préventivement dans les opérations chirurgicales.

Laboratoires M. ROBIN
13, rue de Poissy — PARIS

NUCLÉIGÈNE

Puissant reconstituant général.

Deux formes :

1° Granulé irradié. — Ergostérine irradiée, Vitamine D, Nucléinates Soude et Manganèse, Arrhénal, Ext. de Kola ; 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 fr.

Prescrire : Nucléigène irradié granulé.

2° Élixir Acide nucléinique, Arrhénal, Glycéros, Muscat, Vanilline.

Prix : 15 fr.

Indications. — Prétuberculose, Tuberculose, Rachitisme, Anémies...

Laboratoire CHEVILLON

38, rue Ramey — PARIS

NUCLÉOPHORINE

Reconstituant, Accélérateur de la Nutrition.

Composition. — Nucléinate de soude, phosphate disodique, Méthylarsinate Na, Maté, Kola, Essence spéciale.

Indications. — Neurasthénie, Lymphatisme, Bronchites chroniques, Convalescence de Grippé et de Maladies infectieuses.

Formes. — Élixir.

Doses :

Adultes : 2 cuillérées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillérées à café par jour.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie Médicale.

40, rue Claire-Paulbac — TOULOUSE

NUCLHÉMOSE

Ampoules et granulé au
Nucléinate de Manganèse.

Action. — Hyperleucocytose, Accélération des échanges, Reprise de poids, Augmentation de la résistance organique, Reminéralisation

Indications. — Anémie, Prétuberculose, Puberté. Paludisme, Chlorose, Déchéances organiques, Léucorrhée, Suite d'hémorragie, Convalescences.

Posologie :

Injectable : une ampoule par jour.

Granulée : trois mesures par jour.

Prix au public : 12 francs.

LABORATOIRE
DE LA NUCLHÉMOSE

REMY et LECOQ, 6, place Clichy, Paris (IX^e).

NUJOL

Huile de paraffine

Description. — Le NUJOL est une huile de vaseline parfaite, incolore, inodore et sans goût, possédant un degré exactement défini de viscosité et de densité.

Indications. — Le NUJOL est spécialement indiqué pour le traitement de la constipation. Il est particulièrement recommandé pendant la grossesse et la période d'allaitement. Le NUJOL peut être administré en toute confiance à tous les âges et dans toutes conditions de santé.

Doses. — Pour les adultes : Une cuillerée à bouche soir et matin, à jeun.

Pour les enfants : D'une demi-cuillerée à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Préparé par les

Laboratoires du NUJOL

Stanco Incorporated, (New Jersey)

Chez tous les Pharmaciens ou directement chez l'Agent de vente pour la France : SCOTT et Fils, 38, Rue du Mont-Tabor — PARIS

NUTROBIASE, RAISIN VIVANT

Composition. — Extrait intégr. de raisin rouge, concentré, conservé VIVANT : levures, diastases, vitamines, etc.

Forme. — Sirupeuse. Flge par refroidissement ; réchauffer légèrement pour ramener la fluidité (+ 30°).

Indications. — Cure de raisin vivant :

Enfants. — Nutrition (Estomac, Foie, Intestin). Constipation, Entérite. Reins. Débilité post-opératoire, Grossesse. Allaitement. Désintoxication

Doses. — Toujours dans 4 parties d'eau. Après les repas : **Enfants** (dep. 1 mois). 1/2 à 2 cuill. à café.

Adultes. — 1 à 2 cuillers à dessert.

Constipation : 2 à 4 cuillers à soupe.

Prix : Flacon 200 gr., 12 fr. ; litre, 38 fr.

A. KOEHLER, Docteur ès sciences

10, rue Cimara — PARIS (XVI°).

NUTROMALT

Composition. — Maltose 30 %, Dextrines 67 %, Chlorure de Sodium 1 %, H²O 2 %.

Sucre nutritif ne fermentant pas dans l'intestin. Complément indispensable du lait de vache dans l'allaitement artificiel.

Forme. — Poudre.

Indications. — Affections gastro-intestinales, selles acides et diarrhéiques des nourrissons et des enfants.

Doses. — Nourrissons de 1 mois : 4 1/2, cuillerées à café par 2-3 décilitres de lait. Doses variables suivant l'âge.

Établissements WANDER

151 bis, route de Joinville
CHAMPIGNY (Seine).

NYCTAL

Composition. — Bromdiéthylacétylurée.

Action. — Hypnotique idéal sans accoutumance, ni accumulation. Absence de toxicité, pas d'odeur désagréable : véritable sommeil de détente.

Indications. — Traitement de l'insomnie nerveuse.

Forme pharmaceutique. — Comprimés.

Dose. — Un comprimé toutes les 4 ou 5 heures comme sédatif, 3 comprimés dans un liquide chaud comme hypnotique.

Laboratoires DURET & RÉMY

ASNIÈRES (Seine).

OCRÉINE GRÉMY

Traitement des insuffisances ovariennes de la puberté à la ménopause.

Formule :

Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais :

Corps jaune de l'ovaire : 0 gr. 20

Excipient :

Q. S. pour 1 pilule de 0 gr. 40.

Dose et mode d'emploi :

Quatre à six pilules par jour, en dehors et loin des repas pendant les 8 jours qui précèdent les règles.

Indications :

Règles rares, peu abondantes, douloureuses, Bouffées de chaleur, Migraine, Obésité, Rhumatisme de la ménopause, Acrocyanose et toutes les manifestations de l'insuffisance ovarienne.

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e)

ODARSOL

Composition. — Opiat dentifrice savonneux, parfumé aux essences de menthe et de badiane, contenant 50 centigr. p. 100 de *Sulfo-Tréparséнан* (dioxy-diamido-arsénobenzène méthylène sulfonate de sodium).

Applications. — *Pyorrhée alvéolaire, Polyarthrite alvéolo-dentaire, Ulcérations de la bouche, Stomatites, Carie dentaire, Gingivites, Aphtes, Amygdalites.*

Formes. — L'Odarsol est délivré en tubes d'étain.

Laboratoires CLIN
PARIS

ODYNAL CHEVALIER

Composition. — Élixir à base de Diméthylamino-analgésine, Guaranine, Broméine et chlorhydrate d'amyléine.

Action. — Stimulant, tonique, analgésique, fébrifuge.

Indications. — Migraines, Névralgies, Rages de dents, Lumbago, Torticolis, Sciatique, Fièvre, Grippe, Paludisme, Dysménorrhée, Crises d'asthme, Accès d'oppression, Zona, Coliques hépatiques et néphrétiques, Douleurs de la cystite, etc...

D'une supériorité incontestée sur le cachet, que beaucoup d'estomacs supportent difficilement.

Mode d'emploi. — Une à trois cuillerées à café, au moment de la douleur, renouvelable trois fois dans les vingt-quatre heures.

Échantillon sur demande.

Laboratoire de l'ODYNAL
VARENNES-SUR-ALLIER (Allier)

OLÉTHYLE-BENZYLE

L'Oléthyle-Benzyle qui sert à faire en France les premières études cliniques sur le Benzoate de Benzyle et permet son introduction dans la thérapeutique est une présentation de Benzoate de Benzyle d'une pureté absolue.

Propriétés physiologiques. — Antispasmodique et Hypotenseur dépourvu de tout pouvoir narcotique ne produisant aucun effet nocif sur le cœur, les reins, l'appareil respiratoire et le système nerveux. Il peut donc être administré même chez les sujets atteints de néphrite.

Indications :

I. — Hypertension, Angine de Poitrine, Angio-Spasmes.

II. — Tous les états spasmodiques de la musculature lisse :

Spasmes bronchiques, asthme, coqueluche, hoquet persistant d'origine périphérique, péristaltisme exagéré de l'intestin (dysenterie, diarrhées, pylorospasme, coliques hépatiques, néphrétiques, intestinales, constipation spasmodique, spasmes de la vessie, dysménorrhées spasmodiques.

Présentation. — Trois formes médicamenteuses : les gouttes, les gélules (capsules molles), les ampoules.

L'Oléthyle-Benzyle Gouttes est une solution de Benzoate de Benzyle synthétique pur titré à 20 %.

L'Oléthyle-Benzyle Gouttes se prête à toutes les exigences de la clinique et permet de graduer à volonté les effets à obtenir suivant l'âge et la nature du sujet.

L'Oléthyle-Benzyle Gélules est la présentation de choix de ce produit permettant au malade d'avoir toujours sur lui et en toutes circonstances son médicament dosé de façon précise (chaque gélule représente vingt gouttes de la solution de Benzoate de Benzyle à 20 %).

L'Oléthyle-Benzyle Ampoules est destiné aux injections sous-cutanées. Chaque ampoule de deux centi-cubes correspond à 25 gouttes de la solution de Benzoate de Benzyle à 20 %.

Posologie. — Oléthyle-Benzyle Gouttes, 20 à 30 gouttes trois ou quatre fois par jour, dans un peu de lait ou d'eau sucrée, de préférence au début ou au milieu des petits et grands repas.

Oléthyle-Benzyle Gélules 3 à 5 gélules par jour, espacées dans le courant de la journée, de préférence au début ou au milieu des petits et grands repas.

Ampoules d'Oléthyle-Benzyle pur. De une à deux ampoules dans les 24 heures en injections sous-cutanées.

Laboratoire Central de Paris

122, faubourg Saint-Honoré — PARIS

CENOPHOS

*Acides hydro-éthylène-phosphoriques.
Reminéralisation phospho-dolomitique.*

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET
de Dijon.

Formes. — Elixir, granulé, gouttes.

Prop. thé r. — Neurotonique, reconstituant
énergique : *fixateur électif* de la magnésie et de
la chaux (*voir fiche DOLOMA*). Médication
phosphorique rationnelle.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, psy-
chasthénies, surmenages physique et nerveux,
cancers, tuberculose.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : A chaque
repas : 1 cuill. à soupe d'*Elixir* ou 2 cuill. à café
de *Granulé* ou 60 gouttes dans un demi-verre
d'eau ou de vin léger sucré. *Enfants* : réduire les
doses suivant l'âge.

Pour la cure reminéralisante, voir "*DOLOMA*".

Laboratoire général d'Etudes Biologiques

S. A., 29, Place Bossuet — DIJON

Téléphone : 16-42

OLÉOCIDASE

ACIDE OLÉIQUE PAUL THIBAUT

Capsules dosées à 0 gr. 50 d'Acide Oléique pur, extrait de
l'huile d'olive, procédé Paul Thibault, licencié es sciences
physiques, ancien président de la Société de pharmacie,
de Paris. Sous un volume très restreint l'*Acide Oléique*
Paul Thibault réalise, avec effet rapide et constant, l'ac-
tion toujours très lente et souvent incertaine attribuée à
l'huile d'olive dans la désagrégation des calculs de cho-
lestérine. La plus sûre méthode de drainage biliaire.

Indications. — Lithiase biliaire, Cholélithiasie, Cholécys-
tites lithiasiques, Cholestérinémie, Ictères, Crises de
Coliques hépatiques, Evacuation des calculs de Choles-
térine, par désagrégation.

Posologie. — 3 capsules le matin à jeun, 3 capsules dans
le milieu de la journée et si besoin, 3 capsules le soir
dans un peu d'eau minérale bicarbonatée ou chlorurée
sodique tiède (Vichy, Châtel-Guyon, Vals, etc.)

Nota. — Pour éviter l'emploi d'acides oléiques impurs
prescrire toujours : capsules d'*Oléocidase Paul Thi-*
bault.

Laboratoire des Produits Paul THIBAUT

6, rue Rosenwald — PARIS (XV^e)

OLÉOFORMINE CORBIÈRE

Comprimés glutinisés et dragéifiés.

Composition :

Acide cholique.....	0,05
Oléate de soude anhydre.....	0,20
Hexaméthylènetétramine	0,25

Indications. — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Cholécystite, Ictères, Cirrhoses, Insuffisance hépatique, Cholémie familiale.

Mode d'emploi. — Deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas, pendant 20 jours.

Présentation. — En boîtes aluminium de 40 comprimés. Prix : 12 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques
CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes, PARIS (17^e)

Téléphone : Carnot 78-44

OLEO-MEL

“ LE LAXATIF DE RÉGIME ”

Gelée de miel à l'huile de paraffine

Formule. — Huile de paraffine extra
neutre à viscosité maxima et spéc. } P. E.
raffinée pour l'usage interne. }
— Miel surfin 1^{er} choix }

Indic. — L'association de ces deux substances réalise une synergie parfaite qui relève, p. le traitement de la **Constipation et des affections gastro-intestinales**, de toutes les indic. et de la posol. même de l'huile de paraffine. **Action mécan. Innocuité absolue.**

Prép. — L'Oleo-mel, préparé p. un procédé spéc., se présente sous forme d'une gelée homogène, absolument stable et inaltérable; il conserve tout l'arôme et toute la saveur du miel, ce qui en fait une médication des plus agréables et des plus faciles à prendre.

Laxatif idéal des nourrissons et des pers. délicates.

Prix : 7 fr. 75

Laboratoire DELFOUR à POUILLON (Landes)

OLIOLASE CORBIÈRE

Huile iodée vraie, indolore, fluide, facilement injectable, contenant 0 gr. 40 d'iode métalloïde pur par centimètre cube.

Est indiquée pour toutes les affections justifiables de l'emploi de l'iode ou des iodures. Pas d'iodisme. Aucune réaction locale ni générale, même si la dose injectée en une fois dépasse 40 cc.

Mode d'emploi. — En injection intramusculaire indolore.

Injecter très lentement.

Présentation.

Boîte de 10 amp.	de 1 cc.	conten.	0 gr. 40	d'iode.
—	6 —	de 2 —	—	0 gr. 80 —
—	4 —	de 5 —	—	2 gr. « —

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes, Paris.

Tél. Carnot 78-11

ONCTION Angelini

Guérison de la Gale

Sans bains,

Sans frotte — En une seule application

Adoptée par la Marine nationale.

Traitement des maladies rebelles de la peau.

L'Onction Angelini est en usage permanent dans les hôpitaux maritimes de Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, Sainte-Anne à Toulon.

Se trouve dans les pharmacies
de Hanoï et Saïgon.

Prix au public : 10 francs.

Angelini Pharmacien

61, rue de Seine, PARIS

Litré : 47-76.

OPHTHALMINE

Indic. therap. — Antisepsie oculaire, Arrêt de la cataracte, par deshydratation du milieu oculaire. Conjonctivites, Blépharites, Presbytie prématurée, etc..., etc.

Doses et Mode d'emploi. — Pom-
made, deux applications par
jour.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE
62, rue de la Tour
PARIS (XVI^e)

OPOTHÉRAPIE " MONCOUR "

En sphérulines, pilules inaltérables et toujours solubles grâce à leur enrobage spécial. A tous extraits totaux d'organes desséchés à froid, dans le vide profond.

Dosages :

(suivants extraits) 10 centigr. et 20 centigr.

Posologie :

1 à 6 par jour, sauf hépatiques et rénales,
1 à 16.

SPHÉRULINES SYNERGIQUES

(associations opothérapiques.)

Thyro - ovariennes, Thyro - orchitiques,
Thyro - surrénales, Hypophyso - ovariennes,
Surréno-ovariennes, Surréno-orchitiques,
Surréno - hypophysaires, Entéro-pancréatiques,
Thyro-surréno-ovariennes-Hypophyso-surréno-Thyroïdiennes,
- Hypophyso - surréno - ovariennes,
- Hypophyso - ovaro - thyroïdiennes,
- Hypophyso - thyro - surréno - ovariennes,
Hypophyso-thyro-surréno-orchitiques.

Posologie. — 1 à 6 par jour.

NÉO-SPHÉRULINES MONCOUR

Préparées de suite après demande médicale. Préparations datées. Tous organes, dosages et associations. Renseignements sur demande.

Laboratoire MONCOUR

49, Avenue Victor-Hugo — BOULOGNE
SEINE

Téléphone : Molitor 08-47

OPOBYL

Forme. — Dragées.

Composition. — Extrait hépatique, Sels biliaires, Boldo et Combretum.

Propriétés pharmacodynamiques. — Cho agogue, Rééducateur des fonctions entéro-hépatiques, Décongestif du foie et des intestins.

Indications. — Hépatites. — Ictères. — Cholécystites. — Lithiase biliaire. — Entérocolites. Constipation chronique. — Dyspepsie gastro-intestinale.

Mode d'emploi. — Une à deux dragées au début ou à la fin des repas, deux ou trois fois par jour.

Laboratoires A. BAILLY et C^{ie}
15 et 17, rue de Rome — PARIS (8^e)

OPOCALCIUM DU D^r GUERSANT

Réminéralisation — Polyopothérapie

Composition. — Extraits totaux de glandes endocrines. Parathyroïde, surrénale, thymus, hypophyse « *ce dernier dans le granulé seulement* » associés au fluorure, phosphate, glycéro-phosphate, carbonate de Ca, phosphate de Mg et nucléinate de Mn.

Formes. — Cachets, comprimés, poudre, granulé (recommandé pour enfants).

Propriétés thérapeutiques. — La décalcification et d'une façon générale la déminéralisation de l'organisme sont dues moins à un apport insuffisant des minéraux alimentaires qu'à la déficience des glandes endocrines.

Pour récalcifier et réminéraliser, il faut donc procurer à l'organisme les extraits des glandes dont l'action hormostimulatrice et régulatrice assure le métabolisme des minéraux.

Or, l'*OPOCALCIUM* seul remplit ces conditions essentielles et permet une minéralisation effective.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose, neurasthénie, surmenage, débilité, croissance, phosphaturie, convalescence, lymphatisme, rachitisme, fractures, carie dentaire, grossesse, allaitement.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 cachets, 6 comprimés. 3 cuillerées à dessert de granulé, 2 à 3 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés, 3 cuillerées à café de granulé, 2 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 5 ans : 2 cuil. à café de granulé, 1 cuiller-mesure de poudre.

OPOCALCIUM ARSÉNIÉ (avec méthylarsinate disodique) une seule forme : cachets.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

OPOCALCIUM GAIACOLÉ (avec sulfo-gaiacolate de potasse), antiseptic pulmonaire et réminéralisation associées.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

OPOFERRINE (avec fer organique).

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 2 à 4 comprimés par jour.

Laboratoire de L'OPOCALCIUM

RANSON, Docteur en Pharmacie
121, avenue Gambetta — PARIS (XX^e)

OPOCALCIUM IRRADIÉ DU Dr GUERSANT

Composition :

Ergostérine activée par les Rayons Ultra-Violets (Vitamine D), associée au Complexe endocrino-minéral de l'Opocalcium.

Formes :

Cachets, Comprimés, Granulé.

Propriétés thérapeutiques :

L'*Opocalcium irradié* ajoute aux principes de *Réminéralisation intégrale* les propriétés centuplées de l'huile de foie de morue.

Indications :

Rachitisme, Croissance, Carence, Ossification, Dentition, Lymphatisme, Dénutrition, Prétuberculose, Tuberculose, Débilité, Asthénie, Surmenage, Phosphaturie, Infections, Fractures, Grossesse, Allaitement, Anémie, Convalescence.

Doses journalières & mode d'emploi :

Cachets : *Adultes* : 3.

Comprimés : *Adultes* : 6.

Granulé : *Adultes* :

5 à 6 cuillers-mesures.

Granulés : *Enfants* : jusqu'à 10 ans :
3 cuillers-mesures.

Granulé : *Enfants* : jusqu'à 5 ans :
2 cuillers-mesures.

Littératures et échantillons :

Laboratoires de l'Opocalcium

A. RANSON, Docteur en Pharmacie,
121, avenue Gambetta, — PARIS (XX^e)

OPOCHOL

Composition :

Oléate de soude, Bile dépigmentée et décholestérinée, Extrait total hépatique, Extrait de Boldo, Extrait de Kinkélibah.

Forme Pharmaceutique :

Comprimés dragéifiés glutinisés.

Indications thérapeutiques majeures

Affections Hépatico-biliaires. — Hépatites, Cirrhoses. Petite insuffisance hépatique, Cholémie simple familiale de Gilbert et Lereboullet, Lithiase biliaire, Angiocholite, Coliques vésiculaires, Cholécystites médicales, Ictères.

Affections Intestinales. — Constipation par insuffisance de chasse biliaire. Entéro-côlite muco-membraneuse.

Indications thérapeutiques secondaires :

Maladies de la Nutrition. — Diabète par hypo-hépatie, Goutte, Obésité, Arthritisme, Hépatisme de Roger Glénard, États hypercholestérolémiques.

Affections de l'appareil Circulatoire avec participation du Foie. — Foie cardiaque, Syndrome d'hypertension portale, Varices et Hémorroïdes des hépatiques, hémophilie, certaines Anémies.

Infections. Intoxications.

Neuro-psychiatrie. — Psychasthénie avec signes hépatiques, Mélancolie anxieuse présénile, dépression avec troubles hépatiques.

Mode d'emploi :

A. *En période de crise.* — 4 comprimés par 24 heures 2 comprimés au moment des repas de midi et du soir.

B. *Dans l'intervalle des crises.* — 2 comprimés par 24 heures, un comprimé à midi et un autre le soir aux repas.

Incompatibilités :

Aucune incompatibilité.

Prescrire :

Opochol : Comprimés, 1 flacon.

Prix, le flacon de 50 comprimés : 15 francs.

LABORATOIRE DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe, Beauvais (Oise).

Échantillons et littérature à la disposition
de MM. les Docteurs

OPONUCLYL IRRADIÉ TROUETTE-PERRET

Catalyseur fixant le Phosphore et le Calcium.
Vitamine D.

Médication synergique organo-minérale.

Compositions. — Lipoides médullaires et spléniques, Orchitine, Hémoglobine, Acide nucléinique, Cinnamate de manganèse et de fer, Algostérine irradiée.

Indications. — Anémie, Chlorose, Convalescence, Croissance, Surmenage, Neurasthénie, Lymphatisme, Tuberculose.

Dose. — *Adultes* : 2 sphérules à chaque repas.
Enfants : 1 sphérule à chaque repas.
Littérature et Échantillons.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

45, rue des Immeubles Industriels.

PARIS (XI^e).

OPOPEPTOL

Suc gastrique physiologique total, inaltérable, incolore et sans goût, se prenant par gouttes, dans l'eau ou dans une boisson peu alcoolisée.

Digestif puissant, spécifique de l'hypo-sécrétion et de l'atonie gastrique.

Prix au public du flacon
(contenant 50 doses) 18 francs.

Dépôt général

Produits CARLO ERBA

Laboratoire G. Hugues.

105, Boulevard Malesherbes (passage)
Paris (VIII^e).

OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE

— DU D^r FRAYSSE —

THYRODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant, ovaire 0,10, thyroïde 0,025

Doses. — *Adultes* : 2 à 3 pastilles par jour.

Indications. — Insuffisances thyroïdienne et ovarienne. — Troubles de la croissance, de la puberté et de la ménopause. — Obésité, etc.

NEURODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant, orchitine 0,20, substance grise 0,10.

Doses. — *Adultes* : 4 pastilles par jour.

Indications. — Epuisement nerveux sous toutes ses formes. — Impuissance sexuelle surmenage. — Infantilisme etc.

PLACENTODOSE. — Granulés chocolatés de Placenta et de mammaire.

Doses. — 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Flaccidite utérine. — Métrorrhagies. — Insuffisance lactée. — Flaccidité et atrophie des seins. — Métrite. — Tumeurs. — Fibromes, etc.

SPLENODOSE. — Granulés chocolatés de Rate. — Foie. — Thyroïde. — Hémoglobine osseine.

Doses. — 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Tuberculose. — Maladies du Foie et de la Rate. — Chlorose. — Anémie. — Maladies infectieuses. — Paludisme, etc.

LABORATOIRE DU D^r FRAYSSE

47, rue de Neuilly, Nanterre (Seine). — Tél. 288

Notices et échantillons sur demande.

OPOTHÉRAPIE BOUTY

Extraits totaux d'organes frais desséchés dans un vide profond vers 0° et présentés en comprimés dragéifiés à froid permettant une conservation indéfinie.

Thyroïdine Bouty	{ 0 gr. 10 de corps thyroïde desséché par dragée. }	{ Obésité. Myxoedème. }
Ovigénine Bouty	{ 0 gr. 12 d'ovaires desséchés par dragée. }	{ Ménopause naturelle ou artificielle. }
Sequardine Bouty	{ 0 gr. 10 de testicule desséché par dragée. }	{ Insuffisance organique. }
Hépatine Bouty	{ 0 gr. 30 de foie desséché par dragée. }	{ Cirrhose, Ictère. Diabète. }
Surrénaline Bouty	{ 0 gr. 10 de capsules surrénales desséchées par dragée. }	{ Basedowisme, Addisonnisme. }
Néphrine Bouty	{ 0 gr. 15 de rein desséché par dragée. }	{ Néphrite. }

ASSOCIATIONS PLURIGLANDULAIRES

Triglandine Bouty	{ Chaque dragée contient : corps thyroïde desséché. 0 gr. 08 Hypophyse 0 gr. 05 Ovaires.... 0 gr. 10 Chaque dragée contient : corps thyroïde desséché. 0 gr. 08 Hypophyse desséché. 0 gr. 05 Testicule desséché. 0 gr. 10 }	{ Sexe féminin. }
Triglandol Bouty	{ corps thyroïde desséché. 0 gr. 08 Hypophyse desséché. 0 gr. 05 Testicule desséché. 0 gr. 10 }	{ Sexe masculin. }

Tous les produits opothérapiques ci-dessus sont également présentés en ampoules de 1 cc. et de 3 cc.

Biliol Bouty	{ Extrait concentré de bile de porc en capsules kératinisées. }	{ Ictère. lithiase biliaire. etc. }
Gastrozymase Bouty	{ Comprimés effervescents du suc gastrique de porc. }	{ Dyspepsie, embarras gastrique. }
Liqueur à la thyroïdine	{ Indicateur infantile 1 cuillerée à café = 0 gr. 02 de thyroïde desséché. }	{ Myxoedème. }

Laboratoires BOUTY
3, rue de Dunkerque — PARIS
Téléph. : Nord 51-64.

OPOTHÉRAPIE BYLA

Nouvelles présentations brevetées

SANS ODEUR, CONSERVATION INDÉFINIE,
CONSTANCE D'ACTIVITÉ

1° **Comprimés-Cachets « OPO »** contenant dans le même pain azyrne, deux comprimés concentriques renfermant, l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le lipode correspondant.

Désagréation immédiate dans le liquide stomacal.

Conservation indéfinie, grâce à la suppression des actions lipasiques de contact.

Prescrire : OPO-OVARINE-BYLA, etc.

2° les **« EXOS » BYLA**, sucs totaux **inaltérables**, préparés par exolyse des organes frais, et aromatisés.

Prescrire : EXO-THYROÏDINE BYLA, etc.

les **GLANDULES BYLA** (comprimés dragéifiés), enrobés de sucre, afin d'empêcher l'action de l'air sur le principe actif et d'éviter toute odeur. *Conservation indéfinie.*

Prescrire : GLANDULES DE SURRÉNINE BYLA, etc...

4° les **AMPOULES BYLA** : préparées à partir des **ORGANES FRAIS** ; amenées à un état voisin de l'isotonie et présentées en ampoules de 2 cc. correspondant à 0 gr. 25 d'organe frais.

Prescrire : AMPOULES D'HÉPATINE BYLA, etc.

Pour les doses massives : AMPOULES **« ISO » BYLA** de 2 cc. correspondant à 1 gr. d'organe frais par cc.

Prescrire AMPOULES ISO Rein BYLA, etc...

Opothérapie simple, pluriglandulaire et panglandulaire

Les Établissements BYLA,

26, avenue de l'Observatoire. — PARIS (XIV°)

R. C. Seine 71895

OPOTHÉRAPIE CHOAY

1° — EXTRAITS TOTAUX

(Poudres d'organes, du Codex) préparés à froid (0°), et dans le vide profond, équivalents aux organes frais.

Formes et Doses. — *Cachets et Comprimés* en tubes hermétiques, 4 à 6 par jour.

Prix. — De 10 fr. à 15 fr. la boîte de 24 à 40 *cachets* ou *comprimés*, suivant la nature et le dosage de l'extrait.

Nomenclature des principaux Extraits Totaux.

Bile, Foie, Glande mammaire, M. èlle osseuse, Ovaire, Pancréas, Surrénale, Testicule, Thyroïde.

Hypophyse (glande totale ou lobes séparés)

2° — EXTRAITS INJECTABLES

Déprotéinés, délipoidés, en solution aqueuse stérilisée, contenant les principes thermostables des organes correspondants.

Formes et Doses. — *Ampoules* de 1 à 5 cc. Sauf cas spéciaux, 1 ampoule tous les jours ou tous les 2 jours.

Prix. — De 12 à 25 fr. la boîte de 6 ampoules.

De 20 à 30 fr. la boîte de 12 ampoules.

Nomenclature des principaux Extraits Injectables.

Foie, Ovaire, Rate, Surrénale, Testicule, Thyroïde.

Hypophyse (glande entière) ou Tot-Hypophyse.

Hypophyse (lobe postérieur) ou Post-Hypophyse (5 dosages)

3° — SYNCRINES

Associations opothérapiques correspondant aux principaux syndromes pluriglandulaires.

Formes et Doses. — *Cachets et Comprimés* en tubes hermétiques, 2 à 4 par jour.

Ampoules injectables. En moyenne 1 ampoule de 1 cc. tous les 2 jours.

Prix. — De 12 à 18 fr. la boîte de 24 *cachets* ou de 30 *comprimés*, suivant la formule.

20 fr. la boîte de 12 ampoules de 1 cc.

Nomenclature des principales Syncrines.

1 et 1 bis. — Pluriglandulaires, F. et M. — 2, Surréno-Hypophysaire. — 3, Thyro-Surréno-Hypophysaire. — 3 bis, Thyro-Surréno-Ovariennne. — 4, Thyro-Ovariennne. — 4 bis, Surréno-Ovariennne. — 5, Thyro-Orchitique. — 7, Thyro-Hypophyso-Ovariennne. — 8, Peptosthénique (Digestive). — 9, Surréno-Hypophyso-Ovariennne. — 10, Placento-Mammaire.

Laboratoire CHOAY

48, rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e)

Tél. : Autcuil 44-09 et 44-10

OPOTHÉRAPIE FOURNIER

Extraits totaux préparés à froid dans le vide.

Endocrisines. — Tous organes : Thyroïde, ovaire, hypophyse, glande mammaire, surrénale, foie, reins, thymus, testicule, pancréas, placenta, etc.

Forme. — 1° *Cachets et comprimés.*

Doses usuelles toutes préparées. —

Thyroïde, 0,025 mgr., 0,10 cgr. ;
ovaire, 0,10 cgr. ; orchitine, 0,20 cgr ;
surrénale, 0,10 cgr. ; hypophyse,
0,10 cgr. ; foie, 0,50 cgr. ; reins,
0,25 cgr.

Cachets pluri-glandulaires

M, sexe masculin.

F, sexe féminin.

Troubles de croissance, infantilisme,
arriération.

2° *Ampoules :*

Thyroïde. Ovaire. Surrénale. Hypophyse. Orchitine. Rate. — Association hypo-surrénale. Asthme. — Hypophyse lobe-postérieur, usage obstétrical.

Formuler : Endocrisines-glande injectable Fournier.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, Rue Biscornet — PARIS

OPOTHÉRAPIE "HENNING"

Lipolysine "Henning" (masculine-féminine)

Préparation pluri-g'andulaire, à base d'Hormone, sous forme de tabl. et d'amp. inject.

Traitement de l'obésité.

Thélygan "Henning" (Féminin)

Comprimés, Ampoules, Suppositoires.

Insuffisance ovarienne, Dysménorrhées,
Troubles de la ménopause, naturelle ou artificielle.

Testogan "Henning" (masculin)

Comprimés, Ampoules, Suppositoires.

Impuissance sexuelle, Sensibilité précoce.

Échantillons et littérature

Laboratoires MERMINOD

49, rue de Paradis — PARIS (Xe)

OPOTHÉRAPIE U. T. A.

Cholédol (pilules).

Pilules hépatiques. Tous les éléments de la Bile.
Lithiase biliaire, Acholie, Constipation chronique,
Entérocélite m. m.

Néothyrol (comprimés-extrait fluide).

Extrait de glandes thyroïdes de moutons.
Myxœdème, Obésité, Infantilisme, Troubles
menstruels.

Néovarine (comprimés).

Extraits d'ovaires d'animaux jeunes. Castration,
Insuffisance ovarienne, Ménopause, Obésité
féminine.

Proményl.

Extraits de glandes thyroïdes et d'ovaires.
Troubles de la puberté chez la femme, Ménopause.

Biocalcine (granulé).

Sels minéraux et extraits de surrénales, glandes
parathyroïdes, thymus.
Grossesse, Convalescence des maladies, Rachitisme,
Tuberculose, Neurasthénie.

Antiplébine (Comprimés).

Extrait de surrenales, corps thyroïde, hypophyse,
Marron d'Inde, Hamamelis, Hydrastis.
Varices, Hémorroïdes, Troubles de la ménopause.

Phoscadol (sirop).

Association des médicaments phosphoriques, calcique
et magnésienne.
Dyspepsie hypoacide. Migraines. Etats rhumatoïdes.
Myalgies.

Diplovaccin (ampoules).

Émulsion de gonocoques cultivés sur milieux à
base d'albumine humaine.
Blennorrhagie, aiguë et chronique, Catarrhe utérin
ou vaginal, gonococcis à foyers fermés, etc.

Staphylovaccin.

Emulsion de staphylocoques polyvalents.
Furoncles, Anthrax, Impétigo, Sycosis, Infections
staphylococciques.

Établissements P. THIWISSEN

13, rue Sainte-Véronique — LIÈGE

OPOTHÉRAPIQUES " MEURICE "

Ovarine. — Aménorrhée, ménopause, dysménorrhée, troubles d'origine ovarienne.

Ovaridine. — Association pluri-glandulaire (ovaro-thyroïdine).

Indications : Insuffisances endocrines, aménorrhées de ménopause ou de puberté, sclérodémie, rhumatisme chronique et troubles circulatoires relevant de la ménopause, suites d'ovariotomie.

Thyroïdine. — Croissance, myxœdèmes infantile et de l'adulte, obésité, insuffisance thyroïdienne.

Union Chimique Belge, S. A.

Division : Produits pharmaceutiques " Meurice "
68, Rue Berkendael — BRUXELLES (Belgique).

OPOTHÉRAPIQUES PELLISSIER

Leur doctrine : Clarté, Simplicité, Loyauté.

Le procédé Pellissier utilisé pour la fabrication des produits opothérapiques est breveté. Il a fait l'objet de communications à l'Académie des Sciences le 21 mars 1921, à l'Académie de Médecine le 15 mai 1923, à la Société de Pathologie Comparée le 11 novembre 1924.

Les appareils de fabrication sont les plus puissants qui existent dans le monde et les poudres d'organes qu'ils permettent d'obtenir, sans aucun dégraissage, sont d'une activité incomparable, d'ailleurs reconnue et de conservation indéfinie.

Deux formes pharmaceutiques :

Pour les *adultes*, le cachet et le suppositoire (Opositoire).

Pour les *jeunes enfants*, le suppositoire (Opositoire).

Exemple de prescription pour les adultes :

Ovaire Pellissier, cachets à 0,25 cgr., 1 boîte.

Glande mammaire Pellissier, cachets à 0,50 cgr., 1 boîte.

Pancréas Pellissier, cachets à 0,25 cgr., 1 boîte, etc...

Opositoires Pellissier de Prostate, à 0,25 cgr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'ovaire, à 0,25 cgr., 1 boîte, etc...

Exemple de prescription pour les enfants :

Opositoires Pellissier de thyroïde, 1 milligr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'hypophyse, à 0,05 cgr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier de surrénale, à 0,05 cgr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier de thymus, à 0,25 cgr., 1 boîte, etc...

Organe scientifique bi-mensuel, les *Consultations opothérapiques*.

Les demander, par simple carte, pour en obtenir le service régulier.

Les **Laboratoires PELLISSIER** ont introduit également dans la thérapeutique :

Les Comprimés de Silicate de soude Pellissier, à 0,25 cgr.

Les Ampoules de Silicate de soude Pellissier, pour l'injection intra veineuse, pour le traitement de l'artériosclérose, Communication à l'Académie des Sciences (17 août 1920).

Laboratoires PELLISSIER

33, avenue de Villiers — PARIS (XVII^e)

Téléphone : Wagram 14-59

Usine, 18, Grande-Rue, à Asnières (Seine).

OPOZONES LUMIÈRE

Constitution. — Préparations opothérapiques, à base de glandes fraîches, obtenues par un procédé spécial, présenté par MM. A. Lumière et Chevrotier, à la Société de Thérapeutique de Paris (23 octobre 1912), fondé sur les propriétés absorbantes de certains sels inertes. Ces préparations renferment intacts tous les éléments chimiques et biologiques de la glande. Ils sont glutinisés et dragéifiés, ce qui facilite leur conservation et permet d'éviter l'action trop hâtive des sucs digestifs.

Les Laboratoires Lumière préparent des Opozones à base de tous organes. Chaque Opozone correspond à son poids de glande fraîche (0 gr. 20).

Produits spéciaux des

LABORATOIRES LUMIÈRE

9, Cours de la Liberté — LYON

ORARGOL AMICROS

Anti-Infectieux Général

ORARGOL INJECTABLE (0,05 %) AMPOULES

Boite de 6 amp. 5 cc. Tube de 4 amp. 10 cc.

Septicémies, Grippe, Fièvres, Traitement pré et post opératoire.

Posologie. — 5 à 20 cc. intramusculaire ou intraveineux tous les jours ou tous les deux jours. Chez les enfants, 1 cc. par année d'âge. En injection dès le début d'une infection seul ou combiné à la vaccinothérapie ou à la sérothérapie.

ORARGOL NON INJECTABLE (0,1 %) GOUTTES

Flacon de 60 grammes avec compte-gouttes

Grippe, Fièvres, Thérapeutique Infantile.

Posologie. — 20 à 100 gouttes par jour en plusieurs fois dans une boisson quelconque. Ces doses peuvent être doublées si cela est nécessaire, sans inconvénient.

ORARGOL O. R. L. — Flacon de 20 grammes avec compte-gouttes et instillateur nasal.

Instillations nasales : 4 à 5 gouttes dans chaque narine à l'aide de l'instillateur Amicros ou du Pulvargol.

Gargarismes : 10 à 15 gouttes dans une tasse d'eau chaude deux fois par jour.

Collyres.

**Laboratoire des Produits
AMICROS**

5, Rue Clauzel — PARIS (IX^e)

Tél. : Trudaine 00-47.

OREXYL

Spécifique des maladies de la nutrition et le plus actif des reconstituants.

Composition :

Persulfates alcalins, métavanadate de soude, fluorure de sodium, tannate d'orexine, glycéro-phosphate de chaux.

Formes. — Granulé et comprimés.

Indications :

L'Orexyl est indiqué dans tous les cas où il s'agit d'augmenter la nutrition et de relever l'état général de l'organisme : Inappétence, Neurasthénie, Anémie, Asthénie, Grossesse, Convalescence, Bacillose pulmonaire, Surmenas, physique ou intellectuel. Fractures.

Contre-indications. — Le diabète sucré et l'état fébrile.

Posologie :

Enfants : Une cuillerée à café de granulé dans un peu d'eau. 20 minutes avant les deux premiers repas, ou un comprimé. — **Adultes :** Une cuillerée à soupe de granulé, ou deux comprimés dissous dans un peu d'eau chaude sucrée, avant chaque repas.

Prix : La boîte, Granulé : 13 fr. Comprimés : 15 fr.

Préparé par M. LOUISGRAND,
pharmacien de 1^{re} classe

Échantillons et vente en gros :

F. CARTIER, 1, rue de la Martinière — LYON

ORIPHOL

Indications. — Médication tonique type. Stimulant parfait de la nutrition. Reminéralisateur physiologique. Action rapide et durable.

Composition. — Acide nucléinique, méthylarsinate, Glycerophosphates, kola.

Forme. — Comprimés de saveur agréable.

Mode d'emploi. — Adultes : 4 comprimés par jour, 2 à chaque repas.

Adolescents : 2 à 3 comprimés par jour, suivant l'âge.

Enfants : 1 à 2 comprimés par jour, suivant l'âge.

A. MILLET & Ch. O. GUILLAUMIN

8, rue Richer PARIS

ORMATOL

contre toutes Dermatitis, Dermatoses, Affections de la Peau.

Forme. — Tube de Pommade de 60 grammes.

Indications. — Eczémas, Brûlures, Impétigo. Prurits, Urticaire, Ulcères, Sycosis, Irritations, Plaies, etc.

Composition. — Formule nouvelle réalisant l'application de la valeur antiseptique des essences en combinaison avec des produits médicamenteux très actifs (Essences de Géranium, Origan, Thym, Verveine, Calomel, Oxyde rouge Hg; Oxyde de Zinc, Acide Salicylique, Lanoline, Vaseline,

Avantages. — Odeur très agréable, pas d'irritation, cicatrisation rapide, ne tache pas.

E. ROBINEAU, pharmacien

80, route des Petits Ponts — DRANCY (Seine)

ORTHO-GASTRINE

Formule :

Sulfate de Soude anhydre.....	0 gr. 25
Phosphate de Soude anhydre.....	0 gr. 25
Bicarbonate de Soude.....	0 gr. 10
CITRATE de Soude.....	0 gr. 10
Pour 1 paquet N° 30	

Avantages. — Sels purs et anhydres, absolument conformes au Codex. Chaque prise donne un verre à Bordeaux de solution limpide et facile à boire même pour les enfants, toujours stable comme goût et composition.

Indications. — Toutes celles de la solution alcalino-sodique dite de Bourget. Insuffisance sécrétoire du foie et de la vésicule biliaire. Dyspepsie. Gastralgie. Hyperchlorhydrie. Entérite. Intoxication alimentaire, etc.

Posologie. — Adultes : 2 à 4 paquets par jour.

Enfants (sucrer légèrement) de 6 mois à un an 1/2 à 1 paquet par jour dans le lait et les bouillies.

De 1 an à 3 ans, 1 paquet par jour

Prix : 9 francs.

Laboratoire A. LEBLOND

Pharmacien de 1^{re} Classe,
Ex-interne des Hôpitaux de Paris
51, rue Gay-Lussac — Paris (V^e)

R. C. Seine 56049

ORTHOGÉNOL

Polythérapie préventive et Médication de bases des déficiences organiques et fonctionnelles de l'Automnose, réalisant la Synthèse des éléments de reconstruction cellulaire et des catalyseurs endocrino-minéraux nécessaires au redressement biologique intégral.

Minéralisation phospho-silico-magnésienne des tissus, Prophylaxie du cancer, Réactivation physiologique, Invigoration, Dépuratation urique.

Formule. — Chlorure de Magnésium, Glycérophosphate et Silicate de Magnésie, Silice végétale (Prêle), Benzoate de lithine, Acide thyminique (solvant urique physiol.) Bioxyde de Manganèse, Talcobrosille, Diastases du Foie, Hypophyse (lobe ant.), Glande interstielle.

Posologie. — Trois cachets par jour avant les repas.

Indications. — Arthritisme, Rhumatismes chron., Artério-Sclérose, Hypertension art., Néphroses, Uricémie, Hépatisme, Infections des voies biliaires, Troubles digestifs, Troubles neuro-cardio-musculaires, Dépression nerveuse, Diabète, Dermatoses, Prurits, Age critique des deux sexes, Sénilité précoce, Hypertrophie prostatique, Cancer, etc.

Pharmacie COULET

HYÈRES (Var)

OSMO-VACCINS P. L.

Vaccins concentrés et isotoniques
en ampoules de 10 cc.

**pour pansements locaux ou par voie
buccale**

(non injectables par voie hypodermique).

Osmo-Vaccins P. L. Gynécologiques. — Traitement des métrites, salpingites, vaginites, etc.

(Par tampons, mèches, injections intra-cervicales, etc.)

Osmo-Vaccins P. L. Gonococciques. — Traitement des affections à gonocoques chez l'homme : uréthrites, blennorrhagies, cystites gonococciques, prostatites, etc.

(Par injections uréthrales.)

Osmo-Vaccins P. L. Colibacilles. — Pour la plupart des infections intestinales (colites, entéro-colites), et dans les cystites, néphrites, tout particulièrement les pyo-néphrites infantiles, et dans tous les cas de syndrome entéro-rénal.

(Par voie buccale-lavages-lavements.)

Osmo-Vaccins P. L. Staphylococciques. — Pour le traitement des affections à staphylocoques : furonculose, anthrax, acné, etc.

(Par pansements et par voie buccale.)

Osmo-Vaccins P. L. Rhino. — Pour le traitement des rhinites aiguës et chroniques, sinusites, otites.

(Pansements et pulvérisations).

Laboratoires BRÉANT

4, rue de Clichy (Trinité) — PARIS

R. C. Seine 381-205 Tél. : Central 71-83.

OSTELINE

Composition :

La première préparation standardisée de vitamine D concentrée, fabriquée par le procédé Steenbock, Br. Fr. 606984, en comprimés et en gouttes, dissoute dans l'huile d'olive. Quatre gouttes ou un comprimé correspondent à une cuiller à café d'huile de foie de morue de qualité parfaite.

Contrôle :

Chaque flacon d'Osteline est l'objet d'un contrôle physiologique rigoureux qui confère au produit une efficacité constante (voir litt.).

Indications :

Toujours parfaitement digérée, dépourvue d'odeur ou de saveur désagréables, extrêmement active à faibles doses l'Osteline a les indications suivantes :

Déminéralisations de toutes natures (décalcification des tuberculeux, des femmes enceintes, de l'allaitement, décalcifications dentaires), *Troubles de la croissance*, *États liés à un métabolisme calcique defectueux* (spasmophilie, laryngospasme, hyperexcitabilité nerveuse), *Asthénies*, *Rachitisme*, *Acidose*, *Putréfactions intestinales* (L'Osteline rend aux fèces, lorsqu'elles sont alcalines ou hypoacides, leur acidité normale et s'oppose à la constipation en stimulant sans irritation ni accoutumance le péristaltisme intestinal).

Mode d'emploi :

Nourrissons, jeunes enfants : 1/4 gouttes deux à trois fois par jour ou plus, dans du lait ou du jus d'orange.

Adultes et grands enfants : 3 à 6 comprimés par jour (avaler sans croquer).

Aucune contre-indication.

Littérature et échantillons

Laboratoires GLAXO

44, rue Bergère, PARIS

Téléphone Provence 29-98. R. C. Seine 210-361 B.

OSTRÉINE

Chaux organique silico-fluorée
(partie centrale de l'écaille d'huître)
et phosphates assimilables.

Propriétés thérapeutiques. — Réminéralisateur type, totalement et directement assimilable.

Indications. — Tuberculose et pré-tuberculose, Dentition, Croissance, Grossesse, Lactation, Phosphaturie, Ostéomalacie, Diabète, Dénutritons organiques diverses, consolidation des fractures.

Forme. — 1^o cachet, 2^o poudre, 3^o granulé.

Posologie. — Au milieu de chaque repas : 1 cachet, une mesure d'Ostréine en poudre, ou une cuillerée à café d'Ostréine granulée délayée dans un peu d'eau sucrée.

Établissements A. BUISSON,

F. JALOT et C^{ie}

157, rue de Sèvres — PARIS

OUABAÏNE ARNAUD

Principe actif du *Strophantus Gratus*
isolé par le procédé particulier
du Professeur Arnaud

**Cardio-tonique énergique,
Diurétique puissant.**

Formes.

Solubaïne (voir à ce nom), Solution au
1/1000 d'Ouabaïne Arnaud.

Solution à QUATRE pour mille.

Comprimés au 1/4 de milligram.

Ampoules de 1 cc. au 1/4 de mmgr.,
pour injections intraveineuses.

Ampoules de 2 cc. au 1/2 mmgr., pour
injections intramusculaires.

Indications :

Toutes les insuffisances aiguës ou progres-
sives du cœur gauche.

Toutes les insuffisances du cœur droit :
Dilatation aiguë, Insuffisance mitrale,
Insuffisance cardiaque droite fonctionnelle
par lésions pulmonaires ou complications,
Asthénie du myocarde due aux maladies
infectieuses, Insuffisance cardiaque des
vieillards.

Bien spécifier sur l'ordonnance

« OUABAÏNE ARNAUD »

Échantillons et Littérature :

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e)

OUATAPLASME

du Dr Ed. LANGLEBERT

Pansement humide complet
Instantané, aseptique émollient

Indications. — Furoncles, Anthrax, Abscess, Brûlures, Eczéma. Plébites, Coliques. Plaies contuses.

Mode d'emploi. — Se prépare instantanément par simple immersion dans l'eau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liquor de Labarraque, Eau d'Alibour, Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Peut facilement se **sinapiser** en étendant à sa surface une couche de farine de moutarde qu'on aura au préalable délayée dans un peu d'eau froide ; ainsi préparé, il est le cataplasme sinapisé idéal.

Établissement SABATIER

10, rue Pierre-Ducieux — PARIS (XVI^e)

OVARINE TISY

En cachets de 20 centigr.

Pharmacie TISY

R. et A. FEIGNOUX, Successeurs
95, rue de Turenne — PARIS (III^e)

OVO-LÉCITHINE BILLON

Stimulant des fonctions de la nutrition et d'assimilation; s'oppose à la déminéralisation phosphorée, relève l'énergie du cœur et des muscles.

Indications :

Fatigue cérébrale, Dénutrition, Chlorose, Surmenage, Neurasthénie, Grossesse.

Posologie et mode d'emploi :

Dragées : Six par jour.

Granulés : Trois cuillerées à café par jour.

Ampoules : Une injection tous les deux jours.

Chez les enfants, réduire les doses selon l'âge.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

OVOMALTINE

Composition. — Matières protéiques 14,2%. Maltose 62,8 %. Dextrines 7,8 %. Corps gras 8,2 %. Cendres 3,7 %. Phosphore organique 1,18 %. H²O₂, 12 %. Diastases.

Forme. — Poudre irrégulière.

Indications. *Aliment de force* pour tout organisme affaibli par le surmenage, la maladie et la vieillesse. *Aliment remède et de régime* dans les affections gastro-intestinales. *Galactagogue* préparant et facilitant l'allaitement.

Doses. — *Enfants-Adultes*: 2 à 3 cuillerées, à café par tasse de lait, de lait coupé d'eau, de thé, de café, etc.

Préparer sans cuisson.

Ne convient pas aux nourrissons.

Etablissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

OVULES IVULA PEARSON

Composition. — Ces ovules sont constitués par une mince enveloppe glyco-gélatineuse, à fusion rapide à 37°, qui contient à l'état liquide l'excipient des principes actifs « *Creoline et Camphre* ». Cet excipient donne avec les sécrétions une émulsion très fine qui assure une pénétration profonde.

Indications. — Traitement de toutes les affections gynécologiques et en particulier de celles relevant du gonocoque.

Présentation. — Boîte de 12 ovules.

Prescrire. — Un ou deux ovules à la fois par jour (ovule Ivula Pearson). (Pour les injections utiliser la « Douche Ivula Pearson », produit liquide antiseptique. 1 cuillerée à café par litre d'eau.)

Prix : 15 fr.

LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES WILLIAM PEARSON

5, rue Clauzel, Paris.

OVULES " ROCHE "

au Thigénol à 30 %

(Voir également page " Thigénol ")

Prop. thér. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants et puissamment résolutifs. On constate au bout de quelques jours du traitement par les Ovules " Roche " la sédation parfaite des douleurs, et, après quelque temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétrocélent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une intervention chirurgicale.

Indic. thér. — Vaginites, Vulvovaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métorrhée, etc., etc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, place des Vosges — PARIS

OXYDOTHYRINE PÂRIS

Composition. — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial. Est sans action sur le cœur.

Indications. — Embonpoint. Obésité. Fibrome, Goître et tous les états dus à l'insuffisance Thyroïdienne.

Forme. — Dragées renfermant 0 gr. 10 de substance active.

Posologie. — 1 à 2 dragées par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : 20 fr. le flacon de 50 dragées.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS(XV^e)

OXYDOVARINE PÂRIS

Composition. — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

Forme. — Dragées dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

Indications. — Troubles de la menstruation. Retentissements pathologiques de l'ovariotomie. Irrégularités. Insuffisance. Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : 20 fr. le flacon de 50 dragées.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS(XV^e)

OXYDROL

Eau oxygénée solidifiée.

Composition et propriétés. — Combinaison cristallisée d'eau oxygénée avec la carbamide. $[\text{CO} (\text{NH}_2)^2 \text{H}_2\text{O}^2]$.

Comprimés blancs, inodores ne contenant aucune trace de sels ni d'acides minéraux, très solubles dans l'eau.

Teneur en eau oxygénée 35 %. Sa solution à 10 % correspond à l'eau oxygénée 11 volumes.

Permet de préparer à chaque instant et partout une solution d'eau oxygénée fraîche, en quantité voulue et d'une concentration bien déterminée.

L'action de l'oxydrol en solution est exactement celle de l'eau oxygénée. Désinfectant de premier ordre n'exerçant aucune action nocive ni toxique sur les tissus organiques soumis à son action.

Usage. — Pharmacie, médecine et chirurgie. Il nettoie à fond les plaies tout en les ménageant et possède en outre des propriétés désodorantes et hémostatiques.

Mode d'emploi. — Pour préparer une solution correspondante à l'eau oxygénée 11 volumes, dissoudre une partie d'oxydrol dans dix parties d'eau. Diluer selon les besoins.

POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

OXYGÉNASE

Composition. — Extrait vitaminique, spécialement préparé à partir de levures sélectionnées et hyper-actives, sensibilisé par un catalyseur, le manganèse. L'addition d'une substance-tampon appropriée, permet la tolérance parfaite.

Indications. — Troubles digestifs : inappétence, dyspepsies, entérites, diarrhées, etc.

Troubles des fonctions du foie et des glandes à sécrétion interne.

Troubles des oxydations : arthritisme, goutte, rhumatismes, asthme, migraines, dermatoses, obésité. — Prétuberculose et Tuberculose.

Mode d'emploi. — Six dragées par jour, dans un peu d'eau, à prendre avant les repas.

Demi-dose pour les enfants.

LABORATOIRE
de PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE,
D^r PH. CHAPELLE

8, rue Vivienne, Paris.

OXYMENTHOL PERRAUDIN (tablettes)

A base d'oxygène naissant, menthol, coca-stovaïne, benzoate de soude, etc.

Tablettes de goût agréable.

Doses et mode d'emploi. — Adultes, 6 à 10 par jour à sucer ; Enfants, 3 à 6 par jour à sucer.

Prop. Thér. — Anesthésiques, antiseptiques, pectorale.

Indications. — Affections des voies respiratoires et de la gorge, Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

Laboratoire des Produits Scientia

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, rue Chaptal. — PARIS

OXYMUTH SACA

Composition :

Hydrate d'oxyde de bismuth en suspension dans l'huile d'olive pure.

Forme :

Ampoules de 2 c.c. renfermant 0 gr. 15 d'hydrate d'oxyde de bismuth (= 0 gr. 125 de bi métal actif).

Indications :

Syphilis à toutes les périodes.

Mode d'emploi :

Une ampoule tous les 2 ou 3 jours en injection intramusculaire.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 18 fr.

A. MILLET

Concessionnaire

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e)

OZOBIASE

Principe actif : catalyseur oxydant (Facteur O). Communication Société de biologie, 27 février 1926 ; Société de thérapeutique, 10 février 1926.

Indic. therap. — Nutrition du tuberculeux, Amaigrissements, Hypotrophie.

Forme. — Comprimés. Flacon de 60 et 1/2 flacon de 30.

Doses. — *Adultes* : 2 à 4 comprimés par jour avant les repas du midi et du soir.

Enfants de 10 à 15 ans : 1 à 2 comprimés midi et soir ; au-dessous de 10 ans : 1 comprimé midi et soir. Pour les petits : écraser le comprimé et en donner la moitié, dans du lait ou des confitures. Pour l'adulte, avoir soin de casser les comprimés avant de les avaler.

Prix : 19 fr. le flacon. — 11 fr. le demi-flacon.

Durée : 12 à 15 jours.

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (S.-et-O.)

OZONAIR

Appareil producteur d'Ozone pour l'assainissement de l'air, par l'effluve électrique.

Indications :

Grippe, Phtisie, Tuberculose, Coqueluche, Laryngite, Anémie, Lymphatisme.

Propriétés :

Antiseptiques, pectorales, désodorantes, Accélération des échanges nutritifs.

Mode d'emploi :

Faire fonctionner l'appareil approprié jusqu'à ce que l'odeur caractéristique de l'Ozone se sente nettement dans la pièce.

Procédés Ozonair.

Concessionnaires :

HALOT & CARPENTIER

2, rue de Vienne — PARIS (VIII^e)

Tél. Labo de 14-46

PAIN ESSENTIEL

avec ou sans chlorure.

Compos. — Le **Pain Essentiel** est préparé avec des gruaux de blé dur, riches en gluten, additionnés de protéine du lait solubilisées.

Présentation. — Chaque baguette de 10 gr., représente la valeur nutritive de 16 gr. de pain ordinaire, et renferme 6 gr. d'hydriocarbonés.

Avantages. — A été étudié pour convenir à tous les régimes. Très friable, mais oblige le malade à mastiquer ses aliments.

Indic. therap. — Produit de haute valeur nutritive. A recommander dans tous les cas de convalescences, surmenage et alimentation difficile; aux dyspeptiques, entéritiques et diabétiques légers. Aux obèses : maximum 3 et 4 baguettes par repas.

Dans d'excellentes panades galactagogues.

Sans chlorure pour arthritiques et albuminuriques.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, Rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, Chemin Feuillat — LYON

PAIN REDEUIL

Pain de régime.

Préparé par des procédés spéciaux de fabrication, diastasé, le PAIN REDEUIL fournit à l'organisme des aliments féculents après les avoir préalablement ramenés à une forme particulièrement apte à l'assimilation.

Ne donne aucun excès de sucre, ni dans le sang, ni dans les sécrétions.

De digestion facile, il est parfaitement bien toléré par l'estomac et ne provoque pas de constipation. De goût très agréable, comparable au pain de gruau du commerce, il ne rebute pas les malades soumis au régime, comme les biscottes, les biscuits, etc.

Pain frais.

En pains de 100 grammes, se conservant une dizaine de jours, ce qui permet de l'expédier à de longues distances.

Pain de conserve.

Préparé suivant les mêmes principes que le pain frais, de conservation pratiquement illimitée.

Aliments de régime.

Pâtes alimentaires. Chocolat. Farines.
Sucre EXCELSIOR.

Établissements REDEUIL

7, rue Couche, PARIS (XIV^e).

Tél. : Gobelins 53-74

PAINS SPÉCIAUX HEUDEBERT

Les **Pains spéciaux Heudebert** ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain est interdit.

Pour tous régimes.

Pain Essentiel avec ou sans chlorure (voir article spécial).

Dyspepsie, entérite.

Pains grillés, Longuets et Gressins.

Constipation.

Pain complet.

Obésité.

Gressins, Pain Essentiel.

Diabète.

Pain de gluten (régime très sévère, 5 à 10 % d'hydrocarbonés). Pain d'aleurone (régime sévère, 15 à 20 %). Spécial diabétique (régime normal, 30 à 35 % d'hydrocarbonés).

Albuminurie, arthritisme.

Pain hypoazoté. Biscottes, languets et gressins sans sel.

Pain des villes d'eaux.

Pain de Royat (cœur, vaisseaux). **Pain de Contrexéville** (reins, voies biliaires), **Pain de Châtel-Guyon** (constipation), **Pain de St-Nectaire** (albuminurie), **Tranches de Plombières** (estomac, intestins), **Pain de Brides** (obésité), **Pain de Vittel** (arthritisme), **Pain d'Évian** (néphrites, artériosclérose).

La haute valeur nutritive de ces pains permet de régler médicalement leur consommation.

Produit de Régime HEUDEBERT

85, rue St-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, Chemin Feuillat — LYON

PAÏPHOS

Composition. — Nucléinates de chaux, de fer, de manganèse, Méthylarsinate de soude, Papaine.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant général, tonique de la cellule nerveuse, stimulant de la nutrition.

Indications. — Dépression nerveuse, Anémie, Neurasthénie, Troubles digestifs, Dénutrition, Convalescence.

Forme pharmaceutique — Comprimés à 25 centigr.

Mode d'emploi. — Six comprimés par jour, trois au milieu de chacun des deux principaux repas.

Action. — Douce, constante, rapide.

Prix : 13 fr. 50 la boîte de 60 comprimés.

Laboratoire du PAÏPHOS

à VERNON — (Eure)

Service commercial et Échantillons

9, rue Perignon — PARIS (XV^e)

F. Cabaille, Pharmacien de première classe

Gros : Office commercial pharmaceutique
71, rue du Temple — PARIS (III^e) — et ses succursales

Jus de raisin

PAMPRYL

Blanc et rouge.

Composition. — Pur jus de raisins frais sélectionnés, préparé à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) par un procédé perfectionné conservant intégralement toute la saveur du raisin mûr fraîchement cueilli.

Indications. — **Nutritif, Antitoxique, Alcalinisant, Diurétique.**

Toutes les indications de la cure de raisin : Auto-intoxications, Entérites, Insuffisance hépatique et rénale, Urologie, Néphrites, Arthritisme, etc. Boisson de chevet des malades dans tous les états infectieux et fébriles.

Dose moyenne. — 3 verres à bordeaux par jour, on peut augmenter sans inconvénient,
Se trouve dans toutes les Pharmacies : bouteille : 10 fr. 50 ; demi-bouteille : 6 fr. 70 ; quart : 4 fr. 75.

Société du PAMPRYL

2, villa de la Terrasse, PARIS. Tél. : Wagram 33 00.

PANBILINE

Formes. — Pilules et Solution.

Définition. — La Panbiline, Spécifique total des *Maladies du Foie* et des Affections qui en dérivent, est la seule médication agissant simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

(*Voir Rectopanbiline*).

Composition. — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les meilleurs Cholagogues sélectionnés et réunit, en milieu glycérimé : Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique, ni irritante, et ne contient ni sucre, ni alcool.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase Biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie Entérite mucomembraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie. Maladies des pays chauds, Congestions du foie. Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

Doses moyennes. — 2 à 12 pilules de Panbiline par jour, ou 2 à 12 cuillerées à café de Panbiline liquide par jour, au début des repas. Demi-dose pour les enfants.

Prix au public :

11 fr. la boîte de pilules de Panbiline.

15 fr. le flacon de Panbiline liquide.

Laboratoire de la PANBILINE

ANNONAY (Ardèche)

PANCRÉANNE

Composition. — Association de poudre de pancréas, pancréatine, tanin, sous forme de comprimés.

Action thérapeutique. — Assure la digestion totale des différentes sortes d'aliments, régularise la sécrétion intestinale, excite la sécrétion interne des Ilots de Langerhans.

Indications. — Dyspepsie. — Entérites. — Insuffisances digestives. — Diabète (cure d'entretien et de remplacement de l'insuline injectable).

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés à la fin des repas.

Prix au public 15.80

Laboratoire des VALÉROMENTHOL

10, rue Poncelet, Paris

Wagram 37.58

PANCRÉPATINE LALEUF

Capsules glutinisées.

Composition. — Extrait spécial de *Pancréas* activé par addition de *Suc hépatique* et analgésine. Chaque capsule contient 25 centigrammes de principes actifs.

Propriétés et indications thérapeutiques. —

Opothérapie du *Diabète* par médication interne.

Sous l'influence de la *Pancrépatine*, on remarque :

- 1° Abaissement de la Glycémie ;
- 2° Abaissement et disparition totale fréquente de la Glycosurie ;
- 3° Disparition de la Polyphagie et retour à un appétit normal.
- 4° Disparition des troubles secondaires : soif, polyurie, prurit, etc.
- 5° Amélioration rapide de l'état général.

Mode d'emploi et doses. — Les capsules de *Pancrépatine Laleuf*, doivent toujours être prises au cours des repas. De 6 à 12 capsules par 24 heures suivant prescription médicale.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e)

PANFÉBRINE

Médicament de la fièvre et de toutes les fièvres

Stimulant les fonctions hépatique, biligène et splénique, sans action déprimante sur le cœur

Traitement du paludisme: **Panfébrine A B**

Spécifique de toutes les pyrexies: **Panfébrine B**

1° Panfébrine B (toutes fièvres)

Composition. — Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Son rôle. — Antithermique dans toutes les pyrexies.

Action. — 1° Apyrétique énergique chez tous les tuberculeux fébricitants.

2° Maladies infectieuses (grippe, dothiéntérie, scarlatine, etc. et phlegmasies de toutes sortes),

Posologie. — Un cachet-comprimé de Panfébrine B dès que la température est à 38° ou au-dessus (Peut être renouvelé 2 à 4 fois en 24 heures).

2° Panfébrine AB (Paludisme)

Composition. — Panfébrine A: Acide méthylarsénique $As = O-CH^3 (OH)^2$. Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Panfébrine B: Composition indiqué ci-dessus.

Son rôle. — Action spécifique dans le paludisme (N'occasionne jamais d'accidents quinqués).

Avantage. — Innocuité absolue.

Posologie. — Préventif 1 cachet-comprimé A le matin, 1 cachet-comprimé B le soir. — Paludisme aigu et chronique: 3 cachets-comprimés A et 3 cachets-comprimés B par jour. — Enfants: 12 ans, 2 cachets-comprimés A et 2 cachets-comprimés B par jour. De 7 à 8 ans, 1 cachet-comprimé B par jour.

(Echantillons et littérature)

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier

PARIS (XI^e) — Tél. Roquette 14-12

PANGADUINE

Extraite directement des Foies de Morue

Contient tous les principes actifs, alcaloïdes, phosphoglycérides, lécithines, contenus dans l'**Huile de foie de Morue**.

Elle permet d'absorber sous une forme agréable et parfaitement assimilable les principes médicamenteux correspondant à une dose d'huile de foie de morue intolérable pour le malade.

Elixir de Pangaduine. — *Très agréable au goût*, contient 10 cgr. de **Pangaduine** par cuillerée à bouche. *Dose*: Un verre à liqueur avant chaque repas.

Pangaduine granulée. — Contient 10 cgr. de **Pangaduine** par cuillerée à café. *Dose*: Une cuillerée à café avant chaque repas.

Ch. SOUILLARD

2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux — PARIS

PANGASTROL

Pansements de l'Estomac.

Composition. — Kaolin, Bismuth, Belladone, Codéine, Carbonate de Chaux, Magnésie.

Forme. — Sachets de 10 grammes.

Prop. therap. — De par sa composition, le PANGASTROL réalise le pansement gastro-intestinal le plus parfait, et soulage rapidement les douleurs les plus aiguës.

Indications. — Hyperchlorhydries, Spasmes gastriques, Ulcères, Aérophagie, Dyspepsies, Diarrhées, Fermentations.

Laboratoire STOULS

156, Avenue Victor-Hugo — PARIS.

Téléphone : Passy 68-14.

PANGESTYL NARTY

Nature et action. — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif; 2° Par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom:

PANGESTYL (*qui digère tout*).

Indications. — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhées, Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion: Coliques hépatiques, Ictère ou Jaunisse. Angiocholites, Cholécystites, etc.

Formes et Mode d'emploi. — *Granulés ou Cachets*. Une cuillerée à café de granulé ou un cachet à la fin des repas ou au moment des malaises dans une infusion chaude, café, tilleul, thé, camomille, etc.

Laboratoire Georges TINARD

134, boulevard Péreire — PARIS (XVII^e)

PANGLANDINE

Description. — Capsules kératinisées de 0 gr. 25 (50 par flacon) contenant une synthèse opothérapique : thymus, ovaires, rate, duodénum, hypophyse, capsules surrénales. thyroïde, pancréas. testicules, foie, prostate, en proportions physiologiques.

Action thérapeutique. — L'insuffisance fonctionnelle d'une glande à sécrétion interne, entraînant un surcroît de travail pour les autres, la médication opothérapique doit renforcer l'action des principales glandes en suppléant celle qui est déficiente et, par conséquent, comporter un mélange synthétique.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dans la sénilité, l'obésité, la neurasthénie, les retards de croissance, les troubles de la puberté, le myxœdème, l'infantilisme.

Laboratoires CH. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

« PANHÉMOL »

**Médication spécifique la plus active
des Syndromes anémiques.**

Le « **Panhémol** » présente, au maximum de concentration et d'assimilabilité, tous les éléments du sang vivant, sauf l'eau de constitution évaporée par concentration dans le vide, à basse température.

Formes. — Sirop. — Comprimés.

Composition. — Chaque cuillerée à soupe de Sirop « **Panhémol** » contient :

{	Extrait hématique total obtenu par concentration dans le vide, à froid, de	20 cc.
	de Sérum et globules d'animaux sélectionnés.	
{	Glycérophosphate de Sodium cristallisé.	0 gr. 10
	Sirop à l'extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorces d'oranges amères vanilliné.	
	Q. S. P.....	15 cc.

Chaque comprimé contient :

{	Extrait hématique sec total obtenu par concentration dans le vide, à froid, de	2 cc. 5
	de Sérum et globules d'animaux sélectionnés.	
{	Glycérophosphate de Sodium cristallisé.	0 gr. 05

Aucune autre préparation ne présente, à poids égal, une telle richesse en Hémoglobine (2 gr. 50 par cuillerée à soupe de sirop) et en principes actifs totaux du Sérum et des globules.

Posologie. — Adultes : Une cuillerée à soupe pure ou diluée dans un peu d'eau pure ou gazeuse, immédiatement avant les repas de midi et du soir, ou 3 à 6 comprimés.

Enfants : Une ou deux cuillerées à café, suivant l'âge, avant les repas de midi et du soir, ou 1 à 3 comprimés.

Indications. — Toutes les Anémies, Convalescences, Croissances, Tuberculoses, Paludisme, Hémorragies, Rachitisme et toutes déchéances organiques.

« **Panhémol** » réalise au maximum de puissance et d'efficacité l'*Opothérapie séro-sanguine totale*.

Laboratoires R. BOUYSSOU et C^{ie}

90, avenue des Ternes, Paris (XVII^e)

Téléph. : Wagram 61-42

PANLACTO MIDY

Culture pure des 3 bacilles lactiques : bacille Bulgare, bacille Bifidus, bacille Paralactique à l'état vivant et actif.

Comprimés dosés à : Bacilles bulgares..... 0,02
Bacilles bifidi..... 0,02
Bacilles paralactiques. 0,02

Mode d'emploi. — 3 à 8 comprimés par jour, soit à la fin du repas, soit au petit déjeuner et dans un verre d'eau lactosée (5 grammes), le soir avant de se coucher.

Prop. thérap. — Détruit toutes les fermentations microbiennes, antiseptise et tonifie les intestins.

Indications. — Affections intestinales: diarrhées infantiles, gastro-entérites, entéro-colites, etc.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e)

PANTOPON "ROCHE"

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0 gr. 01 de Pantopon "Roche"
= 0 gr. 50 ctg. de teinture d'opium,
= 0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium,
= 0 gr. 005 mgr. de morphine.

Posologie et mode d'emploi. — Voie buccale :

PANTOPON "ROCHE" SIROP

(dosé à 0,01 ctg. de Pantopon "Roche" par cuillerée à soupe.)

Adultes : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus
Enfants : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

PANTOPON "ROCHE" COMPRIMÉS

(1 comprimé = 0,01 ctg. de Pantopon "Roche").

Adultes : 1 à 3 par jour et plus.
Enfants : 1/3 à 1 par jour, selon l'âge.

PANTOPON "ROCHE" AMPOULES

(1 ampoule = 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon "Roche").

Boîtes de 3, 6 et 12 Ampoules

Adultes : 1 et 2 par jour et plus.
Enfants : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

Indic. thér. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

PAPAÏNE

de TROUETTE-PERRET

Ferment digestif, énergétique, extrait du suc du *Carica Papaya*, digère les produits azotés, *quelle que soit la réaction de l'estomac*, acide, neutre ou alcaline.

Indications :

Toutes les fois que l'on digère mal.

Pour les Adultes :

Élixir "TROUETTE-PERRET" à la *Papaïne*.

Un verre à liqueur après chaque repas.

Cachets "TROUETTE-PERRET" à la *Papaïne*.

Un à deux cachets à chaque repas.

Comprimés "TROUETTE-PERRET" à la *Papaïne*.

Deux à huit comprimés à chaque repas.

Pour les Enfants :

SIROP DE PAPAÏNE

de TROUETTE-PERRET

Gastro-Entérite des nourrissons, Diarrhées, Vomissements.

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

A souvent réussi après échec de toute autre médication.

Bien formuler : *Élixir - Sirop - Cachets - Comprimés de TROUETTE-PERRET, à la Papaïne.*

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeubles - Industriels, 15
PARIS (XI^e)

PAPAVERYL

Comprimés de Chlorhydrate de Papaverine chimiquement pur doses à 4 centigrammes.

Toxicité très minime (le moins toxique des alcaloïdes de l'opium). Contrôle physiologique: Tableau B.

Indications. — *Tous les spasmes musculaires lisses :* Résultats particulièrement remarquables dans: *l'hypertension*, l'angine de poitrine, les spasmes digestifs, l'entérocolite muco-membraneuse, les coliques hépatiques néphrétiques, la constipation spasmodique, l'asthme, les toux spasmodiques (Coqueluche), le hoquet, la dysménorrhée, etc...

Posologie. — 2 à 6 comprimés par jour et plus (la toxicité chez l'homme est extrêmement faible); chez l'enfant, 1/4 de comprimé par année d'âge (1 centigramme).

Mieux supporté et plus actif que la belladone.

Présentation. — Tube de 20 comprimés dosés à 4 centigr. par comprimé.

Prix : 15 francs.

Littérature sur demandé. Thèse Baconnet 1927, Paris.
Rosenberg Mendel Wolf 1929, Paris.

Laboratoires ORRILLARD

245, rue de Vaugirard.

Ségur 41-59

PAQUETS VÉDÉ

Traitement idéal de l'hyperchlorhydrie et de tous accidents digestifs.

Forme. — Poudre divisée en sachets de trois grammes et composée de produits chimiquement purs et sélectionnés. Le pouvoir saturant est en raison directe de la pureté chimique des constituants de la poudre Védé. Magnésie extra-blanche, Carbonate de chaux précipité, extra-léger, Bicarbonate de soude surs. raffiné n° 1, Lactose H. M. S., Essence d'anis.

Posologie. — Un paquet après chaque repas ou plus si nécessaire. La boîte contient 20 paquets.

Prix au public : 10 fr. 70

Laboratoires VÉDÉ (Dr et G. de Montmorot)
2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e)

Téléphone : Roquette 43.88 et 82.11

Boîtes sur demande aux Docteurs
pour expérimentations.

PARADOLINE

Solution calmante sans Morphine ni aucun dérivé de l'Opium. Diurétique puissant.

Composition. — Boldo, Bachu, Uva-Ursi, Kawa-Kawa, Pichi, Piscidia, Salicylate et Bicarbonate de Soude, Gl. célerine, Eau distillée de Menthe.

Indications. — Disparition rapide de la douleur dans Coliques hépatiques, néphrétiques, Rhumatismes, Affections génitales. En même temps traitement causal de ces affections.

Posologie :

Adultes : 1 à 4 verres à madère par 24 heures entre les repas.

Enfants : 1 à 3 verres à liqueur.

Prix du flacon de 500 cc. : 16 fr.

Laboratoire CHEVILLON

38, rue Ramey — PARIS (XVIII^e)

PARALACTINE BYLA

Deux formes actives :
Comprimés sur lactose
Culture pure sur lait

Composition. — La *Paralactine Byla* est constituée par une culture de ferments lactiques, d'activité et de stabilité contrôlées.

Indications. — Entérites aiguës et chroniques des enfants et des adultes, eczéma, urticaire, acné, herpès, toutes affections de la peau, et tous phénomènes consécutifs à l'auto-intoxication d'origine intestinale.

Mode d'emploi. — *Comprimés* : 1 à 3 comprimés dissous dans un peu d'eau sucrée, froide ou tiède, trois fois par jour.

Culture sur lait. — Quatre cuillerées à café par jour, délayées dans un peu d'eau lactosée.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire, Paris (XIV^e).

R. C. Seine 71895.

PARATHYROCALCINE

“ MONCOUR ”

REMINÉRALISATION

Fixation des SELS de CALCIUM
par l'utilisation, comme *MORDANT*,
de l'EXTRAIT TOTAL PARATHYROÏDIEN

Indications. — Prébacillose, bacillose, scrofulé, convalescence, croissance, fractures, affections osseuses, décalcification dentaire, et, en général, toutes affections avec déminéralisation.

Notre Extrait total Parathyroïdien, élément essentiel de la médication, est préparé avec des glandes soumises à un contrôle histologique régulier.

Cachets : 1 à 3 par jour.

Comprimés : 2 à 6 —

Laboratoire MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS

Tél. : Molitor 08-47.

PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche).

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse, ni stupéfiante.

Prop. therap. — Action régulière et sûre.
Effet non seulement calmant, mais curatif.

Indications. — Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).
Pas de contre-indication.

Posologie. — 3 prises par jour (quel que soit l'âge du malade).

Trois prises par jour	}	Enfants de moins de 1 an... :	X à XXX gouttes
		— de 1 à 5 ans..... :	XX à LX gouttes
		— 5 ans et au-dessus :	XX à cent gouttes
		Adultes..... :	XXX à cent gouttes

THIRIET et C^{ie}

26 et 28, rue des Ponts — NANCY

PASSIFLORINE

Traitement phytothérapeutique des états
névropathiques.

Composition. — Une cuill. à café contient
0 gr. 50 extrait fluide de *Passiflora incar-*
nata; 0 gr. 25 extrait mou de *Salix Alba*;
XX gouttes alcoolé de *Cratægus oxyacantha*.

Action. — La *Passiflore* diminue la tension
artérielle, régularise l'influx nerveux dans
le domaine du grand sympathique et est un
sédatif et un antispasmodique de premier
ordre.

Son action est renforcée et prolongée dans la
Passiflorine par le *Saule*, sédatif nervin que les
auteurs américains ont comparé au bromure
et par le *Cratægus* dont l'action tonicardiaque
et équilibrante du système nerveux est bien
connue (Huchard, Renon, H. Leclerc, etc.).

Indications. — Tous états névropathiques :
angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. Insom-
nie nerveuse, troubles fonctionnels du cœur
d'origine nerveuse (palpitations, tachycar-
die, etc.), troubles nerveux de la vie géni-
tale, etc.

Posologie. — Comme médicament équil-
ibrant du système nerveux : Une cuillerée à
café midi et soir avant les repas.

Contre l'insomnie nerveuse : Une à trois
cuillerées à café le soir.

G. REAUBOURG, docteur en pharmacie
1, rue Raynouard — PARIS (XVI^e)

PASSIVAL

Antispasmodique nouveau
(procédé Elzévir).

Action *synergique* de la Passiflore et de la Valériane désodorisée. (La Passiflore renforce l'effet de la Valériane).

Goût agréable.

Effet presque immédiat, et toujours constant.

Expérimenté et adopté dans les hôpitaux et cliniques de Paris.

Posologie :

2 à 5 cuillerées à café par jour.

Échantillon et littérature au Corps médical.

Laboratoires H. SALLE
4, rue Elzévir — PARIS (III^e)

PATHOLYSINE

(Traitement interne des néoplasmes)

Deux formes : Ampoules et Pilules

Composition. — Salicyl-arséni-oxybenzénol-magnésien.

Indications. — S'emploie dans tous les cas où le tissu conjonctif sous-cutané est intéressé, c'est-à-dire dans tous les cas de cancer, sauf le cancer du cerveau.

Mode d'emploi. — 1^o Ampoules : Injecter quotidiennement une ou deux ampoules de un centimètre cube. En injections sous la peau de l'abdomen ou des membres ou en injections intramusculaires dans les muscles fessiers ou dans ceux de l'épaule.

2^o Pilules : Quatre pilules par jour, au moment des repas.

LABORATOIRES A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — Paris (XII^e)

PAVÉRON DAUSSE

(Alcaloïdes totaux de l'Opium)

Hypnotique, sédatif, analgésique.

Complexe alcaloïdique renfermant à l'état de chlorhydrates solubles tous les alcaloïdes de l'Opium.

0 gr. 02 de Pavéron = 0 gr. 01 de Morphine.

Action plus douce, plus régulière et plus durable que celle de la Morphine.

Indications. — Toutes les indications de l'Opium, de la Morphine et de ses succédanés.

Formes et posologie. — *Ampoules de Pavéron* dosées à 0 gr. 02 de Pavéron par cc.
— *Dose* : 1 ampoule à la fois.

Dragées de Pavéron dosées à 0 gr. 01 de Pavéron. — *Dose* : 1 ou 2 dragées à la fois.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

PÉLOSPANINES

Sulfates de terres rares

Traitement des Bacillooses subaiguës ou chroniques et des "Déficiences organiques".

Injections intra-veineuses :

Pelospanines A, ampoules de 2 cc.

Pelospanines B, ampoules de 4 cc.

Injections intra-musculaires :

Pelospanines C, ampoules de 2 cc.
(associat. lipoïdique).

Pelospanines G. (gouttes) dites : Pelo G.
(Didyme, Calcium, Manganèse, Magnésium).

Prix : A : 12 fr. — B : 18 fr. — C : 12 fr.
G : 14 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, Rue Biscornet — PARIS (XII^e)

PEPSODIA

Comprimé saturant anti-acide
anti-dyspeptique et anti-gastralgique.

Régulateur de la digestion.

Présentation et Composition. — Comprimé friable d'un emploi très pratique, utilisant à la fois l'action neutralisante des sels alcalins et alcalino-terreux et les propriétés absorbantes des sels neutres. Ne contient aucun toxique.

Indications. — Pyrosis, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Spasmes pyloriques, Aérophagie, Troubles nerveux d'origine gastrique (Névralgie, insomnie, vertige, nervosisme), Gastrites inflammatoires et toxiques, Ulcérations de l'estomac.

Mode d'emploi et Doses. — Dans les cas légers, 1 à 2 comprimés délayés dans un demi-verre d'eau froide ou tiède dès le début des sensations pénibles. Peut être croqué comme une dragée. En cas de gastrites ou d'ulcérations 2 à 4 comprimés et plus (pansement calmant).
Aucune contre-indication.

LABORATOIRE CHIMICO-THÉRAPIQUE DE PARIS

12, rue des Apennins — PARIS (XVII^e)

Téléphone : Marcadet 20-28.

PEPTALMINE

Peptones de Vlande et de Poisson

Extraits d'Œuf et de Lait

Farine de blé dans l'enrobage.

Prop. thérap. — Médication antianaphylactique polyvalente.

Indications. — Migraines, Urticaires, Troubles digestifs par assimilation défectueuse. Rougeurs de la face, Somnolences ou Pesanteurs après les repas, Colites, Asthme, Prurits, Eczémas et, en général, les diverses manifestations anaphylactiques.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 dragées ou 2 cuillers à café de granulés, *une heure avant chacun des trois repas.*

Enfants : Moitié de ces doses.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, Rue Chaptal — PARIS

PEPTALMINE MAGNÉSIÉE

Peptones de viande et de poisson.

Extraits d'œuf et de lait.

Farine de blé dans l'enrobage.

Sulfate de Magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique et cholagogue.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépatique, insuffisance hépatique, congestions du foie, cholecystites chroniques et toutes les manifestations anaphylactiques avec participation hépatique.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cuillères à café de granulés ou 4 dragées 1 heure avant chacun des 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

**LABORATOIRE
DES PRODUITS SCIENTIA**
D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal — PARIS

PEPTODIASE

Stimulant gastrique

Forme. — Gouttes.

Composition. — 1° Association de :
Chlorure de Calcium,
— magnésium,
— sodium,

sels qui stimulent la sécrétion et la motilité gastriques et augmentent considérablement le pouvoir digestif du suc gastrique.

2° **Principes amers de la gentiane**, renforçant l'action des chlorures.

Propriétés thérapeutiques :

Réveille l'appétit,
Augmente la sécrétion et l'activité des sucs digestifs,
Accélère la digestion,
Favorise l'évacuation de l'estomac.

Indications. — Atonie gastrique,
Hypoacidité,
Hyposécrétion,
Digestion lente,
Aérogastrie,
Anorexie.

Posologie. — Trente gouttes dans un peu d'eau sucrée au début ou au milieu des repas.

Enfants : quatre gouttes par année d'âge et par 24 heures.

Prix : 12 francs.

Laboratoire P. ZIZINE

D^r en Médecine — D^r en Pharmacie,
Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux,
Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.
24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e)

Tél. : Diderot 28-96.

PEPTO KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment

Liqueur très agréable contenant le suc de Kola fraîche.

Dose et mode d'emploi. — 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Indications. — Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, etc.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

PEPTONAL

Composition. — PEPTONE rendue inaltérable par dragéification spéciale.

Action. — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique ; curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

Indications. — Migraine, Somnolence, frissons, lourdeur, après les repas (crise hémoclasique atténuée). Urticaire.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés dragéifiés — Granulés.

Dose. — Deux Comprimés une heure avant chaque repas, ou une cuiller à café de granulé.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DURET & REMY

ASNIÈRES (Seine)

PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone, de glycérine et de fer.

Gouttes concentrées. Elixir. Vin.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 10 à 30 gouttes ou 1 verre à liqueur d'Elixir ou de vin à chaque repas ; Enfants : 1 goutte par année d'âge 2 fois par jour.

Prop. Thér. — Reconstitution du globule rouge du sang.

Indications. — Tous les états anémiques et chlorotiques.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS

PEPTONE VASSAL

SÈCHE

Représente 12 fois son poids de viande de bœuf. Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a en outre l'avantage d'être d'un *prix modéré* qui en permet un usage prolongé.

Dose. — 3 cuillerées à soupe par jour dans le potage ou dans du vin de Malaga.

Chaque flacon de 50 gr. « Peptone » représente 600 gr. de viande de bœuf solubilisée.

Echantillon gratuit sur demande.

Établissements Léon DANJOU — LILLE

PEPTOZYM

Médication Opothérapique antidyspeptique.

Forme. — Dragées à double enrobage : 1^o externe, soluble dans l'estomac ; 2^o interne, soluble dans l'intestin.

Composition. — Les dragées « Peptozym » sont constituées de deux parties distinctes et concentriques :

1 ^o un noyau central	{	Extrait de Pancréas...	0 gr. 10
constitué par		Extrait de Bile.....	0 gr. 05
		Boldine.....	0 gr. 00075

et enrobé dans du gluten.

2 ^o une masse	{	Extrait de muqueuse gastrique	0 gr. 15
périphérique		Poudre de noix vomique.....	0 gr. 025

constituée par

et enrobée dans du sucre.

Indications. — Grâce au choix de leurs principes constituants particulièrement actifs et grâce à leur double enrobage qui permet à ces principes d'agir *physiologiquement*, avec le *maximum d'efficacité*, les Dragées « Peptozym » réalisent le traitement de choix de tous les *Troubles Dyspeptiques par Insuffisance sécrétoire* et *Asthénie nervo-motrice*.

Posologie. — Deux à trois dragées, au cours des deux principaux repas, au début de l'absorption du plat principal.

Laboratoires R. BOUYSSOU et C^{ie}

90, avenue des Ternes, Paris (XVII^e).

Téléph. : Wagram 61-42

PÉRAZIODOL

Iodosalicylate de pipérazine

Forme. — Pilules kératinisées à 0 gr. 40.

Propriétés. — 1^o *Iode naissant* = puissant antitoxique et antiseptique.

2^o Pipérazine = antiarthritique.

Avantages. — 1^o *Composé stable* sans acide iodhydrique libre.

2^o *Pas d'iodisme*. Parfaite tolérance par le poumon.

Indications. — Artériosclérose, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Adénopathies, Infections microbiennes et leurs séquelles, Rhumatisme, Goutte, Douleurs rhumatoïdes.

Laboratoires

ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS

PÉRISTALTINE CIBA

Glucoside pur du *Rhamnus Purshiana* (Cascara), agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cm³ 1/2).

Ne produit pas d'accoutumance.

Indic. — Constipation chronique, formes atoniques et spasmodiques. Atonie post-opératoire : Injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention).

Comprimés — Cachets — Ampoules

Doses. — Adultes : 1 à 2 cachets, 2 à 4 comprimés, 1 à 2 ampoules. — Enfants : 1/2 à 1 1/2 comprimé, 1 cachet. — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

La boîte de 20 cachets : 8 fr. 50

Le flacon de 20 comprimés : 7 fr. 50

La boîte de 5 ampoules : 18 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

PERLES TAPHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tannophosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

Prop. thérap. — Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, pré tuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 5 perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e)
124, avenue Rogier — BRUXELLES

PERSODINE LUMIÈRE

Constitution. — Préparation stable de persulfates alcalins purs, obtenue par procédés spéciaux dans les Laboratoires Lumière.

Propriétés. — Préparation eupeptique exerçant une stimulation générale sur les fonctions de la nutrition. Elle excite l'appétit, facilite la digestion et l'assimilation, et provoque aussi l'augmentation rapide de l'embonpoint et du poids.

Indications. — Inappétence (Arnozan). Anorexie (Huchard). Tuberculoses pulmonaires et osseuses (Hobbs). Rachitisme, Dyspepsie (Robin), excepté dans les formes hyperchlorhydriques.

Emploi et doses. — Donner 2 fois par jour, une demi-heure avant les principaux repas, dans un quart de verre d'eau pure:

Adultes: 3 comprimés de Persodine Lumière.

Enfants: 1 à 2 comprimés.

Produits spéciaux des
LABORATOIRES LUMIÈRE
9, Cours de la Liberté — LYON

PERUBORE (Comprimés)

Désinfectant rationnel des voies respiratoires
Inhalations — Gargarismes

Composition et forme. — Association d'essences balsamiques et de principes actifs de plantes, présentée sous forme de comprimés progressivement solubles.

Chaque comprimé contient

Baume du Pérou.....	0 03
Essences aromatiques.....	0 025
Borate de soude.....	0 6
Bicarbonate de soude.....	0 30

Propriétés thérapeutiques. — Pansement antiseptique et sédatif du revêtement intérieur des voies respiratoires.

Indications thérapeutiques. — Rhumes, angines, toux, affections de la gorge, enrouements, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, sinusites, coryza.

Posologie et mode d'emploi. — 1^o *Inhalation*: à faire matin, midi et soir, de 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur, respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant cinq minutes.

2^o *Gargarisme*: à faire plusieurs fois par jour, un comprimé pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

Pulvérisation: dissoudre 2 à 3 comprimés dans l'eau du pulvérisateur à vapeur et faire une pulvérisation de 5 minutes.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

A Bruxelles: LE MARINEL, pharm., 273, r. Victor Rauter.

PHAGOLYSINE

ENDOTINE EN ELIXIR COMPOSÉ

Médication Tonique Type
de toutes les **CONVALESCENCES**
et de tous les états
de **DÉFICIENCE ORGANIQUE**

Composition :

Par cuillerée à café.

Un demi-milligramme d'endotine,

Un quart de milligramme d'arsenic.

Cinq milligrammes de fer assimilable.

Indications :

Adénopathies, anémies, lymphatisme, affections pulmonaires chroniques, convalescence des maladies aiguës, notamment des affections contagieuses de l'enfance, états prébacillaires, tuberculoses curables sous toutes leurs formes.

Indication majeure :

Prévention de la bacillose pulmonaire et tonique général.

Contre-indications :

Période menstruelle, température élevée, formes congestives, hémoptysies, formes trop avancées des affections pulmonaires.

Pendant la prise :

Eviter les Acidités et les Crudités.

Doses Maxima Prophylactiques et Toniques :

Nourrissons : En principe, pour débiter, une goutte par jour et par mois d'âge, deux ensuite.

Age scolaire : Le matin et à la fin de l'après-midi une cuillerée à café.

Adolescents.

Grossesse.

Suite de couches.

Vieillards.

Adultes : Deux cuillerées à bouche par jour avant les repas.

} Deux cuillerées à dessert
par jour avant les repas.

Doses thérapeutiques.

Le médecin traitant débiter par de très faibles doses avant le repas ; ces quantités seront progressivement augmentées jusqu'au maxima des doses prophylactiques, suivant : réaction, température et signes cliniques présentés par le malade.

Laboratoires de la PHAGOLYSINE

14, rue Cantin — COURBEVOIE (Seine)

PHAGOSTHYL

Sérum neurotonique, Cytophile, Hémopoïétique, Reconstituant, phagocytaire. (*Pour adultes.*)

Formule :

Cacodylate de soude pur....	20 centigr.
— de magnésie pur.	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Soluté chloruré isotonique	5 cent. cubes

Indications :

Tuberculose, Pré-tuberculose, Anémies, Asthénie, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Paludisme, Dermatose, Tertiarisme, Etats cancéreux, Cachexies.

Emploi :

Une injection intra-musculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse. Absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 c. c.

Prix au public : 20 francs.

Laboratoires Biologiques André PARIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV°)

PHAGOSTHYL MANGANÉ

(exempt de Strychnine).

Formule :

Cacodylate de manganèse...	2 centigr.
— de soude.....	10 —
— de magnésie.....	8 —
— de calcium.....	10 —
Eau distillée.....	5 cent. cubes

Indications. — Carences, Dénutrition, Décalcification, Anémies, Asthénie, Convalescence des Maladies aiguës, Anergie grippale, Surmenage, Amaigrissement, Troubles endocriniens.

Emploi. — Une injection intra-musculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière, en prenant les précautions aseptiques d'usage.

L'injection des Phagosthyl est absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 c. c.

Prix au public : 20 francs.

Laboratoires Biologiques André PARIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV°)

PHAGURYL

Forme. — Dragées.

Composition. — Santalol β , Cédrol, Térébenthinol, Salicylate de Phényle, Lupuline, Formine.

Propriétés pharmacodynamiques :

Antiseptique des voies urinaires, Décongestif, Balsamique et Diurétique.

Indications. — Blennorrhagie, Rétrécissement, Urétrites, Cystites, Prostatites.

Mode d'emploi. — Six, huit à douze dragées par 24 heures.

Laboratoires A. BAILLY et C^{ie}

15 et 17, rue de Rome — PARIS (VIII^e)

PHARMETAN

Association d'urénile, d'iodure et de salicylate de soude en solution glucosée.

Ampoules de 10 c. c., endoveineuses, intramusculaires.

Indications :

Encéphalite léthargique, rhumatismes.
Échantillon sur demande.

Union Chimique Belge, S. A.

Division :

Produits Pharmaceutiques MEURICE
68, Rue Berkendael,
BRUXELLES (Belgique).

PHÉLAXINE

Utile dulci laxatif d'une innocuité absolue même chez les enfants.

Composition et forme. — Granulé, Effet certain, jamais de coliques.

Extr. de Belladone... 50 centigr.

Extr. de Cascara..... 15 gr.

Extr. de Bourdaine..... 15 —

Phénolphtaléine..... 25 —

Résine de scammonée..... 10 —

Vanilline..... 2 —

Sucre..... Q. S. pour 1 kilo.

Indications. — Constipation opiniâtre et habituelle.

Mode d'emploi. — Une demi cuillerée à café, jusqu'à deux cuillerées à café, suivant le tempérament, le soir au coucher.

Granulé à prendre pur ou dissous dans un peu d'eau.

Dose purgative : 2 à 3 cuillerées à café le soir et le lendemain matin, thé léger ou bouillon aux herbes.

Dans la constipation opiniâtre, prendre plusieurs fois de suite la dose laxative et se présenter à la selle aux mêmes heures.

J. MOULINES Pharmacien

VILLENEUVE-LA-GUYARD

(Yonne)

PHIAMINE

Tuberculose. — Asthénie.

Composition.

Aminos-acides en solution à 5 %.

Propriétés thérapeutiques.

La Phiamine ne contient aucun produit toxique. C'est un puissant modificateur du terrain. Son action s'exerce sur la sécrétion bronchique, la température, le poids.

Forme.

Ampoules — Boîtes de 12.

1 c. c. = *Phiamine A.*

2 c. c. = *Phiamine B.*

Injectons indolores ne donnant aucune réaction.

Indications thérapeutiques.

Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, Asthénies, Anémie, Surmenage.
Aucune contre-indication.

Mode d'emploi.

Injectons sous-cutanées ou intra-musculaires, tous les deux jours.

Paul COURSAGET

Pharmacien.

9, rue Porte-Côté,

BLOIS (Loir-et-Cher).

PHLÉBOGUIL

Thérapeutique nouvelle des *affections veineuses* (hémorroïdes, varices, troubles de la ménopause, etc...).

Composition. — 1° *Aesculus hippocastanum* et *hamamélis virginica* : toni-veineux puissants ; 2° *Gui de pommier* : hémostatique veineux remarquable. Hypotenseur artériel (dans la diathèse veineuse est souvent associée l'hypertension artérielle).

Vaso-dilatateur des capillaires et de ce fait, lutte énergiquement contre les troubles trophiques qui accompagnent l'état veineux (trophœdème, prurit, ulcère variqueux, etc.).

Posologie. — X à XXX gouttes (à dose progressive) par jour.

Expérimenté dans les hôpitaux parisiens.

Echantillons et littérature au Corps médical.

Laboratoires H. SALLE
4, rue Elzévir — PARIS (III^e)

PHOS

Régénérateur des centres nerveux.

Médication phosphorique.

Neurasthénie, Fatigue cérébrale,
Anémie, Rachitisme.

Expérimenté dans les hôpitaux

Echantillons et littérature sur demande.

Pharmacie Universelle
213, rue St-Honoré — PARIS

PHOSOFORME

Trois Formes. — Solution, Solution arsénée, Gouttes.

Principe actif. — Acide étheréthyl-orthophosphorique.

Thèse de Doctorat 1923.

Communicat. à la Société de Thérapeutique 1923.

Indic. thérap. — États dyspeptiques. — Neurasthénies. — Rhumatisme chronique. — Lithiases. — Convalescences : Grippe, etc. — Phosphaturie. — Asthénie. — Azotémies. — Nutrition des tuberculeux et prédisposés.

Mode d'emploi. — Solution et solution arsénée, dose moyenne : 2 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée dans un grand verre d'eau, de boisson, de cidre, de vin blanc ou rouge sucré, à prendre au cours des repas.

Gouttes : 100 gouttes midi et soir, prises comme ci-dessus.

Prix : 19 fr. le flacon ; 11 fr. le 1/2 flacon.

Durée : 12 à 15 jours.

Laboratoires D. DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

PHOSOL-QUINET

Formes. — Elixir phosphorique au Muscat et Granulé manganophosphaté. Fondant.

Composition. — *Elixir* : Acide phosphorique. — Sels de chaux et de soude — Kola. — Noix vomique. — Rathanhia. — Arrhénal. — Elixir généreux au Muscat. — *Granulé* : Fondant de quinquina et de kola associés à des sels de manganèse et de chaux et d'acide phosphorique de saveur agréable.

Indications. — Asthénies diverses. — Anémie. — Surmenage. — Suralimentation. — Amaigrissement. — Croissances. — Convalescences, grippale en particulier. — Bacillose. — Affaiblissement général.

Propriété. — Double action.

1^o Action reminéralisatrice.

2^o Puissante et rapide action stimulante sur la nutrition.

Très bien toléré par les estomacs les plus délicats et très agréable à prendre.

Posologie. — **ADULTES** : 2 cuillerées à soupe par jour.

ENFANTS : de 9 à 12 ans, 2 cuillerées à café par jour.

— 12 à 15 — 2 — dessert —

Cet élixir se prend au milieu du repas dilué dans un verre de boisson habituelle.

Prix de vente : 12 fr. (exempt d'impôt).

LABORATOIRE DU PHOSOL-QUINET
143, rue du Temple, Paris (III^e).

PHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Créosote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

Indications. — Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, pré-tuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les 2 jours ou 3 cc. tous les 3 jours), par cures de 21 jours suivies de 9 jours de repos; 2° Suppositoires dosés à 0 cc. 5: 2 par jour.

S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsenicale.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e)

124, avenue Rogier, BRUXELLES

PHOSPHARSOL

Composition. — Préparation phosphoarseniée organique combinée à la strychnine.

Indications thérapeutiques. — Reconstituant général dans l'anémie, la neurasthénie, l'impuissance, la tuberculose, etc.

Doses et mode d'emploi. — De 2 à 4 tablettes, en progressant, à chacun des deux principaux repas. *Ne pas dépasser ces doses.*

Prix en France : 12 fr. 50 la boîte.

Dépôt général pour le gros :

Laboratoires RICARDOU

Docteur en pharmacie.

46, rue Pierre-Charron, Paris (VIII^e).

Tél. : Élysées 76-48.

PHOSPHATES du D^r PINARD

Posphate de chaux du D^r Pinard

Dose par jour. — 2 à 4 cuillerées à potage (*adultes*) ; 2 à 4 cuillerées à dessert (*nourrissons et enfants*).

Phosphate de chaux insoluble, en molécules infinitésimales, dans un liquide isotonique, le seul obtenu en partant directement des os. 9 fr. 50 le flacon pour un traitement de 8 à 10 jours (*adultes*) ; 15 à 20 jours (*enfants*).

Prétuberculose, Grossesse, Fractures, Phosphaturie, Névrose.

Phosphate Pinard irradié.

Dose par jour. — 2 cuillerées à potage (*adultes*) ; 2 cuillerées à dessert (*enfants*) ; 2 cuillerées à café (*nourrissons et enfants jusqu'à 3 ans*).

Émulsion d'ergostérine irradiée (Vitamine D) dans le « Phosphate de chaux du D^r Pinard », 1 milligramme et demi de Vitamine D par cuillerée à potage, soit l'équivalent de 250 grammes d'huile de foie de morue.

15 francs le flacon pour un traitement de 10 jours (*adultes*) ; 20 jours (*enfants*).

Rachitisme, Troubles de croissance, Tuberculose, Allaitement, Fractures.

Phospharsyl.

Dose par jour. — 2 cuillerées à potage (*adultes* : 8 jours sur 12 ; 2 cuillerées à dessert (*enfants* au-dessus de 4 ans), 8 jours sur 12.

Phosphate Pinard méthylarsiné (3 centigr. de méthylarsinate de soude par cuillerée à potage).

10 francs le flacon pour un traitement de 15 jours (*adultes*), 25 jours (*enfants*).

Inappétence, Amaigrissement, Débilité générale, Cachexies.

Sous leurs trois formes les « Phosphates Pinard » se mélangent au lait sans le décomposer, avantage capital pour la thérapeutique infantile.

N.-B. — Il y aura toujours intérêt à prescrire le « Phosphate Pinard simple » en alternance soit avec le « Phosphate Pinard irradié », soit avec le Phospharsyl (8 jours l'un, 8 jours l'autre).

88, boulevard Saint-Denis — COURBEVOIE

PHOSPHATE VITAL DE JACQUEMAIRE

Glycérophosphates très purs qui ont servi aux expériences de M. le Professeur Albert Robin (Communication à l'Académie de Médecine du 24 avril 1894).

Formes et doses. — *Solution gazeuse*
(de chaux, de soude ou de fer) :
2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Granulé (de chaux, de soude, de fer ou composé) :
2 à 4 cuillerées à café par jour.

Injectable (de chaux, de soude ou de fer) :
1 à 2 injections par jour.

Propriétés. — Double action reconstituante :

1° *Action reminéralisatrice*, par l'apport du phosphore uni aux bases qui lui sont normalement associées dans l'organisme, sous la forme même — directement assimilable — adoptée par celui-ci ;

2° Puissante *action stimulante sur la nutrition*, par l'intermédiaire du système nerveux et de tout le système glandulaire.

Indications. — Contre toutes les formes de la faiblesse et de l'épuisement : Croissance. Débilité. Anémie. Neurasthénie. Tuberculose. Grossesse. Allaitement. Surmenage. Convalescence.

Nota. — Ce traitement reconstituant s'associe utilement et sans contre-indications à de nombreuses autres médications : opothérapique, sérothérapique iodurée, arsenicale, mercurielle, anti-paludique.

Établissements JACQUEMAIRE
VILLEFRANCHE (Rhône).

Soc. à resp. lim. au cap. de 2.000 000 de francs.

Adm^r-Gérant : **M. MIGUET**, D^r en Pharmacie.

PHOSPHOBROM

Composition. — Bromure, Phosphate, Citrate alcalins.

Forme. — Granulé fondant soluble de goût agréable.

Mode d'emploi. — Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour ; enfants 1 à 2 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Névropathie. — Fatigues nerveuses. — Neuroarthritisme. — Insomnies. — Palpitations des fausses cardiopathies. — Convulsions de l'enfance. — Dyspepsies nerveuses. — Aérophagie. Menstrues douloureuses. — Vomissements incoercibles de la grossesse.

Laboratoire SERINDAT

22, Rue Poncelet, Paris (XVII^e)

PHOSPHO-FLUOR BEYNET

Reconstituant général aux phosphates organiques fluorés contenant aussi de la magnésie, du fer, de la silice dans les proportions où on les trouve dans l'économie.

Forme. — Granulé, cachets, comprimés.

Indications. — Différentes tuberculoses, rachitisme, ostéites, caries dentaires, grossesse, allaitement, anémie, convalescence, surmenage nerveux, phosphaturie.

Dose et mode d'emploi. — Granulé : Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou dans un liquide.

Enfants de 3 à 10 ans, 1/2 dose,

Nourrissons : une pincée dans la bouillie.

Cachets ou comprimés : 2 à 4 par jour ; enfants 1/2 dose.

Chaque cuillerée à café de granulé de chaque cachet ou comprimé contient 0 gr. 50 de principe actif.

Prix actuel : 12 francs

Envoi d'échantillons sur demande adressée à la

Pharmacie SÉQUIN

165, rue St-Honoré — PARIS

PHOSPHOGAIACOL MARY

Nature. — A base de sels calcaïques assimilables, avec addition de thiocol, acide arsénieux et arseniate de strychnine.

Propriétés thérapeutiques. — Modification rapide des sécrétions bronchiques. Disparition de la toux, de l'expectoration, des engorgements ganglionnaires et du lymphatisme.

Forme. — S'emploie sous la forme de granulé très agréable au goût, à la dose de 2 à 3 cuillérées à café.

**Laboratoire
du reconstituant MARY**

32, rue de l'Ouest, Paris.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

PHOSPHOGÈNE FAVRICHON

Régime et alimentation de l'Enfance.

Composition.

Le Phosphogène se recommande par sa richesse en phosphates assimilables. C'est un aliment très sain, très reconstituant, très agréable au goût. Il ne contient ni cacao reconnu néfaste dans l'alimentation de l'enfance, ni produit exotique échauffant. Il ne constipe pas.

Indications.

Il convient à tous les enfants pendant leur croissance, mais particulièrement aux enfants débiles, à ceux dont la dentition est en retard, ou dont le système osseux ne se développe pas d'une façon normale.

Le Phosphogène rend de grands services aux jeunes mères pendant la grossesse et l'allaitement.

Il est également utile aux surmenés, aux convalescents dont il répare rapidement les forces en éléments phosphorés.

Dose.

Enfants : Une cuillerée à café par 100 gr. de lait, (à partir de 8 mois).

Adultes : Une cuillerée à soupe par 100 gr. de lait.

Le mode de préparation est indiqué sur chaque boîte.

Soupe de grains grillés. — Croissance.

Bouillon végétal. — Entérite avec diarrhée.

Littérature et échantillons sur demande.

FAVRICHON et VIGNON
Pharmacien-Chimiste.

à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).

PHOSPHOPINAL-JUIN

Phosphore colloïdal assimilable en combinaison organique.

Indications. — *Réminéralisateur* : Maladies de la nutrition, tuberculose, convalescence, anémie.

Fixateur des sels de chaux. — *Aliment de la cellule nerveuse* : Maladies du système nerveux, dépression mentale, neurasthénie, surmenage, fatigue cérébrale.

Pas de contre-indication.

Formes et doses moyennes.

Elixir : adultes : 2 cuillerées à café par jour.
enfants : 1 cuillerée à café par jour.

Capsules : adultes : 4 à 6 par jour.
enfants : 2 à 3 par jour.

Gouttes : adultes : 40 à 60 par jour.
enfants : 20 à 30 par jour.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Le PHOSPHOPINAL-JUIN se prend dans un peu d'eau ou de boisson froide.

Laboratoire du PHOSPHOPINAL-JUIN

10, impasse Milord.

Téléph. : Marcadet 37-98.

PHOSTANIOL

en toutes saisons et à tous les âges.

Composition. — Préparation tanno-iodique au phospholactate de chaux méthylarsiné (Parfum délicieux Ananas-fraise).

Pour tous les malades qui acceptent difficilement l'huile de foie de morue ou la digèrent mal.

Indications. — Anémie, croissances retardées, états ganglionnaires, inappétence, bronchite chronique, maladies scrofuleuses, impétigo et toutes dermatoses.

Posologie.

Chez l'enfant. — De 1/2 cuill. à café à 3 cuill. à dessert suivant l'âge.

Chez l'adulte. — 3 cuill. à soupe par jour.

Prix : 14 francs.

Laboratoires COMTOS

F. CHANAL, pharmacien de 1^{re} classe,
FESCHES LE CHATEL (Doubs)

PHOSTYL

Reconstituant puissant du neurone.

2 formes : Gouttes et Ampoules.

Composition : 1° Gouttes :

25 gouttes : S. Strychnine : 0,001; Méthyl. Na. : 0,02; S. Manganèse : 0,10; $\text{PO}^4 \text{H}^3$ off. : 0,25.

2° Ampoules :

1 ampoule : Vanadate Na. : 0,001; S. Strychnine : 0,002; Méthyl. Na. : 0,10; Glycéro. Na. : 0,10.

Indications :

Anémies, Convalescences, Neurasthénie, Dépressions, Surmenage. Reminéralisation rapide et durable par fixation de Ca, Na, K, Mg. Augmente et enrichit les hématies par fixation de fer.

Posologie :

Adultes : 25 gouttes midi et soir. De 12 à 18 ans : 15 gouttes; de 6 à 12 ans, 6 gouttes; à prendre avant les repas dans eau, vin, bière etc; ampoules : une chaque jour en injection intramusculaire.

Prix : Gouttes, 10 fr. — Ampoules, 12 fr.

Laboratoire PY

58, Boulevard Richard-Wallace — Puteaux (Seine)

PHUSASMINE

Traitement de l'Emphysème et de l'Asthme.

Forme :

Pilules de 0 gr. 30 (boîte de 40 pilules),

Composition :

Combinaison de NaI avec antidyspnéiques, antispasmodiques, Diurétiques et expectorants actifs (Lobelia, Drosera, Belladone, Polygala, Digitale, Extrait Suc Capsules Papaver Somniferum.

Indications :

Emphysème, Asthme, Oppressions, Catarrhe, Bronchite Chronique.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 pilules par jour, une demi-heure avant les repas, et 1 pilule la nuit si nécessaire.

Enfants : Ne jamais en donner aux enfants au-dessous de quinze ans.

E. ROBINEAU, pharmacien

80, Route des Petits Ponts — DRANCY (Seine)

PHYLACTONE BYLA

Cachets et Granulé

Peptone spéciale à polyvalence protidique :
viande, poisson, lait, œufs.

Dose et mode d'emploi. — Un cachet ou une dose, une heure avant les repas, dans un peu d'eau froide.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique.

Indications. — Migraines, Céphalées, Urticaires et tous états morbides relevant d'une intoxication alimentaire d'origine anaphylactique.

Phylactone magnésinée
(dragées-granulé)

Drainage des voies biliaires

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire, Paris.

R. C. Seine 71895.

PHYTINATE DE QUININE

CIBA

Phosphate organique de quinine contenant 57 % de quinine et 11 % de phosphore. Réunit l'action spécifique de la quinine à l'action tonique et reconstituante de la Phytine. Très bien toléré. Très soluble.

Indicat. — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Maladies infectieuses, Coqueluche, Diabète, etc.

Doses. — Les mêmes que pour le sulfate ou le chlorhydrate de quinine.

Le tube de 20 comprimés, 10 fr.

Le flacon de 50 comprimés, 20 fr.

On trouve aussi le Phytinate de quinine en vrac, et on peut le formuler comme les autres sels de quinine.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

PHYTINE CIBA

Produit naturel extrait des graines végétales, contenant 22 % de phosphore en combinaison organique avec la chaux et la magnésie. Le plus assimilable des médicaments phosphorés. Tonique et reconstituant. Stimulant des échanges nutritifs et de l'hématopoïèse.

Indicat. — Débilité constitutionnelle, Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie Anorexie. Convalescences difficiles. Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

Cachets — Comprimés — Granulé

Doses. — Adultes : 1 gr. par jour (2 cachets, 4 comprimés, 2 cuillerées à café de granulé).

Enfants : 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte.

Cachets et comprimés : la boîte 14 francs

Granulé : le flacon 16 francs

On peut aussi formuler la Phytine magistralement

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1. place Morand — LYON

PHYTOGÉNINE BYLA

Composition. — Complexe bio-minéral et opothérapique, intégralement assimilable : Phytosphosphine, fluorure de sodium, nucléinate de manganèse associés aux : thymus, rate, surrénales, parathyroïdes, foie, moelle osseuse et os épiphyseaire.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur intensif, modificateur puissant des échanges nutritifs.

Indications. — Troubles de la croissance, tuberculose, rachitisme, dépression nerveuse, convalescences, phosphaturies, anémies et tous états de déchéance organique.

Dose et mode d'emploi. — *Granulé* : 3 cuillerées à dessert par jour, à croquer. — *Cachets* : 2 à 4 par jour. — *Comprimés* : 4 à 8 par jour. (Enfants demi-dose.)

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS

R. C. Seine 71895

PILULES DE BLANCARD

A. Iodure de fer inaltérable, approuvées par l'Académie de Médecine de Paris, dosées à 5 cgr. d'iodure de fer.

Dose et mode d'emploi. — Adultes : 2 à 6 pilules par jour aux trois principaux repas.

Prop. théér. — Agent incomparable d'Hématopoïèse.

Indications. — Anémie, Scrofules, Lymphatisme, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée, Syphilis accidentelles ou constitutionnelles, suite de Gripes infectieuses, etc.

Prix du flacon : 14 fr. Le 1/2 flacon : 8 fr. 50.

BERTAUT-BLANCARD Frères
64, Rue de la Rochefoucauld — PARIS

PILULES du D^r DEBOUZY

Opothérapie biliaire.

Pilules de 0 gr. 30, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée.

Affections hépatiques. — Lithiase biliaire. — Insuffisance hépatique. — Entéro-colite.

Dose. — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Le flacon de 100 pilules : 12 fr.
— 50 — : 7 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e)

PILULES ÉPARVIER

(CASCARA ÉPARVIER)

Forme et Composition. — Pilules contenant toute la partie active de l'écorce du « *Rhamnus purshiana* », à l'exclusion de toute autre substance purgative.

Action physiologique. — Action sur le système nerveux sympathique, sur les fibres lisses de l'estomac et de l'intestin et sur les glandes dont les sécrétions concourent à l'acte de la digestion.

Indications. — Constipation en général. *Laxatif de choix* dans la grossesse et l'allaitement et chez les hémorroïdaires et les variqueux. Intoxications gastro-intestinales. Migraine. Atonie des voies digestives.

Avantages. — Conservation indéfinie. Solubilité rapide et complète. Selles normales, sans coliques, sans diarrhée. *Pas d'accoutumance.*

Dose. — Une pilule (rarement deux) le soir, au dernier repas. — Prix : 6 fr. 50

Echantillons sur demande à :

Laboratoire ÉPARVIER

26, Grande-Rue Saint-Clair — LYON

PILULES HÉLÉNIENNES NAUD

Composition. — A base d'Hélénine cristallisée. Protoxalate ferreux et quassine.

Indications. — D'après les essais cliniques les plus récents (thèse du Dr E. PARIZOT) l'Hélénine constitue le spécifique par excellence de la Leucorrhée, sans lésions anatomiques.

Mode d'emploi. — Sauf indication contraire du médecin, 4 à 8 pilules par jour aux repas.

Echantillon et littérature sur demande

Laboratoires LAOROIX

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

PILULES LÉMARY

Traitement mercuriel dissimulé

Dans le traitement de la syphilis acquise ou héréditaire, il y a très souvent un grand intérêt pour le médecin et même pour le malade à ce que ce dernier ignore quelle est la nature du médicament prescrit. soit que le médecin traitant, mal fixé encore sur le diagnostic veuille le fixer définitivement par un essai de médication spécifique, soit qu'il vienne à ne pas troubler la paix d'un ménage, d'une famille, par la révélation de la nature du mal, soit enfin qu'il s'attache pour une raison quelconque à une discrétion absolue. Il trouvera dans les **Pilules Lémary**, nom banal quelconque, mais **NOM DÉPOSÉ**, ce qu'il désire : le **traitement mercuriel dissimulé** ou **traitement discret**.

L'étiquette du flacon porte seulement cette inscription :

PILULES LÉMARY

(formule A ou formule B ou formule C)
fortifiantes, dépuratives, reconstituantes.

Le prospectus placé autour du flacon n'est pas plus explicite et ne peut donner lieu à aucune indication. Le médecin a donc ainsi toute sécurité.

Pour les pilules Dupuytren Codex, prescrire **PILULES LÉMARY**. formule A. — Dose habituelle, 1 à 3 pilules par jour, aux repas.

Pour les pilules Ricord Codex, prescrire **PILULES LÉMARY** formule B. — Dose habituelle, 2 par jour. 1 à chaque principal repas.

Pour les pilules au biiodure de mercure 0,005 millig. et iodure de potassium 0.25 centig., prescrire **PILULES LÉMARY** formule C. — Dose habituelle : 2 à 4 pilules par jour, selon le cas.

2 Pilules Lémary C = 1 cuill. à bouche de Sirop de Gibert.

Prix au public : 14 fr.

Littérature — Echantillons

Laboratoire du Dr H. PHILIPPE

14 rue Palais-Grillet — LYON

PILULES LITHURANÉES

du Docteur BOVEIL

Traitement du diabète.

Composition :

Uranium : Radio-actif, active la sécrétion des glandes.

Helonin : Décongestif du foie et du pancréas.

Benzoate de lithine : Dissolvant de l'acide urique, en excès chez les diabétiques.

Arseniate de soude : Tonique général. Stimulant des glandes endocrines.

Géranium Robertianum : Tonique et astringent.

Indications. — Le diabète sous toutes ses formes.

Doses et Mode d'emploi. — 6 pilules par jour ; 2 avant chaque repas avec un demi-verre d'eau de Vichy ou de Vals.

Traitement normal : 2 mois environ.

Échantillon et littérature sur demande.

Prix 12 fr. l'étui de 60 pillules.

M. PARIS, Pharmacien de 1^{re} classe

1, Rue Lassalle — LYON (La Boucle).

PILULES DE MOUSSETTE

à l'Aconitine cristallisée.

Propriétés thérapeutiques. — Action sédative et analgésique surtout remarquable dans la zone du trijumeau.

Forme. — Pilules dosées à 1/5^e de milligramme d'aconitine cristallisée et 5 centigrammes de quinium par pilule.

Doses. — 2 pilules le premier jour, une le matin et une le soir ; on prendra 3 pilules le second jour, en 3 prises espacées, si aucun soulagement ne s'est produit. On n'atteindra la dose de 4 pilules qu'exceptionnellement en surveillant la tolérance du malade (la sensation de fourmillement dans la langue, les lèvres et la face est un signe prémonitoire d'intolérance).

Après chaque ingestion de *Pilules de Moussette* prendre une infusion chaude. L'administration simultanée d'un purgatif énergique est conseillée par le Dr Fuchs.

Laboratoires CLIN — PARIS

PILULES

du Docteur SEJOURNET

antidiabétiques

Indications therap. — Traitement du DIABÈTE sans régime trop rigoureux, le guérit souvent, l'améliore toujours sans crainte d'inconvénients. Évite les complications.

Doses et Mode d'emploi. — Complexe sous forme de pilules dosées à 0 gr. 01 de Santonine, avec excipient balsamo-résineux.

Reconstituant de premier ordre, etc.

1 Pilule à chaque repas.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

PILULES PHILIPPE

Potassium — Sodium

Forme. — En pilules kératinisées ; elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*
Prière de prescrire :

Pilules Philippe à l'iodure de potassium { à 0,50
à 0,20
à 0,10

Sans indication spéciale, ce sont les **Pilules Philippe** à 0,20 centigr. d'iodure qui sont délivrées.

Pilules Philippe à l'iodure de sodium... à 0,20

Indications. — Artério-sclérose. Adénopathies, Tension artérielle, Goitre, Obésité, Syphilis, etc.

Dose. — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour en deux ou trois fois.

Littérature et Echantillons

Prix au public : 12 fr.

Laboratoire du Docteur PHILIPPE
14, rue du Palais-Grillet — LYON

PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine, $\text{N H} < \begin{smallmatrix} \text{CH}^+ \\ \text{CH}^- \end{smallmatrix} > \text{N H}$ alcalin organique du groupe des Pyridines. (Inscrit au Codex Français 1908.)

Granulé effervescent, dosé à 0,20 cgr. Pipérazine pure par cuillerée à café.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour comme préventif. 4 à 6 cuillerées à café par jour, dans les crises aiguës, dissoutes dans un verre d'eau à distance des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Dissout 92 % des composés de l'acide urique; réduit les déchets uratiques en stimulant l'activité hépatique; antiseptise les urines.

Indications. — Le plus actif des remèdes à prescrire dans les manifestations de l'Arthritisme et de l'Uricémie, Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Sciaticque, Artério-sclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, innocuité absolue, cœur, estomac, vaisseaux.

Laboratoires MIDY

4 rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e).

PITUILLOBINE BYLA

(en ampoules)

Composition. — Extrait épuré de lobes postérieurs d'hypophyses, *titré physiologiquement* sur utérus de cobaye. Cinq dosages en *unités internationales*: AMPOULES: A = 25 u. i. (1/8 lobe); B = 50 u. i. (1/4 lobe); C = 66 u. i. (1/3 lobe); D = 100 u. i. (1/2 lobe); E (intraveineuses) = 50 u. i. (1/4 lobe.)

Indications. — Inertie utérine, hémorragie de la délivrance, salpingites chroniques, métrites, etc. Hémoptysies des tuberculeux, défaillances du myocarde, constipation.

Mode d'emploi. — Injections hypodermiques ou intramusculaires, ou mieux, injections intraveineuses, après dilution dans du sérum physiologique. 1/2 à 2 cc. dans la journée, suivant avis du médecin.

Les Établissements BYLA,
26, avenue de l'Observatoire, Paris.

R. C. Seine 71895.

PLAGÉÏNE SOULAS

(Ampoules, pansements)

Ni toxique, ni caustique.

Traitement de toutes les plaies.

Composition. — Solution aqueuse de Goudron Végétal désodorisé et décoloré, Essence de cèdre, Essence de lavande.

Propriétés physiologiques. — Antiseptiques, résolutives, épidermisantes, analgésiques, désodorisantes.

Indications thérapeutiques. — Plaies de toutes natures : Plaies aseptiques, Plaies opératoires, Traumatismes, Brûlures à tous les degrés.

Ulcères variqueux, Plaies atones : Eschares sacrées, Ulcères gangréneux diabétiques, Néoplasmes ulcérés. Plaies septiques ou souillées, Abscs, Furoncles, Anthrax, Chirurgie conservatrice et esthétique.

Mode d'emploi. — Une ampoule dans un verre d'eau stérilisée ou bouillie. La solution obtenue s'emploie en pansements humides recouverts d'imperméable.. Échantillons et littérature sur demande.

Laboratoire SOULAS

119, rue de Sèvres — PARIS (VI^e)

PLURION COUTURIEUX

Description. — Complexe colloïdal d'arsenic, fer, manganèse et vanadium, isotonique, indolore, non toxique, en ampoules de 2 cc. (8 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le PLURION augmente l'activité des organes hématopoiétiques et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer), à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

Indications. — 2 à 4 ampoules par jour dans les ANÉMIES GRAVES. 1 ampoule par jour dans les anémies des CONVALESCENTS, PALUDEENS, SYPHILITIQUES, CANCEREUX. 1 ampoule tous les deux jours dans les cas plus bénins.

Laboratoires CH. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

PNEUMOGÉINE RENARD

Composition. — Iodure double de caféine et de théobromine (chaque cuillerée à café = 0,05 de caféine + 0,10 de théobromine combinés à l'iode et en solution dans un véhicule qui en masque le goût.

Propriétés thérapeutiques. — L'action de l'iode et de la caféine se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de la théobromine « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques » (Huchard).

La PNEUMOGÉINE par son action

régulatrice respiratoire assure aux poumons le maximum de rendement fonctionnel.

cardio-tonique, soutient le myocarde défaillant, abaisse la tension artérielle.

éliminatrice, débarrasse le sang des toxines et des déchets qui y sont accumulés, augmente la diurèse.

Indications. — I. Tous les états dyspnéiques : asthme, emphysème, bronchite chronique, dyspnées cardio-rénales, dyspnées névropathiques, etc.

II. Syndrome cardio-rénal.

Posologie. — Pendant les crises paroxystiques, 4 à 8 cuillerées à café par jour dans de l'eau bien sucrée. Entre les crises, 2 à 5 cuillerées.

S'il est possible, verser le matin la dose prescrite dans un verre d'eau sucrée qu'on absorbe par petites gorgées dans le courant de la journée.

Prix : 43 fr. 75

J. RENARD, docteur en Pharmacie

142, Avenue de Clichy

— PARIS —

PNEUMOSTYL DAGUIN

Forme. — Ampoules de 2 c. c. et ampoules de 6 c. c.

Composition. — Morrhuate d'éthyle, cholestérine, cinnamate et benzoate de benzyle, camphre goménol, eucalyptol, essences de labiées et huile d'olives neutre.

Mode d'emploi. — 1^o Pneumostyl hypodermique (2 c. c.). Boîte de 6 ampoules.

2^o Pneumostyl intratrachéal (6 c. c.). Boîte de 7 ampoules.

Indications. — Tuberculose, pré-tuberculose et toutes les affections des voies respiratoires.

Échantillons sur demande aux
Établissements DAGUIN
à SAINT-MAUR (Seine).

POLYFERMENTS LALEUF

Granulé

Composition. — *Ferments digestifs totaux*, associés aux citrate, sulfate, bicarbonate et phosphate de sodium.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Stimulant de la *sécrétion glandulaire*. Médicament de choix des *dyspepsies* de toutes nature et de toutes les affections du tube digestif et de ses annexes.

Mode d'emploi et doses. — Une ou deux cuillerées à café, délayées dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, à la fin des repas principaux ou au moment des troubles digestifs.

Laboratoires LALEUF
20, rue du Laos, PARIS (XV^e).

POLYMINÉRAL FORT

GRANULÉ

Composition. — Adrénaïne, fluorure de sodium, phosphate de manganèse, hydrate de magnésie, formiate de chaux, phosphate de potasse, lactate de chaux, glycérophosphate de chaux.

Indications. — Reminéralisateur pouvant être utilisé pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes de croissance, etc.

Formes et doses. — Existe sous formes de :

Polyminéral adultes (Adrénaïne 0,001 Fluorure de sodium 0,02 par mesure).

Doses : 2 à 6 mesures par jour.

Polyminéral enfants (Adrénaïne 0,0005, Fluorure de sodium 0,01 par mesure).

Doses : Bébés de 1 à 3 ans : 1/2 à 1 mesure : enfants de 3 à 8 ans : 2 à 3 mesures : enfants de 8 à 15 ans : 4 à 5 mesures.

Prix : 12 fr.

MICHEL DELALANDE

13, Rue Lacharrière — PARIS (II^e)

POLIOL CHURCHILL

(Hypophosphites composés de 0 gr. 20 par dose)

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Association du phosphore avec les bases de l'organisme dans leur proportion avec 1 milligr. de méthylarsinate de strychnine par dose. Reconstituant complètement assimilable. Reminéralisant de choix.

Indications. — Neurasthénie, surmenage intellectuel et physique, convalescence, déminéralisation, phosphaturie, affaiblissement.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 15 fr.

Laboratoire CHURCHILL

12, rue Castiglione — PARIS (I^{er})

POMMADE FORNET A L'INSULINE FORNET

Principe actif. — L'Insuline, qui vient d'être reconnu comme un médicament cytopoïétique remarquable, renforçant la trophicité générale de l'organisme (G. P. Boyer).

Indications. — Ulcères variqueux, Prurits, Psoriasis, Diabète léger, Rhumatisme.

Service Commercial et échantillons. — Laboratoires Thaidelmo, 23, rue du Caire, Paris (II^e).

Informations scientifiques. — Échantillons médicaux, littérature.

Institut de MICROBIOLOGIE
Sarrebruck.

POMMADES KLÉOS

Pommade Kléos faible.

Indications. — Feux, rougeurs, eczéma, éruptions dues à la dentition des bébés.

Composition. — Baume du Pérou, Talc, Oxyde de zinc, excipient Glycéro aqueux.

Forme. — Pommades renfermées en tubes étain.

Pommade Kléos forte.

Indications. — Maladies de peau anciennes, gourme, acnée, intertrigo.

Composition. — Essence naturelle, Baume du Pérou, Ichtyol. Acide Borique, soufre, Oxyde de zinc, excipient.

Forme. — Pommades renfermées en tubes étain. Ces pommades étudiées spécialement pour les enfants, sont toutes indiquées pour les épidermes particulièrement délicats.

Littérature et échantillons.

Laboratoires GUÉRET

2, rue des Cordeliers, Meung-sur-Loire (Loiret).

POMMADE LENOIR

à la Cinnamoléine

Traitement spécifique des *dartres chroniques* : s'adresse exclusivement à ces eczémas à forme sèche, desquamant sans cesse, souvent prurigineux dont la tenacité est si désespérante pour le malade et pour le médecin.

Dans le *Pityriasis* du cuir chevelu, en découpant la couche épaisse des pellicules qui enserrant et étouffent les cheveux, elle enrayer la calvitie et permet de recourir avec succès aux diverses lotions excitantes et microbicides qui, sans elle, ne pourraient atteindre le sebumbacille enfermé dans les glandes sébacées.

Employée aussi avec succès contre les *verruës plates séborrhéiques* du visage, dites *crasse des vieillards*, les *psoriasis*, le *sycosis*, la *teigne*, le *favus*.

Mode d'emploi. — Onction matin et soir sur la partie malade.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, Rue de Picpus — PARIS (XII^e)

POMMADE LOGEAI

Composition. — Dosée à 20 % d'oléosulfonate d'hamamélide, combinaison définie d'une huile sulfonée spéciale avec un extrait glycéринé total d'hamamélis préparé sans alcool.

Ni stovaine, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques.

Propriétés. — Atoxique, analgésique, décongestionnante et doucement vaso-constrictive. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite. Ne tache pas le linge d'une manière indélébile.

Indications. — Hémorroïdes externes. Prurits anal et vulvaire. Gerçures des seins.

Mode d'emploi. — Onction matin et soir après lavage avec le doigt enduit d'une forte couche de Pommade Logeais et jusqu'à sédation de la douleur (quelques minutes).

Nous joignons une canule à chaque tube, ce qui permet de traiter les hémorroïdes internes par la pommade Logeais.

Laboratoires Emile LOGEAI

24, Rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

POMMADE MIDY

(Adrénostyptique)

(Adrénaline, Stovaine, Anesthésine et Extrait de marrons d'Inde frais, stabilisé).

Mode d'emploi. — Une application matin et soir, et après les garde-robes.

Propriétés thérapeutiques. — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction-antisepsie.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes haut placées.

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e)

POMMADE AU NESTOSYL

La seule à la fois
Anesthésique et Atoxique.

Composition :

Association d'éthers de la série phtalique et de la série para-aminobenzoïque.

Aucun produit ni du tableau A ni du tableau B.

Excipients antiseptiques, décongestifs et cicatrisants, jamais irritants.

Indications :

Suppression infaillible et immédiate de la douleur ou démangeaison provoquée par les plaies, inflammations, irritations, éruptions, et, d'une façon générale par toute affection qui a modifié l'intégrité de la peau : Eczémas, Ulcères variqueux, Prurit vulvaire, Prurit anal, Prurit sénile, Prurit diabétique, Brûlures, Hémorroïdes, Engelles, Prurigo, Intertrigo, Escarres, Radio-dermites, Fractures compliquées, Pansements douloureux, Urticaire, Herpès, Zona, Gale, Furoncles, Impétigo, Anthrax, Coups de soleil, Piqûres, etc...

Posologie :

Aucune limite ni dans les doses, ni dans la durée du traitement.

Prix : 12 fr. 50

Autres présentations :

Solution huileuse au Nestosyl, comme médication d'urgence, en attendant l'emploi de la pommade, et pour l'usage sur certaines muqueuses.

Suppositoires au Nestosyl, pour les applications anales.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du NESTOSYL

P. BAUDE, pharmacien

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e)

Tél. : Ségur 96-46.

POMMADE NOELLINE

Composition. — Pommade à base d'acide benzoïque et de tanin incorporés à un excipient à la fois gras et alcool.

Action. — Traitement préventif et curatif des gerçures des seins, et des rougeurs des bēbēs.

Mode d'emploi :

a. Gerçure des seins. *A titre préventif* : en massage des mamelons dans les derniers mois de la grossesse.

A titre curatif : En pansements, après lavage antiseptique.

b. Rougeur des bēbēs. Application locale recouverte de poudre Noëlline.

Prix : Le tube 5 fr.

Laboratoire de la NOELLINE

BREST

POMMADE RADINE

Brûlures — Engelures — Crevasses du sein

Pommade à base de principes extractifs de plantes aromatiques, antiseptiques, analgésiques et cicatrisantes (mélilot, romarin thym, sauge, millepertuis, niaouli, etc.).

Mode d'emploi :

Brûlures : applications sur du lin ou de la toile après ouverture des phlyctènes aux ciseaux.

Crevasses du sein : applications sur le mamelon entre les tētees. Lavages avant et après la tētee à l'alcool glycérine.

Cicatrisation rapide et nette sans suppuration, suppression de la douleur.

Échantillonnage large pour hôpitaux, dispensaires, usines.

Tube p. m. : 5 fr. (25 gr.), tube g. m. : 10 fr. (100 gr.).

Laboratoires DUCLOS

EVREUX (Eure).

POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudre et cigarettes anti-asthmiques

Composition. — A base de nitre et des solanées les mieux triées (récoltes de 1^{er} choix.)

Indic. therap. et formes. — N° 2 (la plus faible): Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1: Asthme nerveux, Asthme des foins, fins de coqueluche, etc.

Mode d'emploi. — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise; la prévenir par une fumigation anticipée, et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

Prix de vente: 8 fr. (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

Laborat. ESCOUFLAIRE, à Baisieux (Nord).
(Echantil. grat. sur demande de MM. les Docteurs).

POUDRE GYNULE

Produit gynécologique de choix.

Composition. — Tanin à l'éther, Borate de soude, Acide borique et Bicarbonate de soude.

Présenté sous forme de sachets (20 par boîte) à l'avantage de se dissoudre immédiatement contrairement à la plupart des comprimés.

Propriétés. — Décongestif puissant, modifie rapidement les sécrétions, tonifie la muqueuse et assure l'asepsie de la cavité vaginale. Ni toxique, ni caustique, réalise une isotonie parfaite. Prix: 6 fr. la boîte de 20 sachets.

Emploi. — Un sachet par injection de 1 ou 2 litres suivant les cas.

Echantillons et littérature sur demande.

Aux Laboratoires Ch. DEHAY,
58, rue Saint-Géry, Arras.

POUDRE LAXATIVE DE VICHY

du docteur Léonce Souligoux.

Composée de principes végétaux et aromatiques et d'un soufre spécialement traité, la poudre laxative de Vichy s'emploie à la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, le soir en se couchant. Très agréable, facile à prendre. De résultat constant.

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

1, Quai Aulagnier
ASNIÈRES (Seine).

POUDRE NOELLINE

Composition :

Poudre à base de dermatol.

Indications :

Rougeurs des bébés.

Mode d'emploi :

En applications locales, tant à titre préventif qu'à titre curatif.

Prix : La boîte fer : 5 fr.

La boîte aluminium décorée : 15 fr.

Laboratoire de la NOELLINE
BREST

POUDRE PATERSON

Composition :

Sous-nitrate de bismuth pur, *léger* (ancien Codex). Magnésie calcinée. Sucre pur.

Propriétés :

Le meilleur saturant neutre. Ne constipe jamais. *Agit à faibles doses. Le seul saturant gastrique neutre présent en pastilles*, obligeant à la salivation. Active inoffensive. Très supérieure au carbonate de bismuth et aux produits de substitution (kaolin).

Indications :

Poudre en paquets : Pansement gastrique, Saturation. Gastropathies douloureuses. Dyspepsies. Hyperchlorhydrie. Acidités anormales. Ulcus gastrique et duodénal. Entérites et infections intestinales. Dyspepsies gravidiques. Troubles digestifs du nourrisson.

Pastilles : Traitement d'entretien. Troubles digestifs légers ou chroniques. Digestions pénibles.

Formes et posologie :

Paquets : (2 gr.) 2 à 5 par jour, et plus, au moment des crises douloureuses.

Pastilles : 15 à 20 jour. Laisser fondre en bouche.

Laboratoires des Produits PATERSON

G. et M. Armingeat

46, rue de Saintonge — PARIS (III^e)

POUDRE ET POMMADE D'INSULINE PHYLOZE

Forme et composition. — Insuline purifiée de fabrication française en poudre et en pommade.

Mode d'action. — Excite la vitalité cellulaire et active la cicatrisation des plaies.

Indication. — Ulcères variqueux, plaies atones fermeture rapide de la plaie.

Mode d'emploi. — Déterger la plaie par un pansement humide, la saupoudrer de Poudre d'Insuline Phyloze ou appliquer la Pommade d'Insuline Phyloze et recouvrir d'une gaze.

Appliquer la Poudre ou la Pommade d'Insuline Phyloze une fois par jour.

Dans les cas graves et après cicatrisation de l'ulcère, pour parachever la guérison, recourir aux injections d'Endopancrine. (Voir ce mot.)

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE
GÉNÉRALE

48, rue de la Procession, Paris (XV^e).

POUDRE SATINE

Composition :

Stéarates.....	12 gr.
Acide borique.....	5 —
Talc.....	3 —
Tanin.....	0,40

Propriétés thérapeutiques. — Irritations de la peau ; rougeurs des nouveau-nés. Ne se laisse pénétrer par aucun liquide.

Indications. — Toilette des bébés. Irritations cutanées, escharres des malades alités.

Laboratoires NOGUÈS

11, rue Joseph-Bara, PARIS.

PRÉVALIDINE

Forme. — Pommade résorbable en tube gradué.

Composition :

- 1° Camphre en huiles essentielles aromatiques.
- 2° Baume du Pérou. Acide cinamique.
- 3° Extrait opothérapique de peau animale.

Indications. — Grippe, Bronchite, Bronchopneumonie, Emphyseme, Coqueluche, Tuberculose, etc.

Mode d'emploi. — Une onction par jour, le premier jour le dos, le second jour la poitrine, troisième jour l'un des bras, quatrième jour l'autre bras, le cinquième les cuisses.

Présentation. — Tube gradué par onction.
Prix : 9 fr.

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Dépôt à PARIS : 49, rue de Paradis

Tél. : Provence 30-32

PRÉVENTYL

Nécessaire de poche de prophylaxie
antivénérienne

Le premier créé en France sous le contrôle et d'après les conseils des Maîtres de la vénéréologie française.

Composition. — En trois tubes d'étain de couleur différente :

1° Pommade de Metchnikoff (calomel 33%) ;

2° Gelée au protargol à 3% ;

3° Emulsion de savon ;

4° Une cartouche de ouate hydrophile.

Présentation. — Grand modèle (10 fr.), pour 8 à 10 applications.

Petit modèle (5 fr.), aspect et format d'une boîte d'allumettes, pour 3 applications.

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires MARCHAND et LEROY

40, Rue d'Enghien — PARIS (X^e)

Téléphone Provence 37-13

PREZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition. — Peptone de poisson, peptone de viande et extrait sec de quinquina.

Mode d'action. — Prémunit l'organisme contre les accidents de la sensibilisation (Théorie de Widal). Méthode dont les détails ont été réglés par Pagniez et Pasteur Vallery-Radot.

Posologie. — Une dragée une demi-heure avant chaque repas.

Laboratoires LEBOIME

19, rue Franklin — PARIS (XVI^e)

PRISES DELQUÉ

Composition. — Poudre à base de sels alcalins chimiquement purs.

Action. — Neutralisante, sédative eupéptique.

Indications. — Hyperchlorhydrie gastrites, Gastro-entérites. Fermentations intestinales.

Mode d'emploi. — Une prise à faire dissoudre dans un verre à bordeaux d'eau bouillie ou faiblement minéralisée. A renouveler trois ou 4 fois par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires J. M. RICARDOU

Docteur en pharmacie.

46, Rue Pierre-Charron — PARIS

PRODUITS PENNÈS

Sel de J. A. Pennès

Hygiénique, reconstituant, stimulant.
Remplace les bains alcalins et ferrugineux et surtout les bains de mer.

Vinaigre de J. A. Pennès

Antiseptique, hygiénique.
Rapport favorable de l'Académie de médecine.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque, Paris (X^e).

PROPIDEX

Pommade à base de Propidon.

Vaccination cutanée des infections superficielles.

Indications :

Plaies, Brûlures, Furoncles,
Ulcérations, Engelures.

Mode d'emploi :

Applications deux fois par jour ;
recouvrir d'un tissu souple stérilisé.

" SPÉCIA "

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

PROPIDON

Bouillon stock-vaccin du professeur Pierre Delbet.
L'association de cultures atténuées à la fois par la chaleur et par le vieillissement, de streptocoques, de staphylocoques et de B. pyocyaniques, confère à ce vaccin une action très efficace dans les affections à pyogènes.

Indications :

Straphylococcies fébriles, Anthrax, Phlegmons, Lymphangites, Érysipèles, Affections gynécologiques.

Posologie et mode d'emploi :

Injection sous-cutanée ou intramusculaire du contenu d'une ampoule (4 cc). A renouveler, s'il est nécessaire après 24 ou 36 heures, jusqu'à trois ampoules.

L'injection donne lieu à une forte réaction fébrile, d'ailleurs bien supportée.

" SPÉCIA "

Société parisienne d'Expansion chimique
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

PROTAMINOL BYLA

(en ampoules de 30 cc.).

Composition. — *Sérum de cheval* débarrassé de ses protéines de choc, auquel on a ajouté des produits d'*hydrolyse acide* de la caséine du lait, particulièrement riche en *acides aminés* et en bases hexoniques.

Propriétés thérapeutiques. — Le PROTAMINOL BYLA offre la ressource d'un véritable mode d'alimentation parentérale, aussi bien par l'eau et les sels qu'il renferme que par ses éléments dissous ou colloïdaux qui assurent l'anabolisme cellulaire. Réhydratant des tissus (aucun phénomène de choc.)

Indications. — Traitement des diarrhées infantiles.

Mode d'emploi. — Injections sous-cutanées, ou même, en cas d'urgence, par voie intrapéritonéale, à la dose de 30 à 60 cc. en deux fois dans la journée.

Les ETABLISSEMENTS BYLA,

26, avenue de l'Observatoire, Paris.

R. C. Seine 71895.

PROTIODYNE

Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

Composition. — Sélection de noyaux aminés de Peptones et d'Albumoses iodées, et chlorure de calcium.

Formes. — Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 25 de principes actifs (*Enfants*).

Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 50 de principes actifs (*Adultes*).

Injections hypodermiques indolores.

Jamais de choc, ni de réactions anaphylactiques.

Propriétés. — Par ses effets préventifs et curatifs des infections fébriles et des intoxications, la **Protiodyne** est une arme puissante toujours à la disposition du médecin devant une infection dont il n'a pas le sérum spécifique.

Indications. — Infections fébriles en général. Grippe, Pneumonies, Fièvres typhoïdes, **puerpérales**, etc. Dermatoses par auto-intoxication, Urticaires, Furunculose ; désensibilisation de tout syndrome anaphylactique : Asthme vrai, Asthme des foins, Migraines, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 50 à la première injection.

Enfants : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 25 à la première injection.

A renouveler de 24 en 24 heures ou de 48 en 48 heures, si la sédation des accidents infectieux n'a pas été obtenue ou ne s'est pas maintenue.

Chez le jeune enfant, réduire la dose suivant l'âge et le poids.

La Protiodyne ne doit être employée que sous le contrôle du médecin.

Communications du professeur DUBARD de Dijon : Journal de Médecine et de Chirurgie pratique, 1919 ; La Clinique et le Scalpel, 1923.

Littérature et Echantillons sur demande au

Laboratoire général d'Études Biologiques

S. A., 29, place Bossuet — DIJON

PROTIODYNE DRAGÉES

Composition. — Albumoses et Peptones iodées. Sulfate de magnésie.

Propriété. — Désensibilisation de tout syndrome anaphylactique.

Indications. — Manifestations anaphylactiques, en général : migraines, urticaires, prurits, eczémas, entérocolites, asthmes, troubles digestifs par assimilation défectueuse : rougeurs de la face, somnolences, flatulences, pesanteurs après les repas, etc., etc.

Forme. — Comprimés dragéifiés, à 0 gr. 40 de principes actifs.

Doses et mode d'emploi. — Une heure avant chacun des trois repas. *Adultes* : deux dragées.

Enfants : une dragée. La dragée ne doit être ni croquée, ni sucée, mais avalée avec un peu d'eau.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire général d'Études Biologiques.

S.A., 29, place Bossuet, Dijon.

PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergétique.

Anémie - Chlorose - Débilité - Convalescence

Vingt gouttes de Prosthénase contiennent 1 centig. de fer et 5 millig. de manganèse.

5 à 20 gouttes pour les enfants

10 à 50 gouttes pour les adultes.

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, Rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e)

PROVEINASE MIDY

(Comprimés)

Composition :

1° Extraits secs (desséchés dans le vide) des plantes stabilisées : Cupressus, Viburnum, Maron d'Inde, Hamamélis et Genêt.

2° Poudres d'organes à sécrétion interne : Thyroïde, Surrénale et Hypophyse.

Propriétés thérapeutiques. — Synergie régulatrice de l'insuffisance veineuse. Associe les effets organo-thérapeutiques des glandes endocrines et les vertus vaso-constrictrices de plantes soigneusement sélectionnées.

Indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles congestifs de la Ménopause et de la Puberté.

Mode d'emploi.

États chroniques : 2 à 3 comprimés par jour.

États aigus : 3 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS

PROXYTOL

Association des Proxylases des organes de la digestion (Foie, Estomac, Intestin, Pancréas).
Spécifique des affections gastro-intestinales.

Mode d'action. — Assure le fonctionnement cellulaire normal par l'apport des ferments de synthèse; active la nutrition de l'organe, rétablit les sécrétions.

Indications. — 1° Les dyspepsies; 2° Les entérites; 3° L'insuffisance hépatique; 4° Gastro-entérites des nourrissons.

Forme. — Boîte de 36 comprimés.

Doses. — *Adultes.* Croquer de 4 à 6 comprimés par jour le matin à jeun ou loin des repas.

Enfants : Demi-doses.

Nourrissons : 2 à 4 comprimés dissous dans l'eau, à prendre 3/4 d'heure avant les tétées.

PROXYTASES

Diastases tissulaires pures spécifiques à chaque organe.

Catalyseurs biologiques réglant l'assimilation intime, permettant à l'organe déficient de restaurer ses lésions et de recouvrer son activité physiologique.

Action rigoureusement spécifique.

Indications. — Les insuffisances fonctionnelles de chaque organe.

Prescrire. — Proxylase ovaire, Proxylase rein, Proxylase thyroïde, etc.

Formes. — Boîte de 36 comprimés pour tous les organes.

Doses. — *Adultes* : Croquer 4 à 6 comprimés par jour, le matin à jeun ou loin des repas.

Enfants : Demi-doses.

Laboratoire des PROXYTASES

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e)

PSOTHANOL

Composé arséno-bismuthique soluble.

Indications thérapeutiques. — Psoriasis et toutes affections psoriasiformes.

Présentation. — Ampoules de 3 cc. 1/2 avec anesthésique pour injections intramusculaires.

Ampoules de 3 cc. 1/2 sans anesthésique pour injections intraveineuses.

Posologie. — Une ampoule tous les deux jours en commençant par 1/4 d'ampoule au maximum, et en augmentant la dose suivant la tolérance du malade. Série de 20 injections.

Boîte de 10 ampoules 30 fr.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e)

PULMOCARDINE

Asthme et maladies cardio-respiratoires.

Composition : (comprimés dragéifiés).

Grindelia : Expectorant, diminue la tachycardie et la dyspnée.

Lobélia : détend la contracture et supprime l'angoisse.

Quebraco : Augmente l'amplitude des mouvements respiratoires.

Iodure de Caféine : fluidifie les sécrétions bronchiques, régularise le cœur et restitue l'énergie à la systole.

Indications. — Asthme, Emphysème, Bronchite chronique, Angine de poitrine, maladies du cœur et des vaisseaux, etc.

Doses. — 2 dragées au début des 2 repas.

Prix : 44 francs.

Laboratoires J. PERROCHON

57, Rue Origet — TOURS

PULMOGYL

Composition. — Comprimés dragéifiés constitués par l'association de l'Aconit, la Codéine, le Benzoate de soude et le Thiocol.

Chaque comprimé contient :

Poudre d'Aconit.....	0,02
Codéine.....	0,005
Benzoate de soude.....	0,15
Thiocol.....	0,30
Sucre et gomme, qs. pr.....	0,75

Indications — Spécifique des toux spasmodiques, Asthme, Emphysème, Grippe et toutes affections des voies respiratoires.

Doses. — *Adultes* : 5 comprimés par jour, 7 à 8 dans les toux rebelles.

Enfants : A partir de 8 à 10 ans : 3 à 5 par 24 heures.

Prix : 10 francs.

Laboratoire J. DELORME

33, rue Lauriston — PARIS (XVI^e)

Téléphone : Passy 14-86

(R. C. Seine 4358)

PULMOSERUM

Forme. — Solution.

Composition. — Phospho-Gaïcolate de Chaux, de Soude et de Codéine.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antibacillaire. — Réminéralisant. — Histo-génique. — Hyperphagocytaire. — Anticon-somptif.

Indications. — Grippe. — Toux catarrhale. Laryngites. — Bronchites. — Congestions pulmonaires. — Séquelles de Coqueluche et de Rougeole. — Bacillose.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe, matin et soir, au milieu des repas, dans un peu d'eau.

Laboratoires A. BAILLY et C^{ie}

15 et 17, rue de Rome — PARIS (8^e)

PULSAMONE

Phytothérapie antispasmodique.

Médication exclusivement végétale *associant pour la première fois* la **Pulsatille** (*Anémone Pulsatilla*), excellent modérateur de l'excitabilité nerveuse et douloureuse, à trois autres plantes également douées de propriétés antinerveuses : **gui**, **saule blanc** (châtons) et **passiflore**. C'est donc le prototype de l'*anti-spasmodique végétal, sans stupéfiant, ni toxique* dont l'action n'est jamais suivie de dépression.

La **Pulsamone** ne comporte pas de contre-indication et n'offre aucun danger d'accoutumance. C'est pourquoi elle peut être conseillée aux moins résistants : vieillards, enfants, etc., ainsi qu'aux malades particulièrement susceptibles : cardiaques, hépatiques, etc.

Indications. — *Véritable médication équilibrante du système nerveux*, la **Pulsamone** sera prescrite dans : Neurasthénie, Irritabilité, Angoisse, Anxiété, Psychonévroses, Insomnies, Troubles nerveux de la menstruation et de la ménopause, Troubles cardiaques d'origine nerveuse, Insomnie des biliaires et Excitation nerveuse des hépatiques, etc.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café, dans un peu d'eau, avant chaque repas; et, dans les *insomnies*, deux à trois cuillerées à café, dans une infusion chaude, au coucher.

Laboratoires de la PULSAMONE

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e)

PULVÉOL

(Poudre et pastilles)

réalisant l'antisepsie du carrefour aéro-digestif. Antiseptique volatil, dénué de causticité, à base de menthol, eucalyptol, terpinol, essences volatiles, acide borique et borate de soude.

Indications. — *Oto-rhino-laryngologie et stomatologie courantes.* — Sinusites, rhinites, pharyngites, trachéites affections du cavum, angines, stomatites, gingivites. Calme toutes les dysphagies.

Affections respiratoires. — Trachéo-bronchites, gripes à forme respiratoire, asthme, coqueluche.

Hygiène du nez, de la gorge et de la bouche dans les pyrexies; dentifrice en nature sur la brosse à dents dans les traitements spécifiques mercuriels ou bismuthiques.

Usage hygiénique : tous professionnels de la voix.

Mode d'emploi. — *Poudre* : inhalation avec une cuiller à café de poudre dissoute dans un bol d'eau bouillante. Les éléments volatils disparus il reste une excellente solution tiède, antiseptique et isotonique pour gargarismes, bains de gorge ou lavages de bouche.

Pastilles. — 8 à 10 par jour.

Laboratoire du PULVÉOL

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

Téléph. : Marcadet 37-98.

PURGANOL DAGUIN

(C²⁰H²⁴O⁴)

Forme. — Pastilles laxatives, à la menthe, dosées chacune à 0,20 de médicament actif. Bien préférable à la forme comprimés qui se désagrègent mal.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1/2 à une pastille le soir, au coucher.

Enfants : 1/4 à 1/2 selon l'âge. Sucrer lentement et boire ensuite.

Ne donne pas de coliques, ne congestionne pas les organes du petit bassin, ce qui permet aux femmes enceintes d'en faire usage, Laxatif préféré des nourrices.

*Échantillons sur demande aux
établissements DAGUIN
à SAINT-MAUR (Seine)*

PYOFORMINE

Ampoules de 2 c. c.

Pus aseptique obtenu par ponction de l'abcès térébenthiné du cheval en suspension dans une solution physiologique d'*Uroformine Gobey*.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 amp. p. jour en injection sous cutanée ou intramusculaire.

Propriétés therap. — Médication héroïque des infections, toutes les pyrexies, toutes les septicémies. Remplace l'abcès de fixation.

Indications. — Méningites aiguës et encéphalites, pneumonies et complications, typhoïde, paratyphoïde et infections colibacillaires, pyélites, pyélonéphrites, cholécystites aiguës, états puerpéraux, péritonites aiguës, états septicémiques, grippe et complications.

Laboratoires GOBEY
21, rue d'Aumale — Paris.

PYRATONE

(Guérison rapide de la Coqueluche
et du Rhume des foins)

Composé de métaux colloïdaux, possède des propriétés anti-microbiennes et électro-chimiques puissantes.

Forme. — Comprimés.

Prop. therap. et indications. — Coqueluche et toutes les séquelles bronchiques et pulmonaires de nature infectieuse, convalescences. Anémies, guérison radicale du *Rhume des Foins*.

Mode d'emploi. — Aux enfants de tout âge, un comprimé de deux heures en deux heures dissous dans un peu d'eau ordinaire ou sucrée. La guérison commence généralement le 2^e jour du traitement. Dans les infections graves, fièvres violentes, on peut augmenter le nombre des doses, sauf en cas d'entérite.

Littérature et échantillons sur demande.

Prix : 15 fr. : Le tube de 45 doses.

Pharmacie St MICHEL

A. Ferré, 71, boul. St.-Michel — PARIS (V°)
Télé. : Gobelins 14-26 — Cte Ch. postal : PARIS 290.10

PYRÉLAÏNE COLLAS

Composition. — Fixation à chaud du soufre sur acides gras non saturés d'une huile végétale.

Chaque cc. contient 0 gr. 04 de soufre organique *composé* non oxydé doué de son pouvoir catalytique. Excipient balsamique.

Propriétés. — Permet d'administrer du soufre actif par voie digestive. Contrairement aux formes habituelles du soufre « per os », la Pyrélaine n'est pas oxydée dans l'estomac et possède une action nette.

Indications. — Toutes celles du soufre. *Carences sulfurées*. Résulfuration thérapeutique. Toutes affections tributaires de la Diathèse lithiasique, notamment *Lithiase biliaire*, Cholécytite, Rhumatisme chronique, Goutte, Dermopathies, Parasites intestinaux.

Pas de contre-indications.

Forme et posologie. — Capsules gélatineuses dosées à 0 gr. 25. (Soufre : 0 gr. 01 par capsule). Affections chroniques et doses d'entretien : 2 à 3 capsules par jour avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Crises aiguës : 3 à 6 capsules par jour.

Enfants : moitié de ces doses.

Le tube de 50 capsules : Prix au public : 10 fr.

Société des Produits COLLAS et BOUDAULT
MOUGNAUD et C^{ie} pharmaciens

15, 17, 19, rue Augustin-Thierry — PARIS (XIX^e)
Tél. : Nord 28-65

PYRÉTHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide; Gouttes; Ampoules.

Composition. — Diméthylaminopyrazoline phenazone carbomate d'éthyle (uréthane.)

Emploi et doses. — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Vals ou eau ordinaire ou sucrée, 60 cc. avec 0,30-0,50 de bicarbonate.

Gouttes. Adultes: 25-50 à répéter à intervalles de 20'. Chercher la dose-levier et passer aux doses massives 80-100, si nécessaire. Maximum: 300 *pro die*.

Enfants: 1 à 2 gouttes par année d'âge.

Indications antithermiques: Donner à doses réfractées.

Ampoules A — 2 cc. antithermiques: 1 à 2 ampoules, avec ou sans médication intercalaire.

Ampoules B — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabes, névrites, sciatiques: 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum: 200 gouttes.

Injectons intramusculaires.

Indications. — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaires (25-50 à répéter), chercher la dose-levier; Dysménorrhées (25-50); Arthrites, Lumbagos, Sciatiques, Radiculites, Polynévrites, Syringomyélie (doses variables); Algies syphilitiques, Tabes, Cancer (60-80-100 gouttes, permettent de garder en main médicale l'emploi de la morphine de la diminuer ou de l'espacer); Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (25-50, 2 fois par jour); phénomènes douloureux inflammatoires et traumatiques. (Post opératoire en petite chirurgie.) — Échantillons et Littérature.

Dépôt — Paris: **Pharmacie P. LOISEAU**

7, Rue du Rocher — PARIS

Laboratoires CAMUSET

18, Rue Ernest-Rousselle — PARIS

PYROLÉOL EDET

Composition. — Principes actifs de plantes non toxiques à saturation (mélilot, mille-pertuis, eucalyptus, etc.), solution huileuse.

Propriétés. — Neutre et aseptique, non toxique, analgésique et antiseptique, stimulant, tonique et cicatrisant.

Indications. — Brûlures, plaies atones, dermites, radiodermites; ulcères variqueux, engelures, eschares, eczéma, zona.

Présentation. — En flacons : 1/4, 1/2, entier.

Mode d'emploi. — Laver à l'eau bouillie et à l'eau oxygénée. Appliquer compresses stérilisées imbibées de *Pyroléol*. Renouveler après 24 ou 48 heures.

Résultats. — Disparition de la douleur, suppression de suppuration fétide. Production rapide de cicatrices vascularisées lisses, souples, non adhérentes.

Pharmacie Centrale de France

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV^e).

QUASSIA-KINA RABOT

aux écorces d'oranges amères

Prop. thérap. — Reconstituant énergétique. Le meilleur stimulant de l'appétit. Très bien toléré par les estomacs les plus délicats.

Indicat. — Asthénie, Vertiges stomacaux, Inappétence, Débilité, Convalescences.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi.

VIN : Un verre à madère aux 2 principaux repas. Véhicule idéal de la médication iodée. même intensive. — Prix : 25 fr.

DRAGÉES : Recommandé aux malades, auxquels le vin est contre-indiqué, *Adultes* : 3 à 6 par jour, 1/4 d'heure avant les repas. *Enfants* : 1/2 dose. — Prix : 15 fr.

GRANULÉ : Convient particulièrement aux enfants, *Adultes* : 1 cuillerée à café aux repas. *Enfants* : 1/2 dose. — Prix : 12 fr. 50

les Établissements **C. DAVID-RABOT**

Dr en Ph^{ie}. — Ph^{ica} Ex. Int^{es} des Hôp. de Paris
49, rue de Bitché. — COURBEVOIE (Seine)

QUASSINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 milligrammes.

Quassine Houdé

Principe actif *cristallisé* du quassia amara.

Propriétés thérapeutiques :

Amer, excitant énergétique de l'appétit, prescrit dans dyspepsies atoniques, embarras gastrique, contre les borborygmes, l'inappétence, etc.

Doses et mode d'emploi :

4 à 6 granules par jour, pris cinq ou dix minutes avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS

QUERGÉMOL

Forme. — Dragées.

Composition. — Cérébrine, splénine, bromhydrate de Quinine, Méthylarsinate disodique, Nucléinate de Manganèse.

Propriétés pharmacodynamiques. — Reconstituant thérapeutique du cerveau et de la rate, Antioxygène, Antihémolytique, Régénérateur des globules sanguins, antiasthénique.

Indications. — Paludisme chronique. — Anémie palustre. — Fièvres intermittentes. — Asthénie post-grippale.

Mode d'emploi. — Deux à six dragées par jour, au début des repas.

Laboratoires A. BAILLY et C^{ie}
15 et 17, rue de Rome — PARIS (8^e)

QUINA BARON

à l'extrait sec complet de quina

Solution sans alcool, correspondant à
0 gr. 50 d'extrait par cuillerée à soupe.

Mode d'emploi :

Deux à trois cuillerées à soupe par jour,
avant chaque repas.

Propriétés :

Anémiés, convalescents, tuberculeux, opérés,
et dans tous les cas où l'organisme doit
être tonifié.

P. FOURNIE

pharmacien de 1^{re} classe

3, place de la Miséricorde — LYON

QUINARSOL ANTIANÉMIQUE

Extrait de quinquina Grandval
associé aux Strychno-Phospharsinates

Propriétés thérapeutiques :

Tonique — Stimulant général. — Appétitif.

Composition : Chaque Comprimé contient :

Quinquina Grandval.....	0	gr. 30
Glycérophosphates composés	0	gr. 30
Strychnine combinée.....	1	mgr 60
Arsenic combiné.....	0	mgr. 18

Indications. — Anémie, Surmenage intellectuel et physique. — Faiblesse générale, toutes convalescences, Grippe. — Diabète et ses complications, Séquelles du Paludisme.

Permet l'absorption facile du Quinquina et de la Strychnine.

Dose :

2 comprimés avant chacun des deux principaux repas.

La boîte de 32 comprimés : 12 fr.

(toutes pharmacies).

Laboratoires GRANDVAL

12 et 14, Rue Féry — REIMS

QUINARSOL FÉBRIFUGE

Extrait de quinquina à haut titre alcaloïdique
avec fer et arsenic assimilable.

Composition : Chaque comprimé contient :

Quinquina Grandval (à haut titre).....	0	gr. 60
Fer combiné.....	0	gr. 015
Arsenic combiné.....	0	mmg. 90

Propriétés thérapeutiques :

Antipaludique. — Permet suivant la dose, soit de juguler l'accès, soit de combattre l'état chronique et de faciliter la résistance de l'organisme. — Régulateur du Globule et des Éléments protoplasmiques.

Indications :

Paludisme et ses conséquences, Fièvre de Malte, Affections produites par le séjour dans les pays chauds.

Dose :

Pendant la crise, 4 à 8 comprimés par jour, suivant la violence de l'accès. — État chronique, 4 comprimés par jour.

La boîte de 30 comprimés : 14 fr. (toutes pharmacies),

LABORATOIRES GRANDVAL

12 et 14, rue Féry, Reims.

QUINBY & QUINBY SOLUBLE

(Quinio-bismuth. Formule AUBRY.)

Adoptés par les hôpitaux de Paris, les ministères de l'Hygiène et des Colonies.

Produits originaux à base d'iodo-bismuthate de quinine chimiquement pur :

a) en suspension huileuse 10 % (Quinby).

b) en solution aqueuse incolore (Quinby soluble).

Propriétés thérapeutiques :

Spécifique le plus puissant de la syphilis à toutes ses périodes et sous toutes ses formes. Injections intra-musculaires, indolores. Pas de stomatite, pas d'abcès ni indurations, aucune toxicité.

Présentation

Quinby.

1^o Amp. normales de 3 c. c. correspondant à 0 gr. 075 de bi-métal (boîtes de 12 et 6 amp.).

2^o Amp. double dose (étiq. bleue) de 3 c. c. correspondant à 0 gr. 15 bi-métal (boîtes de 12 et 6 amp.).

3^o Amp. infantiles de 1,5 c. c., correspondant à 0 gr. 0375 de bi-métal (boîtes de 12 amp. seulement).

Quinby soluble.

Amp. de 5 c. c. correspondant à 0 gr. 05 de bi-métal (pour adultes, et par boîtes de 6 amp. seulement).

Posologie :

Adultes : 12 inj. de 3 c. c. (Quinby) ou 18 inj. de 5 c. c. (Quinby soluble). (2 inj. par semaine).

Enfants : 12 inj. de 2/10^e de c. c. (Quinby) par année d'âge (2 inj. par semaine).

B. : Les ampoules *Quinby soluble* sont plus spécialement réservées au traitement d'attaque de la syphilis ou de ses manifestations morbides, les ampoules *Quinby*, étiq. bleue, lorsque l'on désire faire des piqûres moins fréquentes.

Toutes ces ampoules peuvent être livrées directement, en vrac, par boîtes de 25, 50, 100, à des prix très avantageux à MM. les docteurs qui en font la demande directe au Laboratoire.

Prix au public :

Quinby (normale ou étiq. bleue), la boîte de 12 ampoules : 36 francs. — La boîte de 6 : 20 francs.

Quinby infantile, la boîte de 12 ampoules : 25 francs.

Quinby soluble, la boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Laboratoires P. AUBRY

54, rue de Bienfaisance — Paris (VIII^e).

Tél. : Laborde 15-26.

BELGIQUE : Agent Général : Ch. SCHOEFFER

34, rue du Canada — BRUXELLES

En Belgique, ces produits peuvent être prescrits aux frais de l'État par MM. les médecins autorisés.

QUINÉINE

Extrait intégral des principes actifs
du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe, très active, faite avec des écorces choisies de même origine, concassées de la même façon, etc. XL gouttes deux fois par jour comme tonique. Dose fébrifuge : par 1/2 cuillerée à café. En solution non alcoolique.

Indications. — Paludisme, grippe, asthénie, convalescences, anémies.

Laboratoire des Produits Solentia
Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal — PARIS

QUINICARDINE

Forme. — Comprimés de sulfate de quinidine pur à 0 gr. 20.

Indications. — Arythmies ; fibrillation auriculaire ; tachycardies.

Doses. — Tâter la susceptibilité du malade par 1 ou 2 comprimés, puis augmenter progressivement la dose journalière à 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 comprimés par doses fractionnées de 1 à 2 comprimés à la fois.

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e)

QUINIMUTHOL SACA

Composition. — Iodobismuthate de quinine en suspension dans l'huile d'olive pure.

Forme. — Ampoule de 3 c. c. renfermant 0 gr. 30 d'iodo-bismuthate de quinine (= 0 gr. 071 de bi-métal actif).

Indications. — Syphilis à toutes les périodes.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les 2 ou 3 jours en injection intramusculaire.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 18 fr.

A. MILLET
Concessionnaire

5, rue Ambroise Thomas — PARIS (IX^e)

QUINIO-STOVAR SOL

Oxyacétylaminophénylarsinate de Quinine. Combinaison chimique définie, renfermant des proportions égales de Quinine et de Stovarsol ; le pouvoir curatif des composants est exalté par cette association.

Indications :

Paludisme (prophylaxie et traitement).
Grippe.

Posologie et mode d'emploi :

Traitement curatif : 4 comprimés à 0 gr, 25 par 24 heures (série de 10 jours).

Prophylaxie : 1 comprimé le matin à jeun (repos de 4 jours tous les 10 jours).

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

QUINIUM ROY

Composition :

Granulée, inaltérable, cette préparation renferme tous les principes actifs (*toniques et fébrifuges*) de Quinquinas sélectionnés, sous la forme recon-
nue la plus active et n'a *aucune* analogie avec les extraits toujours incomplets du Codex.

Propriétés thérapeutiques :

Fébrifuge. reconstituant énergique, tonique.

Indications :

Grippe, paludisme, Asthénies (post-grippales et autres). Convalescence, anémie.

Doses :

Tonique : 1 cuillerée à café aux repas.

Fébrifuge : 1 à 3 cuillerées à soupe aux repas (en nature, ou dissous dans un liquide au choix).

Laboratoires A. ROY

81, boulevard Suchet — PARIS (XVI^e)

Tél. : Auteuil 05-46.

QUINOBROME

Dragées.

Chaque dragée contient :

Bromhydrate de Quinine (Codex 1908)...	0 gr. 10.
Méthylarsinate de Soude.....	āā
Poudre de Noix vomique.....	} 0 gr. 01 cent.
Lactate de fer.....	
Extrait mou de Quinquina.....	āā
	} 0 gr. 05 cent.

Traitement préventif et d'entretien. Traite-
ment rationnel basé sur l'emploi conjugué
de la Quinine et de l'Arsenic. Tolérance
parfaite. Action rapide et constante. Évite
l'accoutumance à la Quinine.

Doses. — *Préventive* : 4 dragées par jour (2
avant chaque repas).

Curative : 6 dragées par jour (2 avant chaque
repas, matin, midi, soir).

Dépôt général :

Pharmacie Centrale de France.

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV^e)

QUINOFORME LACROIX

Composition. — Formiate basique de quinine découvert par H. Lacroix, inscrit au Codex (1925).

Avantages. — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine.

Le plus riche en quinine (87,56% de sels basique ou neutre.

Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

Indications. — Paludisme, Fièvres malariques
Fièvres intermittentes.

Formes pharmaceutiques:

Ampoules, 6 à 12 ampoules de 0,25, 0,50 0,75, 1 gr.
1,25 et 1,50

Cachets, 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50

Comprimés, 10 et 20 comprimés de 0,10 à 0,50.

Pilules à 0,10.

Laboratoires H. LACROIX

V. Mérobian, successeur

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

QUINOÏDINE DURIEZ

Dérivé du quinquina

Chaque pilule contient 10 centigr. quinoïdine

Antigrippal, tonique général et tonocardiaque, antinévralgique. *Supérieur à la Quinine* comme préventif et curatif du paludisme et de ses séquelles. Aucun des inconvénients de la quinine (bourdonnements d'oreilles, troubles gastriques, etc.) même après usage prolongé (*Voir bull.*

Académie de médecine, communication du Dr. Burdel. Communications des D^{rs}. Le Moine, Dardenne, Dujardin-Beaumetz, etc... Notice sur demande.
3 à 6 pilules par jour au début des repas, pendant plusieurs semaines au besoin.

DURIEZ

20, place des vosges — PARIS

QUINO-THORIUM

Préparation radio-active de chloroformiate de Quinine et de bromure de Mésothorium.

Indications. — Paludisme et indications thérapeutiques de la quinine.

Formes. — 1° Ampoules à 25-50 centigrammes et 1 gr. pour injections intramusculaires profondes.

2° Dragées dosées à 25 centigrammes.

Posologie. — Habituelle de la quinine.

Établissements A. BUISSON

F. JALOT et C^{ie}

157, rue de Sèvres — PARIS

QUINSAL

l'Éther Salicylique de Quinine et lithine
acétylsalicylée en tablettes glutinisées

ACTION THÉRAPEUTIQUE POLYVALENTE :

Calmant immédiat de la Douleur
par le groupement acétylsalicylique et
la Quinine.

Antithermique par la Quinine.

Diurétique et Uricolytique par le Sel
de Lithine et la Quinine.

Spécifique antirhumatismal par les
Salicylates. Tolérance parfaite (tablettes
glutinisées).

Indications : Rhumatismes, Sciatique,
Lumbago, Névralgies, Douleurs grip-
pales et en général toutes les Algies.

Posologie. — *Cas aigus.* — De 7 à
12 tablettes en 3 fois par 24 heures, de
préférence loin des repas afin que l'action
sédative soit plus rapide.

Cas chroniques. — Dans l'intervalle des
accès : 3 par 24 heures.

Enfants. — De 1 à 3 par 24 heures.

Prix de la boîte : 15 francs.

Laboratoire du QUINSAL

M. LEULIER, docteur en pharmacie
Membre de la Société de Chimie biologique
GRAY (Haute-Saône)

Échantillon et Littérature sur demande

LE QUOTIDIEN

(marque déposée en 1909)
pur jus de raisin frais sans alcool.

Composition. — Pasteurisé à température modérée (évite d'altérer les vitamines, les albumines et les corps azotés). Maintenu dans le vide dans son état original (évite toute oxydation). N'est additionné d'aucun antiseptique, ni acide sulfureux, ni autres (évite ainsi d'entraîner des réactions chimiques).

Indications thérapeutiques :

Estomac, Intestins, Reins, Reconstitution.
Boisson de table idéale pour les estomacs délicats.
Doit être bu à table pur ou mélangé d'eau ou un verre à Bordeaux avant chaque repas.
Échantillons et analyse sur demande.
En vente : toutes Pharmacies, Maisons d'alimentation et de Produits de régime.

Prix : 10 fr. la bouteille.

Henri CHARTIER
à SAUMUR.

RADIOBAUME ADRIAN

Préparation kératoplastique et kératogénique à base de Tannins assimilables, de balsamiques et d'anesthésiques.

Traitement préventif et curatif des accidents *des aux radiations*.

Spécifique des brûlures, des coups de soleil et de toutes lésions ou irritations de la peau.

ADRIAN et C^{ie}

9, et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e)

RADIOLYSINE

Complexe colloïdal radio-actif
en solution isotonique injectable

Composition. — Mésothorium, Cu, Mg, Si, Fe, Mn. Ph. Ca.

Propriétés. — La Radiolysine réalise la chimiothérapie totale du Cancer. Elle permet au médecin d'administrer simultanément à son malade tous les éléments qui ont donné des résultats dans le traitement du cancer.

Indications. — Tous les cancers, soit comme médication adjuvante du traitement chirurgical (prévient les récidives) ou des traitements radium et radiothérapiques dont elle prolonge l'action. Cancers inopérables.

Présentation. — En boîtes unitaires, chaque boîte contenant les 2 ampoules jumelles nécessaires pour une seule injection de 5 cc.

Mode de prescription. — Prescrire 10 Radiolysine, pour une série de 10 injections intramusculaires, une tous les 3 jours.

N.-B. — Aucune indication ne révèle au malade la nature de l'affection pour laquelle il est traité.

Pierre ALEXANDRE Pharmacien

41. rue de Rome — PARIS (VIII^e) Lab. 08-00.

RADIOPAQUE HEUDEBERT

Composition. — Le RADIOPAQUE Heudebert est un repas d'épreuve pour examen radiologique du tube digestif; son opacité est obtenue par le sulfate de baryum gélatineux en suspension dans un support alimentaire composé d'hydrates de carbone, de graisses et de matières azotées représentant une valeur nutritive de 750 calories pour la dose de l'examen.

Avantages. — En raison de sa réelle valeur alimentaire le RADIOPAQUE ne modifie en rien le rythme des contractions et permet l'examen du tube digestif dans son état de fonctionnement normal; de plus, son goût très agréable de crème au chocolat le fait accepter sans répulsion par les malades les plus difficiles.

Présent. — Il est présenté en flacons de 400 cc. pour examen complets et en 1/2 flacons pour examens partiels et examens des enfants. Il est prêt à l'emploi sans aucune préparation supplémentaire et son bouchage dans le vide suivi de de 2 stérilisat. lui assure une conserv. in définie.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, Rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)
2 et 4, Chemin Feuillat — LYON

RADIOTÉTRANE GÉRARD

Composition. — Tétra-iodo-phénol-phthaléine disodique.

Mode d'action. — Opacifie la vésicule biliaire aux rayons X.

Avantages. — Stable, de composition constante, non toxique.

1^o *Forme dragées* : grâce à son enrobage spécial, la dissolution intestinale et la visibilité vésiculaire sont assurées.

2^o *Forme colloïdale* : Préparation liquide faite pour les malades ne pouvant absorber les dragées.

Indications. — Examens radiologiques de la vésicule biliaire.

Forme et mode d'emploi :

1^o *Dragées* : 15 à 20 au cours du repas. Visibilité maxima entre la 14^e et la 18^e heure.

2^o *Forme colloïdale* : mélanger le contenu des deux flacons, immédiatement avant l'absorption.

Laboratoires du Docteur LAURENT-GÉRARD

Docteur ès sciences.

Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris

40, rue de Bellechasse — PARIS (VII^e)

REALPHÈNE

Éther phosphorique du glucose
et Stovarsol calcique.
Augmentation rapide et durable
de l'appétit. du poids et des forces.

Indications :

Asthénie. — Anorexie. — Amaigrissement. —
Convalescences. — Anémie. — Surmenage.
— Entérites chroniques. — Troubles généraux de la nutrition.

Formes :

1° comprimés ; 2° cachets ; 3° granulé.

Établissements A. BUISSON

F. JALOT et C^{ie}

157, rue de Sèvres, 157. Paris (XV^e).

R. C. Seine 222 705 B.

RÉARGON

Nouvel agent chimique antigonococcique.

Composition :

Albuminate d'argent spécial et glucosides anthraquinoniques combinés.

Propriétés :

Pénétration profonde des muqueuses.

Haut pouvoir bactéricide.

Action analgésique remarquable.

Tolérance parfaite.

Usage :

En injections, lavages, instillations avec solution
à 5 de Réargon pour 100 eau distillée.

Doses :

Urétrites aiguës : par jour 3 ou 4 injections de
10 minutes.

Traitement abortif : 8 injections en 24 heures.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, pharmacien.

41, rue de Rome, Paris (VIII^e).

Tél. Laborde, 08-00

RECONSTITUANT MARY

Propriétés thérapeutiques. — Tonique de premier ordre ; grande richesse thérapeutique.

Quina. — Coca, kola, gentiane, quassia, cacao, noix vomique, fer organique et phosphates.

Traitement curatif des anémies, lymphatisme, anorexie, convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 verres à madère au milieu du repas. Demi-dose pour enfants.

Laboratoire du Reconstituant MARY

32, rue de l'Ouest, Paris.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

RECTAGINE

(Suppositoires radifères)

Composition. — Organate d'argent à 17 % d'argent pur, Hydrargyre, sulfo-oléo sulfonate de sodium camphré, et bromure de radium.

Indications. — 1^o *Chez l'homme :*

Agit sur les complications de la blennorrhagie, sur l'urètre, les testicules, les vésicules séminales, la prostate, etc.

2^o *Chez la femme :*

Action complémentaire des crayons Leucagine dans le traitement des métrites à tous stades ; médication de tous les états congestifs ou infectieux de l'utérus, des trompes, et des ovaires.

3^o *Cas particuliers :*

Action résolutive très nette sur : le prurit anal, les érosions de l'anus, les hémorroïdes internes et les oxyures.

Posologie. — Introduire un suppositoire au moment du coucher, pendant 10 jours consécutifs, ou tous les 2 jours suivant le cas.

La boîte de 10 suppositoires : 15 fr.

Laboratoire pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE O. * O. I. U

Docteur en pharmacie. Lauréat de l'Institut
et de l'Académie de Médecine

22, rue de la Sorbonne — Paris (V^e)

RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Esculine adrénalinée et d'Ortho-cocaïne, livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdicure parfait.

Prop. thér. — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice. Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Prix : 14 francs complète.

Tube de rechange : 12 francs.

Laboratoire de la Varilaxine

164, Rue Saint-Honoré — PARIS

RECTOPANBILINE

Formes. — Solution pour lavement et suppositoires.

Définition. — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du Dr Bensaude amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la biligénèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

Composition. — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile fraîche* additionnée dans les suppositoires de glycérine solidifiée.

Indications. — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose* dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'*Auto-intoxication intestinale* (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*. Autres indications : Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts : Hernies, Grossesse, Accouchements.

Posologie. — Un ou deux suppositoires par jour ou une à trois cuillerées à café de solution dans 160 grammes d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder quelques minutes. — Demi-dose pour les enfants.

Prix au public : 11 fr. le pot de Rectopanbiline.
9 fr. la boîte de suppositoires.

Laboratoire de la PANBILINE
ANNONAY (Ardèche).

RÉGYL

Régulateur de l'estomac.

(à base de peroxyde de magnésium hydraté, de fluorure de sodium et de ferments digestifs).

Mode d'emploi :

Un ou même deux comprimés après chaque repas et de préférence dans une infusion. Doubler la dose dans les états aigus.

Présentation :

Sous forme de comprimés pesant chacun 0 gr. 60.

Propriétés :

Régulateur de l'estomac, gastralgie, dyspepsie, flatulences, fermentation, pesanteur, renvois, crises stomacales tenaces.

Prix au public : 10 fr. (en France)

Échantillons et notices sur demande.

Laboratoire du RÉGYL

8, Rue Richer — PARIS (IX^e).

Téléphone : Central, 16-85.

RÉNALEPTINE

Dioxyphénylethanol méthylamine.
(Adrénaline lévogyre synthétique)

La Rénaleptine présente toutes les qualités de l'adrénaline naturelle avec l'avantage d'une pureté garantie et d'une constance d'action absolue.

Indications :

Toutes les affections où l'on recherche les effets vaso-constricteurs de l'Adrénaline.
Prévention et traitement des crises nitroïdes.

Posologie et mode d'emploi. — Solution de Rénaleptine à 1/1000. Doses par 24 heures :
Voie buccale : X à XXX gouttes.
Voie hypodermique : 1/4 de cc. à 1 cc.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

RÉPARATEUR THUAU

Présentation. — Vin.

Composition :

Kola stabilisée	Extr. HA.	0,15
Coca.....	Extr. HA.	0,15
Noix vomique.....	Extr. sec.	0,009
Samos.....		20

Indications :

Faiblesse générale, neurasthénie,
surmenage, convalescence.

Mode d'emploi. — Médication pour
adultes : 2 verres à liqueur par jour.

Prix : 15 fr. (sans impôt.)

Laboratoire

du **RÉPARATEUR THUAU**

22, faubourg Saint-Michel — ANGERS

RÉSYL

Antiseptique pulmonaire

Ether glycéro-gaiacolique soluble. Non caustique, libère du gaiacol à l'état naissant. Antiseptique pulmonaire et modificateur des sécrétions bronchiques. Sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

Indicat. — Tuberculose pulmonaire avec ou sans température. Bronchites et toutes les affections de l'appareil respiratoire en général.

Sirop, Comprimés, Ampoules.

Doses. — 2 à 6 cuillerées à café de sirop, 2 à 6 comprimés par 24 heures. Voie hypodermique: une ampoule tous les 2 jours.

Sirop le petit flacon : 8 fr. 50

— grand — : 15 fr.

Le tube de 20 compr. : 7 fr.

La boîte de 12 amp. : 15 fr.

Laboratoires O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

RÉTHRAGINE

Médication bactéricide et radioactive des affections urétrales (aiguës et chroniques,) chez l'homme et chez la femme.

Nature du Produit. — La Réthragine est une composition médicamenteuse présentée sous forme de bougies renfermant en milieu indolore un organate d'argent titré à 20 % d'argent pur, de l'acide urique et du Brome de Radium au maximum d'activité et répondant à des constantes physiques nettement déterminées.

Indications. — La Réthragine, sous forme de bougies urétrales, agit efficacement non seulement sur les infections de l'urètre, mais encore sur les infections annexes.

Prescrire. — Hommes : Bougies Réthragine H ; Femmes : Bougies Réthragine F.

Traitement complémentaire: Capsules RÉTHRAGINOL.

La bougie : 12 fr.

La boîte de 5 bougies : 55 fr.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE O. * O. I. *

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut.
et de l'Académie de Médecine

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e)

RÉVULSIF MILKO

Innovation thérapeutique.

Composition. — Terpènes, Alcool (sans produits phénoliques, essence de moutarde ou de capsicum, prurigineux).

Présentation. — 3 concentrations différentes:

N° 1. *Pour bébés* (Nourrissons et jeunes enfants): 5.50

N° 2. *Pour enfants* (de 5 à 13 ans environ): 6.50

N° 3. *Pour adultes*: 8 fr.

Le **Révulsif Milko** détermine une Vaso-dilatation intense sans provoquer de phlyctènes. *Ne tache ni n'altère les téguments*, d'où répétition à volonté des badigeonnages. Pas d'action lacrymogène, ni sternutatoire. Odeur agréable.

Action secondaire: Antisepsie pulmonaire par absorption cutanée des essences et élimination bronchique.

Indications. — Rhume, Bronchite, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Pleurite, Pleurésie.

Laboratoire H. CLUZEL

60, Cours Émile-Zola — LYON Villeurbanne

RÉVULSIF PROCIPHA

Forme. — Liquide.

Mode d'emploi. — Badigeonnage deux fois par jour.

Composition. — Mélange d'essences, Terpène, Pinène, Carvacrol, qui irritent légèrement l'épiderme, d'odeur très agréable.

Indications. — Maladies des voies respiratoires, affections rhumatismales et névralgies.

Prix : 6 fr.

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Dépôt à Paris : 49, rue du Paradis

Tél. : Provence 30-32

RHAGADINE BRACQUEMOND

Forme. — Pommade en tubes.

Propriétés therap. — La *Rhagadine*, à base d'un mélange de Kératine, d'une innocuité absolue, possède des propriétés durcissantes assez grandes pour raffermir l'épiderme le plus délicat; mélangée à des corps gras, maintient à l'épiderme toute sa souplesse sans atténuer en rien les propriétés spécifiques de la substance médicamenteuse agissante.

Indic. therap. — Gerçures des seins, Erythèmes des nouveau-nés, Fissures anales chez les hémorroïdaires, Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies déchiquetées ou par arrachement.

Échantillons sur demande adressée au :

Laboratoire BRACQUEMOND

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccin curatif antigonococcique.

Constitution. — Corps bacillaires rigoureusement stérilisés et enrobés dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver inaltérés jusqu'au niveau de l'intestin où leur absorption détermine un processus naturel de défense organique.

Indications. — Agit efficacement contre tous les états infectieux, d'origine gonococcique chez l'homme et chez la femme (blennorrhagie, orchite, métrite, salpingite, salpingo-ovarite, rhumatisme gonococcique).

Doses. — 4 à 6 sphérules par jour, loin des repas. Aucune réaction locale ni générale.

Produits spéciaux des **LABORATOIRES LUMIÈRE**

9, cours de la Liberté — LYON

RHÉSAL VICARIO

Succédané inodore du salicylate de méthyle. Liquide rapidement absorbable par la peau, sans provoquer la moindre irritation cutanée.

Action prompte et durable.

Mode d'emploi :

En onctions, deux à trois fois par jour, en recouvrant de flanelle ou même de taffetas gommé.

Indications :

Rhumatismes. Goutte. Névralgies.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e)

RHINADROL

(Baume nasal.)

Forme pharmaceutique et composition. — Vaseline semi-liquide, avec Camphre, traces de Menthol, baume du Pérou, Soufre colloïdal, Adré-naline huileuse et essences.

Propriétés. — Décongestionnant, calmant, bactéri-cide.

Avantages. — Consistance *semi-liquide*, introduction d'adrénaline à l'état huileux, ce qui assure une *homogénéité* parfaite du baume.

Indications. — Toutes inflammations de la mu-queuse nasale. Toutes *rhinites* et à titre préven-tif contre les maladies contagieuses.

Présentation. — *En tube avec embout olivaire* pour faciliter l'introduction dans les narines.

Prescription. — Un tube *Rhinadrol Falvy*.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences.

Ex-interne, lauréat des hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (17^e)

RHINHISTOL

**TOPIQUE HUILEUX
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUE
SÉDATIF LOCAL PAR EXCELLENCE
du
tissu muqueux des voies respiratoires
supérieures**

PRÉPARATION MÉDICINALE FRANÇAISE
simultanément

ANTISEPTIQUE — ANALGÉSIQUE
décongestive et cicatrisante
*exempte de substances toniques ou irritantes
(cocaine, adrénaline, menthol, eucalyptol, etc.)*

COMPOSITION

donnée pour la formule suivante :

Goménol (essence naturelle)	5 gr.
Camphre du Japon	2 —
<i>Huile d'olive lavée à l'alcool et chargée par décoction des principes extractifs de plantes balsamiques sélectionnées.....</i>	<i>100 —</i>

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

**En vue d'immunisation contre toutes épidémies
(grippe, diphtérie, scarlatine rougeole, etc.)**

MODE DE PRÉSENTATION

délivré
dans des flacons en verre à large goulot

MODE D'EMPLOI

Instillations et Pulvérisations
nez — gorge — oreilles

PRIX DE VENTE OBLIGATOIRE

Le Flacon : 15 fr.

LABORATOIRE DU MICELLIODE

Produits médicaux spécialisés
A. Rolland, Pharmacien de 1^{re} classe
88, rue de la Villette — PARIS (XIX^e).

RHIZOTANIN CHAPOTOT

Composition. — Tanin physiologique vivant directement assimilable, sels de chaux et de magnésie.

Forme. — Cachets : pour *adultes*.

Poudre : pour *enfants*.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, états tuberculeux et pré-tuberculeux, états de consommation, bronchites chroniques.

Neutralisation des toxines.

Consolidation du terrain affaibli.

Amélioration rapide des accidents diarrhéiques.

Exaltation des réactions défensives de l'organisme.

Posologie. — Cachets 4 à 6 par jour.

Poudre : 2 à 4 cuillères mesure par jour, dans de la confiture ou du miel.

Laboratoire AUBRIOT

56, boulevard Ornano,
18 et 20, Rue Championnet, PARIS (XVIII^e).

Agent général pour la Belgique

A. CHOCAT, 86, rue du Méridien, Bruxelles.

RHODARSAN

Dioxydiamidoarsenobenzol méthylène
sulfoxyolate de soude.

Teneur en arsenic : 20% environ. Donne, avec l'eau distillée, des solutions neutres, injectables dans la veine, sans alcalinisation.

Indications :

Syphilis, Pian, Protozooses, Symbiose fuso-spirillaire, Charbon, Sodoku.

Posologie et mode d'emploi. —

Séries d'injections graduées de 0 gr, 15 à 0 gr, 90.

Utiliser exclusivement la voie intra-veineuse. Applications locales de poudre, collutoires ou pommades.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

RHODAZIL

Benzoate de Benzyle.

Antispasmodique, non toxique, bien toléré.

Indications :

Asthme vrai, Coliques néphrétiques et hépatiques.

Hoquet persistant, Spasmes des divers organes, Mal de mer.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : Une demi-cuillerée à café de *solution* ou 2 *capsules* toutes les 3 ou 4 heures.

Enfants : IV gouttes de *solution* par année d'âge.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

RHOFÉINE

Association d'aspirine (50 centigr.) et de caféine (5 centigr.) pour un comprimé ou un cachet.

La Rhoféine ajoute à l'action de l'Aspirine les propriétés stimulantes et toni-cardiaques de la Caféine.

Indications :

Grippe, États fébriles, Migraines, Névralgies faciales.

Posologie et mode d'emploi. — Un à six comprimés ou cachets par 24 heures.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

RHOMNOL

A base d'acide nucléinique pur et de nucléophosphates naturels.

Indic. thér. — Puissant reconstituant du noyau cellulaire. antineurasthénique de choix, indiqué dans toutes les affections dyscrasiques consomptives.

Doses et mode d'emploi. — *Pilules* à 0,05 : 4 à 6 par jour aux repas. *Saccharure* (granulé) 0,10 par cuill. à dessert; une cuill. à dessert aux repas, pour adultes; moitié ou quart pour les enfants, suivant l'âge. *Ampoules* 1 cc. (0,05 de nucléinate de soude par cc.) pour injections intramusculaires de préférence (Spécialement indiquées dans les maladies infectieuses aiguës).

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

RICÉYL BILLAULT

Traitement efficace de la constipation.

Forme. — Poudre.

Composition :

Huile de Ricin.....	40 gr.	} pour 100 gr.
Magnésie.....	40 gr.	
Lactate de Magnésie.....	5 gr.	
Excipient : Sucre.....	15 gr.	

Le RICÉYL agit tout à fait différemment des autres laxatifs. A ces derniers, on demande de produire leur effet du soir au matin sans se préoccuper des suites qui se manifestent si l'on en prend chaque jour : entérite, constipation accrue. Tout au contraire, le RICÉYL implique un traitement à suivre et prétend au rétablissement normal des fonctions, grâce notamment à son action sur la sécrétion biliaire. Le plus souvent d'ailleurs, après un, deux ou trois jours, on peut diminuer, puis espacer les doses. Une véritable rééducation de l'intestin est ainsi obtenue rapidement.

Faisons observer que le traitement par le RICÉYL n'est pas onéreux, par le fait que l'on espace les doses pour un résultat durable.

Mode d'emploi. — Le RICÉYL s'administre dans du lait, du café, ou du café au lait sucré, chaud, le matin à jeun ou le soir au coucher.

Adultes. — Dose purgative : 3 à 4 cuillerées à café. Dose laxative : 1 à 2 cuillerées à café.

Enfants. — Bébés, à partir du sevrage, 1/2 cuillerée à café ; de 3 ans à 6 ans, 1/2 cuillerée à café ; de 6 ans à 12 ans, 1 à 2 cuillerées à café.

La boîte : 12 francs.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE O. * O. I. O

Docteur en pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de médecine,

22, rue de la Sorbonne, Paris (Ve).

Dépôt et Agence générale de vente des Produits pharmaceutiques spécialisés BILLAULT

R. C. Seine 218758 B.

RICIGEL

Huile de Ricin

Sous une forme nouvelle et agréable.

Forme. — Gelée de fruits contenant 90 0/0 d'huile de ricin fraîche, 2 0/0 agar-agar, 8 0/0 sirop de fruits.

Goût agréable, spécialement indiqué pour femmes et enfants.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes celles de l'huile de ricin.

Indications. — Toutes celles de l'huile de ricin.

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café à jeun produisent trois ou quatre heures après des selles molles, sans coliques. Cette dose pour les enfants est moindre et, chez les adultes, peut être doublée pour obtenir une véritable purgation.

ROBERTS et C^{ie}, Pharmaciens,

5, rue de la Paix, Paris.

Central 69-86.

RICOMALT

Forme. — Granulé.

Composition. — Huile de ricin, Magnésie, Extrait de Malt.

Indications. — *Constipation* : Laxatif doux, agréable à prendre.

Posologie. — *Adultes* : Laxatif : 1 à 3 cuillerées à café. Purgatif : 2 à 4 cuillerées à soupe.

Enfants : Demi-dose.

MARONNEAU-MOREL

156, rue des Fauvelles —
COURBEVOIE (Seine)

RIODINE



Composition. — Ether glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20% d'iode.

Forme. — Flacon de 50 perles, Chacune représentant l'action de 0,20 cgr. environ d'iodure alcalin.

Propriétés thérapeutiques — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable. *Action prolongée et durable sans iodisme.*

Pour injections intraveineuses ou intramusculaires, voir Néo-Riodine. mêmes applications.: *action rapide et intensive.*

Indications. — Artério-sclérose, myocardites chroniques, hypertension etc... Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme, etc... Obésité, rhumatisme chronique, scrofule, syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Doses. — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 10 francs.

LABORATOIRES P. ASTIER

41 à 47, rue du Docteur-Blanche, Paris (XVI^e).

ROB OBERLIN

(Hérédo-spécificité et cure d'entretien).

Hg. I² = un tiers de centigramme par cuillerée à café.

Hg. I², = deux tiers de centigramme par cuillerée à dessert.

Hg. I² = un centigramme par cuillerée à soupe.

Posologie (en moyenne) :

Un an			
et au-dessous.	1/3	cuillerée à café	par jour.
2 ans.....	1/2	—	—
3 et 4 ans.....	une	—	—
5 à 12 ans....	1 à 2	cuillerées à dessert	—
12 à 17 ans....	1 à 2	— à soupe	—
Adultes.....	2 à 4	—	—

Forme agréable à absorber, présentation discrète.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, pharmacien de 1^{re} classe.
17, rue Cadet, Paris.

ROYÉRINE DUPUY

Poudre digestive absorbante et recalcifiante en cachets.

Compos. — Pepsine extractive : Pancréatine extractive; Sous-carbonate de bismuth, Phosphate, Carbonate de chaux et Magnésie lactosée.

Avantages. — La pepsine et la pancréatine associées à une poudre non fermentescible, antiputride, comme le carbonate de bismuth, se conservent indéfiniment. Absorbant de premier ordre, antiacide, ne provoque pas de constipation. Recalcification assurée.

Indications. — Dyspepsies à forme hypersthénique. Gastralgies. Fermentations secondaires. Entérites aiguës et chroniques. Diarrhées profuses des tuberculeux. Eruptions provenant de troubles digestifs (Urticaire).

Dose. — 2 à 8 cachets par jour.
En boîtes de 40 cachets.

**LABORATOIRE de THÉRAPEUTIQUE
des VOIES DIGESTIVES J. LAUMONIER**

223, rue Saint-Martin, Paris

ROZODERME

Le *Rozoderme* est une pommade *rose* à base d'essences végétales antiseptiques (Lucas-Championnière) et de substances chimiques inoffensives destinées à créer et entretenir un milieu favorable à la réfection des tissus. Présentation en tubes.

Propriétés. — Le *Rozoderme* calme la douleur et l'irritation, aseptise les plaies en détruisant les germes nocifs, stimule la vitalité des tissus et active la cicatrisation. Convient parfaitement pour la toilette journalière des jeunes enfants.

Indications. — Erythème fessier, feux de dents des nourrissons, gerçures du sein, brûlures et diverses formes d'eczéma : aigu, chronique ou variqueux, dermites toxiques, zona intercostal, etc.

Mode d'emploi. — Appliquer une couche légère sur la partie malade, préalablement lavée et séchée, recouvrir de gaze et renouveler le pansement toutes les vingt-quatre heures.

Laboratoire du ROZODERME

11, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV°)

RUBYL

Iodure double de quinine et de bismuth.
Suspension huileuse stérilisée, injectable
par la voie intramusculaire, bien tolérée.
Teneur en Bi = 20 mgr. environ par cc.

Indications :

Bismuthothérapie de la Syphilis.

Posologie et mode d'emploi :

Injectations du contenu d'une ampoule (3 cc.)
tous les trois ou quatre jours; série de
12 injections.

Chez les Enfants : 1/20^e par année d'âge, de
la dose conseillée chez l'adulte.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

RUTONAL

Phénylméthylmalonylurée.

Propriétés hypnotiques et antiépileptiques
très voisines de celles du Gardénal. Action
plus atténuée qui rend le médicament très
maniable et permet de l'administrer aux
malades intolérants.

Indications :

**Épilepsie, Chorée, Convulsions, États
anxieux.**

Posologie et mode d'emploi :

Un à quatre comprimés à 20 centigr. par
24 heures.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

RYTHMOSYSTOL

Marrube blanc, 4/5 ; *adonis vernalis*, 1/5.

Formes : Dragées et Gouttes.

Propriétés. — Régularisation du Rythme cardiaque (*extrasystoles*). Pas d'accumulation. Pas de contre-indications, aucune toxicité.

Posologie. — *Dragées* : 12 par jour.
Gouttes : 60 par jour.

Prix : 14 francs

COMTE, Pharmacien
60, rue Saint-Guilhem
MONTPELLIER.

SALANTALE

Vaccins et antivirus polyvalents.

Vaccination par voie cutanée et application locale.
Traitement curatif et préventif. Application simple
et facile.

Aucune contre-indication. Sans réaction locale ni
générale.

Présentation. — Pommade et ovules.

Indications :

1^o *Pommade* contre : Furunculoses aiguës et chroniques, Panaris, Org. lets, Blépharites, Ostéomyélites, Plaies post-opératoires purulentes, Phlegmons. Erysipèles, Impétigos contagieux, Pyodermites superficielles ou profondes, Plaies infectées, mastites, acné pustuleuse, Otites, Sinusites, Eczémas humides des seins, oreilles et plis des aines (intertrigo) Blessures accidentelles, etc.

Mode d'emploi :

a) Application locale : Faire sur l'emplacement malade un pansement avec de la gaze enduite d'une légère couche de Salantale. Renouveler le pansement matin et soir jusqu'à guérison complète et *simultanément*.

b) Vaccination cutanée : A cet effet prendre un peu de Salantale, environ de la grosseur d'une demi-noisette et frictionner matin et soir une partie du corps éloignée du mal. Par exemple pour un furoncle au cou faire les frictions sur les cuisses ou les bras. Frotter très doucement jusqu'à absorption complète de la pommade par la peau. Après la disparition des symptômes, continuer les frictions pendant un certain temps afin de prévenir les récidives.

2^o *Ovules* contre : toutes Leucorrhées et Affections purulentes, Vulvo-vaginites, Uréthrites, Métrites, Périmétrites, Salpingites, Annexites, Bartholinites et toutes Infections gonococciques.

Mode d'emploi :

Le soir introduire l'ovule aussi profondément que possible et garnir l'orifice vaginal d'un tampon d'ouate ou de gaze recouvert d'une couche de pommade-Salantale.

Garantie vaccinale des produits Salantale par la composition polyvalente des différents vaccins : antivirus, antigène stabilisé, antigène modifié et émulsions de corps microbiens prélevés dans les affections sus-indiquées.

Échantillons et littérature sur demande :

Laboratoires NOTH et ANSELM

42, Grandes-Arcades — STRASBOURG

SALÈNE CIBA (et SALÉNAL CIBA)

Ethers méthyl et éthyl-glyco-salicylique possédant, à un haut degré, les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, mais ayant sur ce dernier l'avantage de l'absence d'odeur et de toute action irritante.

Indicat. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Torticolis, Névrite rhumatismale, Goutte, Sciatique, etc.

Doses. — Se formule magistralement, pur ou en liniment par 5 ou 10 gr.

Le SALÉNAL (pommade au Salène) est vendu en tube de 30 gr. Prix : 10 fr.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

SALICAIRE DAUSSE

Traitement de l'entérite sous toutes ses formes.

Formes. — *Fondant de salicaire* contenant 0 gr. 15 d'extrait de salicaire par 5 gr. de granulé.

Extrait fluide de Salicaire Dausse.

Indications. — *Diarrhée infantile, diarrhée tuberculeuse, dysenterie amibienne, dysenterie bacillaire, entérites.*

Posologie. — *Fondant de salicaire :*

ADULTES : 5 à 6 cuillerées à café par jour.

ENFANTS : 1/2 à 5 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Extrait fluide de Salicaire Dausse :

NOURRISSONS : XX gouttes 3 fois par jour.

ADULTES : 3 à 6 grammes par jour.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

SALICÉRAL

Composition. — Le Salicéral est l'éther monosalicylique de la glycérine, préparé par double décomposition entre la glycérine et un éther sel de l'acide salicylique.

Applications. — Arthrite rhumatismale, Herpès tonsurant, Pityriasis versicolor, Névralgies sciatiques ou intercostales et dans toutes les indications de la médication salicylée.

Formes. — Liniment au Salicéral.
Flacon de 50 cc.

Laboratoires CLIN
PARIS

SALINS DU JURA

Station hydrominérale classée par l'Académie de Médecine de Paris.

Ses Produits Thérapeutiques naturels pour le traitement à domicile :

EAUX MERES CRISTALLISÉES (*Gynecomer*)

Forme : Cristaux.

Propriétés Thérapeutiques. — Résorption des exudats et engorgements, décongestion et mobilisation des organes, correction des déplacements vicieux ; élimination des produits pathologiques.

Indications. — Traitement des Métrites et Salpingites, subaiguës et chroniques, fibromes, déviations utérines, cellulites pelviennes, troubles menstruels, suites de couches.

Doses. — 1 à 4 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie, chauffée à 38-40°C à prendre en irrigation vaginale, à faible pression, dans la position allongée à observer encore une heure après.

SELS POUR BAINS (*Jurbainsel*)

Forme : cristaux.

Propriétés Thérapeutiques. — Augmentation des échanges moléculaires, activation de la vie cellulaire, action modificatrice sur le milieu sanguin et lymphatique.

Indications. — Anémie, Débilité, Rachitisme, Lymphatisme, chez les enfants.
Asthénie, chez les adultes.

Doses. — 10 à 20 grammes par litre d'eau chauffée à 36° C au maximum, pour un bain de 10 à 20 minutes.

EAUX MERES LIQUIDES

Forme : Liquide.

Propriétés Thérapeutiques. — Action résolutive et décongestionnante.

Indications. — Adénites, Adénopathie, Ostéite, Affections ganglionnaires osseuses et articulaires.

Doses. — En compresses, pures ou diluées.

Agence Générale :

11, Avenue de l'Opéra, Paris. R. C. S. 235623.

SALSANOS

A base de sels de soude (sulfate, phosphate, tartrate, citrate)

Forme. — Sel granulé, effervescent, soluble et d'un goût agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Maintient l'alcalinité du sang, empêche celle de l'urine, diminue l'acide urique et participe à son élimination, aide à la dissolution des urates et des oxalates, active la combustion des graisses.

Indications. — Artério-sclérose, Pléthorisme, Gastralgie, Arthritisme, Rhumatisme, Goutte, Coliques hépatiques et néphrétiques, Maux de tête, Troubles digestifs. Obésité et en général toutes les affections du foie et des reins.

Doses. — Une à trois cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau le matin à jeun.

ROBERTS & C^{ie}. Pharmaciens

5, rue de la Paix — PARIS

SALUBRINE PHÉNIX

Liquide et comprimés.

Composition. — Antiseptique puissant à base de formolsulfonate de soude et de thymol.

Formes pharmaceutiques. — Solution inodore miscible à l'eau; d'odeur agréable, ne tachant pas le linge. (Comprimés.)

Indications. — Gynécologie, accouchements, pansements, hyperhydrose.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe ou 2 à 4 comprimés par litre d'eau. (Usage externe.)

Laboratoire P. MAUCHANT

14, rue de Birague — PARIS (IV^e).

SALVATYL

Prophylaxie antivénérienne individuelle

Le Salvatyl est une pommade à base de Protochlorure de Mercure léger et dissociable, polyvalent, efficace contre les infections gonococcique et tréponémique; doit être utilisé le plus tôt possible après un contact suspect, au plus tard dans les douze heures consécutives; agit en surface et en profondeur. Le Salvatyl se présente en tube-canule pour l'application de la pommade dans le canal de l'urètre, sur la muqueuse balano-préputiale et les écorchures des parties génitales. Le Salvatyl a été expérimenté avec succès dans l'Armée Métropolitaine, les équipages de la Flotte, les Colonies; est adopté par le Ministère de la Marine et par le Ministère des Colonies.

LABORATOIRE J. GAUTIER

24. rue Ponthieu, Paris (VIII^e).

SALVENASE LEGOUX

Composition :

Traitement interne.

A. Comprimés non enrobés se désagrégeant très rapide- ment ; consti- tués de :	Extraits secs	{	Marrons d'Inde (stabilisé)
			Cupressus
		{	Hamamelis
			Viburnum
		{	Boldo
			Surrénales
	Poudre de glandes	{	Thyroïdes
			Ovaires

B. Granulé aromatisé soluble dans l'eau, de citrate de soude pur.

Traitement externe.

Sels pour bains à base de :	{	Sulfate de potasse et d'alu- mine
		Hydrochlorate de soude
		Carbonate de soude acide.

Indications. — Traitement complémentaire de la cure A BAGNOLES DE L'ORNE, ou à défaut son meilleur succédané.

Mode d'emploi :

Traitement interne.	{	1° matin à jeun, une cuillerée a café pleine de granulé, dissous dans un verre d'eau.
		2° A chaque repas de midi et du soir, prendre 2 à 3 comprimés.

(Prix :
15 fr.)

Traitement externe.	{	1 bain ou 2 par semaine dans lequel on aura fait dissoudre le contenu d'une boîte Salvenase (sels pour bains).

(Prix :
3 fr. 75)

Laboratoires LEGOUX, frères

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

Anciennement, 10, rue de Turcune — PARIS (IV)

SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche et des maladies des Voies respiratoires.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament héroïque, calmant énergique de la toux, anti-fébrifuge de premier ordre, médicament anti-grippal et anti-bronchitique, par excellence.

Indications :

Laryngites. Trachéites. Rhumes vulgaires. Bronchites aiguës. Bronchites chroniques dites négligées. Affections pulmonaires. Gripes et ses formes. Coqueluche et toutes les toux de l'enfant.

Deux formes :

Elixir (adultes) : 4 à 5 cuillerées à dessert par 24 heures.

Gouttes (enfants) : 10 gouttes par jour et par année d'âge.

Laboratoire Georges TINARD

134, Boulevard Pereire — PARIS (XVII^e)

SALYSÉRUM

du Docteur Jules SÉJOURNET

Composé cosalycilé

(*Communication Académie de Médecine.*)

Forme. — Ampoules de 2 cc. d'acide salicylique *indolore*.

Indic. therap. — Rhumatisme aigu ou subaigu, Pleurodynies, Torticolis, Lumbagos, Rhumatisme gonococcique, Sciatique, Goutte.

Doses. — 2 à 4 ampoules chaque jour injectées au point douloureux.

Prix : 20 fr. la boîte de 12 ampoules.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

SAMBUL

Médicament végétal, *sans colchique.*

Composition :

A base d'un suc extrait des baies du Sambucus Ebulus. Désodorisé.

Indications :

Goutte ; rhumatismes ; sciaticque ; névralgies ; lumbago ; migraines, etc.

Posologie :

Une cuillerée à café matin et soir, avant et à distance des repas. *N'est pas toxique ;* pas de contre-indications. Traitement à prolonger dans les cas chroniques rebelles de prime abord. Cures ininterrompues de 1 à 3 flacons.

Le flacon pour dix jours de traitement : 15 fr.

Littérature et spécimens médicaux
sur demande

Société des Laboratoires du SAMBUL
ÉVREUX — (Eure)

SANAS

Composition.

Extrait glycéринé concentré de foies frais de morue. Produit vitaminé, (facteurs A et D) sans trace d'huile, ne contient aucune substance irradiée artificiellement.

Préparation.

Sur les lieux mêmes de la pêche, dans les laboratoires du *Sanas*, à Saint-Pierre, Miquelon.

Formes.

- 1° Gouttes ;
- 2° Ampoules pour boisson. Spécialement indiquées pour les colonies et pays chauds.

Avantages.

Sans odeur ou saveur désagréables.
Contient sous un faible volume, les principes actifs des foies frais. Se prend aussi bien l'été que l'hiver.

Indications.

Toutes celles de l'huile de foie de morue.
Rachitisme. Prétuberculose. Anémie. Convalescence des maladies infectieuses. Adénopathies. Inappétence.

Posologie.

Enfants : Dose journalière : II à IV gouttes par année d'âge.

Adultes : Dose journalière : L à LX gouttes.

Mode d'emploi.

Une demi dose journalière avant chacun des deux principaux repas, dans un peu de lait, de bière, de vin, de potage ou mélangée à un aliment quelconque.

Prix du flacon : 12 francs.

A. WELCKER et C^{ie}

72, rue du Commerce — PARIS (XV^e)

SANDOPTAL

Acide isobutyl-allyl-barbiturique

Forme. — Comprimés dragéifiés dosés à 20 centigr. d'isobutylallylmalonylurée.

Propriétés. — Assure un sommeil tranquille et naturel, suivi d'un réveil euphorique. Index thérapeutique élevé. Tolérance parfaite.

Indications. — Toutes les insomnies.

Posologie. — Une dragée le soir avant de se coucher. Cas rebelles : deux à trois dragées (maximum quatre) à la fois.

Présentation. — Tubes de 10 dragées. Pour hôpitaux et cliniques : flacons de 100 et 500 dragées.

Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e)

M. CARILLON, pharmacien de 1^{re} classe.

Dépôt général et ventes :

Usine des pharmaciens de France,
125, rue de Turenne PARIS (III^e)

SANEDRINE

d - hydroxy - B - méthylamino - propyl - benzène.

Ephédrinesynthétique lévogyre, supérieure par sa pureté et sa constance d'action à l'alcaloïde naturel tiré de l'Ephedra.

Indications :

Asthme bronchique, Fièvre des foins, Hypotension, Dysménorrhée, Accidents allergiques, Ophtalmologie (Action mydriatique).

Posologie et mode d'emploi :

Deux à six comprimés à 25 milligr. par 24 heures, en prises espacées.

S'abstenir chez les hypertendus.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimiques
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

SANEX-INHALANT

Composition. — Liquide volatil antiseptique, à base d'essences aromatiques de pin sylvestre, de thym, de menthe, de camphre, de melaleuca de Gomène, d'eucalyptus, etc. Présenté en tube stilli-gouttes aluminium.

Avantages. — Permet de faire de très fréquentes inhalations antiseptiques sans appareil spécial ; il suffit de verser sur un mouchoir, quelques gouttes de SANEX-INHALANT et de respirer fréquemment les vapeurs qui se dégagent pendant plusieurs heures. Ne tache pas le linge. Odeur agréable.

Indications. — Affection du nez, de la gorge et des bronches ; en particulier Coryza, Sinusite, Rhume des foins.

Sur demande, envoi d'un spécimen à MM. les Docteurs.

Laboratoire BOISSY

49, rue Hoche, COURBEVOIE, près Paris.

Dépôt : Pharmacie MANTOUT, 3, rue de Scribe,
PARIS

SANGUIL

Reconstituant complet.

Composition. — Association de glycéro-phosphate de soude, phosphate tricalcique, fluorure de calcium, nucléinate de manganèse, oxalate de fer, méthylarsinate de soude, kola fraîche totale, noix vomique totale, surrénale, corps thyroïde.

Action thérapeutique. — Stimule la cellule nerveuse. Excite la nutrition. Régénère les globules sanguins. Tonifie l'organisme. Assure la reminéralisation complète par ses fixateurs opothérapiques.

Formes. — **Cachets**, la boîte de 42 : 15 fr. **Granulé** de goût agréable, la boîte : 13 fr.

Mode d'emploi :

Cachets : Un cachet avant chacun des trois repas.

Granulés :

Moins de 12 ans : deux cuillerées à café par jour.

De 12 à 18 ans : trois cuillerées à café.

Adultes : trois cuillerées à dessert.

A prendre au début des repas.

Laboratoires du SANGUIL

12, rue Saint-Gilles, Paris (III^e).

Téléphone : Archives 67-05.

SANLUOL

Arsenobenzol en comprimés.

Le Sanluol permet, sous une forme commode et bien tolérée, l'administration de l'arsenobenzol en comprimés, méthode préconisée par M. le docteur Ravaut.

Indications :

**Amibiase (prophylaxie et traitement).
Diarrhées, Entérites.**

Posologie et mode d'emploi :

Traitement : Deux à six comprimés à 10 centigr. par 24 heures, par séries de 8 à 10 jours.

Prophylaxie : Un ou deux comprimés par jour, une ou deux fois par semaine.

" SPÉCIA "

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

SANOFORMINE

Composition. — Bicarbonates alcalins, trioxyméthylène, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, menthol et essences aromatiques.

Formes. — Comprimés de dissolution facile et rapide dans l'eau tiède ou froide.

Prop. thérap. — Antiseptique, bactéricide, désodorisant puissant, astringent, décongestionnant et analgésique.

Indications thérapeutiques et posologiques.

1^o Toilette intime : 1 à 2 comprimés par litre.

2^o Métrites, leucorrhée, salpingites, etc., 2 à 3 comprimés par litre.

3^o Désodorisant : 12 comprimés pour un bain de pieds quotidien. — 10 comprimés par litre en lavage (plis de l'aîne, creux de l'aisselle).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e)

A Bruxelles :

LE MARINEL, pharmacien, 273, rue Victor-Rauter.

SANOGYL

Pâte Dentifrice antispirillaire pour prévenir et traiter les Pyorrhées alvéolaires Gingivites, Stomatites simples, mercurielles, bismuthiques, etc. — Prix : 5 fr.

SANORAM

Antiseptique puissant, en comprimés : ne coagule pas l'albumine. Recommandé en Chirurgie générale, traitement des brûlures, soins de la bouche, toilette intime, etc., etc. — Prix : 4 fr.

“ LA BIOTHÉRAPIE ”

131, Rue Cambronne PARIS (XV^e)

Téléph. : Vaug. 49-20

SANTAL-MIDY

Composition. — Essence de Santal pure obtenue par la distillation du bois de Santal citrin de Bombay, préférable au Copahu au Cubèbe et à l'essence de térébenthine.

Forme. — Capsules.

Caractéristiques. — Pureté de l'essence et dosage élevé (0 gr. 25) par capsule.

Indications. — Blennorrhagie, Inflammation de la vessie, Néphrite suppurée, Catarrhe de la Vessie, Catarrhe vésical des vieillards, Maladie de Bright, Cystite aiguë, Coliques néphrétiques.

Doses. — Dès que la maladie est déclarée, 10 à 12 capsules le premier jour. Augmenter de 3 à 4 capsules les deuxième et troisième jours. Diminuer progressivement la dose.

Diviser les doses en quatre parties que l'on prend à distance égale et chaque fois un quart d'heure avant les repas.

Laboratoire de Pharmacologie Générale
Dr Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS

SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène

Forme. — Capsules.

Compos. — Chaque capsule contient :

Essences balsamiques : 0 gr. 16

Bleu de Méthylène : 0 gr. 02

Dose. — 4 à 10 capsules par jour.

Action. — Antigonococcique, Antiseptique, Analgésique, Diurétique. Le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des Affections des Voies Urinaires.

Particularité. — Colore les urines en bleu.

Laboratoires MONAL & C^{ie}

26, rue Bridaine — PARIS

SANTHÉOSE

A base d'une diméthylxantine irrécusablement pure, associée selon les cas au *phosphate de soude*, à la *caféine* ou au *benzoate de lithiné*.

Forme :

Se présente en cachets en forme de cœur (dosés à 0,50 de principe actif) et existe sous 4 variétés :

1° **Santhéose pure** : Affections cardio-rénales, albuminurie. 2° **Santhéose phosphatée** : Scléroses, convalescences. 3° **Santhéose caféinée** : asthénie, asystolie, infections. 4° **Santhéose lithinée** : artério sclérose, rhumatisme, goutte.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour.

Propriétés thérapeutiques :

Diurétique, hypotenseur, toni-cardiaque, antitoxique.

Indications :

Toutes les affections justiciables d'un diurétique rénal direct.

Dépôt général :

4, rue du Roi-de-Sicile — PARIS (IV^e)

SAPOLAN

Onguent de Naphte spécial
Spécifique des Prurits. — Eczémas.
Psoriasis. — Lichens.

Sapocrème. — Crème de SAPOLAN. Adoucissante, antiprurigineuse. Dermites aiguës.
Prix : 40 fr.

Sapocade. — Sapolan et Huile de Cade.
Psoriasis. Séborrhée, Sycosis. Le tube : 40 fr.

Lait de Sapolan. — Erythèmes. Le flac. : 47 fr.

Lait de soufre-Sapolan : Acné. Le flac. : 47 fr.

Lait de Cèdre-Sapolan : Pityriasis et Séborrhée du cuir chevelu. Le flac. : 47 fr.

Poudre de Sapolan : Dermites aiguës.
La boîte : 40 fr.

Savon de Sapolan : Savon surgras au Sapolan : Peaux irritables. Prix : 5 fr.

Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS

34, rue de Turin — PARIS (VIII^e)

Détail: 116, bd Haussmann et toutes pharmacies.

SARCOPTOL

Solution à base de soufre colloïdal,
Une seule friction. sans bain, guérit la gale
sarcoptique d'une façon radicale.

Démangeaisons. — Séborrhée et états séborrhéiques, Epidermodermes microbiennes, Eczéma chronique, Eczémas impétigineux, Pityriasis, Chute des Cheveux, Alopecie,
Spécifique de la Gale.

Ni toxique, ni irritant, *d'un parfum agréable*,
supprime les démangeaisons, ne provoque
pas d'éruption cutanée, *ne tache* après friction,
ni le linge, ni la peau, d'un emploi simple,
propre, commode.

Laboratoire du SARCOPTOL,

5, rue Clauzel, PARIS (IX^e)

SARCOSERUM ISCOVESCO

Extrait abipurétique injectable de viande de bœuf
(amino-acides)

Posologie. — S'emploie en injections hypodermiques à la dose de 1 à 2 ampoules de 2 cc. par jour suivant les indications du médecin.

2 Formules :

Sarcoserum pur (étiquette rouge).

Sarcoserum aux adjuvants (étiquette bleue)
associé au cacodylate de soude et à la strychnine.

Indications. — Pré-tuberculose, tous les cas d'épuisement et de dépression, Convalescence des grandes pyrexies.

LIPOÏDES ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e)

Téléphone : Galvani 07.90

Adresse télégraphique : Lipoïdes — PARIS 54

SAVONS A°. MOLLARD

SAVONS MOLLARD A TOUS MÉDICAMENTS

SAVONS SULFUREUX DE TOILETTE
A°. MOLLARD

SAVONS FLUIDES MOLLARD
pour les soins du cuir chevelu
(cèdre, cade, sulfureux, panama)

LOTION A° MOLLARD A. LA PILOCARPINE

SAVON DENTIFRICE MOLLARD

POMMADE ALCALINO-SULFUREUSE MOLLARD

CRÈME SULFUREUSE DE SAVON MOLLARD
(affections squameuses du cuir chevelu)

Émile LANG et C^{ie}

2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux
PARIS (IV^e)

SAVON PÉRUSOL

Composition. — Baume du Pérou, Benjoin.

Propriétés. — Neutre, Balsamique, Antiseptique, adoucissant.

Formes et Indications :

a) *Savon de Toilette* : Toilette quotidienne, soins hygiéniques de la peau et des muqueuses.

Dermatoses superficielles. — Rougeurs, Acnés, Gercures, Engelures Dartses.

b) *Savon pour la barbe* : Sycosis, Dermites irritatives, Acné.

c) *Savon Liquide* : Chirurgie, Gynécologie, Soins de la Chevelure.

Tarif Médical très réduit.

Laboratoires HOURQUET et VIENNE

114, Rue du Temple — PARIS (III^e)

SOIALINE

Composition. — Acide diphenyl cinchoninique.

Action. — Favorise l'élimination de l'acide urique.

Augmente l'excrétion biliaire et la richesse de la bile en pigments.

Indications. — Goutte, Rhumatismes, Névralgies, Lithiase biliaire.

Contre-indications : Gravelle, Lithiase urinaire.

Doses. — Traitement curatif : 1 à 2 comprimés dissous dans un verre d'eau alcalinisée (1 cuillerée par jour après le repas.

Traitement préventif : 1 comprimé le matin après le repas pendant 10 jours (pris comme ci-dessus).

Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES

SCILLARÈNE " SANDOZ "

Compos. — Glucosides cristallisés, principes actifs isolés du Bulbe de la Scille.

Forme. — Comprimés à 0 millig. 8 de substance active : solution à 1/2000, ampoules p. injections intramusculaires profondes à 1 cc. dosées à 0 gr. 0005, suppositoires dosés à 1 millig.

Propriétés. — Produit pur, cardiotonique et diurétique. Pas d'irritation rénale ou gastrique. Pas d'accumulation.

Indications. — 1° Remplace la digitale quand elle n'agit pas ou n'agit plus; 2° Maintient la compensation; 3° Puissant diurétique dans les néphrites, *le diurétique azoturique vrai.*

Posologie. — 1/2 à 2 ampoules par jour, 1 à 2 suppositoires, 1 comprimé ou XX gouttes 2 à 8 fois par jour.

Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz. — PARIS (X^e)

Dépôt général et Vente ;

Usine des pharmaciens de France.

125, rue de Turenne — PARIS (III^e)

SCLÉRAMINE DAUSSE

(Cachets d'iode dissimulé).

Iodométhylate d'hexaméthylénététramine.

Produit cristallisé organique contenant 45 % d'iode dissimulé et permettant l'administration d'importantes quantités de ce métalloïde sans crainte d'iodisme. C'est, en outre, un antiseptique interne puissant par son radical hexaméthylénététramine.

Formes. — Cachets dosés à 0 gr. 25 de ce produit.

Indications. — Artério-sclérose, goutte, rhumatismes chronique et infectieux, rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme blennorrhagique, sciatique, tuberculose pulmonaire, emphyseme, arthritisme, tertiarisme, tabès, myélites, hypertension.

Posologie. — *Cachets.* — 2 cachets par jour, par périodes de 15 jours.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

SCLÉROSÉROL

Hypotenseur, Diurétique
Spécifique de l'Artério-sclérose

Composition. — Acide thyminique, Théobromine, Digitale, Lactose, Extrait de Gui, Silicate de Soude.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes, Rétention chlorurée, Athérome, Scléroses organiques et Préscléroses.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Dose :

3 à 6 par jour. Avaler les comprimés avec une gorgée de liquide et sans les écraser.

Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie Médicale.

40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE

SCLÉROSÉRUM

Traitement des Varices et des Hémorroïdes par les injections sclérosantes.

Formule. — Nouvelle formule à base de sels doubles de Quinine et d'Urée, en milieu hyper-sclérosant. (Employée dans les Hôpitaux).

Indications, technique et posologie. — Demander à notre Laboratoire l'opuscule traitant ces questions et contenant quelques-unes des observations prises dans les hôpitaux de Paris.

Avantages sur les autres solutions. — 1° Le plus actif des sels employés ; 2° absolument indolore pendant et après l'injection (jamais de crampe) ; 3° le moins réactionnel pour les tissus périvasculaires ; 4° nullement escharrotique à des doses permettant des scléroses étendues et complètes ; 5° sa présentation permet d'obtenir automatiquement tous les taux de solution désirables.

Laboratoires HOURQUET et VIENNE

114, rue du Temple — PARIS (III^e)

SCUROCAÏNE

Novocaïnum (Codex français 1908.)

Le moins toxique des succédanés de la cocaïne.

Solutions : à tous titres, additionnées ou non d'Adrénaline, pour tous usages anesthésiques.

Anesthésie par infiltration, tronculaire, rachidienne, épidurale, dentaire, oculaire, rhino-laryngologique.

Comprimés dosés à 5 centigr. avec ou sans Adrénaline. *Scurocaïne* cristallisée (chlorhydrate), nitrate de Scurocaïne, Scurocaïne basique.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

SCUROFORME

Paraminobenzoate de Butyle normal.

Anesthésique insoluble, non irritant, non toxique.

Indications :

Plaies, Brûlures de la peau, Ulcérations des muqueuses, Dysphagie, Pharyngites, Ulcères gastriques, Usages stomatologiques.

Présentation, mode d'emploi :

- 1^o Poudre en nature : Applications locales. —
- 2^o Poudre lactosée à 1/10^e : toilette du nourrisson. —
- 3^o Pastilles chocolatées à 2 centigr. : Stomatites, Pharyngites —
- 4^o Comprimés à 5 centigr. : Douleurs gastriques. —
- 5^o Solution huileuse ou glycérinée : Badigeonnages.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

SÉCACORNINE " ROCHE "

Compos. — Tous les principes actifs de l'ergot de seigle (*secale cornutum*) sous une forme soluble et injectable.

Action therap. — Stable, d'action sûre, régulière et constante, c'est un vaso-constricteur puissant, donc un hémostatique interne énergique, décongestionnant, augmentant la tension artérielle et régularisant le pouls.

Indic. Thérap. — a) *Action hémostatique.* Toutes les hémorragies internes, hémoptysies, hématomésés, entérorragies, ménorragies, etc. — b) *Action toni-cardiaque.* Myocardites infectieuses. — c) *Action décongestive.* Congestion pulmonaire, états congestifs de l'encéphale, congestion éthylque, etc. — d) *Action vaso-constrictive.* Diarrhées, leucorrhée, lochies persistantes, sueurs des phtisiques, etc. — e) *Action sur les fibres musculaires lisses.* — a) *Utérus.* — Atonie utérine, avant, pendant et après les accouchements et les avortements. — Troubles menstruels. — b) *Rectum et vessie.* — Polypes du rectum (injection sous-muqueuse). — Incontinence d'urine, spermatorrhée, etc.

Doses et mode d'emploi. — 1 centimètre cube ou 1 ampoule, ou 40 gouttes, ou 4 comprimés de Sécacornine " Roche " agissent comme 4 grammes de seigle ergoté.

Thérapeutique d'urgence. — 2 cc. ou 80 gouttes par voie buccale; ou 2 ampoules par voie hypodermique ou intramusculaire.

Doses moyennes. — 1/2 à 1 ampoule par jour, par voie hypodermique ou intramusculaire; 20 à 30 gouttes par jour, 1/2 à 1 cc. par jour, par voie buccale ou rectale; 2 à 4 comprimés par jour, par voie buccale.

Thérapeutique locale. — 2 cc. ou 2 ampoules par jour, en injections intra-utérines (atonie utérine); 1 cc. ou 1 ampoule par jour en injection sous-muqueuse (loco dolenti): Prolapsus du rectum.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
21, Place des Vosges — PARIS (III^e)

SEDATINE CHRISTIAENS

Formule. — Diiodo Salicylate de sodium, 2 g. 10 ; Solution q. s. pour 100 cc. En ampoules stérilisées de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Remplace la *Morphine* dans : Douleurs arthritiques, Sciatique, Lumbago, Névralgies cérébrale et intercostale, Vomissements incoercibles, Crises hépatiques.

Toxicité : Nulle. — Peut être laissée dans toutes les mains.

Forme. — Boîtes de 6 et boîtes de 12 ampoules de 2 cc.

A. CHRISTIAENS

2, rue du Champ-de-Mars, Reims.

SÉDATOSE

Tartrate borico-potassique
du Docteur André Gigon

Composition. — Tartrate borico-potassique chimiquement pur.

Forme. — Poudre desséchée.

Indications thérapeutiques. — Epilepsie.

Mode d'emploi et dose. — Cuillère-mesure dosant 50 centigr. : 6 à 10 par jour ; traitement prolongé.

Flacon de 40 gr.

Laboratoire du Doct^r André GIGON

7, rue Coq-Héron — PARIS (1^{er})

SÉDATULINE

Aérophagie-Palpitations

Composition. — A base de passiflore, ballote, cratægus, valériane (plantes stabilisées).

Indications. — Insomnies, états nerveux et spasmodiques, affections du cœur et des vaisseaux de l'estomac et de l'intestin.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin et le soir et la nuit si besoin avec un peu d'eau pure ou sucrée.

Prix : 14 francs.

P. BOUSQUET et E. LEROUX

Anciens internes des Hôpitaux

46, rue de la Barrière — ELBEUF

SÉDOBROL "ROCHE"

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré

Tablettes et liquide :

1 tablette ou 1 mesure = 1 gr. Na Br.

Mode d'emploi et doses :

Adultes : 1 à 5 tablettes ou mesures par jour.

Enfants : 1/2 à 2 tablettes ou mesures par jour, selon l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on verse une ou deux mesures de *Sédobrol* "Roche" liquide ou on fait dissoudre une ou deux tablettes : on prépare ainsi instantanément un bouillon particulièrement savoureux que l'on peut prendre à n'importe quel moment de la journée.

Prop. Thér. :

Médicament sédatif, hypnotique et calmant donnant des résultats certains et permettant d'imposer un *traitement bromuré intensif dissimulé*, tout en rendant agréable le régime déchloruré.

Indic. Thér. :

Insomnies, névralgies, excitabilité, irritabilité, gastralgies, dyspepsies, palpitations, cardiopathies, migraines, spasmes, convulsions, chorée, névroses, épilepsie, etc.

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS

SEDOGASTRINE

Sédatif gastrique.

Formes. Granulé, comprimés (avec bonbonnière de poche).

Composition. — 1° *Substances neutralisantes :*

Hydroxyde de magnésium. Carbonate de calcium léger précipité à froid. Bicarbonate de sodium.

2° *Substances modératrices de la sécrétion :*
Phosphate de sodium, Phosphate de calcium.

3° *Substance calmante et antispasmodique :*
Poudre de Ciguë à dose inoffensive, mais suffisamment active.

Propriétés thérapeutiques :

Sédation des phénomènes douloureux gastriques.

Réparation de la muqueuse de l'estomac.

Pas de constipation.

Pas d'accoutumance.

Indications. — Hypersécrétion.

Hyperacidité.

Dyspepsies douloureuses.

Spasmes.

Ulcères.

Posologie. — Après les repas et au moment des douleurs, prendre :

Granulé : une cuillerée à café.

Comprimés : deux à quatre jusqu'à sédation.

Prix : 9 fr. 50

Laboratoire P. ZIZINE

D^r en Médecine — D^r en Pharmacie.

Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux.

Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e)

Tél. : Diderot 28-96

SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine.

Mode d'emploi et dose. — 1° **Ampoules**
1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures;
2° **Suppositoires** 1 à 2 "supposédol" par
24 heures.

Prop. Thér. — Beaucoup plus actif que la
morphine à dose égale.

Indications. — Phénomènes douloureux.
Insomnies douloureuses. Cancers. Spasmes.
Crises tabétiques. Anesthésie chirurgicale.
Maladie de Parkinson. Accouchements, etc.

Etablissements Albert BUISSON

F. JALOT & Cie

157, rue de Sèvres — PARIS

SÉDONEUROL DEHAUSSY

Antispasmodique, Sédatif, Antialgique.
Pas d'accoutumance. — Pas de torpeur.

Composition.

Médication de base : Phényl-éthyl-malonyl-urée (gardénal).

Tartrate boricopotassique.

Correctifs et adjuvants : Atropine, Caféine (comprimés blancs), Strychnine (comprimés roses), à très faibles doses.

Médication énergique *renforçant l'une par l'autre l'action sédatrice* du gardénal et du bore, *permettant un même effet thérapeutique* avec des doses moins élevées de gardénal que lorsque ce dernier est employé isolément, *supprimant les inconvénients* de ce dernier (somnolence, dépression physique et intellectuelle) grâce aux correctifs auxquels on évite l'accoutumance en alternant leur administration dans les traitements de longue haleine (comprimés blancs et roses).

Formule, posologie et indications établies d'après les travaux de Pierre Marie, Crouzon, Bouttier, Carrière, etc.

Indications.

États spasmodiques. — Traitement de choix de l'*Épilepsie* dans toutes ses formes. — *Maladie de Parkinson* et *Parkinsonisme*. — *Asthme rebelle*.

États d'instabilité nerveuse. — *Insomnies rebelles, Anxiété, Instabilité des basedowiens et des hypertendus, Prurits sénils.*

Algies paroxystiques. — *Migraine, Angine de poitrine.* §

Enfants et nourrissons. — Toutes les manifestations spasmodiques de l'épilepsie, du croup, des laryngites striduleuses et aiguës, toux persistante des broncho-pneumonies, coqueluche, tétanie, états convulsifs, chorées, tics, vomissements spasmodiques du nourrisson, etc.

Posologie.

Épilepsie. — Doses progressivement croissantes jusqu'à suppression des crises. Commencer par quatre comprimés chez l'adulte, deux comprimés à cinq ans.

Autres indications.

Adultes, dose moyenne entre 4 et 8 comprimés. — **Enfants,** 1/2 comprimé par année d'âge. — **Nourrissons** (tolérance parfaite), 1/2 comprimé jusqu'à six mois, un comprimé de six à douze mois en deux prises.

(Un comprimé = 2 centigrammes et demi de gardénal).

Laboratoire DEHAUSSY

66, rue Nationale, LILLE

SEDORMID " ROCHE "

allylisopropylacétylcarbamide
(Chaque comprimé est dosé à
25 centigr.)

Propriétés :

Sédatif hypnogène doux et inoffensif, très maniable ; ne s'accumule pas.

Indications :

Toutes les Insomnies légères de quelque nature qu'elles soient ; Anxiété, Mélancolie, Symptômes hypernerveux, etc.

Doses et mode d'emploi :

Dose sédatif : 2 à 3 comprimés dans la journée.

Dose hypnogène : 1 à 2 comprimés au coucher.

Boîte de 20 comprimés.

Produits

F. HOFFMANN-LAROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS

SÉDOSINE

**Sédatif à action élective
sur le système neuro-végétatif.**

Association synergique hyperactive :

Dans la *Sédosine*, l'action antispasmodique bien connue de la Jusquiame se trouve considérablement renforcée par la présence du Cratœgeus et de la Passiflore, l'association des trois principes végétaux permettant d'obtenir un effet notable avec une dose réduite de Jusquiame.

Le mode d'association médicamenteux n'a, comme on sait, nulle part ailleurs, autant d'importance que lorsqu'il s'agit du Sympathique (Expériences de Danielopolu, de Garrelon, Santenoise et Tinel).

La *Sédosine*, à l'encontre des hypnotiques, agit par un véritable processus de détente et sans recourir à l'intoxication de la cellule nerveuse.

Indications :

États spasmodiques. Excitation nerveuse. Insomnie. Neurasthénie. Psychasthénie. Mé-lancolie.

Posologie :

Contre l'insomnie : 2 à 3 cuillerées à café prises en une seule fois avant de se coucher.

Sédatif nerveux : Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café ou davantage dans le courant de la journée, suivant tolérance du malade.

La *Sédosine* se prend en nature ou mieux dans un peu de tisane.

Laboratoires LECARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS

Téléphone : Maillot 17-75

SELAMON

Voir : **Magnétone**

page 469.

SEL DE HUNT

Alcalin type

Régulateur normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions digestives.

Indications. — Dyspepsies. Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Fermentations acides, de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie.

Forme. — Granulé friable.

Posologie. — Une à une cuillerée et demie à café dans 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 9 fr. le flacon

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT

16, rue de Boulainvilliers — PARIS

(Téléphone : Auteuil 20-21)

SEL HÉPATIQUE U. N. ARQUEVAUX

Composition. — Complexe alcalin hypersolvant de l'acide urique.

Forme. — Poudre blanche entièrement soluble.

Propriétés thérapeutiques. — Lixiviation de l'organisme par osmose isotonique; action désincrustante décuplée analogue à celle des stations thermales de Carlsbad, Contrexéville, Bagnoles. Dissolvant de l'acide urique, éliminateur de toxines. Laxatif. Stimulant des fonctions de l'estomac, du pancréas, du foie, des reins et de l'intestin. Régulateur du métabolisme physiologique.

Indications. — Traitement des troubles dus à l'acide urique (Rhumatisme, Goutte, Gravelle, Névralgies, Lumbago, Sciatique, etc.), de l'Artério-sclérose, des Phlébites et troubles trophiques; de la Constipation. Anti-acide. Anti-rhumatismal. Lithiases hépatique et rénale.

Posologie. — Une cuillerée à café rase (cinq grammes) dans 200 gr. d'eau, de préférence très chaude à prendre le matin à jeun 25 jours de suite.

Le flacon : 15 fr. (pour 25 jours de traitement).

L. ARQUEVAUX ☼

Pharmacien à Étampes (S.-et-O.)

Dépôt. — Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple, et 43, rue des Francs-Bourgeois, à Paris (III^e), et dans ses succursales d'Alger, Bordeaux, Lille, Lyon, Nice, Rennes, Rouen, Troyes, etc...

SELENIOL

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cmc (4 par boîte).

Action thérapeutique. — Le sélénol est une solution limpide de couleur brune; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

Indications. — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections cancéreuses, soit seul, soit associé à la Cytuline Gouturieux.

Laboratoires CH. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

SEPTICEMINE CORTIAL

Composition. — Di-formine iodobenzo-méthylée, cristallisée, dialysable, injectable, atoxique, indolore. Aucune réaction locale ou générale.

Propriétés. — Antisepsie intégrale, interne et externe, diffusion extrême jusque dans le liquide céphalo-rachidien. Chute de la température, régulière, complète, définitive. Microbicide et antitoxinique ; éliminateur hépatique et rénal.

Indications. — **Infections Aiguës médicales :** Grippe, encéphalite, broncho-pneumonie, fièvre typhoïde et paratyphoïde, Entérites aiguës, Fièvres éruptives, Paludisme, Affections rhinopharyngées.

Infections Chirurgicales : Septicémies, pyohémies, infections puerpérales. Appendicite, Erysipèle, Anthrax, Ostéomyélites, Péritonites tuberculeuses.

Forme. — Ampoules de 4 cc. et 10 cc.

Dose. — Septicémies à marche rapide : 8, 16, 20 cc. dans les 24 h. Septicémies à marche lente : 4 à 12 cc. dans les 24 heures.

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations. Pure ou étendue d'eau. Urologie, Gynécologie, Suppurations, Tumeurs ouvertes, Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

Stomatologie : pulvérisations alvéolaires et gingivales, injections intra-gingivales, circonscrivant le foyer infectieux.

Laboratoires CORTIAL

15, Boulevard Pasteur — PARIS

SÉRO-COMPRIMÉS MÉRIEUX

Composition :

A base de sérums polyvalents antidiptérique, streptococcique, staphylococcique de l'Institut biologique Mérieux, Lyon.

Indications :

Préventivement : dans tous les cas de contagion ou d'irritation de la gorge.
Curativement : dans le traitement local des diverses angines.

Mode d'emploi :

Prendre toutes les heures et le soir au coucher, un à deux comprimés qu'on laissera fondre lentement dans la bouche en évitant l'absorption trop voisine de liquides ou aliments.

Prix du flacon de 40 compr. : 12 fr. 50

S. SAVIGNEUX

Dépositaire général

63, rue Victor-Hugo — LYON

SÉRODAUSSE ANTITOXISENYL

Nature du produit.

C'est un sérum de jeune taureau, traité par du sérum de vieux bœuf. Il contient toutes les hormones circulantes des jeunes animaux et les anticorps des poisons séniles de Carrel, ces derniers apparaissant consécutivement à l'injection du sérum de vieil animal faite au jeune taureau.

Propriétés physiologiques.

Ce sérum, administré à des chapons ou à des vieux coqs, oriente l'animal vers la masculinité : il chante, devient combatif, sa crête se développe et prend un aspect sanglant, l'instinct sexuel s'éveille. Le chapon, en raison de la netteté de ses réactions, sert au titrage physiologique du SÉRODAUSSE.

Effets thérapeutiques.

Chez les vieillards des deux sexes, chez les sujets d'âge mûr, chez les individus jeunes atteints de sénilité précoce, le SÉRODAUSSE produit un effet d'invigoration avec plus grande aptitude au travail physique et intellectuel, de l'euphorie et une orientation du caractère vers l'optimisme.

Mode d'emploi.

Prendre, pendant six jours consécutifs, une ampoule de 15 c.c. le matin à jeun, 30 minutes au moins avant le petit déjeuner, dans un quart de verre d'eau sucrée.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e)

SÉRODAUSSE OVARIEN

(Sérum activé de génisse).

Nature du produit. — Ce sérum a été préparé en prélevant le sang de génisses traitées par les poisons séniles de CARREL. Il contient toutes les hormones circulantes, des jeunes animaux femelles et les anticorps des poisons de la sénilité.

Effets physiologiques et indications. — Il produit comme le sérum activé de taureau, des effets d'invigoration et d'euphorie chez les femmes âgées. En outre, et c'est là son effet spécifique, il fait disparaître les troubles de la ménopause physiologique ou chirurgicale (bouffées de chaleur, sueurs, vertiges). Il est également, indiqué contre l'insuffisance ovarienne des jeunes filles. Dans les convalescences, quel que soit l'âge de la femme, il hâte le retour des forces en suppléant aux déficits endocriniens si fréquents après les maladies aiguës.

Mode d'emploi. — Une ampoule le matin à jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner, dans un demi-verre d'eau, pendant six jours consécutifs chaque mois.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS

SÉRODAUSSE INFANTILE

Nature du produit :

C'est un sérum de jeune bovidé en période de croissance. Il contient les harmozones et hormones qui règlent le développement physique et intellectuel et la morphogénèse. Il est présenté en ampoules de 10 cm³.

Propriétés physiologiques :

Le Sérodausse infantile active la croissance et l'engraissement chez les enfants trop petits ou trop maigres. Cet effet est la conséquence d'une amélioration de l'appétit que produit ce médicament. Il facilite le développement intellectuel chez les arriérés.

Indication thérapeutique :

Le Sérodausse infantile est le médicament des arrêts de croissance, de l'amaigrissement, de l'atrepsie, des retards de la dentition et de la marche, des convalescences et de l'arriération mentale chez les enfants.

Mode d'emploi :

Prendre pendant 10 jours consécutifs, une ampoule de 10 cc., le matin à jeun, 30 minutes au moins avant le petit déjeuner, dans un quart de verre d'eau sucrée,

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS

SÉROMA

Sérum granulé, activé, total.

Composition :

100 gr. de Séroma contiennent :

Sérum normal d'équidés..	90 gr. 90
Sucre aromatisé.....	90 gr. 90
Calcium.....	0 gr. 05
Fer.....	0 gr. 30
Manganèse.....	0 gr. 15

Propriétés thérapeutiques. — Sérum total de sang artériel d'équidés soumis à une saignée unique, scientifiquement traité, stérilisé sans coagulation, rendu atoxique, stabilisé par dessiccation et activé par des co-ferments minéraux.

Indications thérapeutiques. — Surmenage, Fatigue cérébrale, Chocs moraux, Dépression, Hémorragies, Hémophilies, Hémoptysies. Dans les Affections chroniques, quelle que soit leur nature (tuberculose, cancer, paludisme, etc.), adjoint à la thérapeutique appropriée, il permet à l'organisme de résister, ainsi que dans toutes les maladies infectieuses.

Doses moyennes :

Adultes : 1 cuillerée à café de granulé deux fois par jour, un quart d'heure avant les repas.

Enfants : demi-doses.

Prix : 15 fr. le flacon
(pour une dizaine de jours de traitement).

Laboratoires REY

(Ludin) DIJON.

*Séroma contient près de son poids
de sérum activé.*

SÉROQUINOL INJECTABLE

Paludisme.

Traitement d'attaque des accès.

Composition. — Chaque ampoule contient :

Bibromhydrate basique de Quinine (Codex 1908)	0 gr. 50
Antipyrine.....	0 gr. 40
Cacodylate de soude	0 gr. 10
Glucose.....	0 gr. 10
Eau distillée.....	5 cent. cubes.

Forme :

Boîtes " A " — pour adultes — 6 amp. de 5 cm³.

Boîtes " B " — pour enfants — 6 amp. de 2 cm³.

Boîtes " DD " — pour adultes — 6 amp. de 5 cm³.
(double dose).

En Injections intra-musculaires ou sous-cutanées.
Absolument indolores (ne provoquant ni abcès, ni
eschares).

Tolérance parfaite très grande diffusibilité.

1 à 2 ampoules par jour, suivant la gravité des
accès, l'âge et le poids des malades.

Dépôt général :

Pharmacie Centrale de France.

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV^e)

SÉRO-SÉRUM RIVIER

Tonique — Hémopoiétique

Hémostatique

Rigoureusement désalbuminé.

Chaque préparation passe par un double service de contrôle.

Injectable, sans risque d'anaphylaxie.

Contient la totalité des éléments sériques (lipoïdes, hormomes, etc.), sauf les albumines.

Injection indolore.

Ampoules de 2 cm³ représentant 5 cm³ de sérum frais de cheval.

1 à 4 ampoules par jour, suivant la gravité des cas et d'urgence.

Laboratoires RIVIER

26 et 28, rue Saint-Claude,
PARIS

SÉRUM ANTI-ASTHMATIQUE de HECKEL

Composition. — Le Sérum de Heckel a pour base un extrait organique pur des glandes surrénales stabilisé dans un liquide isotonique.

Mode d'emploi. — Au moment de la crise, une injection sous-cutanée d'une demi-ampoule ou d'une ampoule.

Action. — L'excitation du pneumo-gastrique spasme les bronches et cause la crise d'asthme. Le sérum de Heckel en excitant le grand sympathique, annihile l'action du pneumo-gastrique et le spasme cessé.

Indications. — Toutes les formes d'Asthme, au moment des crises. Il est contre-indiqué chez la femme au terme de sa grossesse, et chez les cardiaques en imminence d'asystolie.

Présentation. — Sérum de Heckel pour adultes. 12 ampoules de 5 centicubes.

Sérum de Heckel infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes - PARIS - Tél. : Carnot 78-11

SÉRUM FERRUGINEUX FRAISSE

Composition :

Glycérophos. de Soude; 0 gr. 10; Cacodylate de Fer : 0 gr. 01; Cacodylate de Strychnine : 1/2 milligr., pour 1 cm³ d'eau distillée.

Indications :

Dynamogénique puissant : spécifique des anémies et de la chlorose.

Formes :

1^o En ampoules, boîtes de 12 ampoules : 16 fr.

2^o En gouttes, prix du flacon : 12 fr.

Laboratoires FRAISSE

8, Rue Jasmin, 8 — Paris

SÉRUM HYPOTENSIF FRAISSE

Composition :

Extrait de Gui : 0 gr. 05.

Nitrite de Soude : 0 gr. 01.

Indications :

Contre l'hypertension artérielle, l'artério-sclérose.

Formes :

1° En gouttes, prix du flacon : 12 fr.

2° En ampoules, boîte de 12 ampoules : 16 fr.

Laboratoires FRAISSE

8, Rue Jasmin, 8 — PARIS

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

Composition :

Glycérophosphate de Soude : 0 gr. 10 :

Cacodylate de Strychnine 1/2 milligr. ;
pour un cm³ d'eau distillée.

Indications :

Dynamogénique puissant. Active la phagocytose. S'emploie dans l'adynamie et la neurasthénie.

Formes :

1° En ampoules, boîte de 12 ampoules : 16 fr.

2° En gouttes, prix du flacon : 12 fr.

Laboratoires FRAISSE

8, Rue Jasmin, 8 — PARIS

SÉRUM NÉVROTONE

Composition. — Ampoules à doses progressives de glycérophosphate de soude et nitrate de Strychnine.

Action. — Combat l'anorexie, augmente le pouvoir phagocytaire du sang.

Indications. — Asthénies, Anémies, Chlorose, Anorexie, Tuberculose.

Doses. — Trois séries de 10 ampoules. Injecter une ampoule chaque jour en commençant par la série n° 1. Espacer les séries de 2 à 3 jours.

L'injection (sous-cutanée ou intramusculaire) est indolore.

Pharm. centrale de Belgique S. A.
12, rue du Téléphone — Bruxelles.

SÉRUM-VÉGÉTAL

du Docteur CUGUILLIÈRE
(antituberculeux)

Composition :

Essences d'ail finement distillées et indolores, sels de chaux d'origine végétale, diastases vivantes soufrées.

Références scientifiques :

Expérimentation sur des bovidés sous le haut patronage de M. le marquis de Castellane et sous le contrôle de l'éminent vétérinaire M. Faure, guérisons reconnues à l'examen anatomopathologique par le professeur H. Martin-Roux (hôpital Bichat à Paris).

Académie de médecine (séance du 10 mars 1908.) Travail scientifique : *Guérison de la tuberculose par l'ail*. En vente : Librairie Norbert Maloine, 27, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris.

Indications :

Tuberculose pulmonaire au début ; 75% de guérisons.

— — — 2^e période : 55% de —

(si l'état général n'est pas trop mauvais et que les lésions n'ont pas détruit entièrement la totalité du tissu noble).
— — — 3^e période : 25% de —

Tuberculose ostéo-articulaire (non suppurée)
99% de guérisons.

Tuberculose ostéo-articulaire (suppurée).
85% de guérisons.

Posologie :

Le sérum existe sous 3 formes : Ampoules à 5cm³ (adultes). Ampoules à 2cm³ 1/2 (enfants), et sirop où le sérum est mélangé à du sirop iodotannique et à de l'arrhénal.

Le sérum végétal du Docteur Cuguillière ne possède aucune toxicité et est employé depuis 21 années avec le plus grand succès par les plus éminents praticiens.

Dans les formes chroniques : *Enfants* : une injection de 2cm³ 1/2 par semaine, et une cuillerée à café de sirop par jour. *Adultes* : une injection de 5cm³ par semaine et une cuillerée à soupe de sirop par jour.

Dans les formes aiguës : *enfants* : 2 injections de 2cm³ 1/2 par semaine et 2 cuillères à café de sirop par jour. *Adultes* : 2 injections de 5cm³ par semaine et 2 cuillerées à soupe par jour.

Arrêter le traitement par le sérum en période d'accidents congestifs.

(Échantillons permettant un essai loyal.)

Laboratoires CUGUILLIÈRE

19, rue des Chalets, Toulouse (France).

SICOPION

Extrait d'Opium stabilisé

les alcaloïdes sous forme de chlorhydrates solubles.

Formes :

Ampoules correspondant à 1 centigr. de morphine.

Comprimés correspondant à 5 centigr.

de poudre d'opium.

Indications. — Celles de l'opium et de la morphine, à des doses moindres avec une toxicité très réduite.

Prix :

Ampoules, boîte de 6..... 18 fr.

— 12..... 26 —

Comprimés, flacon de 24..... 20 —

Préparé par la Société industrielle de Chimie organique à Sainte-Geneviève (Eure).

Dépositaire pour la vente et la publicité :

Établissements M. A. WOLLACKER

31, rue Saint-Georges — PARIS (IX^e)

SIDERARSAN

Réparateur général par excellence, fer et arsenic et glandes endocrines.

Forme. — Sirop. — Comprimés (opothérapie).

Posologie. — 3 cuillerées ou 3 comprimés par jour 0,005 de méthylarsinate de fer + extraits pluriglandulaires et oxyhémoglobine par cuillerée à soupe et par comprimé.

Indications. — Tuberculose, Anémie, Chlorosé, Paludisme, Neurasthénie, Surmenage, Troubles de la formation, Convalescence.

Echantillons gratuits sur demande.

Prix : Sirop : 18 fr. — Comprimés : 13 fr.

A. POURSAIN

Docteur en médecine,

2, avenue des Tilleuls, Melun.

Paris. Téléphone : Opéra 00-45.

SILGUINE

Composition. — Chaque comprimé contient :

0.05 Extrait sec stabilisé de gui de pommier.

0.01 Extrait sec d'aubépine.

0.10 Poudre de prêle.

0.03 Extrait de glandes endocrines mâles.

Action. — La "SILGUINE", à base de produits végétaux particulièrement assimilables, abaisse la tension artérielle, augmente la diurèse, tonifie le cœur. Elle comble le déficit des sécrétions endocrines particulièrement important au moment de la ménopause. Elle sature l'organisme de silice et empêche l'apparition de lésions athéromateuses et de l'artério-sclérose.

Indications. — Tous les symptômes de l'"Automnose", hypertension artérielle, artério-sclérose, céphalées, somnolence, vertiges, bourdonnements d'oreilles, troubles oculaires, troubles de la circulation, dyspnée nocturne, dyspnée d'effort, hémorragies, hémorragies cérébrales, accidents rénaux, accidents cardiaques.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés, avant chaque repas, 20 jours par mois.

Laboratoires G. REAUBOURG

1, Rue Raynouard, PARIS (XVI^e)

SILIOYL

Médication de base et de régime des carences siliceuses et des états artérioscléreux, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, l'est-à-dire la lésion initiale et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestérinée d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

Principe — L'adrénaline ne produit plus de lésion athéromateuse chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude (Professeur Goujet, *P. M. 1911*). — L'injection intra veineuse inoffensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeurs Sartory, Scheffler et Pélissier, *acad. Sciences, Août 1920*).

Composition. — Silicates de formule $\text{Si}^2 \text{O}^{12} \text{Na}^8$ et K^6 stables, solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

Emploi et doses. — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante par périodes de 20 jours par mois.

GOUTTES : Seule préparation titrée à 25 p. 100 de SiO_2 , X à XXV gouttes aux repas, matin, midi et soir.

COMPRIMÉS : Titrés à 0,50 de sel de soude et de potasse 1 à 2 compr. au repas, 3 fois par jour.

AMPOULES : Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures (Action rapide : préscleux, angor.)

Résultats. — Abaissement de la tension Mm et Ma. Viscosité ramenée à la normale. Élimination chlorurée. Diurèse. Action antiathéromateuse. Hypotension. Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

Indications. — 1° Action minérale tissulaire : Bacillose, Consolidation accélérée des fractures. Surdité (ionisation). États élastopatiques.

2° Artériosclérose. Hypertension, Aortite, Athérome aortique, Sclérose rénale, Angine de poitrine, Endartérite oblitérante progressive, Prophylaxie de l'athérome et de l'hémorragie cérébrale, Troubles cérébraux, Migraines. Vertiges, Paresse intellectuelle, Bourdonnements, etc. Otite scléreuse, Sclérose auriculaire. Troubles oculaires. Presbytie, Fatigue et Sclérose cardiaque, Anémie siliceuse.

· Échantillons — Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**
7, rue du Rocher — PARIS

Laboratoire CAMUSET
18, rue Ernest-Rousselle — PARIS

SILISODE

Forme. — Granulé.

Composition : Une cuillerée à café contient :

Silicate de soude 0 gr. 40

Benzoate de lithine 0 gr. 10

Dose. — Une cuillerée à café avant les repas, 15 à 20 jours chaque mois.

Action. — Hypotensive, antisléreuse.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes, Artério-Sclérose, Aortites, Angine de poitrine.

Laboratoires MICHELS

9, Rue Castex — PARIS

SINAHIN

Antidiabétique

Forme. — Pilules de Semen-contrà total.

Propriétés :

Traitement sans restrictions trop sévères dans l'alimentation normale.

Formule extraite des travaux d'Avicenne (Communication Académie de Médecine, décembre 1913.)

Posologie :

Trois à quinze pilules par jour.

Laboratoires CARTERET

15, Rue d'Argenteuil — PARIS

LE SINAPLASME

Cataplasme sinapisé instantané
du Dr **JEAN FAURE**

LE PREMIER EN DATE — LE PLUS RÉGULIER
LE MOINS CHER — LE MEILLEUR DE TOUS

— *ÉVITER LES CONTREFAÇONS* —

DUSSUEL et FAURE

AIX-LES-BAINS (Savoie).

SIROP DE BLANCARD

A l'iodure de fer inaltérable
10 cgr. par cuillerée à soupe.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à soupe par jour aux repas.

Propriétés. — Agent incomparable d'Hématopoïèse.

Indications. — Anémie, Scrofules, Lymphatisme, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée, Syphilis accidentelles ou constitutionnelles, suite de Gripes infectieuses, etc.

Prix : 11 francs.

BERTAUT-BLANCARD Frères,
64, Rue de La Rochefoucauld — PARIS

SIROP BRAHMA

Composition. — Sulfogaiacolate de potasse, benzoate de soude, codéine, dionine, aconit, belladone, grindéia.

Action. — Antiseptique puissant, régularise les sécrétions, les diminue. Calme rapidement la toux.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, laryngites, coqueluche, tuberculose au début.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe par vingt-quatre heures, une heure avant ou deux heures après manger, pur ou mieux dans de la tisane.

Laboratoires G. COULLOUX
416, rue du Pont — AUXERRE (Yonne).

SIROP COMPOSÉ AUX HYPOPHOSPHITES " FELLOWS "

Le réminéralisateur par excellence

Compos. — Potasse, chaux, fer, manganèse, sodium, quinine, strychnine.

Indicat. — Anémie, neurasthénie, maladies chroniques, affections pulmonaires, rachitisme, convalescence.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : tonique. 1 cuillerée à café à chaque repas; stimulant et tonique, 2 cuillerées à café aux repas. — Pour les enfants : De 9 à 12 ans, une demi cuillerée à café. 5 à 9 ans, un tiers de cuillerée à café; 1 à 5 ans, un quart.

Nota. — Pour obtenir les meilleurs résultats, avoir soin de toujours diluer le sirop dans de l'eau froide, dans la proportion d'un demi-verre d'eau pour une cuillerée à café de sirop.

Laboratoire ROBERTS & Co

SIROP FAMEL

Antiseptique. — Lactocréosote soluble. — Cicatrisant, non caustique bien toléré.

Calmant. — Codéine, Aconit.

Récalcificateur. — Lactophosphate de chaux.

Doses et mode d'emploi. — Adultes. — Une cuillerée à soupe le matin, avant déjeuner, et une le soir, au coucher; délayer dans infusion chaude non sucrée. En cas de besoin, 3^e cuillerée à midi.

Propriétés Thérapeutiques. — Calmant de la toux, puissant antiseptique du poulmon.

Indications Thérapeutiques. — Affections des bronches et du poulmon: bronchites chroniques, tuberculose, rhumes négligés. Comme adjuvant dans la grippe, coqueluche, rougeole, scarlatine, pour écarter les dangers de complications pulmonaires.

Prix : 10 francs.

16 à 22, rue des Orteaux. Paris (XX^e).

SIROP DU D^r GELINEAU

Composition :

Arsenic-Chloral-Bromuré.

Indications thérapeutiques :

Insomnie, Névralgie, Hystérie.

Posologie :

Une à deux cuillerées à bouche le soir au coucher.

Doses supplémentaires en cas de besoin.

Littérature et échantillons sur demande

Laboratoires J. MOUSNIER

9, bd Carnot, Bourg-la-Reine (Seine)

SIROP GRIBELL

Composition. — Baume du Canada, « *Prunus virginianus* », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble, Baume de Tolu.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — Adultes : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour, pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

Le flacon : 9 fr.

PÂTE GRIBELL

Même composition — Mêmes indications

La boîte : 3 fr. 25

SIROP GRIBELL POUR ENFANTS

Formule spéciale ne renfermant aucun principe opiacé.

Mode d'emploi. — Jusqu'à 7 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour. Au-dessus de 8 ans, par cuillerée à dessert, suivant l'âge.

Le flacon : 7 fr.

Laboratoires BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e)

SIROP LANCHAT

Composition. — Alc. f. Aconit (VIII gouttes + bromoforme I goutte).

Héroïne, 0 g. 002; Iodophosphate de codéine, 0 g. 015; Thiocol, 0 g. 20 p. cuil. à soupe.

Suppression des formalités inhérentes aux prescriptions de toxiques.

Indications thérapeutiques. — Dans toutes les *Affections des voies respiratoires*, toux rebelle à forme quinteuse, émétisante ou catarrhale, asthme, emphyseme, grippe, tuberculose...

Posologie. — 6-12 ans, 3 cuil. café p. jour; 12-15, 3 cuil. dessert p. jour; adultes 3-5 cuil. soupe p. jour. Éviter son usage chez les tout petits enfants.

Entre les repas pur, ou dans tisane, grog. ou lait tiède.

Littérature et échantillons

Prix : 12 francs.

Laboratoires COMTOS

F. CHANAL, pharmacien de 1^{re} classe
FESCHES LE CHATEL (Doubs)

SIROP LAXATIF GOBEY

Laxatif uniquement végétal, d'une douceur et d'une sûreté d'action inégalées. Le véhicule, pur jus de fruits, constitue une véritable friandise.

Doses et mode d'emploi. — De une demi-cuillerée à café à une cuillerée à soupe le soir, au coucher, suivant l'âge.

Indications thérapeutiques. — Le sirop Laxatif Gobey peut être employé dès le premier âge, chez les nourrissons. Sa composition en fait le médicament par excellence de tous les sujets délicats. Il est particulièrement indiqué chez la femme enceinte, les opérés, les enfants et les vieillards. Ne provoquant jamais le moindre trouble, il ne comporte donc aucune contre-indication et peut être utilisé par tous sans limitation de durée parce qu'il ne s'accompagne pas d'accoutumance.

Pris pendant deux ou trois semaines systématiquement au printemps et à l'automne, le sirop laxatif Gobey réalise une cure de désintoxication et constitue le dépuratif idéal.

Laboratoires GOBEY, 21, rue d'Aumale, PARIS

SIROP DE LA MATERNITÉ

Ext. de fl. pêcher 25 gr., Manne en larmes 20 gr.
Alcool 60 gr., Alc. de mandarine 5 gr.
Sirop q. s. pour 1 litre.

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à 2 mois
1/2 cuill. à café, au-dessus de 2 mois 1 à
2 cuill. à café.

Propriétés therap. — Laxatif pour enfants,
pouvant être donné à tout âge. Pas de co-
liques.

Indications. — Constipation Embarras gas-
trique. Pas de contre-indications.

L. LAURIN

86, Boulevard Port-Royal — PARIS

SIROP MAVER

Composition. — A base d'*hyposulfite de soude*, ayant subi une préparation spéciale, de benzoate de soude et de sulfo-gaïcolate de potasse.

Ne contient *aucun stupéfiant*, ni belladone, ni aconit.

Indications. — Toutes affections des *bronches* et des *poumons*. Médicament de choix des *tousseurs* habituels à *expectoration difficile*. Aucune contre-indication.

Posologie. — 4 à 5 cuillerées à soupe par jour loin des repas. Pour les enfants suivant l'âge, remplacer par cuillère à dessert ou cuillère à café.

Prix : 13 fr.

Établisse^{nts} M. A. WOLLACKER
31, rue Saint-Georges — PARIS (IX^e)

SIROP MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER.

Au monosulfure de sodium inaltérable et goudron.
Approbation scientifique de l'Académie de médecine
de Paris.

Indications thérapeutiques :

Succédané avantageux des eaux sulfureuses. Affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, lymphatisme, dermatoses, hydrargyrisme, bismuthisme.

Posologie :

Adultes : une cuillerée à soupe de sirop 2 à 3 fois par jour, une heure avant ou deux heures après les repas.
Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert : de 7 à 14 ans ; 2 à 3 cuillerées à café pour ceux de 2 à 6 ans.

Granules minéral sulfureux Crosnier.

Composition & indications thérapeutiques :

Celles du sirop.

Posologie :

2 granules = 1 cuillerée à soupe de sirop.

Laboratoires CROSNIER
6, rue Chanoinesse — PARIS.

SIROP MIREILLE

Le plus *agréable* au goût, le plus *actif*, pour le **traitement polyvalent** des **Affections de l'Appareil respiratoire**.

Calmant, sédatif, hypnotique, par : le bromhydrate de codéine, l'eau de laurier-cerise, l'aconit et la belladone.

Balsamique, antiseptique, diurétique, par : la terpine et le benzoate de soude du benjoin.

Expectorant, émollient, sudorifique, par : des extraits de plantes pectorales.

Doses par 24 heures et mode d'emploi :

Adultes : 4 à 6 cuillères à soupe.

De 10 à 16 ans : 3 à 6 cuillères à dessert.

De 2 à 10 ans : 2 à 6 cuillères à café.

Se prend à toute heure ; aucune contre-indication ; pas de toxicité ; pas d'intolérance ; pas d'accoutumance ; Une cuillère à soupe prise le soir au coucher dans une infusion chaude assure un sommeil paisible.

Prix au public : 10 fr. 50 (exempt d'impôt)

PATE MIREILLE

Mêmes propriétés : même composition (avec en plus : cocaïne et chlorate de potasse).

Même saveur plaisante.

Prix au public : 4 fr. 50 (exempt d'impôt)

Littérature et échantillons.

Laboratoires **LEGENDRE**

44 bis, Rue Nationale à LIMAY (Seine-et-Oise).

Téléphone : Mantes 484

Dépôt général pour la *France, Colonies, et Protectorats* : O. C. P.

71, Rue du Temple, à PARIS (III^e)

Pour la *BELGIQUE* s'adresser : M. RAMLOT
72, Rue, de l'Escaut à BRUXELLES-MARITIME

SIROP NOGUES

Composition :

Alcoolre d'aconit	{	āā.....	0,035
Teinture belladone			
Teinture de grindelia.....			0,08
Bromoforme.....			0,02
Codéine.....			0,02
Benzoate de soude.....			0,09
Sirop de Tolu, Desessartz, laurier-cerise.....			Q. S.
pour une cuill-rée à bouche.			

Dose et mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à bouche par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, incisif. pectoral.

Indications. — Toux quinteuses, bronchites, toutes affections de bronches.

Laboratoire NOGUES
11, rue Joseph-Bara — PARIS

SIROP PHÉNIQUE VIAL

Composition. — Sirop à base d'acide phénique, principe actif des goudrons.

Indications. — Trachéite, Laryngite, Bronchite aiguë et chronique, Asthme, Grippe, Coqueluche, Tuberculose pulmonaire, Hémoptysie, Bronchite fétide, Gangrène pulmonaire, toutes les Hémorragies, Diarrhées chroniques.

Action. — Antiseptique et désodorisant puissant; augmente la coagulabilité du sang, diminue les sécrétions.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à soupe par jour, pur ou de préférence dans une tasse de tisane quelconque.

LABORATOIRE
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
D^r PH. CHAPELLE, 8, rue Vivienne, PARIS

SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches.

- 1° Calme l'irritation et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques, grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, tolu, aconit, benzoate de soude.)
- 2° Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir, le spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique, par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthyl-lique, qui calme ces fibres aussi puissamment que la papavérine, sans en avoir la toxicité.

Dose pour les adultes. — 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Doses pour les enfants. — 2 ans : une cuillerée à café matin et soir; 5 ans : 3 à 4 cuillerées à café par jour; à 10 ans : 5 à 6 cuillerées à café.

Laboratoires DEHAUSSY

66, Rue Nationale — LILLE

SIROP " ROCHE "

AU THIOL

1 cuill. à soupe de Sirop " Roche " = 1 gr. de Thiocol " Roche ".

1 gr. de Thiocol " Roche " = 0,52 cgr. de galacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour; Enfants : 2 à 4 cuill. à café selon l'âge.

Prop. Thér. — Antiseptique pulmonaire. Phagocytogène. Eupeptique. Orexique.

Indic. Thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques. Grippe. Pneumonie. Coqueluche. Scrofule. Anémie. Rachitisme. Dyspepsies. Entérites. Diarrhées, etc.

Produit F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, place des Vosges — PARIS

SIROP DE SIRTAL

Composition. — Tricrésol sulfonate de calcium, dérive d'un monophénol, le Crésol, qui est lui-même un des constituants de la créosote; aucun autre agent sédatif, opiacé ou hypnotique.

Propriétés. — C'est au Tricrésol que sont dues les principales propriétés antiseptiques et balsamiques de la créosote. Il présente les propriétés physiologiques de la créosote et ne détermine jamais aucun phénomène d'intolérance des voies digestives.

Applications thérapeutiques. — Puissant sédatif de la toux par antiseptie pulmonaire. Indiqué dans toutes les maladies des voies respiratoires accompagnées de catarrhe, de toux et d'expectoration : rhumes, bronchites aiguës, bronchites chroniques, congestions pulmonaires, emphyseme, grippe, dilatation des bronches, broncho-pneumonies, pneumonies, tuberculose pulmonaire dans ses formes à marche lente, torpides, sans hémorragies, avec expectoration abondante.

Doses :

Pour l'adulte : 4 à 6 cuillerées à soupe par jour ;

Pour l'enfant : 4 à 6 cuillerée à café.

Ces doses peuvent être augmentées suivant les cas

Laboratoires CLIN

PARIS

SIROP TINARDON

Iodo-tannique phosphaté

Contenant pour 100 cc³ :

Iode bi-sublimé..... 0 gr. 15

Extrait sec de ratanhia... 1 gr. 10

Lactophosphate de chaux. 2 gr. 25

Sirop d'orange q. s. pour 100 cc³.

Posologie. — 2 ou 3 cuillerées à soupe suivant l'âge. (Le flacon contient environ 30 cuillerées à soupe).

Indications. — Lymphatisme, Adénopathies, croissance difficile.

LABORATOIRE OBERLIN

J. TINARDON,

Pharmacien de 1^{re} classe de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet, Paris.

SISTOMENSINE CIBA

Substance lipoidique extraite de l'ovaire, insoluble dans l'eau.

Action physiologique. — Equilibre la fonction menstruelle, limite et régularise le flux cataménial. Agit efficacement sur les douleurs dysménorrhéiques.

Indications.

- I. — Flux menstruel trop abondant, ménorragie essentielle des jeunes filles.
- II. — Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.
- III. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.

Comprimés, Ampoules.

Doses. — 3 à 6 comprimés par 24 heures : 1 ou 2 ampoules.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

Le — de 100 — : 30 francs.

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

(Voir Agomensine)

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

SODERSEÏNE

Indication. — Coqueluche.

Composition. — Bismuth colloïdal obtenu par électrolyse.

Forme. — Solution sans saveur et d'une innocuité absolue. (Ce qui en rend l'emploi facile même chez les nourrissons).

Doses journalières.

Enfants jusqu'à 6 mois 100 gr.

— de 6 mois à 2 ans 150 gr.

— de 2 ans et au-dessus 200 gr.

(Echelle de doses sur le flacon)

Prix du flacon de 500 gr. : 10 francs.

J. DEPRUNEAUX, Pharm. de 1^{re} Classe

18, Rue de Beaune et 31, Rue de Verneuil
PARIS (VII^e)

SODOLACTINE

(Estomac.)

Poudre soluble, n'agissant ni comme un alcalin, ni comme un absorbant, ni comme un isolant. De goût très agréable, la *Sodolactine* est le médicament de choix dans la plupart des affections stomacales.

La *Sodolactine* ne modifie pas le chimisme du contenu gastrique, elle facilite physiquement l'évacuation de l'estomac. Non laxative.

Outre son activité, facile à vérifier, elle a l'énorme avantage de constituer un traitement très économique.

Posologie :

Une mesure dans une tasse à thé d'infusion ou d'eau tiède.

Après les repas : Hyperchlorhydrie. Dyspepsies hypersthéniques, Aigreurs, Brûlures, Ulcérations, Affections atteignant l'orifice pylorique, Vomissements et nausées de la grossesse. Vomissements des nourrissons :

(une cuillerée à café dans un biberon de 120 c/c d'eau bouillie, faire prendre 1 à 2 cuillerées à soupe de cette solution après chaque tétée.)

Avant les repas (un quart d'heure) et le matin à jeun : Hypochlorhydrie, Dyspepsies simples, Dilatations, Atonies gastriques, Digestions laborieuses, Mal de mer.

Remarque importante. — La *Sodolactine* agissant d'une façon physique et non chimique, bien respecter la concentration indiquée : *une mesure par tasse à thé de liquide.* (A titre indicatif une tasse à thé 120 c/c ou 8 cuillerées à soupe.)

Laboratoires GERDA

93, rue de Marseille — LYON.

SODOTHIOL

Composition :

Solution stérilisée pure, isotonique, injectable de thiosulfates alcalins.

Forme pharmaceutique :

Ampoules de 2 centicubes préparées pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

Indications thérapeutiques majeures :

Affections hépatiques. — Coliques hépatiques, Lithiase biliaire, Angiocholite lithiasique, Cholécystite calculueuse, Cholémie simple, Ictère catarrhal ou émotif, Hépatisme de Roger Glénard.

Manifestations Arthritiques. — Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Gravelle, Anurie calculueuse, Calculs vésicaux, Rhumatisme noueux déformant, chronique Ankyloses fibreuses articulaires, Otosclérose, Otospongiose.

Indications thérapeutiques secondaires :

Dermatologie. — Eczémas, Acnés, Accidents cutanés récidivants ou prurigineux.

Etats Congestifs chroniques des muqueuses respiratoires

Mode d'emploi :

A. *Cure d'Assaut.* — 10 injections, une tous les jours.

B. *Cure de Fixation.* — 10 autres injections 15 jours, puis deux mois plus tard.

C. *Cure d'Entretien.* — 10 injections six mois, puis 1 an après la première série.

Dans le cas de Rhumatismes chroniques noueux ou déformants et quelques affection cutanées récidivantes, la *Cure d'Assaut* comprendra 20 injections à raison d'une par jour, complétée d'une *Cure de Complément A bis* après 15 jours de repos.

Le *Sodothiol* étant dépourvu de toute toxicité son usage pourrait, s'il en était besoin, être prolongé tout le temps jugé nécessaire.

Incompatibilités :

Acides, Sels acides, Iodures.

Prescrire :

Sodothiol : 1 boîte d'Ampoules.

Prix, la boîte de 10 ampoules : 20 francs.

**LABORATOIRE DE MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue de Malherbe, Beauvais (Oise).

Echantillons et littérature médicale sur demande.

SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate
de Bismuthyle.

Indications :

Le Solmuth s'emploie en *injections intra-musculaires* dans le traitement de la syphilis à toutes périodes. Tolérance parfaite; élimination complète, sans dépôt huileux ou bismuthique intra-musculaire. Activité supérieure à celle des sels insolubles de bismuth, action stérilisante aussi rapide que celle des arsenicaux en solution aqueuse.

Mode d'emploi :

2 injections intra-musculaires de une ampoule de 1 cc. par semaine.

Présentation :

En boîte de 12 ampoules de 1 cc. (une ampoule contient 4 centig. Bi-métal par cc.).

Prix de vente au public :

25 francs la boîte de 12 ampoules.

Laboratoire **L. LECOQ et F. FERRAND**
14, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine).

SOLUBAÏNE

Solution au millième d'Oubaine Arnaud

Cardio-tonique énergique, diurétique puissant.

Indications. — Toutes les insuffisances aiguës ou progressives du cœur gauche. Toutes les insuffisances du cœur droit : Dilatation aiguë, Insuffisance mitrale, Insuffisance cardiaque droite fonctionnelle parlésions pulmonaires ou complications pulmonaires, Asthénie du myocarde due aux maladies infectieuses, Insuffisance cardiaque des vieillards.

Doses. — Petites doses d'entretien prolongées : XX gouttes par 24 heures. Doses moyennes : XXX à L gouttes par 24 heures. Doses massives : L à CL gouttes par 24 heures.

Fractionner les doses en 3-4 fois dans la journée.

La Solubaïne permet d'administrer l'Ouabaïne Arnaud par voie buccale; elle est aussi maniable que la solution de Digitaline Nativelle.

Echantillon et Littérature

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e)

SOLUCAMPHRE DELALANDE

Dérivé du camphre naturel, soluble dans l'eau succédané de l'huile camphrée

Avantages. — Injection facile et indolore. Résorption immédiate d'où action plus vive et plus vigoureuse. Injection intraveineuse sans danger. Toxicité nulle.

Action physiologique. — L'action du Solucamphre rappelle en tous points celle du camphre. Il agit sur le myocarde en renforçant les contractions et sur le pneumogastrique en régularisant celles-ci.

Mode d'emploi :

De 2 à 8 cc. par jour en médecine.

De 10 à 15 cc. par jour en chirurgie.

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules de 1 cc., 2 cc., 5 cc.

Prix : 6 amp. à 1 cc., 9 fr. ; 6 amp. à 2 cc., 12 fr. ; 6 amp. à 5 cc., 17 fr.

MICHEL DELALANDE

13, rue Lacharrière, Paris (XI^e).

SOLUPROTINE ROCHE

Solution à 10 % de Protéine Solubilisée.

(PEPTONE de CASÉINE " ROCHE ")

de composition constante, stérilisable et inaltérable.

Indications. — *Toutes les indications de la Protéinothérapie :* Rhumatismes. Infections. Septicémies. Gonococcies. Salpingites. Kératites. Sycosis. Furunculose. Tuberculose, et en général, toutes les fois que l'on cherche à déclencher ou à stimuler les réactions défensives de l'organisme.

Doses et mode d'emploi. — *Injections intra-musculaires.* — Etats aigus : doses croissantes de $1/4$, $1/2$, puis 1 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

Etats subaigus et chroniques : doses croissantes de $1/2$, 1, puis 2 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

Injections endoveineuses. — Etats aigus ou subaigus : diluer $1/4$ ou $1/2$ cc. dans 10 cc. de solution physiologique pour chaque injection et faire l'injection tous les 3 ou 4 jours.

N. B. — *Les injections intramusculaires et endoveineuses sont parfaitement indolores ; elles donnent lieu quelquefois à des réactions assez violentes, dont l'intensité varie avec chaque malade (choc protéique). Il peut y avoir des sueurs, de la fièvre, des frissons, etc. qui sont l'indice de la réaction défensive de l'organisme.*

Boîte de 12 ampoules de 1 cc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS (III^e)

SOLUROL

(Acide thyminique pur)

Prop. thér. — Éliminateur physiologique de l'acide urique. Traitement de la diathèse urique sous toutes ses formes.

Formes. — Comprimés dosés à 25 centigr.

Doses et mode d'emploi. — Crises aiguës : 5 à 7 comprimés par jour. Cures périodiques : 3 à 4 comprimés par jour. Ecraser les comprimés pour les avaler.

Remarque. — Le Solurol doit faire l'objet de cures périodiques chez tous les malades, qui ont à redouter le retour d'accidents uriques. Ces cures devront de préférence avoir lieu au printemps et à l'automne surtout chez les gouteux. Elles dureront chaque fois 3 à 4 semaines, au minimum.

Laboratoires CLIN
PARIS

SOLUTION BARDET

à l'Extrait sec de Quinquina.

Adoptée par le Ministère des Colonies.

Médaille d'Or, Strasbourg 1924.

Composition. — Solution sans sucre, ni alcool, contenant 0 gr. 50 de principes actifs par cuillère à soupe et titrant au minimum 10 % d'alcaloïdes totaux.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique et reconstituant énergique contre l'Anémie, la Chlorose, le Lymphatisme et dans toutes les Convalescences.

Fébrifuge puissant à forte dose contre les Fièvres intermittentes, le Paludisme et toutes Maladies fébriles.

Mode d'emploi. — Comme *Tonique et Reconstituant* : Adultes : une cuillère à soupe.

Enfants : Une cuillère à café au début des deux principaux repas.

Comme *Fébrifuge* : 4 à 5 cuillères soupe dans les 24 heures.

Se méfier des nombreuses contrefaçons et imitations.

Formuler : « **SOLUTION BARDET** »

Echantillons et Littérature :

Laboratoires BARDET

Fondés en 1860

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e)

SOLUTIONS DU D^r CLIN

1^o A salicylate de soude. 2^o Au salicylate de lithine. 3^o A l'antipyrine.

Avantages. — Pureté et tolérance garanties.

Formes et doses. — 1^o Solution du D^r Clin au salicylate de soude dosée à 2 gr. par cuill. à soupe. 2 à 4 cuill. à soupe par jour.

2^o Solution du D^r Clin au salicylate de lithine, dosée à 1 gr. par cuill. à soupe. 1 à 4 cuill. à soupe par jour.

3^o Solution d'antipyrine du D^r Clin, dosée à 1 gr. par cuill. à soupe. 1 à 3 cuill. par jour.

Remarque. — Grâce à leur véhicule spécial, les solutions du D^r Clin assurent la tolérance et la diffusion du médicament et se sont acquises à ce point de vue, une réputation bien connue.

Laboratoires CLIN
PARIS

SOLUTION LAROYENNE

Composition :

Succinate d'ammoniaque, valérianate d'éthyle, bromure de potassium.

Indications :

Spécifique contre toutes les formes de l'agitation nerveuse.

Posologie :

Une cuillerée à café, dans un peu d'eau avant chacun des trois repas.

Laboratoire DUREL

7, Boulevard Denain, Paris.

SOLUTION PAUTAUBERGE

Composition. — Créosote, 0 gr. 10; chlorhydro-phosphate de chaux, 0 gr. 50; par cuillerée à soupe.

Action. — Absorbée par l'appareil digestif, éliminée par les poumons, la créosote combat les deux foyers de la Tuberculose et des Infections à flores associées.

Le **chlorhydro-phosphate de chaux** recalcifiant et reconstituant.

Indications. — Affections pulmonaires, Convalescence de pleurésie, Broncho-pneumonie, Grippe, Rougeole, Coqueluche, Scrofule.

Dose. — 2 à 3 cuillerées à soupe par jour

Prix : 15 fr. le flacon de 350 cm³.

Laboratoires L. PAUTAUBERGE,

10, Rue de Constantinople — PARIS (VIII^e)

SOLVOSCLÉROSE

Composition. — Silicate de soude chimiquement pur. Extrait de gui frais stabilisé. Peptone iodée sèche.

Action. — Hypotensive, diurétique, déchlorurante.

Indications. — Artério-sclérose, Athérome, Aortite, Angine de poitrine; Troubles de la circulation : Vertiges, torpeur intellectuelle, Affaiblissement de la vue, Paresse auditive et Bourdonnement d'oreilles, Refroidissement et Engourdissement des extrémités, Crampes, etc.

Forme et posologie. — Comprimés vernis solubles dans l'intestin : 5 par jour (1 le matin, 2 à midi, 2 le soir) avec une gorgée d'eau 10 minutes avant les repas.

Prix : 15 fr.

E. GAUCHON, docteur en pharmacie
83, boulevard de la Villette — PARIS (X^e)

SOLVURIC**Forme :**

Granulé effervescent à base de formine et de benzopyruvate de soude et de lithine.

Indications :

Arthritisme, Goutte, Gravelle, Artériosclérose, Antisepsie urinaire.

Doses .

2 à 4 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau.

Laboratoire P. MAUCHANT

14, rue de Birague — PARIS (IV^e)

SOMNIFÈNE " ROCHE "

Dialcoyl-barbiturates de diéthylamine.

Le plus maniable des hypnotiques.

C. F. trav., observ., serv. des Professeurs Raviart, Abadie, Claude, Crouzon, Laignel-Lavastine, Weiss, Etienne, Anglade, Roger, Perrens, Cloetta, Gelma, Combemale, Fredet, Cleisz, Gayet, S. Banus et des D^{rs} Perlis, Vullien, Assoignon, Kindler, Boisnière, Jourdan, Journiac, de Teyssieu, Hamant, Bénéch, Redonnet, G. et D. Bardet, etc., etc.

Indio. therap. — Toutes les insomnies simples ou compliquées, Agitation, Délire, Convulsions, Troubles mentaux, Troubles nerveux, Epilepsie, Tétanos, etc.

SOMNIFÈNE " ROCHE " Gouttes

XXX gouttes = 1 cc.

Solution aromatisée pour atténuer la saveur spéciale du produit, ne pouvant être utilisée pour injections, permettant de donner à chacun sa dose, que l'on peut ainsi augmenter ou diminuer à volonté.

Doses habituelles. — XXX à XLV et LX gouttes (et plus) dans 1/2 verre d'eau ou de tisane, 1/2 heure avant de se coucher ou dans la nuit.

Enfants : V à X et XV gouttes (selon l'âge).

SOMNIFÈNE " ROCHE " Ampoules

Ampoules de 2 cc.

pour injections intra-musculaires

1 à 3 ampoules (Intolérance gastrique, refus du malade, agitation intense, troubles mentaux, etc.)

Ampoules de 5 cc.

pour injections indoveineuses

Anesthésie Obstétricale et Chirurgicale.

Cas graves de psychiatrie.

Produits

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

SOMNOTHYRIL

(Traitement de l'insomnie)

Composition :

Diéthylmalonylurée, Analgésine, Thyroïdine, Salicylate de Physostygmine.

Une pilule = 0,20 Diéthylmalonylurée.

Caractéristiques. — *Actif dans les insomnies les plus rebelles à des doses fort au-dessous du seuil de toxicité. Pas d'accoutumance. Sommeil calme. Réveil agréable, Action sur le système nerveux de la vie de relation, sur le système nerveux de la vie végétative et les glandes endocrines.*

Indications thérapeutiques :

Toutes insomnies et particulièrement insomnies rebelles, Anxiété, Excitation psychique et maniaque, Cures de désintoxication.

Mode d'emploi :

Avaler sans sucer ni croquer avec un demi-verre d'eau ou de tisane.

D'une façon générale, prendre le premier soir une pilule deux heures environ après le repas.

En cas d'efficacité insuffisante, porter le lendemain la dose à deux (2) pilules prises au même moment.

Dans de rares cas, il est utile de maintenir cette dernière dose pendant 2 ou 3 soirs, pour obtenir l'effet recherché.

Ne pas dépasser trois pilules (3) par dose et par vingt-quatre heures.

Laboratoires CANTIN
à PALAISEAU (S.-et-O.)

SONERYL

Butyléthylmalonylurée.

Action hypnotique très sûre, propriétés sédatives marquées, sans effets toxiques ni phénomènes d'accoutumance.

Indications :

Insomnies de toute nature, notamment celles causées ou entretenues par la douleur.

Posologie et mode d'emploi :

Deux comprimés à 10 centigr. le soir au coucher. Répéter cette dose dans la nuit en cas de besoin.

Dose maximum (adultes) 6 comprimés par 24 heures.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

SOPORALOSE

Principe actif. — Anhydroglucotrichloréthanol chimiquement pur.

Propriétés physiques. — fines aiguilles cristallines, légèrement amères, peu solubles dans l'eau.

Action physiologique. — Son action est sur le système nerveux, localisée au cerveau. Agit à faible dose comme hypnotique, à dose plus forte comme anesthésique.

Sans action sur la circulation, la respiration, la digestion. Non toxique, élimination parfaite, accoutumance nulle.

Action thérapeutique. — Provoque un sommeil calme et exempt de rêves, sans sensation désagréable au réveil.

Posologie. — Dose normale moyenne : 0 gr. 30.

Usage. — Contre toutes insomnies simples ou provenant de causes passagères, de fatigue, de surmenage, de soucis, de neurasthénie.

Convient remarquablement aux cardiaques, dyspeptiques, artérioscléreux, vieillards, tuberculeux.

La boîte de 12 cachets : 10 francs.

Fabricants : POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

SOPORIGÈNE DELQUÉ

Composition. — Cachets de buthyl-éthyl-malonylurée, dosés à 20 centigrammes.

Action thérapeutique. — Hynoptique, analgésique.

Avantages. — Le moins toxique des hypnotiques, ne laisse au réveil aucune sensation désagréable, procure un sommeil parfait.

Indications. — Toutes les insomnies nerveuses et douloureuses.

Mode d'emploi. — 2 cachets par jour au maximum, dans un peu d'eau, 1/2 heure avant le sommeil, à une heure de distance des repas.

Prix : 8.50 la boîte de 10 cachets.

Laboratoires J. M. RICARDOU

Docteur en Pharmacie.

46, Rue Pierre-Charron — PARIS

SORNYAL

Produit supérieur au Benzoate de Benzyle, dont il ne présente pas les inconvénients et contenant tous les dérivés benzyliques en association médicamenteuse.

Deux présentations : 1^o *Gouttes* ; 2^o *Comprimés*.

GOUTTES. — Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse :

Asthme vrai (ou essentiel). Coliques hépatiques ou néphrétiques. Constipation et diarrhée spasmodiques. Hoquet persistant. Coqueluche. Hypertension.

Posologie. — V à XL gouttes 4 à 5 fois par jour.

COMPRIMÉS. — Spécifique de la DYSMÉNORRHÉE (Règles douloureuses).

Posologie. — 2 comprimés à un quart d'heure d'intervalle, 6 à 10 par jour.

Gouttes : Le flacon : 12 fr.

Comprimés : La boîte de 12 tubes de 10 : 10 fr.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE O. * O. I. *

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e)

SPASMALGINE " ROCHE "

Antispasmodique vrai.

Composition. — 4 ampoule ou 1 comprimé contient :

- A. 1 centigramme PANTOPON " ROCHE " (Opium total injectable).
 B. 2 centigrammes PAPAVERINE " ROCHE " (Alcaloïde de l'opium le moins toxique, à propriétés spasmolytiques spéciales).
 C. 1 milligramme ATRINAL " ROCHE " (Ether sulf-atropine, sans action sur le centre parasympathique).

Propriétés. — Les propriétés antagonistes des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine " Roche "* expliquent la *toxicité atténuée* de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

Indic. thérap. — Tous les états spasmodiques, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation ante et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyperexcitation, etc.

Dose et mode d'emploi :

- | | | |
|---|---|--|
| Voie buccale | { | Dose moyenne : 1 à 2 comprimés par jour. |
| | | Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour. |
| Voie hypodermique
ou
intramusculaire. | { | Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. |
| | | Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour. |

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS

SPASMINE JOLLY

Sédatif de choix du système nerveux.
Combinaison physiologique stabilisée de
Valériane fraîche et Aubépine.
Odeur et saveur agréables.

Forme. — Elixir dosé à 0 gr. 10 par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — 4 à 6 cuillerées à café par 24 heures; 1/2 dose pour les enfants.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, hypnotique et hypotenseur, régulateur cardiaque.

Indications. — Névropathies et Cardiopathies.

Echantillons et Notice sur demande.

Prix du flacon : 12 francs.

Laboratoire L. JOLLY

1, rue Christine — (PARIS (VI^e))

SPASMOSÉDINE

Antispasmodique — Sédatif nerveux.

(Thérapeutique cardio-vasculaire).

Composition :

Phényléthylmalonylurée	0 gr. 015
Bromhydrate de quinine	0 gr. 05
Extrait de Cratægus stabilisé	0 gr. 05
Excipient q. s. pour 1 comprimé.	glutinisé

Présentation :

Comprimés glutinisés.

Indications & Posologie :

- a) *Palpitations, extrasystoles, instabilité cardiaque.*
1 à 2 comprimés avant chacun des 2 principaux repas (10 jours par mois).
- b) *Tous les troubles fonctionnels consécutifs aux spasmes vasculaires de l'hypertension (céphalée, bourdonnements d'oreilles, éblouissements, vertiges, etc...)*
1 à 2 comprimés avant chacun des 2 principaux repas (10 à 15 jours par mois).
- c) *Angine de poitrine et algies précordiales.*
1 à 3 comprimés avant chacun des 2 principaux repas (pendant 10 à 15 jours par mois).
- Avaler avec un peu d'eau, sans sucer ni croquer.

LABORATOIRES DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

Digibaine, Cardibaine, Théoxanthine, etc.
6, rue d'Assas, PARIS (VI^e)

Tél. Littré 31-85.

Belgique :

Agent Général : L. PRUNIERES
19, rue Louis Hap, Bruxelles.

SPÉCIFIQ BRACHAT

Médication antihémorroïdale.

Formes. — Pommade et suppositoires.

Composition. — Contient une série de principes actifs non toxiques, assurant au patient un soulagement immédiat, arrête les hémorragies, cicatrise, décongestionne.

Indic. — Hémorroïdes internes et externes.

Mode d'emploi. — Une application matin et soir et après les selles.

Les mêmes principes se trouvent réunis sous forme de suppositoires; MM. les docteurs peuvent ainsi ordonner la forme de produit qui convient le mieux à leur malade.

Pour se convaincre de la réelle efficacité de ce produit, ne pas hésiter à demander échantillons aux :

Prix : 15 fr.

Laborat. Chimico-Pharmac. BRACHAT
à Livry-Gargan (S.-et-O.)

SPÉCIFIQUE BEJEAN

La préparation antigoutteuse et anti-rhumatismale la plus efficace et la plus inoffensive. Elle réussit dans les cas où les autres médicaments ont échoué.

Composition :

Contient comme principes actifs : 1 gr. de teinture de colchique et 0,20 d'iode de potassium par cuillerée à café.

Indications :

Goutte aiguë ou chronique, Rhumatismes, Sciatique, Névralgies et, en général, toutes les manifestations douloureuses ou fluxionnaires se portant sur les articulations, les muscles et les viscères et qui soient d'origine goutteuse et rhumatismale.

Doses :

Cas aigus : Trois cuillerées à café par jour, dans une infusion de feuilles de frêne ou un peu d'eau sucrée, jusqu'à sédation de la douleur.

Cas chroniques : Une ou deux cuillerées à café par jour pendant une semaine sur deux ou pendant douze jours.

Pour les enfants et les vieillards, les doses ci-dessus devront être réduites de moitié.

La médication devra être suspendue en cas de diarrhée ou autres troubles intestinaux.

Dépôt général :

30. rue des Francs-Bourgeois, PARIS

SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies

Composition. — Sérum frais hémopoïétique de cheval, prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine par saignées préalables, contenant les hémopoïétines spécifiques du Professeur Carnot (Ac. des Sc., 1906). Ce sérum n'est pas inactivé par tyndalisation, ses substances minimales sont intactes.

Action. — 1° Agent d'Hémopoïèse (Hémopoïétines de Carnot);

2° Agent de Leucopoïèse et de phagocytose (opsonines);

3° Action tonique générale du sérum de cheval;

4° Agent d'Hémostase générale (Traitement prophylactique des interventions sanglantes).

Indications. — Toutes anémies, hémophilie, états hémorragiques, convalescences, déficiences organiques, tuberculose, infections, et toxoinfections, cure pré-opératoire dans les interventions chirurgicales sanglantes.

Pas d'accidents sériques ou infectieux.

Mode d'emploi. Posologie. — Sirop agréable à prendre.

Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude).

Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

Littérature. Échantillons

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel III — PARIS (VIII^e)

SPYROLIDES

Composition. — Comprimés gynécologiques à base de bleu de méthylène, de méthylbenzénols, de tanin et de perborate de sodium, source d'oxygène naissant.

Présentation. — Ces comprimés, à base de substances antiseptiques et décongestionnantes, ont un parfum discret et agréable et possèdent d'éminentes propriétés désodorisantes. Les SPYROLIDES sont le *DERNIER MOT* de la science pharmaceutique en matière de comprimés gynécologiques. Leur emploi est commode et discret. *Ils se dissolvent instantanément et intégralement. Ils ne tachent ni le linge ni les objets de toilette. Ils ne sont ni caustiques, ni irritants ni toxiques.*

Absolument parfaits pour l'hygiène et les soins intimes de la femme ils sont à tous points de vue bien supérieurs aux autres antiseptiques tels que : sublimé, liqueur de Labarraque, permanganate de potasse etc..

Propriétés Thérapeutiques. — Au contact de l'eau, les SPYROLIDES dégagent de l'oxygène ; on obtient ainsi une solution riche en oxygène à l'état naissant qui vient renforcer l'action antiseptique des SPYROLIDES et donne une solution puissamment bactéricide, dont l'emploi, même prolongé, n'irrite jamais les muqueuses. Au contraire les antiseptiques-purins, non seulement les SPYROLIDES laissent aux muqueuses toute leur vitalité mais ils favorisent leur rapide régénération et les aident ainsi en les tonifiant, à se défendre contre les infections microbiennes.

La petite pellicule qui se forme à la surface de l'eau est due au dégagement d'oxygène elle se dissout par simple agitation. Nous insistons particulièrement sur le fait que les SPYROLIDES se dissolvent intégralement et immédiatement dans l'eau chaude, tiède ou même froide.

Mode d'emploi. — Un ou deux comprimés par litre, pour l'injection quotidienne ou bi-quotidienne de propreté et d'hygiène.

A titre curatif : de 10 à trois comprimés par litre, en cas de leucorrhée, métrite, vaginites, salpingites, etc..., ou après l'accouchement.

L'eau SPYROLIDÉE par un ou deux comprimés désodorise complètement la peau (transpiration excessive des aisselles, des pieds, etc.).

Prescrire : Spyrolides : 1 tube. — Faire suivre du nombre d'injections quotidiennes et du nombre de comprimés à employer.

Le tube de 28 comprimés permet ordinairement un traitement de 14 à 28 jours d'un prix de revient particulièrement modéré (6 fr. 50 par jour au maximum au prix actuel de 7 fr. 85).

Echantillons et littérature : sur simple demande adressée aux

LABORATOIRES ANDRÉ NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

STAL-KOSAL

« La poudre qui calme »

Coréïne bismuthée

Pansement gastro-intestinal

Poudre et tablettes.

Formule. — Coréïne, mucilage pur et carbonate de bismuth, chimiquement pur, associés au kaolin et au $\text{Co}_3 \text{Ca}$.

Indications. — Toutes les Gastrites et toutes les Colites. Toutes les inflammations du Cœcum.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe bien délayée dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin au lit et à jeun.

Une deuxième cuillerée à soupe le soir, une heure avant le dîner.

Et une cuillerée à dessert au moment des douleurs.

Sous la forme tablette : 2 tablettes dès l'apparition des douleurs, puis une demi-tablette de 5 à 5 minutes jusqu'à sédation.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, rue de la Source — PARIS (XVI^e)

Tél. : Auteuil 11-86.

STALYSINE

Vaccin curatif antistaphylococcique
(d'après la technique du Dr Fisch).

Indications. — Furunculose, anthrax, Acné, et toutes affections d'origine staphylococcique.

Double supériorité : Action directe sur le microbe, pas de réaction fébrile.

Formes. — Buccale, *la plus pratique*
(10 ampoules de 3 cc.).

Injectable, *la plus rapide et la plus sûre*
(10 ampoules de 1 cc.).

Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts (6 ampoules de 2 cc.)

Prix : 25 fr.

Laboratoires P. ASTIER

41 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS

STANION

Description. — Etain colloïdal en capsules et en ampoules.

Capsules : contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage de kératine (50 capsules par flac.).

Ampoules : contiennent 3 cmc de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons ; les récidives sont évitées.

Indications. — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

Capsules : 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculites, anthrax, phlegmons, panaris, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylococciques.

Laboratoires CH. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

STANNOXYL

Oxyde d'étain et étain métallique
absolument purs

Indications. — Furonculose et toutes affections à staphylocoque : acné, anthrax, abcès du sein chez les nourrices, etc.

Formes. — Pour l'usage interne : comprimés, cachets, ampoules. — Pour l'usage externe : liquide, pommade.

Avantages. — Traitement pratique, rapide et définitif : l'ingestion quotidienne de 4 à 8 comprimés fait disparaître l'inflammation et les douleurs et arrête l'évolution de la maladie.

Laboratoires

ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS

STAPHYLASE

du Docteur DOYEN

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

Indications. — Acné, Furunculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

Doses. — Adultes : 4 à 12 cuill. à potage par jour ; Enfants : 1 à 4 cuill. à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

Laboratoires **LEBEAULT & C^{ie}**

Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e)

STAPHYLOCIDE AUDRAS

Tablettes sucrées parfumées à la menthe, dosées à 1 gr.25 d'Étain-Oxyde d'étain plus purs et plus solubles que les produits commerciaux, parce que "Étain d'électrolyse".

— Croquer 2 à 4 tablettes par jour, aux repas de préférence.

— Contre furunculose, acné, orge ets, phlegmon, abcès divers et toutes infections staphylococciques.

Enfants et adultes : pas de contre-indication.

NOTA. — Préparation particulièrement *pratique, absorbable, efficace*, à cause de sa forme de tablettes, nécessitant une longue trituration et division des principes actifs avec le sucre, et leur assurant en outre une *fine émulsion* par la salive. L'étain arrive ainsi à l'estomac dans l'état idéal pour une absorption rapide et totale.

La boîte (10 à 20 jours) : **10 fr.** toutes pharmacies.

Demander échantillon à :

Laboratoire du **STAPHYLOCIDE AUDRAS**

112, rue de Gerland — LYON

STAPHYLO-COCCINE FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte à doses moindres.

Prop. Thérap. — Agent de la phagocytose.

Indications. — Furunculose, Anthrax, Angine, Maladies infectieuses, Dermatoses.

Doses et mode d'emploi.

Adultes : 2 à 5 cuillers à soupe par jour.

— 4 à 10 comprimés —

— 1 ampoule —

Enfants : Moitié de ces doses ou moins suivant l'âge.

Laboratoire des PRODUITS SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, rue Chaplal — PARIS

STAPHYLOTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

Indications thérapeutiques. — Toutes les staphylococcies : Furoncle, Anthrax, Abscess tubéreux de l'aisselle, Ostéomyélites, Ostéites, etc.

Se recommande dans les cas rebelles à toute autre médication.

Posologie et Présentation :

Adultes : 1 ampoule de 2 cc. tous les trois jours (boîte de 6 ampoules) 18 fr. ; ou 1 suppositoire tous les deux jours (boîte de 10 suppositoires) : 15 fr.

Enfants : 1 ampoule de 1 cc. tous les trois jours (boîte de 6 ampoules) : 13 fr. ; ou 1 suppositoire tous les deux jours (boîte de 10 suppositoires) : 12 fr.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e)

R. C. Seine : 143.981

STÉRAMINE

Pâte antiseptique soluble

Compos. — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 % de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

Indications. — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

Avantages. — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

En tubes d'étain.

Echantillons médicaux sur demande.

Laboratoire
des ANTISEPTIQUES CHLORÉS
40, rue Thiers — LE HAVRE

STÉRINASE VINCENT

Granulé de Cholestérine.

Composition. — Granulé renfermant dix centigr. de Cholestérine par cuillerée à café. La Cholestérine n'est pas irradiée et agit ici par doses massives.

Indications. — *Chez les enfants :* Hypotrophie, Débilité, Troubles de croissance. *Chez les adultes :* Tuberculose, Maladies infectieuses, Anémie, Hypotension artérielle, Amaigrissement, Convalescence.

Doses. — Quatre à six cuillerées à café par jour, au début des repas, et plus s'il est nécessaire. Mêmes doses chez les grands enfants. Deux ou trois cuillerées à café chez les nourrissons.

Laboratoire VINCENT
14, avenue Mac-Mahon.

STÉROGYL

Formule. — Solution huileuse au centième d'ergostérine irradiée pure.

Présentation. — En flacon de 10 c. c. dont 10 gouttes = 4 milligr. de vitamine D. La faible quantité d'huile administrée à chaque prise n'est pas susceptible de provoquer le moindre trouble digestif, même chez les nourrissons les plus fragiles.

Propriétés thérapeutiques. — Sous l'influence des rayons ultra-violet, l'ergostérine, substance inerte, donne naissance à une substance active, la vitamine D, douée d'un pouvoir antirachitique très puissant.

La vitamine D est la seule partie agissante de l'huile de foie de morue qu'elle remplace totalement dans toutes ses indications.

Indications thérapeutiques. — Tous les états rachitiques, tous les troubles du métabolisme du Calcium, toutes les déperditions en chaux et en phosphates.

Par conséquent, rachitisme, états ganglionnaires, anémies pré-tuberculeuses et post-infectieuses, grossesse, carie des dents, consolidation des fractures.

Posologie. — Jusqu'à 1 an..... 10 gouttes par jour
de 1 à 10 ans..... 10 à 20 gouttes.

Au delà de 10 ans et chez l'adulte : 20 à 30 gouttes.

Laboratoire Français de Chimiothérapie,
21, rue d'Aumale — PARIS (IX^e)

STHÉNOLÉINE

HUILE TONIQUE INJECTABLE
FORTEMENT GOMÉNOLÉE ET CHOLESTÉRINÉE
 pour

IMMUNISATION ARTIFICIELLE

préventive ou curative
DE TOUT ORGANISME DÉFICIENT
CONTRE LES GRANDES INFECTIONS

PRÉPARATION MÉDICINALE FRANÇAISE
 très diffusible
 pour injections hypodermiques et intramusculaires
 garanties absolument indolores.

COMPOSITION

donnée par la formule suivante :

Goménol naturel.....	40 cgr.
Eucalyptol.....	02 —
Camphre.....	05 —
Cholestérine pure.....	04 —

Huile d'olive lavée à l'alcool et chargée par décoction
 des principes extractifs de plantes sélectionnées riches en
 phytine et en baume. Q. S. pour une ampoule de 2 cc.

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Cardio-tonique — Anti-infectieuse.
 Antiseptique pulmonaire.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

États adynamiques rebelles
 Grippe et toutes maladies infectieuses
Affections aiguës ou chroniques des poumons
et des voies respiratoires supérieures.
 Convalescences pénibles.

FORME PHARMACEUTIQUE

DÉLIVRÉE

SOUS LA SEULE FORME D'AMPOULES DE 2 cc.
 (Boîtes de 10 amp. et Boîtes de 5 amp.)

MODE D'EMPLOI

Dans la pratique courante on utilise plus volontiers
la voie intramusculaire fessière.

DOSES ET DURÉE DU TRAITEMENT

ADULTES : 1 AMP. DE 2 cc. TOUTS LES 2 JOURS
Enfants (1 c.c.) et Nourrissons (1/2 c.c.) tous les 2 jours
 jusqu'à concurrence de dix injections consécutives.
Il est souvent indiqué de faire 3, 5 et même 6 séries
de dix injections sans aucun intervalle de repos.
Etats graves adultes : 2 à 10 amp. par j progressivement
suyant l'avis du médecin.

PRIX DE VENTE OBLIGATOIRE

Boîte (10 amp.) 20 fr. — Boîte (5 amp.) 12 fr. 50

LABORATOIRE DU MICELLIODE

Produits médicaux [spécialités]
A. Rolland, Pharmacien de 1^{re} classe,
 83, rue de la Villette — PARIS (XIX^e).

STOMAL

Pansement gastrique calmant.

Composition. — Poudre à base de kaolin, carbonates alcalins saturants, bétol, pepsine.

Indications. — Pyrosis, Dyspepsie, Hyperchlorhydrie, Gastrite, Dilatation. Calme la crise gastrique par saturation des acides; désinfecte l'intestin et neutralise les fermentations.

Posologie. — Une cuillerée à café à jeun et après les repas dans un peu d'eau; une ou deux autres dans la journée si besoin. Innocuité absolue.

Prix : 9 francs

Échantillons sur demande adressée à :

Laboratoire PY

58, Bd Richard-Wallace, à Puteaux (Seine).

STOMARINE BILLAULT

Traitement des maladies de l'estomac par le tricarbonate de chaux, magnésie, bismuth.

Forme : Comprimés.

Il résulte des recherches faites sur des affections stomacales et notamment des travaux remarquables du professeur ROBIN que les meilleures médications provoquant le soulagement et la guérison de la presque totalité des troubles de l'estomac comportent dans leur formule de la magnésie et du bismuth.

Partant de ces données, nous avons fait un choix judicieux des composés de magnésie et de bismuth qu'il fallait utiliser et après un dosage rigoureux de ses éléments actifs, nous avons adopté le tricarbonate de magnésie, bismuth et chaux; ce dernier corps agissant comme neutralisant de l'acidité stomacale sans action laxative.

Mode d'emploi. — Sucrer 2 comprimés et davantage sans inconvénient chaque fois que les douleurs se font sentir; celles-ci sont calmées instantanément.

La boîte : 10 francs.

Laboratoires pharmaceutiques

L. G. TOULAUDE & C^{ie}

Docteur en pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e)

Dépôt et Agence générale de Vente des Produits pharmaceutiques spécialisés. BILLAULT — R. G. Seine 218758 B

STOMAXINES ROXELANE

Médication complète des affections digestives.

Formule A : Antisepsine

Phosphate de Na Charbon végétal et animal.

Benzonaph. Bic. de Na Citrate de Na

Magnésie calc. Carb. de Ca.

Médication d'Attente. — Embarras gastriques.
Fermentations.

Formule B : Neutraxine

Substances neutralisantes notamment.

Carb. de Ca, de Magnésie. Charbon.

Hyperchlorydrie.

Formule C : Eupexine

Pepsine Pancréatine (Système de conservation breveté).
Hypoepsie.

Formule D : Spasmaxine

Ext. jusquiame..... 1 centig.

Ext. thébaïque..... 5 millig.

Poudre de Belladone..... 2 centigs.

Stovaine..... 2 millig

Sels digestifs..... q. s.

Spasmes. — Crises douloureuses gastriques.

Aérophagie.

Formule E : Biskaogastrine

Combinaison de Carb. de Bi et Kaolin par procédé spécial assurant l'adhérence parfaite à la muqueuse.

Pansements gastriques. (Poudre)

Formule F : Purgolaxine

Purgatif 2 à 3 cachets.

Scammonée Jalap Rhubarbe (poudre de belladone q. s.)
Constipation.

Formule G : Entérolactine

Ampoules et Comprimés de ferments lactiques.
Affections gastro-intestinales.

Formule H : Hepaxine

Citrate de Na. Bic. de Na Phosph. de Na Sulf. de Na desséchés et chimiquement purs.

États gastro-intestinaux et hépatiques.

Forme cachets : 3 à 6 par jour.

Forme poudre : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

**Les laboratoires PHARMACEUTIQUES
DE LA ROXELANE**

38 bis, rue Raphaël, Vanves-Paris

STOMÉOL-VICHY

Poudre-Cure alcaline.

Composition. — Papaine, Kaolin, Carbonate de Chaux, Magnésie, Phosphate de Chaux, Sel de Vichy, Ess. de Menthe.

Indications. — Le meilleur saturant des Hyperacidités gastriques. Digère les albuminoïdes. Agit aussi bien en milieu acide que neutre ou alcalin.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau, après les repas ou au moment des douleurs.

Prix du flacon : 15 fr.

Laboratoire CHEVILLON

38, rue Ramey — PARIS

STOMOBROL

Sédatif et Curatif puissants des Gastropathies, Troubles dyspeptiques douloureux.

Propriétés thérapeutiques. — *Pansement véritable de la muqueuse gastrique* par le Kaolin.

Antiseptique : par le Carbonate de bismuth.

Absorbant : par le Carbonate de chaux léger et la Magnésie hydratée.

Sédatif : par le bromure de sodium, la belladone, la codéine.

Musculoprotétique : par la noix vomique qui rétablit les contractions normales de l'estomac rendues indolores par la belladone.

Reconstituant : par le phosphate tricalcique et la strychnine (noix vomique) dans les états dépressifs consécutifs aux gastropathies.

Indications. — Dyspepsies, hypersthénies, gastralgies, pyrosis, ulcères, aérophagies, anorexies d'origine digestive. Entérites aiguës et chroniques.

Présentation et mode d'emploi. — *Poudre* : 1 à 2 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau après les repas ou au moment des douleurs.

Cachets : 2 à 4 par jour, après les repas ou au moment des douleurs avec une infusion chaude de préférence.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires CLAVERIE

4, Avenue de Brazza — ROMAINVILLE (Seine)

STOMOPHILE

RÉGULATEUR ÉNERGIQUE
DES FONCTIONS STOMACALES

(Alcalin-Antiferment).

Forme. — Paquets (de saturation).

Composition. — Alcalins (sodium, calcium, magnésium). Bismuth (professeur Hayem).

Indications. — Dyspepsie, Gastralgie, Gastrites aiguës et chroniques, Hyperchlorhydrie, Hypersthénie, Pyrosis, Ulcère.

(Supprime, dans de nombreux cas, l'atonie intestinale).

Posologie. — Un paquet, délayé dans un peu d'eau, à la fin ou une heure après les principaux repas.

Dans les crises aiguës, prendre supplémentairement 1 ou 2 paquets dans le courant de la journée.

INNOCUITÉ ABSOLUE

Littérature et échantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Prix : 12 fr.

Laboratoires DORANTOWICZ
17 bis, avenue Parmentier — PARIS

STOVAÏNE

Chlorhydrate de diméthylaminobenzoylpentanol.

Le moins toxique des anesthésiques locaux. Vaso-contriction, toni-cardiaque et antiseptique. Toxicité réduite. Pas d'accoutumance.

Indications :

Toutes les applications médicales et chirurgicales de la cocaïne.

Posologie et mode d'emploi :

Solution à 0,50 et à 1 p. 100, (Anesthésie locale), Solution à 10 p. 100, (Rachi-anesthésie), Pastilles à 2 centigr., (Affections de la bouche et du pharynx).

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (11^e)

STOVARSOL

Acide oxyacétylaminophénylarsinique.

Fortement arsénique (27,2 %). Toxicité faible.

S'administre par la voie buccale.

Indications :

Syphilis, Plan. Amibiase. Protozooses, Diarrhées.

Posologie et mode d'emploi :

Comprimés à 25 centigr., 5 centigr. et 1 centigr.

Doses moyennes : adultes : 50 centigr. à 1 gr. par 24 heures ; enfants : 2 à 10 centigr.

Le *Stovarsol sodique*, soluble, convient aux injections hypodermiques (paralysie générale).

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.

86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

STRICTOFORME DAUSSE

(Extrait spécial de Genêt)

Vaso-constricteur des artères et des veines. Hémostatique puissant, non toxique, retiré du Genêt à balais. Succédané de l'adrénaline et de l'ergot de seigle.

Formes. — *Solution à administrer par gouttes.*

Indications. — 1° Dans les *Hémorragies, Hémoptysies, Hématémèses, Epistaxis, Métrorragies*, etc. etc.

2° Dans les états hypotensifs : *Tuberculose, insuffisance surrénale*, etc.

3° *Varices, phlébites chroniques, ménopause.*

Posologie. — 1° *Par voie buccale*: 3 prises de XXV à XXXV gouttes avant les repas, dans un peu d'eau sucrée.

2° *En application locale*; appliquer sur la partie saignante une compresse imbibée de strictoforme.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

STROPHANTINE CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,0001 de Strophantine cristallisée
extraite du Strophantus Gratus.

Synonyme **Ouabaïne**.

Indications. — Affections mitrales. Dyspnée. Oppression. OEdèmes. Asystolie. Cardiopathies des enfants et vieillards. Lésions cardiaco-aortiques. Artério-sclérose avec ou sans néphrites.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur.

STROPHANTUS CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,001 d'Extrait titré de Strophantus.

Indications. — Asystolie. Oppression. Dyspnée. OEdèmes. Affections mitrales. Cardiopathies enfants et vieillards.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur, *diurétique*.

En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Prix de l'Académie de Médecine.

Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin — PARIS

STRYCHNAL LONGUET

Toutes indications de la strychnine.

Dérivé synthétique de la strychnine, de toxicité dix fois moindre.

Affections médullaires et névritiques. —
Asthénie. — Neurasthénie. — Tuberculose. — Maladies infectieuses. —
Convalescence. — Anémie.

Doses. — Par jour :

2 à 4 granules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal.

1 à 2 ampoules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal par c³.

Le flacon de 50 granules : 11 fr.

La boîte de 12 ampoules : 14 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e)

STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable

Nucléophosphate de soude pur et
méthylarsinate de strychnine

Ampoules injectables de 2 cc.

Dose et mode d'emploi.

Une injection Hypodermique de 1 cc.
par 24 heures pouvant être portée
à 2 cc. en une seule injection
dans les cas graves.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

STUPHO

Antidiarrhéique non toxique

Composition. — Extrait de Salicaire, Lactate de chaux, Benzonaphtol.

Aux propriétés anti-diarrhéiques de la salicaire signalées par d'éminents thérapeutes (de ROUVILLE, CAMPARDOU, DUFOUR) s'associe l'action remarquable du Lactate de chaux dans toute diarrhée ou dysenterie.

La présentation en comprimés ou granulés en permet l'administration aisée aux enfants les plus jeunes. La solution du granulé dans l'eau donnant instantanément une préparation vanillée très agréable au goût.

Mode d'emploi. — Comprimés : 2 à 6 par 24 h. pour l'adulte ; 1 à 4 par 24 heures pour l'enfant à délayer dans 1/4 verre d'eau sucrée tiède.

Granulé : 1 à 4 cuillerées à bouche pour l'adulte
1 à 3 cuillerées à dessert pour l'enfant.
1 à 4 cuillerées à café pour le bébé.

à croquer ou dissoudre dans un peu d'eau tiède.

LABORATOIRE DU MAINQUY

M. BASSIN, D^r en pharmacie, à Bondy (SEINE)
Échantillons sur demande.

SULFARSINOL LEFÈVRE

Composition. — Combinaison organique de nature grasse, renfermant du soufre, de l'iode et de l'arsenic associés de l'acide cinnamique.

Facilement saponifiable dans l'intestin en donnant du soufre et de l'iodure d'arsenic à l'état colloïdal en même temps qu'un cinnamate alcalin.

Se trouve en capsules gélatineuses correspondant à la formule : acide cinnamique : 0,02 ; iodure d'arsenic : 0,003 ; sulfoléine à 35 % de soufre : 0 gr. 30.

Propriétés thérap. — Celles du soufre colloïdal et de l'iodure d'arsenic associés à un balsamique, l'acide cinnamique. — Affections cutanées, rhumatismes, bronchites, emphysemes, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 6 capsules par jour, avant le repas.

Échantillons :

Laboratoire du Docteur C. LEFÈVRE
52, Rue Descamps — Paris (XVI^e)

SULFARSIODE

Composition et dosage:

Iode.	0 gr. 006	par cc.
Arsenic.	0 gr. 02	—
Soufre allylique.	0 gr. 004	—
1 cc. représente 42 gouttes.		

Indications.

Troubles ganglionnaires et lymphatiques, adénite, affections cutanées, asthme, arthritisme, engelures, accidents spécifiques héréditaires ou acquis.

Posologie:

Bébés, selon l'âge, 6 à 12 gouttes par jour.

Ado escents — 10 à 20 — —

Adultes — 15 à 30 — —

A prendre en 2 fois dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas.

Formes et prix:

Gouttes : 12 fr. le flacon

Agent général: **François CARTIER**

1, rue de la Martinière — LYON

Préparé par D^r ROGER, Pharmacien

SULFO-BORE

Composition. — Poudre antiseptique, désodorisante, par l'anhydride sulfureux et le soufre naissants.

Indications. — *Gynécologie*: Métrites, leucorrhée, suites de couches, toilette intime, prurits (1 à 2 cuillerées à soupe par litre d'eau chaude).

Affections de la peau: Pellicules, acné, sueur des aisselles, des pieds (en lavages ou saupoudrage)

Coryza, ozène (en prises ou humage) *Maux de gorge* (en gargarismes): 1 cuillerée à café par verre d'eau chaude.

Laboratoires A. ROY

81, boulevard Suchet — PARIS (XV^e)

Tél.: Auteuil 03-46.

SULFOBYL

Forme. — Dragées glutinisées.

Composition :

Soufre colloïdal.....	0,02
Extrait de bile.....	0,05
Extrait de foie.....	0,05
Entérokinase ...	0,02
Extrait de pancréas.....	0,02
Urotropine.....	0,05
Aloïne.....	0,005

Par dragée.

Action thérapeutique :

Excite la sécrétion biliaire et la fonction antitoxique, assure la digestion parfaite des différents aliments, combat les infections intestinales et la constipation, évite le choc hémato-clasique de Vidal.

Indications :

Insuffisances du foie et de l'appareil digestif, constipation, auto-intoxication intestinale, arthritisme, dermatoses, etc...

Mode d'emploi :

Adultes : 2 dragées après chaque repas avec un peu d'eau.

Enfants : 1 dragée.

Avaler sans croquer. — Prix 10 fr.

Laboratoires LAFARGE

6, boulevard Arago — PARIS

SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal.

Granulé. Ampoules. Pommades.

Doses et modes d'emploi. — Granulé : 2 cuillers-mesure 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 40 centigr. de soufre colloïdal.

Injectable : 1 injection par jour dans les cas graves. Dans les cas ordinaires 1 injection tous les 2 ou 3 jours.

Indications. — Troubles de la nutrition sulfurée. Pharyngites chroniques. Bronchites chroniques. Antisepsie de l'intestin. Rhumatismes aigus et chroniques. Arthritismes. Syphilis.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS

SULFOLÉINE

du D^r E. ROZET

Principe actif. — Sulfolitholate d'ammonium.

Propriétés thérapeutiques. — Médication soufrée organique, antiseptique, expectorante, balsamique, décongestionnante. N. toxique, ni narcotique, ni antispasmodique, n'entrave pas l'expectoration.

Forme. — Solution désodorisée, aromatisée.

Indications. — Coqueluche, Bronchites aiguës et chroniques, Laryngites et Rhino-pharyngites aiguës et chroniques, Associations microbiennes secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Doses moyennes. — 3 à 5 cuillerées à café, à dessert, à soupe par 24 heures, suivant les âges et l'intensité des cas. La Sulfoléine peut être prescrite aux plus jeunes nourrissons. Les doses moyennes peuvent être doublées.

Mode d'emploi. — Donner les doses prescrites avant les repas, après une quinte, soit pures, soit dans eau sucrée, lait, tisane, à volonté.

Prix : 8 fr.

Laboratoire de la Sulfoléine ROZET

Benleritter et C^{ie}, à VENDOME (Loir-et-Cher).

SULFO-MÉSARCA « ROCHE »

Pour injections intramusculaires dans toutes les formes de la syphilis

Le Sulfo-Mésarca « Roche » est le 4,4'-dioxo-3,3'-diamino-azéno-benzène-N-méthylène sulfonate de sodium; il est présenté sous forme d'une poudre fine, légèrement colorée en jaune, très soluble dans l'eau, avec une réaction faiblement acide. Sa teneur en arsenic est de 20‰.

Aussi actif, plus stable et moins toxique que les sulfoxylates, le Sulfo-Mésarca « Roche », n'est pas irritant pour les tissus et peut être parfaitement employé en injections sous-cutanées et intramusculaires indolores, avec d'aussi bons résultats, ce qui met entre les mains de tous les praticiens, sans préparation ou anté-opératoire, sans soins spéciaux post-opératoires, un traitement ambulatoire facile et discret, sans que le malade soit obligé de s'absenter, donc d'attirer l'attention de la famille, sur une thérapeutique exceptionnelle.

Conditionnements :

Pour nourrissons et jeunes enfants :

Dose 00 (rouge) = 45 milligrammes.

Dose 0 (violet) = 75 milligrammes.

Pour adultes :

Dose I (bleu) = 5 centigrammes

— II (orange) = 30 —

— III (rouge) = 45 —

— IV (violet) = 65 —

— V (noir) = 75 —

— VI (noir) = 90 —

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Co

21, Place des Vosges, Paris (III^e)

SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de Médecine.

MÉDICATION SULFUREUSE

Le Sulfureux Pouillet pour boisson est une poudre sulfureuse amorphe créée par M. Pouillet l'éminent professeur de Chimie.

Mode d'action. — Au contact de l'eau, formation de Monosulfure de sodium à l'état naissant.

Indications thérapeutiques. — *Les propriétés sont celles des eaux minérales, sulfureuses naturelles.*

Son action est merveilleuse dans les Rhumes au moment de l'expectoration, Catarrhes pulmonaires ou Bronchites, Affections du Larynx, Granulations de la Gorge, Pharyngites, Extinction de voix, Catarrhes, nasopharyngiens, dans l'Ozène et autres maladies du nez et de la gorge, les Diathèses arthritiques, herpétique, rhumatismales, et en lavements contre les oxyures.

Enfin l'Pellet curatif est survenant dans la plupart des Eczemas, dans l'Akné et en général dans toutes les affections de la peau. Le Sulfureux Pouillet s'emploie en boisson ou en inhalations, Il est des plus efficaces en vaporisations au moyen du pulvérisateur à vapeur.

Mode d'emploi.

Boisson : 1 mesure par un verre d'eau ou de lait (agiter avec une baguette de bois) ; à prendre matin et soir, loin des repas.

Echantillons sur demande.

SULFUREUX POUILLET

pour bains et lotions.

flacon pour un bain d'adulte,

un demi-flacon pour un bain d'enfant

1 cuillerée à café pour deux litres d'eau (pour lotions).

Laboratoire POMPANON

112, rue du Bac, 112 — PARIS

SULFURINE DU DOCTEUR LANGLEBERT

Composition. — A base de : Carbonate neutre de sodium, de soufre spécial et de chrome.

Action :

Le *sulfurine* donne, par sa dissolution dans l'eau, un bain alcalin soufré ; et réalise, à domicile, le bain hygiénique par excellence.

Indications. — Dermatoses, rhumatisme chronique, traumatismes, blessures, diabète, lymphatisme, scrofule, anémie, chlorose, rachitisme convalescences, déchéance organique.

Bain hygiénique, tonique et fortifiant. N'abîme pas les baignoires.

Mode d'emploi. — Une boîte pour un grand bain. Utiliser, pour les soins de toilette et dans les dermatoses, le *savon Sulfurine Langlebert*.

ADRIAN & C^{ie}

9 et 11, rue de la Perle. — PARIS

SULFURION

Description. — Complexe colloïdal électrique isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

Indications. — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, bien torragique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

Laboratoires CH. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

SULFURYL MONAL

Forme. — Pastilles agréables au goût.

Composition. — Synthèse des eaux minérales sulfureuses.

Chaque pastille dégage 2 cc. d'hydrogène sulfuré dans l'estomac.

Dose. — Croquer ou sucer 2 à 6 pastilles par jour.

Propriétés. — Permet d'instituer d'une façon active partout et en toute saison la *médication sulfureuse interne*.

Action. — Antiseptique et antitoxique, stimule les échanges.

Indications. — Affections de la gorge et des voies respiratoires. Grippe, Coqueluche. Lymphatisme. Rhumatismes. Syphilis. Maladies de la peau. Etats infectieux et post-infectieux.

Laboratoires MONAL et C^{ie}

6, rue Bridaine — PARIS

SUPPARGYRES

du Docteur FAUCHER

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire, récente ou ancienne. Méthode simple sous forme discrète, *voie recto-portale*, (*voie rectale*), active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (grossesse, fatigue, voyage, etc.).

Forme. — Adultes. — Suppositoires à 0,04 cgr. de Hg. vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue. Nourrisson et enfants de 1 à 10 ou 11 ans 0.02 cgr.

Dose. — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours, repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

Nota. — Hg. vif est et reste. Supérieur à tous les sels, toujours instable. Le seul anti-syphilitique indiscutable et indiscuté. Sa véritable voie d'absorption est la *voie rectale* parceque tous les capillaires de l'intestin vont au foie qui vitalise et rend Hg. actif : On mélange à une solution d'arséno-benzoïde des tréponèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'EXTRAIT de FOIE, les tréponèmes sont *soudroyés*,
(Exposé de Levaditi.)

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, Boulevard de Clichy — PARIS

SUPPO-GYNALS

Analgésique sédatif, local et général

Forme. — Suppositoires.

Composition. — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame, de cannabis et de sénécio, beurre de cacao.

Prop. therap. — Calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles, et en général toutes les douleurs des organes du bassin, règles douloureuses, contractions utérines, hémorroïdes, fistules, etc.

Mode d'emploi. — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un « SUPPOGYNAL ». Dix minutes après, deuxième suppositoire. (Il est bon d'employer les Suppo-Gynals dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr).

Laboratoire LEES

Directeur : **Dr P. ROLLAND**
18, rue Pierre-Curie — PARIS.

SUPPOSITOIRES CORBIÈRE

Composition. — A base d'Arsénobenzol (606).

Mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir après une selle spontanée ou provoquée par un lavement évacuateur.

Continuer le traitement vingt-quatre jours, cesser deux semaines et reprendre une nouvelle série.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Syphilis viscérale.

Hérédo-Syphilis. — Angine de Vincent. — Dysenteries amibiennes.

Présentation. — Chaque boîte contient 6 suppositoires et ne porte aucune indication de nature à gêner le secret professionnel.

Suppositoires pour adultes à 0 gr. 10 de 606.

Suppositoires pour enfants. à 0 gr. 03 de 606.

Suppositoires pour nourrissons, à 0 gr. 01 de 606.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS — Tél. : Carnot 78-11

SUPPOSITOIRES A L'ESCULEOL

Contre les hémorroïdes

Adrénaline, scuroforme, stovaine, extrait de marron d'Inde et d'Hamamelis, Euproctol.

Avantages. — Analgésiques, antiseptiques, decongestionnants.

Ne provoquent aucun choc local et atténuent rapidement les douleurs.

Mode d'emploi. — Un suppositoire matin et soir et après chaque garde robe pendant les crises. Pour les chroniques, un suppositoire par jour.

Prix : 11 fr.

Michel DELALANDE

13, rue Lacharrière, Paris (XI^e).

SUPPOSITOIRES HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

2 Titrages :

Adultes : 0,06 Onguent napolitain, soit 0,03 Hg. métal.

Enfants : 0,03 Onguent napolitain, soit 0,015 Hg. métal.

Originalité. — Préparés entièrement à froid, ce qui assure une exacte répartition de mercure dans le produit fini. Aussi ils sont très *bien tolérés*, ne causant ni ténésme, ni diarrhées, ni coliques.

Présentation dissimulée. — Sans indication de maladies, ni de nature de produit actif.

Posologie. — Un le soir au coucher, pendant vingt jours de suite.

Prescription. — De préférence, intercaler une période de vingt jours d'Élixir Hymel entre deux périodes de suppositoires Hymel.

Laboratoires A. DUTEIL

38, rue de Bondy, PARIS

SUPPOSITOIRES LOGEAIS

Composition. — Chaque suppositoire contient 0,60 cgr. d'oléosulfonate d'hamamélinine, combinaison définie d'une huile sulfonée spéciale avec un extrait glycéринé total d'hamamélis préparé sans alcool.

Indications. — Hémorroïdes internes, et rectite concomitante.

Propriétés. — Atoxiques, analgésiques, décongestionnants vaso-constricteurs. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite. Ne tachent pas le linge d'une manière indélébile.

Ni stovaine, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques. Prescription facile sans contre-indications.

Mode d'emploi. — Introduire matin et soir après lavage un suppositoire Logeais par le petit bout pour ne pas augmenter l'irritation locale.

Laboratoires Émile LOGEAIS

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 40-45 et 40-16.

SUPPOSITOIRES MIDY

(Adrénostyptiques)

Adrénaline.....	0 gr. 00025
Anesthésine-stovainée.....	0 gr. 06
Ext. de Marrons d'Inde frais stabilisé.....	0 gr. 02
pour un suppositoire.	

Dose et mode d'emploi :

Introduire un ou deux suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin une heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes; soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Propriétés Thérapeutiques :

Décongestionnants, astringents, anesthésiques, calmants, antiseptiques.

Indications :

Traitement rationnel des Hémorroïdes.

LABORATOIRES MIDY

4, rue du Colonel-Moll, Paris (XVII^e).

SUPPOSITOIRES PEPET

(Beurre de Cacao-Glycérine)
pour Bébés, pour Garçonnetts,
pour Adultes.

CONSTIPATION. HÉMORROIDES

La boîte : 12 fr. 50

La 1/2 boîte : 7 fr. 50

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie.

56, Boulevard Pèreire

PARIS

SYLCASE

Silicium — Calcium

Formule du Docteur CRETIN.

Fractures, ...

Toutes maladies osseuses.

Laboratoires GRYSA

7, rue Saint-André. — LE MANS

C. LÉTANG, pharmacien.

SYLVOL

Composition :

Benzoate de benzye.....	XX gouttes
Benzaldéhyde.....	I —
Aleool à 90°.....	LXXX —

Perles :

Benzoate de benzye.....	10 centigr.
Benzaldéhyde.....	5 milligr.
Huile d'olive stabilisée.....	Q. S.

Mode d'action. — Antispasmodique.

Indications. — Spasmes digestifs, œsophagiens, pyoriques, néphrétiques, bronchiques, vasculaires, utérins, cardiaques, etc.

Mode d'emploi :

Gouttes : XL gouttes 4 à 5 fois par jour, entre les repas.

Perles : 4 à 13 perles par jour, entre les repas.

Prix : 10 fr.

Laboratoires J. M. RICARDOU

Docteur en Pharmacie

46, rue Pierre-Charron — PARIS

SYMPATHYL

Chantereau

La première synergisme mélicamenteuse constituant, non pas seulement un sédatif, mais un régulateur complet des dystonies organo-végétatives, mise au point d'après les travaux les plus récents de sympathologie et d'endocrinologie.

Forme. — Comprimés.

Indications principales. — Émotivité Irritable, Anxiété, Éréthisme cardiaque, Angor Spasmes, Asthmes, Troubles thyroïdiens, Séquelles d'hystérectomie et d'ovariotomie, Syndromes colaires.

Posologie. — 3 à 6 comprimés par jour, de préférence avant les repas.

Laboratoires CHANTEREAU

8, rue de Constantinople — PARIS (VIII^e)

et 26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e)

SYNCAÏNE

Novocaïnum: Pharmacopée française 1920

Composition. — Ether para-aminobenzoïque du diéthyl-aminoéthanol.

Propriétés. — Anesthésique, sept fois moins toxique que la cocaïne.

Applications. — Anesthésie locale, régionale, épidurale et rachidienne.

Formes : *I. Syncaïne pure, à l'état de sel.*

II. — Comprimés Syncaïne pure et de Syncaïne-Adrénaline.

III. — Ampoules sèches, à 0 gr. 08, 0 gr. 12, 0 gr. 15.

IV. Solutions adranesthésiques.

V. Nécessaire pour anesthésie épidurale.

VI. — Tubes stérilisés Clin (1, 2, 5 10. 25 et 50 cc.), aux titres usuels.

VII. — Collyres de Syncaïne.

Laboratoires CLIN

PARIS

SYNERGYL VADAM

Histogénèse générale

Formes. — *Ampoules et Granulé.*

Doses. — Une ampoule tous les deux jours (ou une cuillerée à café de granulé deux fois par jour), chez tous les grands déprimés et convalescents.

Tonique ante et post-opératoire.

Composition. — Nucléophosphates de soude et de chaux associés aux arsenicaux assimilables et à la strychnine (0,004 par ampoule).

Prix : Boîte 12 amp. : 18 fr. — Boîte 200 gr. granulé : 15 fr.

Demander renseignements et Littérature aux

Laboratoires J. PLÉ

Docteur en Pharmacie

111 bis, rue de Turenne — PARIS (III^e)

SYNTHOL

Complexe de Cyclanols polyméthylliniques et de Cétones cycliques agissant par action physique. Rigoureusement exempts d'alcaloïdes toxiques, de radium ou de dérivés radio-actifs.

Présentation. — Liquide hyalin, non toxique, ni caustique, ni saïssant, s'employant exclusivement en applications externes. Livré en flacons de 250 cc. environ, entourés, chacun d'un écran inactinique.

Propriétés. — Excitant efficace de la vasomotricité (propriétés immédiatement vérifiables). Tonique du système nerveux par action réflexe et régulateur des échanges intraorganiques. Cryogénique d'action rapide provoquant instantanément une sensation d'euphorie chez l'individu en état de santé ou en cours de maladie. Dynamogénique et tonique de toute déficience organique sans aucune action secondaire néfaste.

Indications. — La plupart des états de dépression et le symptôme douleur.

Du fait de son mode d'action très général, le **Synthol** est plutôt qu'un médicament un mode thérapeutique utilisable dans de nombreuses circonstances comportant un état de dépression ou le symptôme douleur.

a) Symptôme *Fatigue*: États asthéniques au cours des maladies. Anémies, Dénutrition, Convalescence des États infectieux, etc., Surmenage intellectuel, Insomnie, Dépression nerveuse. Neurasthénie, Surmenage physique.

b) Symptôme *Douleur*: Migraines, Névralgies, toutes les douleurs dues aux accidents arthritiques, Rhumatismes aigus, chroniques, déformants, articulaires, musculaires.

Limitations des mouvements articulaires, Arthrites. Sciatiques. Lumbagos, Névralgies faciales, Douleurs intercostales, Coliques intestinales, Hépatiques, Néphrétiques, Utéro-ovariennes, etc.

c) Autres Indications principales :

Troubles de la circulation veineuse : Hémorroïdes, Phlébites, Varices, etc.

Usages gynécologiques: Leucorrhée, Vaginites, Métrites. Troubles de la Ménopause. Période obstétricale.

Usages chirurgicaux: Pansements aseptiques. Anesthésie locale en remplacement du Kéleu. Anémie post-opératoire.

Usages stomatologiques: Pyorrhée alvéolo-dentaire. (Irrigations dans le trajet intragingival au moyen d'une seringue, guérison obtenue en quelques jours.)

Pansements dentaires, Irritations des muqueuses, etc.

Posologie. — S'utilise en Lotions, Compresses, Frictions, Pulvérisations, Lavages, Gargarismes, Pansements pur ou étendu d'eau à 50 et 20 %. En général, les applications doivent être faites non seulement sur le point où se manifeste le symptôme douleur, mais en même temps sur la région où l'on estime que se trouve la cause principale du malaise (les applications sur la tête et la nuque sont très importantes et généralement indiquées du fait de l'action du **Synthol** sur les centres bulbaires).

Utiliser: **Synthol** pur: en Frictions sur la tête, la nuque et les régions malades. Additionné d'eau à 50 et 20 %; en Gargarismes et Injections intravaginales, etc., et Compresses permanentes renouvelées plusieurs fois par jour, en Compresses sur les Contusions, Brûlures, Douleurs névralgiques variées, et injections dans les trajets fistuleux.

Eviter de laisser s'écouler plus de 24 heures entre chaque application. L'usage du **Synthol** sur l'épiderme ne doit jamais produire de rubéfaction. Il est inutile de frictionner fort. Dans le cas d'utilisation prolongée en compresses pures, vaseliner légèrement la peau.

LABORATOIRES DU SYNTHOL

Usine Centrale,

3, 5, 7 et 9, rue de l'Abreuvoir
BOULOGNE-SUR-SEINE (Seine).

Tél.: Molitor 14-47 et 14-48.

TABLETTES HOVA

(ou Hovalettes)

Composition. — Chaque tablette renferme *cinq centigrammes* d'extra ts dialysés, dont un tiers de houblon et deux tiers de valériane.

Propriétés. — Sédation inoffensive et *progressive* du système nerveux, dispensant de l'emploi du chloral, des bromures et des dérivés barbituriques.

Indications. — *Toutes les affections d'origine nerveuse* : Surexcitation, Insomnie, Neurasthénie, Troubles de la ménopause. Se prescrit également aux enfants dont le sommeil est agité, aux vieillards pour combattre les battements de cœur et autres manifestations de l'artériosclérose.

Mode d'emploi. — 3 à 4 tablettes trois fois par jour, aux deux repas et au moment de se coucher. Demi-dose pour les enfants.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV^e).

TABLETTES PERROUD

La "Tablette Perroud" est certainement la forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : Le goût n'est pas offusqué, les reflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Dose. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie*, 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médiocrement puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastro-pathies : *Gastrite*, *gastralgie*, *Hypersécrétion* dans les *fermentations intestinales*, à petites doses seule ou associée, la "Tablette Perroud" rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD

3 rue Sébastien Gryphe — LYON
(ancien^t 7, rue des Archers)

TABLETTES ZÉVA

Formule. — Extraits SECS d'hydrastis, hamamélis, viburnum, bourdaine, kola, excipient spécial.

(aucune incompatibilité comme avec les mélanges d'extraits fluides et de teintures).

Présentation. — Tablettes de 1 gr. équivalentes à environ XL gouttes du mélange d'extraits fluides. Goût agréable.

Posologie. — 1 à 4 par jour, 15 à 20 jours par mois.

(aucune contre-indication)

Indications. — Dysménorrhée, aménorrhée, Ménopause, Suites d'ovariotomie, Varices, Phlébites, Hémorroïdes.

Prix : 9 fr. 50

Laboratoire H. CLUZEL

60, Cours Émile-Zola—LYON-VILLEURBANNE

TABUROL MONAL

Hématopoiétique leucocytogène.

Trois formes. — Ampoules, Dragées, Gouttes.

Composition. — Hémoglobine, manganèse, strychnine, fluor, méthylarsinate, glycérophosphate, acide nucléinique. Dans les ampoules pas hémoglobine.

Doses. — 4 à 6 dragées par jour aux repas. Avaler sans croquer. — XV à XX gouttes avant les repas. — 1 ampoule chaque jour.

Action. — Stimule la nutrition cellulaire. Restaure les déficiences nerveuses. Reminéralise l'organisme.

Indications. — Etats anémiques, convalescences ; troubles palustres, dépression nerveuse.

Laboratoires MONAL et C^{ie}

6, rue Bridaine, Paris

TÆNIFUGE BARDET

(Médaille d'or, Strasbourg 1924)

Composition. — Préparation liquide à base d'*Aspidium Felix Mas*, obtenue par un procédé mécanique à l'état colloïdal, lui conférant un maximum d'activité.

Indications. — Médication anthelminthique complète : *Tænias*, *Ascarides*, *Oxyures*, *Ankylostomes*, *Tricocéphales* et tous parasites intestinaux.

Présentation. — Dans la même boîte se trouvent : *a)* le *Tænifuge* proprement dit; *b)* le purgatif.

Posologie. — *Tænia* : Absorber en 2 fois à vingt minutes d'intervalle le *Tænifuge*. Une heure après, le purgatif.

Ascarides, *Oxyures*, etc. : Une cuillerée à soupe du *Tænifuge* le matin à jeun pendant 4 jours. Le 5^{me} jour absorber le purgatif.

Enfants 1/2 ou 1/4 des doses ci-dessus. Se conformer aux indications détaillées du prospectus joint au flacon.

Formuler : « **TÆNIFUGE BARDET** »

Échantillons et Littérature détaillée

Laboratoires BARDET

Fondés en 1860

76, Rue de Sèvres — PARIS (VII^e)

TÆNIFUGE FRANÇAIS DU D^r E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait chloroformo-huileux de Fougère mâle des Pyrénées, comprenant le purgatif. Présenté en capsules.

Indications. — Ankylostomiase, Teniasis, Parasites intestinaux.

Caractéristiques. — Pas de traitement préalable, pas de diète, pas de purgatif, pas d'arrêt du travail, absorption particulièrement simple, *non toxique*.

Mode d'emploi. — Absorption de capsules le matin à jeun, en dix minutes, avec *aussi peu de liquide que possible*. Action au bout d'une heure ou deux. Si malaise ou nausées absorption d'un peu de café ou de thé.

Dose. — Adultes : 12 capsules. Enfants au-dessous de 12 ans : autant de capsules que d'années d'âge et une en plus.

Prix : 12 fr. 50

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU
6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).
Anciennement, 10, rue de Turenne — PARIS (IV^e).

TÆNIFUGE KIRN

en capsules

à base de filicine, principe actif de la fougère mâle dissous dans son huile grasse.

Tænifuge le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des ténicides, comme la pelletièreine.
(Travaux et thèse de Kirn et Schmidt)

Capsules Kirn. — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme; sans calomel.

Mode d'emploi. — 1^o Avant-veille, purgation; 2^o la veille, diète presque absolue (lait); 3^o Le matin à jeun l'absorption de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog, suivie à nouveau d'une légère purgation.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement observés.

Enfants. — Capsulines Kirn, spécialement dosées.
Médication sans similaires

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

r e de la Source — PARIS (XVI^e) Tél. Aut. 11-86

TAMPOL " ROCHE "

Pansement gynécologique idéal

Le *Tampol Roche* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique, non absorbante contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet.

Mode d'emploi. — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol " Roche "* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade, ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait.*

N. B. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol Roche* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

TAPO

Ferments lactiques.

Spécifiques des affections gastro-intestinales.

Forme. — Cultures liquides.

Composition. — Excipient : Bouillon de Viande peptoné. Principe actif : Ferments lactiques sélectionnés.

Propriétés thérapeutiques. — Au point de vue curatif, le **Tapo** modifie rapidement le terrain infecté, augmente la résistance du malade : n'apporte ni une aide indispensable à la leucocytose organique et détruit les conséquences de l'infection.

Au point de vue préventif, le **Tapo** met l'organisme en état de non réceptivité tant par la résistance qu'il augmente que par la destruction des micro-organismes qui assiègent l'individu continuellement.

Indications. — Gas'trites, Entérites, Entérocôlites. Intoxications alimentaires, Diarrhées chroniques, Dysenteries. Insuffisance hépatique, Appendicite chronique, Néphrites colibacillaires, Albuminurie, Impétigo, Eczéma, Furunculose, Pyodermites, enfin dans toutes les maladies fébriles aiguës (grippe, fièvres typhoïde et para-typhoïde) *comme agent anti-infectieux.*

Posologie. — De 1 à 2 flacons-ampoules par vingt-quatre heures (ou plus dans les cas d'infections marquées) pur ou dans un peu d'eau. Le traitement est de trois boîtes, on peut le continuer comme préventif en cas de récurrence.

Le **Tapo** est d'une conservation indéfinie ; ne s'altère pas sous l'action de la chaleur et du froid : c'est donc le produit d'élection pour les colonies et les pays chauds.

Prix de vente au public : 15 francs.

Laboratoires MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS

TARTRATE BORICO- POTASSIQUE PACHAUT

Tubes dosés de tartrate borico-potassique pur
 à faire dissoudre au moment de l'emploi.
 Conservation parfaite.

Indications. — Épilepsie, troubles névropathiques.

Présentation. — En boîtes de 30 tubes dosés à : 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr., 3 gr., 4 gr., 5 gr., 6 gr., 8 gr.

Posologie. — Dose moyenne : 4 à 5 gr. par jour pour les adultes. Dépourvu de toute toxicité, doit être pris chaque jour sans interruption jusqu'à guérison.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre le contenu d'un tube dans un verre d'eau, à prendre en 2 ou 3 fois dans les 24 heures.

Laboratoires PACHAUT

430, Boulevard Haussmann — PARIS

TAXOL

Composition :

Extrait total des glandes de l'intestin.....	0 gr. 05.
Extrait biliaire.....	0 gr. 10.
Agar-Agar.....	0 gr. 05
Ferments lactiques.....	0 gr. 05

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Prop. théér. — Régulateur physiologique de l'intestin. Aucune accoutumance. Non toxique.

Indication. — Constipation.

Dose et Mode d'emploi. — Commencer le traitement par deux comprimés après un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Laboratoires "LOBICA"

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e)

TÉBÉPHAGUINE-FORNET

Vaccin buccal antituberculeux

Principe actif. — Bacilles tuberculeux isolés des affections tuberculeuses les plus diverses et dégraissés par un procédé spécial breveté en France.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire, osseuse et autres.

Posologie. — 1 à 3 pilules par jour.

Propriétés therap. — Après une réaction locale et générale, légère diminution et disparition de la Fièvre, des Sueurs, de la Toux, des Douleurs et de la Faiblesse, Augmentation du poids et des forces, Amélioration de l'appétit, du sommeil et de l'état général.

Service commercial et échantillons.

Laboratoires **THAIDELMO**

23, rue du Caire — PARIS (II^e)

Informations scientifiques et échantillons.

**INSTITUT DE MICROBIOLOGIE
SARREBRUCK**

TÉCARINE

Homocaféinate de sodium.

Diurétique déchlorurant, dépourvu de toxicité. Présente sur la théobromine l'avantage d'être soluble dans l'eau.

Indications :

Oligurie des affections cardio-rénales, Œdèmes, Ascites.

Posologie et mode d'emploi :

Voie buccale : 1 à 3 comprimés à 25 centigr. par 24 heures.

Voie hypodermique : 1 ou 2 ampoules de 2 cc. par 24 heures.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

TERKAL MONAL

Forme. — Dragées.

Compos. — Carbonate de gaiacol ter-pino-codéiné associé au fluorure de calcium nucléiné et aux extraits de plantes béchiques.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour entre les repas. Avaler sans croquer.

Action. — Calmantes, Expectorantes, Curatives, Reminéralisatrices.

Indications. — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

Laboratoires MONAL & C^{ie}

6, Rue Bridaine --- PARIS

TÉTRANITROL ROUSSEL

Composition.

Comprimés de tetranitrate d'Erythrol à 1, 2, 5 mmgr et 1 centigr.

Indications.

Hypertension : **Angine de poitrine, asthme cardiaque, œdème pulmonaire.**

Doses et mode d'emploi.

Laisser fondre les comprimés sur la langue au moment des crises (de 1 à 15 mmgr. par 24 heures).

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington. — PARIS (VIII^e).

THALASSOTONINE VADAM

Triade leucocytogène et tonique associée à l'action catalytique de l'Eau de Mer.

Formule :

Eau de mer isotonique..... 5 cc.
 Cadodylate de soude..... 5 centigr.
 Sulfate de strychnine..... 1 milligr.
 Nucléino-phosphoglycérate de soude.. 10 centigr.

Posologie. — Une injection, indolore, intra-musculaire, tous les deux jours. Enfants au-dessous de 10 ans : 1/2 dosé.

Indications. — États infectieux chroniques, déficiences cellulaires, surmenages, neurasthénie, convalescence.

Prix au public : Boîte de 10 ampoules : 25 francs, Échantillon et littérature sur demande de MM. les Médecins.

Laboratoire J. PLÉ

111^{bis}, rue de Turenne, PARIS (III^e)

J. PLÉ, Docteur en Pharmacie (Univ. de Paris)

THAOLAXINE

(Laxatif-régime)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhamnées. Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

Doses et mode d'emploi. — Paillettes 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas ; cachets, 1 à 4 cachets à chaque repas ; comprimés, 2 à 8 comprimés à chaque repas ; granulé, 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas (spécialement préparé pour les enfants).

Prop. therap. Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

Indications. — Spécifique de la constipation habituelle.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DURET & RÉMY

ASNIÈRES (Seine)

THÉBAÏL

(Opium essentiel).

Propriétés. — Le *Thébaïl* (opium essentiel) qui exclut de sa composition les alcaloïdes convulsivants et stupéfiants de l'opium et qui n'en conserve que les alcaloïdes soporifiques et calmants, donne la puissance maxima de l'opium, avec toutes les efficacités pacificatrices que l'on attend de ce précieux agent. Enfin son activité physiologique est rigoureusement dosée *in vivo*.

Formes thérapeutiques. — Le *Thébaïl* est présenté sous 3 formes :

1^o En ampoules isovisqueuses indolores dosant par cent. cubes :

Thébaïl.....	2 centigr.
équivalent à { morphine.....	1 —
{ extrait d'opium.....	5 —

2^o En comprimés dosant :

Thébaïl.....	1 centigr.
équivalent à { morphine.....	5 —
{ extrait d'opium.....	25 —

3^o En suppositoires dosant :

Thébaïl.....	1 centigr.
--------------	------------

Posologie pour les adultes :

Ampoules.....	1 à 2 par 24 heures
Comprimés.....	2 à 4 —
Suppositoires.....	1 —

Dépôt Laboratoires **NOGUES**
11, rue Joseph-Bara — PARIS

THÉISINE DUBAT

Granulé de Théobromine et Extrait de maïs.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique idéal dans les affections du cœur et des reins. Action certaine, constante, durable ; toxicité nulle ; pas de céphalées, pas d'intolérance. *Granulé* de goût agréable, préféré aux cachets et aux solutions par les enfants et les vieillards.

Indications. — Toutes celles de la théobromine, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, fléchissement du cœur dans l'artériosclérose, affections cardiorénales, mal de Bright, albuminurie, néphrite, maladies infectieuses et tous les cas d'insuffisance urinaire.

Doses. — 2 à 8 cuillerées à café par jour.

cuillerée à café = { 0 gr. 25 théobromine pure,
 { 0 gr. 05 extrait de maïs.

Prix : 12 francs.

Echantillons sur demande.

LABORATOIRE DU D^r DUBAT

80, rue du faubourg Saint-Denis, Paris.

THEINOL

Forme. — Élixir.

Composition. — Théine en combinaison salicylique, Salicylate d'Antipirine.

Propriétés pharmacodynamiques. — Euphorique. — *Antidépresseur*. — Analgésique. — Régulateur des fonctions nerveuses. — Tonique circulatoire.

Indications. — Migraines. — Névralgies. — Douleurs rhumatoïdes. — Crises gastro-intestinales. — Dysménorrhées.

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à dessert à une heure d'intervalle l'une de l'autre.

Laboratoires A. BAILLY et C^{ie}
15 et 17, rue de Rome — PARIS (8^e)

THEMSALINE

Composition :

La Themsaline préparée d'après les travaux du Dr Jentzer de Genève (Voir *Traitement biologique des infections*, Masson, éditeur) est un mélange fractionné et rectifié d'essences et de résines.

Propriétés :

Agit comme antiseptique, antitoxique, analgésique, sédatif, leucogène et tonique. Attaque l'infection étiologiquement et non symptomatiquement, comme tous les narcotiques.

Indications :

Toutes les infections aiguës : grippe et infections pyogènes, érysipèle, angines, annexites, furoncles, phlegmons, péritonites, fistules d'origine infectieuse, plaie infectées. *Contre-indications* : éviter les doses fortes dans la pneumonie, la broncho-pneumonie, les néphrites.

Mode d'emploi :

En injections intraveineuses, pratiquées lentement avec une seringue à tuberculine et, de préférence, avec l'aiguille spéciale Jentzer : 6/10 cmc. chez l'adulte et 3/10 cmc. chez l'enfant. Une injection par jour jusqu'à guérison ou apyrexie.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV^e)

THÉOBROMINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Diurétique puissant.

Indications. — Néphrites, cardiopathies, artériosclérose, arthritisme.

Formes. — Pure, caféinée, lithinée, phosphatée, en boîtes de 24 cachets à 0,50 ; 30 cachets à 0,25.

Pharmacie Centrale de France
21, rue des Nonnains-d'Hyères.
PARIS (IV^e).

THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé

Prop. ther. — Possède les propriétés toni-cardiaques et diurétiques de la théobromine, mais est dépourvue des inconvénients de celle-ci ; son activité se manifeste à des doses 5 fois moindres. Elle agit quand la théobromine est inefficace et provoque l'excrétion de l'urée et des chlorures.

Indications. — Les effets cardio-toniques et vaso-dilatateurs de la Théobromose, en outre de son action diurétique énergique, font de ce produit associé ou non à la Digitaline la base de la thérapeutique cardio-rénale. Elle est indiquée dans l'urémie, l'uricémie, l'artério-sclérose, la sclérose cardio-rénale, les œdèmes d'origine cardiaque ou rénale, etc.

Formes. — 1^o Solution. Dose : 1 à 4 cuill. à soupe par jour dans un peu d'eau sucrée.

Une cuill. équivalent à 0,50 cgr. de théobromine.

2^o Gouttes. — Dose : 1 à 4 cuillers-mesures par jour.

60 gouttes ou une cuiller-mesure équivalent à 0,50 de Théobromine.

3^o Comprimés. — Dose : 2 à 8 par jour.

comprimés équivalent à 0,50 cgr. de Théobromine.

Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS

THÉOBRYL " ROCHE "

(Théobromine injectable).

Indications. Contre-indications, Action thérapeutique de la Théobromine, mais plus maniable, plus actif et à doses moindres. (Voir les travaux des Professeurs Pouchet, Rémond, E. Duhot, des Docteurs Jouisse, Richard St-Yves, Bénech, Ségard, Vigoureux, Colombiès, Crampon, etc.).

Toujours très bien toléré par les adultes, les vieillards et les enfants.

THÉOBRYL " ROCHE " AMPOULES

chaque ampoule = 2 cc.

Cette forme est indiquée quand il y a intolérance gastrique ou susceptibilité du malade et chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

ADULTES : dose moyenne utile, 1/2 ampoule 2 à 4 fois par jour.

(Voir page Ampoules Théobryl).

THÉOBRYL " ROCHE " GOUTTES

1 cc. = XXX gouttes.

Cette forme permet de continuer et de prolonger l'action obtenue par les injections ou de réaliser un *traitement d'entretien* toujours parfaitement supporté. Chaque dose doit être prise dans un verre d'eau sucrée ou aromatisée, ou bien dans une tasse de tisane de queues de cerises, orge et chiendent, stigmates de maïs, etc., à n'importe quel moment de la journée, de préférence une demi-heure avant ou après les repas.

ADULTES : dose moyenne utile, X gouttes 4 à 8 fois par jour.

Enfants : V gouttes 2 à 6 fois par jour.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS

THÉOSALVOSE

Composition. — Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao.

Propriétés. — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

Indications. — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales. Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 ou 4 à 8 cachets dosés à 0 gr. 25 par jour.

Formes. — Théosalvose pure, digitalique, strophantique, spartéinée, scillitique, barbiturique, caféinée, phosphatée, lithinée.

Laboratoires André GUILLAUMIN
13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

THÉOXANTHINE

Diurétique cardio-rénal
Adjuvant précieux des cures toni-cardiaques

Composition. — Théobromine cristallisée pure associée au phosphate disodique.

Indications. — En général toutes celles de la théobromine. Pas d'intolérance. Activité plus grande à doses moindres. Complète très heureusement les cures toni-cardiaques.

Présentation et posologie.

<i>Cachets A :</i>	Théobromine crist. pure.....	0,50
	Phosphate disodique.....	0,20
<i>Adultes.</i>	— 2 à 3 cachets par jour.	
<i>Cachets B :</i>	Théobromine crist. pure....	0,25
	Phosphate disodique.....	0,10

Enfants : 1 à 2 par jour ; *Adultes* 4 à 6.

Echantillons et littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

6, rue d'Assas, Paris (6^e) Tél. : Littré. 31-85.

Belgique : *Agent général* : **L. Prunières**
19, rue Louis Hap. — BRUXELLES

THIGÉNOL " ROCHE "

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

Indications. — Dermatologie, Oto-rhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

Thigénol " Roche " pur ou en solution glycinée (10 à 15%) en applications externes :

Savon " Roche " au Thigénol, le meilleur savon antiseptique.

Toutes les affections gynécologiques :

Thigénol " Roche " pur ou en solution glycinée (10 à 15%).

Ovules " Roche " au Thigénol à 30% (voir page spéciale).

Tampol " Roche " pansement gynécologique idéal (voir page spéciale).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co
21, Place des Vosges — PARIS

THIOLCOL "ROCHE"

Dérivé du gaiacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 gr. de Thiocol "Roche" = 0,52 cg. de gaiacol cristallisé.

Doses et modes d'emploi :

SIROP "ROCHE" au Thiocol

(1 cuill. à soupe = 1 gr. Thiocol "Roche")

Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour

Enfants : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge.

CACHETS "ROCHE" de Thiocol

(1 cachet = 0,50 cg. Thiocol "Roche")

2 à 6 cachets par jour

COMPRIMÉS "ROCHE" de Thiocol

(1 comprimé = 0,50 cg. Thiocol "Roche")

2 à 6 comprimés par jour

Prop. Thér. :

Antiseptique pulmonaire, Phagocyto-gène, Eupeptique, Orexique.

Ind. Thér. :

Toutes les affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites. Diarrhées, etc.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{le}
21, Place des Vosges — PARIS

THIOSOTE

Lambiotte Frères

Sirop concentré à base de sulfo-créosotate de potassium et de teintures de Lobélie et de Drosera.

Propriétés thérapeutiques. — Bactéricide, Dynamogène, Sciergène, Modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires.

Mode d'emploi :

Adultes : 4 cuillérées à dessert par jour.

Enfants : A partir de 3 ans 4 cuillérées à café par jour), à prendre de préférence comme édulcorant d'une boisson chaude (lait, tisane, etc.).

Nourrissons : XXV à L gouttes par jour selon l'âge par prise de V à X gouttes mélangée au lait.

Littérature et échantillons :

Produits LAMBIOTTE Frères

20, rue Dumont-D'Urville — PARIS

124, avenue Rogier — BRUXELLES

THOROXYL

Antiseptique intestinal - antidiarrhéique non constipant.

Pharmacologie. — A base de terres rares, bactéricide et favorisant l'action des sucs digestifs.

Indications. — Tous les états diarrhéiques du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. Tous les syndromes infectieux à point de départ intestinal (colibacillurie, etc.).

Posologie. — Aucune contre-indication. Aucune toxicité. 6 à 10 comprimés pour l'adulte. 2 à 6 comprimés pour l'enfant et le nourrisson.

Laboratoires du D^r LAURENT-GÉRARD

Docteur ès sciences.

Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris.

40, rue de Bellechasse — PARIS

Tél. : Littré 97-95.

THYROXINE " ROCHE "

Thyroxine synthétique préparée suivant les données de Harington et Barger.

Ampoules : (boîtes de 6) une ampoule de 1 cent. c. = 1 milligr. de thyroxine.

Comprimés (tube de 30) : un comprimé = 1/2 milligr. de thyroxine.

Indications. — Obésité générale, Myxoedème, Goitre, Cachexie strumiprive, Troubles de la croissance et du développement, Oligurie.

Mode d'emploi et Doses :

Voie buccale : 1 à 2 comprimés par jour et plus. Voie intramusculaire : 1/2 à 1 ampoule par jour et plus. Les injections peuvent être aussi endoveineuses et même sous-cutanées, celles-ci déterminant une légère sensation de tension qui disparaît rapidement.

Produits

F. HOFFMANN-LAROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS

TIODINE COGNET



Composition. — Combinaison cristallisée, soluble dans l'eau, de l'iode 47 % avec la thiosinamine.

Propriétés. — Réalise l'Association *Iode-soufre*. Médicament organo-iodique-soufré. Pas d'iodisme. Pas de contre-indications.

Indications. — Toutes celles de l'iode et du soufre, ensemble ou séparément. Toutes scléroses. Hypertension. Rhumatisme chronique. Tabès. Scléroses médullaires. Asthme. Emphyseme. Syphilis, Obésité, etc.

Formes et posologie. — Pilules (Tiodine: 0 gr. 05 par pilule). *Adultes*: 2 à 5 par jour. *Enfants*: 2 par jour. Ampoules (Tiodine 0 gr. 20), 1 tous les 2 jours (voie sous-cutanée, intramusculaire ou intra-veineuse).

Laboratoires des Produits COGNET

Armingeat et C^{ie}

43, rue de Saintonge — PARIS (III^e)

TOCHLORINE

Paratoluène Sulfochloramine

Action antiseptique durable, par mise en liberté progressive de petites quantités d'hypochlorite de soude (principe de la solution de Dakin).

Indications:

Antisepsie chirurgicale et médicale.

Désinfection des eaux.

Posologie et mode d'emploi. — *Usage externe*: Solution aqueuse de 0 gr. 50 p. 100 à 2 p. 100 pour lavages; gaze imprégnée, pâtes, collyres, etc...

Usage interne: Quatre cachets de 0 gr. 05 par 24 heures.

Désinfection des eaux: Deux centigrammes par litre.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum Neuro-Tonique

Ampoules contenant chacune :

Sulfate de strychnine.....	1 milligr.
Cacodyl. de soude.....	0.05
Glycérophosph. soude (Cod. 1908).	0.20
Eau de mer diluée.....	5 cc.

Prop. thér. — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer auxquelles s'ajoutent celles des autres éléments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

Indications. — *États de dépression nerveuse et organique, Convalescences, Neurasthénie, Entérites, Tuberculose.*

Laboratoires LEMATTE et BOINOT

52, rue La Bruyère — Paris

Télégr. CHEVREMATTE-PARIS

TONIQUE " ROCHE "

Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale.
Goût très agréable, Efficacité certaine.

Propriétés thérapeutiques :

Propriétés classiques de ses constituants : Acide phosphorique, Arsyène, Strychnine, Kola, complétées et renforcées par un catalyseur de choix : le Manganèse.

Indications :

Toussurmenages, Asthénies, Neurasthénie, Anémies, Prétuberculose, Convalescences, Adénopathies, etc.

Mode d'emploi et doses :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un liquide quelconque.
Enfants (de 8 à 15 ans) : demi-doses.

Produits

F. HOFFMANN-LAROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS

TONUDOL

Comprimés, granulé, injectable.

Nucléarsinate de manganèse associé aux hypophosphites de chaux et de fer.

Dose et mode d'emploi. — 2 comprimés, 1 mesure ou cuillerée à café de granulé avant chaque repas.

Injectable : 1 ampoule de 1 cc. tous les jours ou tous les deux jours en injection intramusculaire profonde.

Indications. — Reconstituant de l'organisme indiqué dans les Surmenages, les Troubles de la Nutrition et de la Croissance, la Chlorose et l'Anémie.

Fortifie sans provoquer d'excitation.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS
Téléphone : Maillot 17-75.

TONYOL "F"

Composition. — Préparation à base d'acantha virilis, de piscidia et de viburnum.

Action. — L'acantha virilis, dont le principe actif est la muirapuiamine, a été étudiée par Rebourgeon et Matte. C'est un remarquable tonique neuromusculaire et un accélérateur du courant circulatoire, à action prolongée due à la lenteur de l'élimination.

Indications. — Troubles de la circulation, Accidents de la puberté et de la ménopause, Règles douloureuses et irrégulières, Congestion pelvienne, Artério-sclérose, Varices, Hémorroïdes.

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés par jour.

Prix du flacon : 13 francs.

Laboratoires VARGAS

5, rue Chauveau-Lagarde — PARIS (VIII^e)

TOPIQUE STOMACAL DAUSSE

Granulé à base de gélose, gélatine et carbonate de bismuth. Réalisation pratique de la Thérapeutique par le pansement gastrique.

Indications. — Toutes les formes de gastrite, même celles qui s'accompagnent de *réten-*
tion, les *dyspepsies hyperacides*, les *ulcéra-*
tions, les *hémorragies gastriques*.

Action sédative immédiate dans toutes les algies gastriques.

Posologie. — 1 cuillerée à soupe plusieurs fois par jour, au réveil à jeun, une demi-heure avant chacun des principaux repas, le soir au coucher.

Délayer la dose dans 1/4 de verre d'eau et absorber après simple dissolution.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV).

TOTAL-TONIC

Le plus complet et le plus énergique des Reconstituants.

Forme. — Elixir.

Action. — Immédiate sur les systèmes nerveux, osseux, musculaire, glandulaire et sur le plasma sanguin.

Indications. — Toutes défaillances de l'organisme, Amaigrissement, Asthénie, Anorexie, Anémies, convalescences, maladies de la nutrition, bronchites chroniques et pré-bacillose, neurasthénie etc.

Composition. — Chaque cuiller à soupe contient :

Fer (citrate ammoniacal).....	0.05
Manganèse (sulfate).....	0.0375
Phosphate de soude.....	0.50
Acide phosphorique officinal.	0.25
Méthylarsinate de soude.....	0.015
Extrait de quinquina.....	0.25
Teinture de noix vomiques...	0.25
Teinture de Coca.....	1.25
Extrait fluide de kola.....	0.32

Le TOTAL-TONIC réalise une association nouvelle, complète, et moderne des éléments indispensables à l'organisme défaillant.

Mode d'Emploi. — Adultes : Une cuiller à soupe avant le repas de midi et du soir dans un peu d'eau, de vin ou de lait.

Adolescents : (14 à 18 ans) : Une cuiller à dessert aux mêmes heures et de la même façon.

Enfants (au-dessus de 10 ans seulement) : Une cuillère à café dans un peu d'eau ou de lait avant le repas de midi et du soir pendant 12 jours ; arrêter 5 jours et terminer le flacon aux mêmes doses.

Prix : 16 francs.

Laboratoires B. C. L.

M. BERGER

29, Faubourg de Bourgogne — ORLÉANS

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple PARIS (III^e) et ses succursales.

TOT'HAMÉLIS

Chantereau

(ni jouvence, ni extrait, ni teinture).

Composition. — *Feuille* d'Hamamélis administrée en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante *fraîche*.

Propriétés thérapeutiques. Médication de base de l'insuffisance veineuse. Le **TOT'HAMÉLIS** peut être prescrit : 1° seul, avec des résultats contrôlables en moins de huit jours de traitement ; 2° associé à tous produits ; 3° en alternant avec les mêmes produits pour éviter l'accoutumance. (Le **TOT'HAMÉLIS** a, sur les compositions polyvalentes, l'avantage de laisser au médecin la direction du traitement à instituer, selon les cas).

Indications. Stases veineuses. Etats congestifs. Hypertension.

Posologie. — *Comprimés* : 6 par jour, aux repas. *Cachets* : 2 par jour, aux repas. *Suppositoires* (hémorroïdes) : 1 à 2 par 24 heures. Après disparition des troubles à combattre, les doses peuvent être diminuées de moitié comme médication d'entretien.

Laboratoire CHANTEREAU

8, rue de Constantinople et
26 bis, rue Dombasle — PARIS

TRÉPARSÉNANS

SULFO-TRÉPARSÉNAN

Composition. — Dioxydiaminoarsénobenzène méthylène sulfonate de soude. Contient 20 % d'arsenic; solutions moins oxydables à l'air que celles des 606 et 914. Injections sous-cutanées ou intramusculaires indolores.

Formes. — Le *Sulfo-Tréparsénan* est délivré en ampoules scellées à la lampe et contenant le produit dans le vide sur gaz carbonique, en boîtes d'une dose et en boîtes de 10 ampoules d'une même dose.

Doses.	00	0	I	II	III	IV
	0 gr. 02	0 gr. 04	0 gr. 06	0 gr. 12	0 gr. 18	0 gr. 24
	V	VI	VII	VIII	IX	X
	0 gr. 30	0 gr. 36	0 gr. 42	0 gr. 48	0 gr. 54	0 gr. 60

NÉO-TRÉPARSÉNAN

Composition. — Dioxydiaminoarsénobenzol méthylène sulfoxylate de soude. Produit défini, rigoureusement stable; se présente sous l'aspect d'une poudre jaune citron légère, douée d'une odeur franche, faiblement alliée, très facilement soluble dans son poids d'eau distillée; sa solution est neutre.

Doses et Formes. — Délivré en ampoules scellées à la lampe et contenant le médicament dans le vide, sur gaz carbonique, aux doses suivantes:

I	II	III	IV	V
0 gr. 15	0 gr. 30	0 gr. 45	0 gr. 60	0 gr. 75
	VI	VII		
	0 gr. 90	1 gr. 05		

- 1° Par boîte de 1 dose en ampoules de 10 cc. à fond plat;
- 2° Par boîte contenant la série des 6 doses progressives (I à VI) en ampoules à fond plat;
- 3° Par boîte de 10 ampoules de la même dose, en ampoules ordinaires de 5 cc. à fond rond;
- 4° En boîtes de 3 ampoules de 3 grammes de sel.

TRÉPARSÉNAN. — Dichlorhydrate de dioxydiamidoarséno-benzène.

Doses de 0 gr. 10 à 0 gr. 60 par progression de 0 gr. 10.

Nota. — Avant d'être livrés pour l'usage thérapeutique, les *Tréparsénans* sont l'objet d'un contrôle chimique et d'un contrôle physiologique des plus sévères de façon à ne présenter que des produits parfaitement purs, de bonne conservation et de constance éprouvée.

TREPARSOL

acide formyl-méta-amino-
para oxyphénylarsinique.

Indications :

Syphilis, à tous les âges (nourrissons, enfants, adultes), et à toutes les périodes de la maladie (Hérédo-Syphilis, Syphilis primaire, secondaire, tertiaire, Para-Syphilis).

Dysenterie amibienne. Le Tréparsol est un véritable spécifique de cette affection, qu'il guérit en détruisant les Amibes et les Kystes amibiens.

Protozooses intestinales ; Diarrhée des Tuberculeux ; entéro-colites diverses (d'origine parasitaire ou infectieuse).

Pian et toutes Spirochétoses ; Angine fusospirillaire de Vincent, etc.

Présentation :

Tubes de 30 comprimés dosés à 0,25
(dosage adultes). Prix : 22 fr.

Tubes de 40 comprimés dosés à 0,40
(dosage enfants). Prix : 43 fr. 20

Tubes de 60 comprimés dosés à 0,02
(dosage nourrissons). Prix : 44 fr.

Posclogie :

Adultes : 1 à 4 comprimés par jour.

Enfants : 0,01 à 0,02 cg par jour et par kilog.

Mode d'emploi :

Traitement *discontinu* (3 à 4 jours consécutifs par semaine), et *progressif* (commencer par des doses faibles et augmenter de semaine en semaine.)

Dépôt : Pharmacie général.

54, rue de la Chaussée-d'Antin, PARIS.

Laboratoire

L. LECOQ et F. FERRAND,
44, rue Gravel, LEVALLOIS (Seine).

TRÉPOL

Traitement bismuthique de la syphilis. Médication intra-musculaire en ampoules stérilisées (3 cc.).

Spirillicide à base de tartrate basique de bismuth renfermant environ 80 % de Bi en suspension huileuse.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'Hygiène.

La boîte de 12 amp. : 36 fr. — de 6 : 20 fr.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE O. * O. I. 

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°)

TRIBROMURE GIGON

Composition. — Bromure triple de potassium, sodium et ammonium.

Forme. — Poudre desséchée.

Indications thérapeutiques. — Etats nerveux, Psychoses, Hyperexcitabilité, Insomnies, Epilepsie.

Mode d'emploi et doses. — Cuillère-mesure dosant 1 gr. : 2 à 12 par jour.

Flacons de 30, 60 et 125 gr.

Laboratoire du Doct. André GIGON

7, rue Coq-Héron — PARIS (1^{er})

TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et de magnésie nécessaires à l'organisme.

Prop. Thérap. — Recalcification de l'organisme (formule et théorie de Ferrier-Sergent).

Indications. — Tuberculoses pulmonaire, osseuse, péritonite tuberculeuse, Rachitisme, Lymphatisme, Scrofides, Grossesse, Allaitement, Troubles de la dentition, Fractures.

Doses et mode d'emploi. — Tricalcine pure.

Adultes :

Poudre : 1 cuiller mesure

Cachets : 1 cachet

Comprimés : 1 comprimé

Granulés : 2 cuillers mesure

Tablettes chocolat : 2 tablettes

Tricalcine a renalinée : 1 cachet

— M thymarsinée : 1 cachet

— Fluorée : 1 cachet

— **Opothérapique** (1) : 2 drag. ou 2 cuillers à café de granulés aux 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Avant
ou
pendant
chacun
des trois
repas

(1) La formule de la Tricalcine opothérapique a été établie d'après les travaux les plus récents des auteurs français et étrangers sur le métabolisme du calcium. Cette formule d'association pluriglandulaire est composée des meilleurs fixants endocriniens du calcium.

(Association Parathyroïdes, Surrénales, Thymus, Foie, Rate, Moelle osseuse.)

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, rue Chaptal — PARIS

TRIDIGESTINE DALLOZ

Composition. — Les trois ferments digestifs essentiels à leur maximum d'activité physiologique sous une forme qui assure l'intégrité complète de leur pouvoir digestif.

Forme. — Granulé.

Indications. — Dyspepsies par insuffisance sécrétoire.

Dose. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Le flacon : 12 fr. 50

Laboratoire DALLOZ

13, Bd de la Chapelle — PARIS (Xe).

TRIDYNOL

Traitement du Dr. Delmasure de Lille.

Médicament composé leucopoiétique puissant. Employé avec succès depuis un an et demi contre les tuberculoses.

Mode d'action. — Augmentation des globules blancs et spécialement des lymphocytes.

L'autolysat des globules blancs est bactéricide par ses oxydases et lipases. Dissolution des cires bacillaires par les lipases, Exp. de Fiessinger.

Agglutination des bacilles qui prennent des formes d'involution et de souffrance, puis diminuent de nombre et disparaissent après 6, 8, 10 mois.

Ce traitement est activé et exalté par la Diathermie transpulmonaire qui, employée seule, est inutile. Diathermie transpulmonaire 1500 à 2000 milliam-pères, trois séances par semaine une demi-heure. 20 à 30 séances consécutives.

Parfois momentanément dépression et fatigue vers le dixième au quinzième jour.

En général, augmentation de la toux et des crachats qui deviennent souvent très abondants, purulents, puis muqueux et enfin disparaissent.

Contre-indication absolue : l'*Albuminurie*.

Contre-indication passagère : l'*Hémoptysie*.

La Diathermie ne provoque pas d'*Hémoptysie* (professeur d'Arsonval).

Réaction thermique variable, souvent défervescence après un temps variable.

Résultats. — Malgré toute la prudence de rigueur en cette matière, on peut dire que les résultats sont très bons au premier et deuxième degré. Variable au troisième degré, tout dépendant de l'état général.

Administration à doses fractionnées pour éviter le choc, pilules.

Pilules : 5 par jour en moyenne, 8 h., 10 h., 12 h., 3 h., 7 h., sans s'occuper des repas.

Cette médication est très efficace à doses réduites chez les enfants, combinée avec les rayons ultra-violet (sans diathermie).

Pour renseignements s'adresser :

Laboratoire du TRIDYNOL

18, rue de l'Orphéon — LILLE

TRIGANOL VIGIER

Traitement des Amaigrissements et des Asthénies,

Forme :

Cachets.

Composition :

Poudre de fenugrec désodorisée, additionnée d'extrait hydro-alcoolique de fenugrec.

Propriétés et indications thérapeutiques :

Stimule l'appétit, donne des forces et favorise la reprise du poids. Tuberculose à tendance fibreuse. Asthénie (dépression physique ou psychique). Convalescence des maladies infectieuses. Diabète et tous états d'amaigrissement.

Doses. — Trois cachets par jour. Cette dose peut être augmentée considérablement, le fenugrec ne présentant aucune toxicité.

Laboratoires VIGIER et HUERRE

12, Boul. Bonne-Nouvelle — PARIS

TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

(Dragées à Noyau Mou).

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième.	2 gouttes (3 centigr.)
Caféine.....	2 centigrammes.
Chl. d'Héroïne.....	1 demi-milligramme.

Propriétés et indic. thérap. — *Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate*, ne provoquant aucun phénomène réactionnel. Médicament de choix de l'*Angine de Poitrine*, l'*Asthme Cardiaque*, l'*Œdème Pulmonaire*.

Mode d'emploi. — Ces dragées doivent être croquées : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée du principe actif et par là-même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès. Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e)

TRINITRINE ROUSSEL

Composition :

Comprimés n^{os} I, II, III correspondant à 1, 2 ou 3 gouttes de la solution au 1/100^e.

Indications.

Hypertension : Crises douloureuses des aortiques, angine de poitrine, asthme cardiaque.

Doses et mode d'emploi :

Au moment des crises, laisser fondre sur la langue un comprimé. Deux à 6 par 24 heures).

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington. — PARIS (VIII^e)

TRIRADOL

Association d'iode organique, menthol, camphre et éléments radio-actifs.

Indications thérapeutiques. — Toutes les tuberculoses à lésions limitées et à évolution lente.

Contre-indications. — Tuberculose évolutive rapide, néphrite, insuffisance hépatique, etc.

Posologie. — Adultes : une ampoule de 1 cc. ou 4 à 6 capsules par jour, par série de 30. Enfants : suivant l'âge. — Voir Littérature.

Présentation. — Boîte de 10 Ampoules. — 20 fr. Flacon de 60 capsules. — 20 fr.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e)
R. C. Seine 143.981.

TRISODYL ROZET

Hypotenseur Antiscléreux.

Composition (Dose quotidienne moyenne)

Nitrite de soude Chimiq. pur...	0 gr. 20
Silicate de soude Chimiq. pur...	2 gr.
Citrate de soude Chimiq. pur...	4 gr.

Formes Pharmaceutiques et Posologie.

Comprimés. — 6 comprimés par jour dans un peu d'eau.

Solution. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, avant les deux principaux repas.

Action. — Provoque une vaso-dilatation périphérique modérée et continue, portant sur les Artérioles et les Capillaires. (Nitrite de soude). Solubilise la chaux, augmente la diurèse, s'oppose aux fermentations (Silicate de soude). Ramène à la normale, la coagulabilité et la viscosité sanguine (Citrate de soude).

Indications. — Hypertension artérielle. Artériosclérose, États pléthoriques et angiospasmodiques, Angine de poitrine, aortites, etc.

Prix: 20 fr. le flacon de solution ou la boîte de Comprimés pour un traitement d'un mois environ.

Laboratoire de la Sulfoleïne Rozet

Benderitter et C^{ie}, Vendôme (L.-et-Ch.)

TRYPARSAMIDE

Sel de sodium de l'Acide-N-phényl-glycinamide-p. arsinique.

Actions spirillicide et trypanocide très énergique. Teneur en arsenic = 25 p. 100. Action élective sur les formes nerveuses de la trypanosomiase.

Indications :

Maladie du sommeil, Syphilis nerveuse.

Posologie et mode d'emploi :

Injections hebdomadaires (intraveineuses, intra-musculaires ou sous-cutanées) à raison de 35 mgr. par kilogr. de poids du malade. Séries de 6 à 10 injections. Surveiller l'état de la vision.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

TRYPSOGEN

Composition. — Chaque tablette contient les éléments excitant la sécrétion interne du pancréas insuffisant, les ferments protéolytiques et lipolytiques et 5 milligr. de bromure d'or et de bromure d'arsenic.

Indications. — Diabète sucré, glycosurie, troubles du métabolisme des hydrocarbures. Est également indiqué dans certains troubles du pancréas et comme adjuvant dans l'hypertension.

Présentation. — Flacons de 50 et 100 tablettes.

Mode d'emploi. — 2 à 7 tablettes, après les repas.

G. W. CARNRICK CO.

20 Mt. Pleasant Ave. Newark, N. J. U. S. A.

Agent pour la France : **DÉGÉCÉ**

7, rue Princesse — PARIS

Agent en Belgique :

Pharmacie Centrale de Belgique

12, rue du Téléphone — BRUXELLES

TUBEROL

Association d'essences balsamiques pures.

Propriétés therap. — Sans aucune toxicité. Inoffensif. Il est absorbé par la peau ou respiré en fumigations ou inhalations, puis exhalé avec toute son efficacité antiseptique par la muqueuse des voies respiratoires. Une petite quantité est éliminée par les reins dans les urines.

Indic. therap. — a) Toutes affections des voies respiratoires: Broncho-pneumonie, Bronchite capillaire, Abscès du poumon, Pneumonies grises, Bronchites aiguës, Catarrhes des emphysémateux, etc.

b) Les états ganglionnaires: Ganglions et Abscès froids non fistuleux.

Mode d'emploi. — 1° Applications thoraciques. Dans une flanelle bien imbibée qui séchera à même la peau;

2° En inhalations, 1/2 cuill. à café dans un litre d'eau bouillante;

3° En compresses. Sur les ganglions, pur ou mélangé de 2 ou 3 parties d'huile ou de vaseline.

Laboratoires du TUBÉROL-E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS

TUBES DULCIS

Pommades ophtalmiques.

Argolène (Sel d'Ag). — Conjonctivites aiguës, à 5 0/0 et 10 0/0.

Cadmiol — Conjonctivites chroniques, à 1 0/0 et 2 0/0.

Cuprinol (Sel organique de Cu). — Conjonctivites chroniques, à 1 0/0 2 0/0, 5 0/0.

Iodo-Calcique. — Traitement de la cataracte, 8 0/0.

Novoptine. — Ulcères à pneumocoques, à 1 0/0.

Oxyde orangé de Hg. — Blépharites, conjonctivites phlycténulaires, à 1 0/0 2 0/0, 3 0/0, 4 0/0, 5 0/0.

Ophtalmoforme. — Antipurulent, à 2 0/0, 3 0/0.

Aristol. — Antipurulent, à 2 0/0.

Iodoforme. — à 1 0/0 et 2 0/0.

Thiosinamine. — Opacités et synéchies à 1 0/0.

Mydriasine. — Mydriatique puissant.

Alcaloïdes seuls.

Alcaloïdes associés.

Myosine. — Glaucome.

Iodo-Rubidium. — Cataracte.

Laborat. de Thérapeutique oculaire
du Docteur FERRY, à BOURG (Ain)

TUBES DU D^r GUIRAUD

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux
(Anciennement tubes DAVIEL)

POMMADES OPHTALMIQUES

munis d'une canule spéciale permettant l'introduction directe de la pommade dans l'œil.

TOUTES FORMULES

Spécialement recommandées : Pommades à l'aristol, à l'oxyde jaune orangé et à l'atropine. Obtenues par dissolution préalable de la substance active et évaporation du solvant, ce qui assure un état de division extrême et une puissance d'action considérable.

Échantillons sur demande

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e)

Téléph. : Marcadet 37-98

TUBES OPHTALMOLOGIQUES FERLUX

Tubes Ferlux :

Huile de Chaulmoogra, Chaulmoogra-Butelline.

Oxyde de mercure orangé, 1, 2, 3, 4 et 5%

— — — — — jaune, 1, 2, 3, 4 et 5%

Iodoforme, Calomel, Précipité blanc, Ethylhydrocupréine (optochin), Halocalcine ($\text{I Na} + \text{Ca Cl}^2$), Ichtyol-oxyde de zinc, Thigénol-oxyde de zinc, etc, etc.

Produits Orhino :

Pour Otorhinolaryngologie.

Prix moyen : 40 francs

Laboratoires RHINOPHTA

G. Bousquet, Docteur en Pharmacie, à Albi.

TULLE GRAS LUMIÈRE

au Baume du Pérou

est destiné à éviter l'adhérence aux plaies des pièces de pansement. — Le pansement fait avec le **Tulle Gras Lumière** se détache aisément sans effort, sans provoquer de douleur ni d'hémorragie résultant de l'arrachement d'éléments appartenant aux tissus fragiles en voie de régénération.

Le **Tulle Gras Lumière** est coupé en carrés de 10×10 cm, qui sont superposés dans une boîte métallique, et séparés par du papier destiné à en protéger l'asepsie.

Pour les plaies de grande surface, nous avons un format de 22×22 qui n'est livré que sur demande spéciale.

Produits Spéciaux des LABORATOIRES LUMIÈRE
9, Cours de la Liberté — LYON

TYMOCALCINE

Irradiée.

Forme :

Granulé chocolaté.

Composition :

Poudre d'os frais de veau, Carbonate de calcium précipité, Carbonate de magnésie précipité, Fluorure de calcium, Silice végétale (Prêle), Thymus, Surrénales, Vitamine D.

Indications :

Tuberculose, Rachitisme, Anémie, Croissance, Affection des os, Ostéomalacie, Consolidation des fractures, Lymphatisme.

Posologie :

Adultes : 4 cuillerées à café par jour après chaque repas.

Enfants au dessus de 5 ans : 2 cuillerées à café par jour. *Au-dessous de 5 ans* : 1/4 ou 1/2 cuillerée à café par jour dans un peu d'eau ou de lait.

MARONNEAU-MOREL

156, rue des Fauvelles — COURBEVOIE (Seine

UCLARSYL

(Ancien Mètarsenobenzol Saca)

Dioxydiaminoarsénobenzène - monométhylène-
Sulfoxylate de soude (914).

Rigoureusement pur (double contrôle chimique
et physiologique). Traitement d'attaque et
d'entretien de la syphilis.

I. Préparation Intraveineuse.

Poudre très aisément soluble dans l'eau distil-
lée pour injections intraveineuses.

Doses progressives de 0 gr. 15 à 0 gr. 90.

II. Préparation sous-cutanée.

Solution stabilisée directement injectable dans
le tissu sous-cutané ou musculaire.

Doses progressives :

de 0 gr. 01 à 0 gr. 05 (*nourrissons*).

de 0 gr. 10 à 0 gr. 50 (*adultes*).

USINES CHIMIQUES

DES LABORATOIRES FRANÇAIS

Siège social : 89, rue du Cherche-Midi, PARIS.

ULCÉOBALNÉINE

Poudre spéciale pour bains de jambe antivariqueux.

Alcalino-sodique-silicatée.

Par son action sédative sur l'élément nerveux, les bains à l'Ulcéobalnéine.

Calment les douleurs variqueuses, arrêtent l'évolution des varices et en diminuent le volume; font résorber l'œdème et l'empâtement; guérissent les congestions variqueuses et phlébitiques.

Un bain de jambe de 30 minutes à 36° tous les jours pendant 24 jours.

Une boîte pour 4 bains de jambe.

Prix : 6 fr. 75

ULCÉOPLAQUE-ULCÉOBANDE

Pansement

Cicatrisation certaine des *Plaies aux jambes*, des *plaies atones* et des *Ulcères variqueux*, même anciens et trophonévrotiques sans interrompre ni le travail ni la marche.

Pansement souple et spongieux préparé avec des poudres aseptiques émulsionnées. C'est un merveilleux générateur de la cellule, un stimulant de sa vitalité. **Résultats surprenants.**

Boîtes de 6 pansements pour 20 ou 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaque n° 1 5/6 centim. Ulcéoplaque n° 2 7/9 centim.

Formuler : Une boîte Ulcéoplaque n° 1 ou n° 2.

Prix : 24 ou 40 fr.

1 Ulcéobande. Prix : 30 fr.

Laboratoire SÉVIGNÉ

10, rue du Parc-Royal — PARIS (III^e)

ULCÉOSINE

Sulfo-citrate de soude et pipérazine formino-bicarbonaté, arsénio-lithiné.

Action antitoxique et hypotensive.

Indiquée dans l'artério-sclérose, l'hyper-tension artérielle, les troubles hépatiques, les varices, les congestions variqueuses et phlébitiques, les plaies atones, les ulcères variqueux le rhumatisme chronique, l'hyperglycémie, le diabète.

1 cuillerée à café par jour dans un verre d'eau chaude ou froide, pendant 15 jours consécutif.

Prix : 10 francs.

ULCÉOSOL-POMMADE

Oxyde de zinc, Sulfate de cuivre salicylé, Silicate de magnésie, Vasolandoline hydratée et glycéринée.

Guérison rapide de l'Eczéma variqueux sec, Irritation de la peau, Prurigo.

Prix : 40 fr.

ULCÉOSOL-POUDRE

Oxyde zinc bismuthé, Acide salicylique, Silicate de magnésie.

Poudresiccative, guérit rapidement l'eczéma variqueux suintant, les excoriations eczémateuses superficielles.

Prix : 40 fr.

Laboratoire SÉVIGNÉ

10, rue du Parc-Royal — PARIS (III^e)

ULCÉROPHILE NOSAN

Traitement ambulatoire des Ulcères variqueux.

Présentation et composition :

Bande de 0m,13 x 12 mètres imprégnée aseptiquement par un procédé spécial d'une pâte gélatino-amidonnée (pâte de Unna modifiée) constituant, après application, un appareil de contention parfait.

Action :

Décongestionnant, cicatrisant, on obtient par ce pansement un bas à varices semi-rigide moulé sur le membre et ne pouvant se distendre; provoque par la marche un léger massage qui a pour résultat la résorption rapide du liquide séreux infiltré et le dégonflement du membre. Rétablissement de la circulation veineuse, meilleure nutrition des tissus qui retrouvent toute leur vitalité et enfin la cicatrisation des lésions.

Indications :

Toutes les plaies atones des membres inférieurs et particulièrement des Ulcères variqueux même les plus anciens, sans tendance à la cicatrisation. Plaies traumatiques à cicatrisation lente, phlébites, varices douloureuses, eczémas, brûlures à épidermisation difficile.

Mode d'emploi :

Plonger la boîte contenant la bande dans un récipient d'eau assez profond (bouillotte) et porter à l'ébullition jusqu'à ramollissement complet, (15 à 20 minutes). Appliquer la bande directement sur la peau à la façon d'une bande molletière en évitant les renversés.

Pharmacie MAYAUD

6 ter, rue Voltaire,

La Garenne-Colombes (Seine).

ULMARÈNE GIGON

Composition. — Éther salicylique liquide d'odeur agréable.

Indications thérapeutiques. — Analgésique local, antirhumatismal externe. Spécifique contre les rhumatismes, les névralgies.

Formes. — 1° Ulmarène pur flacons de 30, 60, 125 cmc. ;

2° Ulmarène formulé dans une préparation magistrale (liniment, pommade) ;

3° Ulmarol Gigon (liniment) ;

4° Baume du docteur Gigon, en tube.

Mode d'emploi. — Onctions suivies d'enveloppements.

Laboratoires du docteur André GIGON,
7, rue Coq-Héron — PARIS (1^{er})

URACÉTOSE

Granulé sucré, effervescent, soluble

Propriétés therap. — Action urisolvante très énergique, diurétique aussi puissant que doux pour le filtre rénal. Antiseptique urinaire et hépato-rénal par excellence, analgésique.

Tolérance indéfinie. Aucune contre-indication.

Composition. — Tartrate de pipérazine (Lycéto), hexaméthylénététramine, salicylate, benzoate et formiate de lithine, lactose et sucre effervescent.

Indications. — Toutes les manifestations de l'arthritisme; Artério-Sclérose. Douleurs, Rhumatismes, Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques et hépatiques, Névralgies, Migraines, Sciatiques, Maladies du foie, des reins, de la vessie et des Voies urinaires (Néphrites, Pyélo-Néphrites, Cystites, Urétrites, Blennorrhagies etc.).

Grippe, Influenza, Fièvre et toutes les maladies infectieuses.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 6 cuillerées à café par jour, dans de l'eau. Pour les enfants de 5 à 15 ans, par demi cuillerée à café, 3 à 6 par jour.

Echantillons et littérature

Laboratoires de l'URACÉTOSE

10, rue du Parc Royal — PARIS (17^e)

URALYSOL

Prop. thér. — Traitement de la diathèse rhumatismale. Agent de dissolution et d'élimination de l'acide urique.

Indications. — Arthritisme, Rhumatismes, Goutte, Coliques néphrétiques et hépatiques, Uréthrites, Cystites.

2 Formes: a. Granulés ; b. Comprimés.

Formule. — Acide thyminique, Urotropine, Lysidine, Helmithol, Sels de lithine.

Modes d'emploi :

A. Granulés : Une cuillerée à café, matin et soir dans un verre d'eau.

B. Comprimés : 4 comprimés par jour en moyenne une demi-heure avant les repas ou une heure après.

Laboratoires LOBICA

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e)

URASEPTINE ROGIER

A base de Pipérazine, Urotropine, Helmitol, Benzoate de soude et de lithine, etc.

Granulé soluble dosé à 0 gr. 50 de substance active par cuill. à café.

Dose. — 3 à 6 cuill. à café par jour.

Propriétés. — Antiseptique urinaire et biliaire par excellence. Dissout et chasse l'acide urique.

Le flacon : 12 fr. 50

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie
56, boulevard Pereire — PARIS

URAZINE

Citro-salicylate de Pipérazine.

Dissolvant de l'acide urique et des urates.

Action analgésique et antiseptique,
Innocuité absolue.

Indications :

**Lithiase rénale, Goutte, Gravelle, Dou-
leurs rhumatismales.**

Posologie et mode d'emploi :

Comprimés à 30 centigr. : trois ou quatre
par jour, au moment des repas.

Granulés effervescents : une cuillerée à café
dans un demi-verre d'eau, aux deux
principaux repas.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

URICLARINE

(comprimés)

Antiseptique entéro-rénal et biliaire.

Propriétés thérapeutiques. — Combat
l'infection urinaire au lieu même où elle
naît : dans le tube digestif. L'Uriclarine, où
le Chlorure d'Ammonium renforce l'action
du Salol et de l'Urotropine, est le médica-
ment des affections réno-vésicales d'origine
intestinale.

Indications. — Maladies infectieuses des
Voies Urinaires, Cystites, Pyélites, Coliba-
cillurie, Blennorragie.

Mode d'emploi. — Avaler 6 à 8 comprimés
par jour de préférence aux repas.

Laboratoires P. BRISSON ET C^{ie}
114, avenue Michelet, SAINT-OUEN (SEINE)

URILYSONE

Héxaméthylène-citrate d'anhydro-héxaméthyl-tétramine-benzoate de lithine.

Antiseptique urinaire et des voies biliaires

Indications :

Cystites et pyélonéphrites.

Blennorragie.

Cholécystites et Angiocholites.

Rhumatismes.

Calculs.

Doses :

Etats aigus : 2 à 3 comprimés par jour.

Etats chroniques : 1 à 2 comprimés par jour.

Le tube de 20 comprimés : 7 francs.

Laboratoires O. ROLLAND

1, place Morand — Lyon

URISANINE

Composition. — Benzoate d'hexaméthylène-tétramine dissous dans un excipient à base végétale (plantes balsamiques) auquel a été incorporé l'extrait de stigmates de maïs.

Dosage. — Une cuillerée à café = 1 gr. de Benzoate d'hexaméthylène-tétramine + 0,20 cgr. d'extrait de stigmates de maïs dissous dans 4 gr. d'excipient végétal balsamique.

Propriétés thérap. — Antiseptique urinaire et biliaire complet ; balsamique et diurétique ; dissolvant phosphatique, urique et uratique ; éliminant sûr et rapide.

Indications. — Toutes affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésico-rénale.

Mode d'emploi. — Se prend dilué dans 1/2 verre d'eau naturelle ou gazeuse.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour,

Enfants : par 1/2 cuillerée à café suivant l'âge.

Laboratoire de l' " URISANINE "

28, rue Milton — PARIS

UROBUCCOL MALMANCHE

Composition :

Formine (uroformine, urotropine)	25 centigr.
Benzoate de soude.....	20 —
— de lithine.....	10 —
Extrait fluide de buccu.....	25 —
— — de maïs.....	25 —
— — de térébenthine.	50 —

par cuillerée à café.

Forme. — — Liquide, sirupeuse.

Propriétés therap. — Antiseptique des voies urinaires et des voies biliaires, antiseptique général, balsamique et diurétique puissant, Dissolvant phosphatique, urique et uratique.

Indications. — Pyérites, Pyélonéphrites, Cystites, Urétrites, Prostatite, Blennorrhagie, Uricémie, Goutte, Lithiase rénale, Coliques hépatiques.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion.

Prix au public : 12 francs.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien. Docteur ès-sciences.
RUEIL-MALMAISON (S. et-O.)

UROFORMINE GOBEY

Comprimés dosés à 0 gr. 50. Comprimés effervescents dosés à 0 gr. 25 (solubilité instantanée.) Solution injectable en ampoules de 2 et 5 c c., 0 gr. 25 par c c.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour dans un verre d'eau froide. Injections de 0 gr. 50 à 2 gr. par jour.

Prop. thér. — Le plus puissant antiseptique interne. Dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Fièvres infectieuses, Grippe, Encéphalite, Complications broncho-pulmonaires, etc., Rhumatismes, Infections des voies biliaires et urinaires, etc.

Laboratoires GOBEY

21 rue d'Aumale — PARIS

UROIODINE

Composition. — L'Uroiodine ou Iodoéthylate d'hexaméthylènetétramine est une combinaison organique contenant 42 % d'iode rigoureusement titré, associée à un sel de lithine.

Propriétés physiques et chimiques. — Solution dialysable, se décompose lentement, est diffusée dans tout l'organisme, s'élimine dans l'urine sous forme d'iodure alcalin, ce qui indique une destruction complète de la molécule organique. Pas d'accumulation.

Propriétés physiologiques. — Grâce à sa molécule iodée, l'Uroiodine est un excitateur puissant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense, un fixateur d'oxygène, stimulant les échanges nutritifs de l'organisme.

Grâce à l'heureuse combinaison Iodo-Formine, l'Uroiodine constitue un agent anti-infectieux particulièrement énergique. Enfin grâce à l'association Formine-Lithine l'Uroiodine est un diurétique très actif et un excellent dissolvant de l'acide urique et des urates.

Indications. — Toutes affections glandulaires : adénites, adénopathies, végétations adénoïdes, scrofulides, etc... Maladies de la nutrition : toutes manifestations des diathèses Urique-goutte, gravelle, calculs, etc. Arthritique : rhumatismes chroniques et déformants. Tuberculoses localisées : osseuses et ganglionnaires. Tertiarisme, Scléroses, Asthme, Emphysème, etc...

Formes et Posologie. — Ampoules de 3 % $\frac{3}{4}$. Comprimés kératinisés de 0gr. 50. Chez l'enfant au-dessous de 15 ans, 1/2 à 1 ampoule par jour. Chez l'adulte, 1 à 2 ampoules en injections intramusculaires ou intraveineuses (bien tolérées sans réaction locale ni choc hémoclasique, résorption parfaite). Comprimés : 1 à 2 comprimés suivant l'âge chez l'enfant ; 2 à 6 comprimés suivant l'âge chez l'adulte, comme traitement d'entretien contenant 42 % d'iode ; remplaçant avantageusement les iodopeptones qui n'ont que 17% d'iode, mieux tolérés grâce à leur enrobage spécial.

Laboratoire de l'UROIODINE

45, boulevard Lafayette — CALAIS

UROL NEUVILLE

Antiseptique urinaire. — Antiseptique biliaire. —
Antiseptique général.

Composition :

L'Urol est à base de benzoate de soude, d'hexaméthylène tétramine et d'extraits diurétiques, (*uva, ursi*, chiendent, etc.). Une cuillerée à café correspond à 0 gr. 50 de citrate d'hexaméthylène tétramine et 0 gr. 10 d'extraits. Il présente tous les avantages de l'urotropine en remédiant à ses inconvénients. Il respecte l'estomac et assure la perméabilité du rein.

Action et Indications :

Antiseptique urinaire, il exerce sur l'urine une action infertilisante, il retarde sa fermentation ammoniacale et la désinfecte lorsqu'elle est précédemment infectée. Son emploi est indiqué dans les infections aiguës ou chroniques de l'arbre urinaire (pyurie, bacilliose-rénale, cystite, infections gonococciques, uréthrites, prostatites, lithiases, pyélonéphrites, etc.)

Cholagogue, il favorise l'excrétion biliaire, en agissant directement sur le foie, sur la contraction des canaux et la vésicule biliaire ; il exerce un pouvoir antiseptique et en agissant sur les phénomènes moteurs et sécrétoires, il assure le drainage des voies biliaires.

Ajduvant de toute médication anti-infectieuse, il s'associe au traitement sérothérapique, dans toutes les septicémies, quel qu'en soit l'agent pathogène, et dans toutes les grandes infections à germe connu (diphtérie, broncho-pneumonie, fièvre puerpérale). Dans certaines infections dont l'agent causal n'a pu être encore déterminé (encéphalite léthargique) il devient, grâce à son urotropine, un véritable spécifique.

Contre-indication :

Dégénérescence rénale.

Mode d'emploi :

2 à 3 cuillerées à café par jour, dilué dans un verre d'eau.

Laboratoire NEUVILLE

239, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris (VIII^e)

Tél. : Elysées 17-58.

UROMÉTINE

LAMBIOTTE FRÈRES

Hexaméthylène-tétramine pure

Formes. — Comprimés, Ampoules, Cristaux.

Prop. thér. — Puissant antiseptique interne, antitoxique, antiuricémique.

Indications. — Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses toutes manifestations de la diathèse urique.

Mode d'emploi. — 1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques. 2° Ampoules de 2 cc. et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses. 3° Cristaux pour prescriptions magistrales.

Littératures et échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, Rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e)

124, Avenue Rogier — BRUXELLES

UROMIL

Composition. — Association d'éther phényl-cinchonique, piperazine, hexaméthylène-tétramine.

Forme. — Granulé de goût agréable, effervescent, instantanément soluble dans l'eau.

Action. — Mobilise, dissout, élimine l'acide urique. Par ses éléments phosphoriques, empêche la formation de purines endogènes, génératrices d'acide urique.

Par son phosphate disodique, entrave la précipitation de l'acide urique au niveau du rein et de la vessie.

Possède une activité double de celle des pipérazines granulées.

Indications. — Diathèse urique, goutte, rhumatisme chronique, lithiase hépatique et rénale.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

Laboratoires UROMIL

D^r L. BÉLIÈRES,

19, rue Drouot, 19 — PARIS (IX^e)

UROPHILE

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Lithine en combinaison benzoïque, Hexaméthylène tétramine, Acide Thyminique.

Propriétés pharmacodynamiques. — Uricolytique, Diurétique, Régulateur de l'activité hépatique. Antiseptique des voies urinaires et biliaires.

Indications. — Diathèse arthritique. — Goutte aiguë et chronique. — Gravelle urique. — Lithiase biliaire. — Rhumatismes. Cystites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, deux fois par jour, entre les repas.

Laboratoires A. BAILLY et C^{te}
15 et 17, rue de Rome — PARIS (8^e)

UROSAN DUFAYARD

Forme. — Comprimé à faire dissoudre

Composition. — Benzo-camphorate d'urotiopine et extrait de styles de maïs.

Indications. — Antiseptique, urinaire et biliaire. *Médicament de choix* pour le traitement des Cystites. Prostatites. Urétrites. Pyélites. Pyélonéphrites, de la Grippe. Fièvre typhoïde. Diathèse urique. Rhumatismes. Goutte. Gravelle. Calculs. Phosphaturie.

2 à 6 comprimés par jour, dissous dans l'eau.

Echantillons sur demande.

Prix : 14 francs

Laboratoires DUFAYARD
12, rue des Saints-Pères — PARIS

UTÉRAMINE

Composition

Solution au centième de chlorhydrate de paraoxyphénylthylamine présentée en ampoules de 1 c. c., pour injections-, et en flacons de 10 c. c., pour l'usage interne.

Propriétés :

Excellent hémostatique, cardio-tonique et bon excitant de l'utérus. Remplace ergotines et extraits pituitaires aux effets inconstants.

Indications :

Obstétrique et gynécologie. Post-partum (hémorragies et atonies utérines), placenta praevia, ménorragies, métrorragies, dysménorrhées, ménopause.

Médecine interne. Hémophylie, hémoptysie, épistaxis, hémorragies intestinales, choc, collapsus, hémorragies en napées.

Mode d'emploi :

On utilisera pour les injections hypodermiques (avant-bras ou cuisse) ou intramusculaires (muscles fessier), 1 à 3 c. c. et jusqu'à 5 c. c. selon les cas. Pour l'usage interne, 20 à 30 gouttes trois fois par jour.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV^e)

UVÉ

(Gouttes)

Composition. — Solution aqueuse de Phosphate de chaux, Chorures de manganèse, Magnésie et fer (11 centigr. par cc.) irradiés par rayons ultra-violets. Ni Arsenic, ni Strychnine.

Mode d'action. — Reminéralisent, reconstituent, désintoxiquent.

Indications. — Toutes les **ANOREXIES** (nourrissons, enfants, adultes) dont elles sont le véritable spécifique, Convalescences post-infectieuses, Asthénies, etc.

Posologie. — *Adultes*: XL à LX gouttes. *Enfants*: XX à XL gouttes, en une ou deux fois, dans un peu d'eau simple ou de préférence bicarbonatée. *Nourrissons*: 1 goutte par mois d'âge de un à six mois; Une goutte et demie de six à douze mois, dans le lait des tétées.

Prix : Le flacon : 9 fr. 80 ; grand modèle : 18 fr.

Laboratoires de L'UVÉ

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV^e)

UVÉSTÉROL

Vitamines D. + Facteur de Croissance.

ERGOSTÉRINE et CHOLESTÉRINE

Irradiées par rayons ultra-violet.

Composition :

Emulsion non huileuse contenant par X gouttes :
Ergostérine 1 mgr. ; Cholestérine : 6 mgr. ; Extrait
vitaminé de levure : 0 mgr. 4.

Mode d'action :

Fixe chaux et phosphore, Active la croissance,
Stimule l'action antitoxique.

Avantages :

1. *L'Uvéstérol remplace intégralement l'huile de foie de morue*, parce qu'il unit à l'action exclusivement antirachitique de l'Ergostérine irradiée (Lesné, Clément, Simon) l'activité de croissance de la Cholestérine et des Vitamines de la levure.

2 gouttes égalent 3 cuillerées à soupe d'huile de foie de morue.

Aucune toxicité, aucune contre-indication.

Parfaitement toléré même par les fébricitants.

Indications :

Croissances difficiles ou retardées, Lymphatisme, Prétuberculose.

Rachitisme et toutes affections décalcifiantes.

Toutes tuberculoses (osseuses, séreuses, ganglionnaires, pulmonaires).

Conservation :

Garde intacte son activité, même au bout d'un an. Les flacons portent la date d'irradiation.

Posologie :

Adultes : XXX à LXXX gouttes : *Enfants* : X à LX gouttes, soit pures, soit diluées dans un peu de lait, une eau alcaline ou du jus d'orange.

Chez le nourrisson sain (action préventive) V gouttes.

Chez le nourrisson rachitique : X à XX gouttes.

Prix : Le flacon : 10 fr. 50 ; grand modèle : 18 fr. 50

Laboratoires de l'UVÉ

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV^e)

VACCIN ANTI-ASTHMATIQUE du Professeur MINET

Le traitement vaccinal de l'asthme et des affections pulmonaires présente sur les nombreuses médications utilisées jusqu'à ce jour, l'avantage de s'adresser non pas à un symptôme, tel que la toux ou l'oppression, mais à une des causes les plus évidentes de l'entretien des affections, à savoir la pullulation microbienne à l'intérieur des voies respiratoires.

Indications. — Asthme, Emphysème, Catarrhe, Infections secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — L'injection doit être faite dans le tissu cellulaire sous-cutané; le point d'élection est la région dorsale, vers la base du thorax. Chez l'adulte, on peut injecter sans inconvénient le contenu d'une ampoule de 1 cc. 1/2. Les injections doivent être répétées tous les deux jours. Entre la 5^e et la 6^e injection, il est recommandé d'interrompre durant 6 jours et de reprendre le traitement dans les mêmes conditions. Chez l'enfant, le vaccin est aussi bien supporté que chez l'adulte, à la dose de 1/4 de cc. entre 1 et 3 ans; à 1/3 de cc. de 3 à 7 ans; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

VACCIN ANTI-PNEUMONIQUE du Professeur MINET

« A la suite de l'injection de ce Vaccin, on assiste à une « modification véritablement impressionnante du tableau classique de la Pneumonie. »

Indications. — Pneumonie, broncho-pneumonie des enfants et des vieillards.

Mode d'emploi. — Le point d'élection est incontestablement la région sus-épineuse. Chez l'adulte, il faut injecter d'emblée le contenu d'une ampoule, soit 1 cc. et répéter l'injection toutes les 24 heures. Dans les cas graves, la dose peut être portée, dès le deuxième jour, à deux ampoules en une seule injection. Si le cœur et les reins sont déjà touchés par l'infection, il y a lieu de commencer à la dose de 1/2 cc. Chez l'enfant, il y a lieu de réduire la dose à 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans; 1/3 de cc. de 3 à 7 ans; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

VACCIN ANTI-GRIPPAL du Professeur MINET

Traitement de la grippe et de toutes les complications pulmonaires et suppuratives : otites, sinusites, etc. congestion grippale.

Mode d'emploi. — Voir Vaccin Anti-Pneumonique.

Laboratoires " STÉNÉ "

2, place des Vosges — PARIS

VACCINOTHÉRAPIE ATOXIQUE CÉPÈDE

Hyperleucocytose et phagocytose spécifique exaltée.
Médication causale naturelle.

Innocuité absolue.

Vaccin Ac. Sa (acné).....	Cépède.
Vaccin Bg. Pf. S. P. E. S. Ca (coqueluche et complications).....	Cépède.
Vaccin C. (colibacillaire).....	Cépède.
Vaccin C. E. (coli-entérococcique).....	Cépède.
Vaccin C. E. S. (diarrhée).....	Cépède.
Vaccin C. S. E. S. (entérite et entérocolite)....	Cépède.
Vaccin E. (entérococcie).....	Cépède.
Vaccin E. S.....	Cépède.
Vaccin E. Sa.....	Cépède.
Vaccin G. (gonococcie).....	Cépède.
Vaccin G. S. E. S. (blennorrhagie).....	Cépède.
Vaccin G. C. S. E. S. (affections blennorrhagiques de l'homme et de la femme).....	Cépède.
Vaccin G. C. S. E. S. Psd.....	Cépède.
Vaccin Mo (Morax) (conjonctivite aiguë).....	Cépède.
Vaccin Mo. Sa. (Morax-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
Vaccin Mo. P. Sa. (Morax-Pneumo-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
Vaccin P. E. S. (pneumonie).....	Cépède.
Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca.....	Cépède.
Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca. Py (Otite).....	Cépède.
Vaccin Pf. S. P. E. S. Ca. (grippe et complications).....	Cépède.
Vaccin Pf. Pb. S. P. E. S. Ca. (Asthme).....	Cépède.
Vaccin S (érysipèle).....	Cépède.
Vaccin Sa (furoncles).....	Cépède.
Vaccin S. Sa (peau-ostéomyélite).....	Cépède.
Vaccin S. E. S (puerpéralité).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S (100 millions).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S (400 millions).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. (catarrhe).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. 100.....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. Pz. (Ozène).....	Cépède.

Tous curovaccins atoxiques sur demande de MM. les médecins

La caractéristique de la méthode Cépède réside dans la suppression totale de la phase vaccinale négative. Dans les curovaccins Cépède ci-dessus (désignés par les initiales des microbes servant à leur préparation) les toxines microbiennes sont toujours éliminées ou anéanties. L'injection sous-cutanée n'entraîne aucune réaction ni aucun phénomène morbide général ou local surajouté.

La boîte de 10 ampoules : 30 francs au public.

Institut de Biologie appliquée

60, rue Mathurin-Régnier et 47, rue Bargue

PARIS (XV^e) — Téléph. : Ségur 11-40

Adresse télégraphique : Ibacépède — PARIS

Dans toutes les pharmacies.

Adoptée par les Hôpitaux.

VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Stock-vaccins constitués par des émulsions de cultures traitées par le fluorure de sodium, injectables par la voie sous-cutanée ou intramusculaire, sans réaction appréciable. Action polyvalente.

Nomenclature et Indications :

Neo-Dmègon : Antigonococcique.
Néo Dmesta : Antistaphylococcique.
Neo-Dmétys : Anticoquelucheux.
Apféxil : Complications grippales.
Dmelcos : Antichancrelleux.

N. B. : Les *Dmelcos* s'injecte par la voie intraveineuse.

“ SPÉCIA ”

Société parisienne d'Expansion chimique.
 86, rue Vieille-du-Temps — PARIS (III^e)

VACCINS BACTÉRIENS I.O.D

(Procédés RANQUE et SENEZ)

Prophylaxie — Vaccinothérapie

VACCIN : Antityphoïdique.

- Antistaphylococcique.
- Polyvalents.
- Pneumo-Streptococcique.
- Anti-coquelucheux.
- Anti-gonococcique.
- Antistreptococcique.
- Anticolibacillaire.
- Antimélicococcique.

Injectables en injections sous-cutanées
 Polyvaccin-Pansements non injectable.

Dépôtaires généraux :

DEFFINS, 40, Fg Poissonnière — PARIS
LABORATOIRE de BIOLOGIE MÉDICALE

16, rue Dragon — MARSEILLE

HAMELIN, 31, rue Michelet — ALGER

CAMBE, passage de Corinthe — TUNIS

Pour littérature et échantillons :

16, rue Dragon — MARSEILLE

VACCINS

(Bruschettini)

I. V, Antipyogène.

II. V, Antigonococcique.

Littérature et Échantillons

Laboratoires Fournier Frères

7, Rue Biscornet — PARIS

VACCINS CLIN

Composition :

Constitution à l'aide de souches sélectionnées et fréquemment renouvelées; concentration élevée en microbes; stérilisation au moyen du peroxyde d'hydrogène; stabilisation parfaite.

Mode d'emploi :

Les Vaccins Clin sont présentés en ampoules titrées d'une capacité uniforme de 1 cc. mais de concentrations croissantes. C'est afin d'éviter la complication qu'entraîne la mesure de fractions petites et variables de centimètre cube, et aussi pour éviter les erreurs qui peuvent résulter d'une telle mesure, que les ampoules sont toutes de 1 cc. en suivant l'ordre des ampoules numérotées de 1 à 5 (la dilution maxima n° 5 étant répétée six fois).

Injectons sous-cutanées ou intramusculaires, toutes les 48 heures ou tous les trois jours.

1^o Vaccin Clin antistaphylococcique.

2^o Vaccin Clin antistreptococcique.

3^o Vaccin Clin antigonococcique.

a) monomicrobien; b) polymicrobien.

4^o Coli-Entéro Vaccin Clin

a) injectable; b) buccal.

Laboratoires CLIN

PARIS

VACCINS DE RONCHÈSE

Ampho-vaccins

Composition générale. — Sont constitués par un lysat de germes ayant en suspension une faible proportion de germes entiers bromés.

Avantages. — De par leur composition, ils allient les avantages des lysats (introduction dans l'organisme des protéines microbiennes déjà préparées, d'où action rapide) et ceux des émulsions microbiennes de faible concentration (solicitation des défenses de l'organisme contre le corps microbien lui-même d'où, production de substances agglutinantes et lytiques).

Le brome assure une stérilisation parfaite des germes et atténue considérablement les toxines tout en respectant leur pouvoir antigène.

AMPHO-VACCINS INJECTABLES

Par centimètre cube : Lysat de 2 milliards de germes totaux et 200 millions de germes totaux bromés.

Anti-infectieux. — Staphylocoques, Streptocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.

Toutes infections générales ou locales. Peut être employé alors même que l'agent infectieux n'est pas encore déterminé.

Antistaphylococcique. — Staphylocoques. Furoncles, Anthrax, Ostéomyélites, Impétigo, Acné, Folliculites, Septicémies à staphylocoques.

Intestinal. — Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, Bacilles pyocyaniques. Tous états intestinaux aigus ou chroniques.

Pulmonaire. — Pneumocoques, Pneumobacilles, Streptocoques, Staphylocoques, Entérocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer.

Pneumonie, Broncho-pneumonie, Bronchites, Grippe, certains Asthmes, Sinusites, Otites, Conjonctivites.

Urinaire. — Colibacilles, Entérocoques, Staphylocoques.

Infections de l'appareil urinaire. Son action est renforcée par l'ingestion journalière de l'ampho-vaccin à ingérer intestinal.

Posologie :

Délivrés en boîtes de 6 ampoules de 1 cc. 5.

Adultes :

Première injection : $\frac{1}{4}$ de centimètre cube ;
deuxième injection : $\frac{1}{2}$ centimètre cube ; troisième injection et suivantes : 1 centimètre cube.

Enfants :

Première injection : $\frac{1}{8}$ de centimètre cube (II gouttes) ; deuxième injection : $\frac{1}{4}$ de centimètre cube ; troisième injection et suivantes : $\frac{1}{3}$ ou $\frac{1}{2}$ de centimètre cube, selon l'âge.

Injectons journalières pour les doses d'essai tous les deux ou trois jours pour les suivantes. Injectons sous-cutanées ou intramusculaires. L'injection intraveineuse est possible si elle est jugée nécessaire.

AMPHO-VACCIN A INGÉRER

En ampoules de 5 centimètres cubes. Par centimètre cube : Lysat de 1 milliard de germes totaux et 1 milliard de germes totaux bromés.

Intestinal. — Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, Bacilles pyocyaniques.

Entérites, Syndrome entéro-rénal d'Heitz-Boyer, Auto-intoxications ; Appendicites, Cholécystites. Certains Rhumatismes. Indiqué pour la préparation des malades avant les interventions abdominales. Préparation aux Accouchements.

Cas aigus :

Une ampoule le matin à jeun, une le soir en se couchant pour les adultes ; une ampoule par jour en deux fois pour les enfants.

Cas chroniques auto-intoxications :

Pour adultes et enfants d'âge moyen : une ampoule par jour le matin pendant huit jours, puis une ampoule tous les trois ou quatre jours

AMPHO-VACCINS-PANSEMENTS.

Filtrat de cultures additionné de microbes broyés et rendu impropre à la culture «in loco» des germes secondaires.

Antipyogène. — Staphylocoques, Streptocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.

Tous foyers de suppuration : Furoncles, Anthrax, Abcès, Dermatoses infectieuses. Vaccination locale après interventions abdominales, curetages, etc.

Délivré en boîtes de trois ampoules de 10 centimètres cubes. Mettre sur la plaie une compresse imbibée de vaccin. Recouvrir d'un imperméable. Un à deux pansements par jour. *Pour les cavités* : imbibé une mèche de vaccin-pansement et l'introduire dans la cavité à traiter.

Rhino-pharyngien. — Pneumocoques, Pneumobacilles, Entérocoques, Streptocoques, Micrococcus catarrhalis, Coccobacilles de Pfeiffer, staphylocoques.

Très actif contre le coryza. Vaccination locale pour le nez, le pharynx, les oreilles, la cavité mastoïdienne après l'évidement de la mastoïde, la conjonctive.

Présenté en ampoules qui se transforment en appareil d'instillation par l'adjonction d'une tétine livrée avec les ampoules.

Trois à quatre instillations par jour, ou encore des pulvérisations dans la journée et deux instillations, une le matin, et une le soir.

Laboratoires des Ampho-Vaccins.

A. D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie.

7, place Cassini — NICE

Littérature et échantillons :

Laboratoires DURET et RÉMY

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine.)

VACCINS " STÉNÉ "

Vaccin anti-furonculeux " Sténé ".

Traitement de la furonculose et des affections à staphylocoques.

(En injections sous-cutanées, ampoules de 1 cc. — en comprimés).

Bouillon - vaccin anti - furonculeux " Sténé ", pour pansements.

Vaccin anti-coryza " Sténé " polyvalent. Traitement des Coryzas aigu et chronique, des pharyngites, angines, rhinites et de l'ozène.

Ovules-Vaccin " Sténé " Métrites, Salpingo-ovarites, pertes blanches.

LABORATOIRES " STÉNÉ "

2, place des Vosges, PARIS

VACCIN DE WEILL ET DUFOUT

Composition. — Pneumocoques, Entérocoques, Staphylocoques, Tétragènes.

Indications :

1^o) *Préventif* : Bronchites profondes ou épidémiques. — Broncho-pneumonies post-opératoires.

2^o) *Curatif* : Broncho-pneumonies de l'enfant et de l'adulte. — Pneumonies.

Avantages. — Aucune contre-indication. — Aucune réaction.

Posologie :

Nourrissons : 1/3 de cc. ; puis 1/2 cc. ; puis 1cc.

Adultes : 1 cc.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne, Paris.

VACLYDUN

Lysats vaccins du D^r Louis Duchon.
Adoptés par les hôpitaux de Paris.

Le Vaclydun est un vaccin d'un type entièrement nouveau. Il est obtenu par un procédé exclusivement biologique. Utilisation des propriétés du bacille pyocyanique qui lyse les germes, neutralise leurs toxines (en particulier, la toxine diphtérique) ce qui permet sa stérilisation par filtration sur bougie serrée. Il est donc un vaccin " vivant "

BRONCHO-VACLYDUN

Composition. — Lysat polyvalent (B. Diphtériques, Streptocoques, Pneumocoques, Staphylocoques, B. de Pfeiffer, M. Catarrhalis, Colibacilles).

Indications. — *Enfants, adultes, vieillards :* Grippe, Bronchites profondes, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonies (Rougeole, Coqueluche, Diphtérie), Accidents pulmonaires post-opératoires, Suppurations pleuro-pulmonaires non fétides.

Posologie. — 1^o Injection 3/4 de cc., les suivantes : 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours.

GONO-VACLYDUN

Composition. — Lysat de Gonocoques (Souches sélectionnées).

Indications. — Blennorrhagie des deux sexes, Complications de la blennorrhagie, Rhumatisme, Épididymite, Prostatite, etc...

STAPHYLO-VACLYDUN

Composition. — Lysat de Staphylocoques, (Souches variées).

Indications. — Furunculose, Anthrax, Absès et lymphangites du sein, Pyodermites du nourrisson, Pleurésies purulentes à Staphylocoques, Staphylococcémies.

STREPTO-VACLYDUN

Composition. — Lysat de Streptocoques hémolytiques (souches variées).

Indications. — Erysipèle, Lymphangites, Pleurésies purulentes à streptocoques, Adéno-phlegmons, Infections à Streptocoques.

PYO-VACLYDUN

Composition. — Lysat de Streptocoques et de staphylocoques.

Indications. — Suppurations : Phlegmons, abcès, panaris etc...

COLI-VACLYDUN

Composition. — Lysat de Colibacilles (Souches variées).

Indications. — Pyélonéphrites, Colibacilloses.

Posologie des Lysats-Vaccins :

1^{re} injection : 3/4 de cc. Les suivantes : 1 cc. tous les jours puis tous les deux jours.

VACCINATION LOCALE

RHINO-VACLYDUN

Composition. — Lysat des germes pathogènes du rhino-pharynx. Les surinfections dans les broncho-pneumonies démontrées par l'étude simultanée des flores du rhino-pharynx et des foyers pulmonaires, ont permis de déceler la nocivité de ces germes.

En application sur les muqueuses des fosses nasales, de la gorge, ce lysat-vaccin provoque une immunité cellulaire locale.

Indications. — Spécialement indiqué dans le rhume de cerveau et les infections (Rhino-pharyngées) il trouve encore son emploi dans les angines, les adénoïdites et la prévention des infections descendantes de la grippe, de la rougeole, de la coqueluche, de la diphtérie, etc.

Posologie. — En instillations ou mieux en pulvérisations dans les narines, la gorge trois à quatre fois par jour.

NOTA. — Le lysat-vaccin, milieu favorable au développement des germes est antiseptisé en raison de son contact avec les poussières de l'air. Il n'est pas injectable.

Laboratoires LEBOIME

19, rue Franklin — PARIS (XVI^e)

Ad. : Télég. : Vaclydun. — PARIS

VACUOLINE

Traitement de la Constipation.

3 formes présentant des propriétés différentes.
Granulé-Laxatif à effet rapide. Goût agréable. Huile de paraffine, ricinate de magnésie, cacao.

Indications. — Constipation aiguë et chronique.

Adultes : 1 à 3 cuill. à café. — *Enfants* : 1 à 2.

Prix : 1/2 flacon, 8 fr. ; le flacon, 15 fr.

Émulsion. — Huile de paraffine et mucilage d'algues marines. Crème délicieuse.

Indications. — Constipation entérocolite, etc., excellente pour enfants et nourrissons, recommandée pendant la grossesse et l'allaitement.

Adultes : 1 cuill. à soupe matin et soir ; *enfants et nourrissons* : 1/2 à 1 et 2 cuill. à café.

Prix : 1/2 fl., 8 fr. ; le fl., 12 fr. 50 ; le double fl., 20 fr.

Émulsion opothérapique. — Émulsion simple et sucs intestinaux. Goût très agréable.

Indications. — Constipation par insuffisance duodénale et intestinale ; 2 à 4 cuill. à soupe par jour.

Prix : 1/2 flacon, 8 fr. ; le flacon, 15 fr.

Laboratoires **DECHOSAL**

39, rue de la Gare — BONDY (Seine)

VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé)

Perles. — 3 à 6 par jour avant les repas ; ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux heures après un léger repas.

Propriétés. — Antispasmodique énergique et puissant sédatif du système nerveux, régulateur de la circulation et de la respiration.

Le flacon : 8 fr.

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie
56, boul. Péreire — PARIS

VALÉRAL PUY

Liquide ou capsules
Bromovalérianate sodique alcalin.
Alcoolat de cratœchus et passiflora.

Succédané plus actif des Valériانات et des Bromures, tolérance absolue, odeur, saveur agréables, action fidèle et soutenue, pas d'accoutumance ni dépression.

Véritable spécifique des Névroses convulsives douloureuses spasmodiques, Phobies, Névralgies, Insomnies, Crampes, Vertiges.

Dose. — Une cuillerée à soupe ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 2 à 3 cuillerées à soupe dans 1/4 verre d'eau sucré par jour, dont une le soir.

Envoi de littérature. **Laboratoire PUY**
à GRENOBLE (Isère).

VALÉRIANATE GABAIL DÉSODORISÉ

La seule et unique préparation
n'ayant pas d'odeur.

Composition. — Extrait de valériane, acide valérianique, eau distillée.
0,50 d'extrait par cuillerée à café.

Indications. — Spécifique des maladies nerveuses, le seul réellement sans odeur.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoires S. GABAIL
5, rue Lefebvre — PARIS (XV^e).

VALÉRIANATE GRIGNON

à odeur dissimulée

Composition. — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

Forme. — Liquide de goût agréable. l'odeur de valériane étant absolument masquée.

Prop. thérap. — Antinerveux, antispasmodique.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuill. à café par jour.

Pharmacie GRIGNON

2, rue Duphot — PARIS.

VALÉRIANATE PIERLOT

Liquide ou en capsules.

RESTE TOUJOURS et MALGRÉ TOUT

l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de la valériane officinale.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée ou non le soir avant de se coucher et le matin à jeun.

H. RIVIER

Pharmacien de 1^{re} classe

26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS

VALÉRIANE BYLA

(Sédatif régulateur du système nerveux.)

Renferme tout le suc inaltérable de la *plante fraîche et vivante, stabilisé* et concentré. Ne contient ni acide valérianique libre, ni ammoniacque combinée.

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant des centres nerveux supérieurs affaiblis, dépresseur de l'excitabilité réflexe exagérée. Antiépileptique, antispasmodique, analgésique, hypnotique.

Indications. — Névroses, hystéries, épilepsie, insomnies nerveuses, névralgies, neurasthénie, troubles de la ménopause, convulsions des enfants, palpitations, tachycardie, etc.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à café par jour.

Les Établissements **BYLA**,
26, avenue de l'Observatoire, Paris.

R. C. Seine 71895.

VALÉRIANE PACHAUT

Préparation liquide contenant les principes actifs de la valériane fraîche sans addition d'aucun hypnotique ou stupéfiant.

Indications. — Névroses, états spasmodiques, insomnies.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour.

La Valériane liquide **PACHAUT** est **inodore** et d'une **saveur agréable**.

Laboratoires PACHAUT
130, boul. Haussman — PARIS

VALÉRIANOSE GIGON

Composition. — Extrait de valériane fraîche stérilisée et pepsine.

Forme. — Pilules glutinisées.

Indications thérapeutiques. — Sédatif du système nerveux, Antispasmodique, Antinévralgique.

Mode d'emploi et doses. — 4 à 6 pilules par jour. Solubilité dans l'intestin.

PEPTO-VALÉRIANE

Solution sans odeur d'extrait de valériane fraîche stérilisée et pepsine.

De 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoires du Dr André GIGON
7, Rue Coq-Héron — PARIS (1^{er}).

VALÉRINODOR MALMANCHE

Composition. — Préparation liquide sirupeuse contenant par cuillerée à café : 0^{sr},05 d'extrait sec de Valériane stabilisée, 0^{sr},50 d'extrait fluide de Passiflora incarnata, 0^{sr},15 de Véronal sodique.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant sédatif du système nerveux central. Tolérance parfaite. Sommeil calme sans nausées au réveil.

Indications. — Insomnies, Palpitations, Spasmes musculaires, Excitation psychique, Angoisse Chorée, Convulsions, Toux nerveuse.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion de tilleul.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoire MALMANCHE
Pharmacien. Docteur ès-sciences.

101, avenue de Paris.
RUEIL-MALMAISON (S.-et-O.)

VALÉRIUM PAUL THIBAUT

Dragées de *Valérianate de Cérium*, sans odeur, de P. Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Le meilleur sédatif régulateur du système nerveux. Action particulièrement élective sur le grand sympathique.

Indications. — Troubles gastriques d'origine névropathique, Dyspepsies nerveuses, Vomissements chroniques, Vomissements incoercibles de la Grossesse, Insomnies, Névralgies, Neurasthénie, Mal de Mer, Hoquet.

Posologie. — Prescrire 2 dragées le matin et 2 dragées dans le milieu de la journée. Dans les affections chroniques, prescrire, si possible 2 dragées 2 à 3 heures avant les troubles. Continuer le traitement 10 à 12 jours. Cesser 2 à 3 jours et reprendre.

Les dragées de *Valérium P. Thibault*, sont dosées à 0,05 de principe actif.

Laboratoires des Produits Paul THIBAUT
6, rue Rosenwald — PARIS (XV^e).

VALÉROMENTHOL

Préparation à base de *suc frais de valériane* combiné à l'éther mentholique de l'acide valérianique.

Propriété thérapeutique. — Tous les avantages des bromures sans aucun de leurs inconvénients. Calmant par excellence. Antispasmodique sûr. Antidote de la douleur, des troubles nerveux et des états pathologiques de la neurasthénie.

Indication thérapeutique. — Neurasthénie, Hystérie, Insomnie, toutes affections nerveuses.

Mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

Prix au public 14 fr.

Laboratoire du VALÉROMENTHOL

10, rue Poncelet, Paris

Wagram 57.58

VALÉRONAL

Solution ou comprimés.

Sédatif puissant et inoffensif
des troubles nerveux, Psychopathies.

Hypnotique doux sans odeur.

Antispasmodique.

Par cuillerée à café ou par comprimé.

Véronal sodique très pur..... 10 gr. 15

Extrait physiologique de Valériane
fraîche par plasmolyse..... 5 cc.

Dose sédative. — 1 cuillerée à café ou
1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Dose hypnotique. — 1 cuillerée à café ou
1 comprimé avant le dernier repas et 2 ou
3 au coucher dans infusion.

Pas de contre-indication.

LABORATOIRE BERGER

14, rue des Pyramides, Paris.

VANADARSINE GUILLAUMIN GOUTTES

Composition. — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

Propriétés. — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence le teint redevient frais.

Indications. — S'emploie avec succès dans la pré-tuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme, les leucémies et les convalescences.

Mode d'emploi. — La *Vanadarsine* s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler dont elle n'a pas les inconvénients : V à X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

VANADARSINE GUILLAUMIN AMPOULES (Sérum Vanadarsiné)

Composition. — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cent. cube.

Propriétés. — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

Indications. — Chlorose, anémie, pré-tuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Injecter 1 à 3 cent. cubes par jour ou tous les deux jours.

Enfants : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos recommencer le traitement si nécessaire.

Se prescrit en ampoules de 1 cc. et de 3 cc. (dose forte).

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN
13, rue du Cherche-Midi — PARIS

VANADINE CHEVRIER

Composition :

Solution d'acide vanadique chloratée.

Propriétés :

Stimulant de l'appétit.

Indications :

S'emploie dans la prétuberculose, la tuberculose, l'anémie, la neurasthénie, et les affections de l'estomac.

Mode d'emploi :

Six à dix gouttes dans une cuillerée d'eau, avant le repas.

Docteur G. CHEVRIER

21, faubourg Montmartre — PARIS

VANUCLÉOL

Composition. — Nucléophosphate de Vanadium strychnarsiné.

Formes pharmaceutiques. — 1° Ampoules ;
2° Gouttes.

Indications. — Oxydant par le Vanadium, leucosthénique par les nucléines, le **VANUCLÉOL** s'emploie dans les cas d'*Asthénies, Surmenage, Tuberculose et Prétuberculose, Anémie, etc...*

Mode d'emploi. Douze injections journalières par les ampoules.

Gouttes : Vingt gouttes à chaque repas.

Échantillon et littérature sur demande

Laboratoires LACROIX

37, rue Pajol. — Paris (XVIII^e).

VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes, numérotés de 1 à 5.

Doses et mode d'emploi. — Avaler, sans les croquer, deux Comprimés avant le repas du soir, en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le 6^e jour, et continuer la variation.

Prop. Thér. — Action laxative toujours identique — Jamais d'accoutumance ni d'irritation — Tolérance parfaite — Innocuité absolue.

Prix : 10 francs la boîte.

Laboratoire de la VARILAXINE

164, rue Saint-Honoré — PARIS

VARI SERUM LEBON

(Ampoules, gouttes, dragées).

Traitement rationnel des varices par les injections sclérosantes.

Vari-sérum Quinine, Vari-sérum Salicylé, Vari-sérum Bi-ioduré : pour injections intra-variqueuses.

Vari-sérum urée : pour injections sous-cutanées. Une notice détaillée contenant le mode d'emploi, les indications et contre-indications du traitement est jointe à chaque boîte ou envoyée gracieusement sur demande.

Les gouttes et les dragées complètent l'action des ampoules et agissent seules d'une façon remarquable dans les varices douloureuses, les crampes, les œdèmes, les hémorroïdes et les métrorragies de toute nature.

Prix : ampoules : 20 fr. la boîte.

Gouttes et dragées : 12 fr. 50 le flacon.

Laboratoires G. LEBON

CHAROST (Cher)

VARISCLÉRINE

(Ampoules)

**préparées selon les indications
du Professeur Sicard**

Injections sclérosantes intravariqueuses, sans accidents, sans succès.

Varisclésine A : Salycyl de soude.

Varisclérine B : Quinine.

Prix de la boîte de 12 : 30 fr.

Prix spéciaux au corps médical.

Laboratoire Angelini

61, rue de Seine — PARIS

Tél. : Littré 47-76.

VASCUROL

(dragées)

Traitement de l'hypertension et des troubles de la ménopause.

Composition. — Gui, cratægus, formine iodée, scille, pyrole, extraits laxatifs et opothérapiques.

Indications. — Hypertension, Présclérose et Artério-sclérose. Troubles de la ménopause. Varices. Hémorroïdes. Obésité.

Mode d'emploi. — 2 dragées au début de chacun des deux principaux repas.

Le flacon de 48 dragées : 16 fr.

Laboratoire P. GUÉRIN

Meulan (Seine-et-Oise).

VASOLAXINE

Huile de vaseline pure

Dose :

Adultes : 1 cuillerée à soupe en se levant à jeun et le soir en se couchant.

Enfants : 1 cuillerée à café.

Aromatiser, si jugé nécessaire, avec menthe, citron, cognac, etc.

Indications :

Constipation, Entérites, Appendicites chroniques, Hémorroïdes.

Le flacon : 10 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères
7, Rue Biscornet — PARIS.

VÉGÉPHOS

Composition. — Phosphore organique, extrait de l'embryon de blé.

Propriétés. — Récalcifiant supérieur aux phosphates de chaux, directement assimilable. Agent phosphoré, contribue à la formation du squelette du noyau cellulaire, de la substance nerveuse.

Indications. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Rachitisme, Déminéralisation.

Utile dans : convalescence, grossesse, allaitement.

Formes. — Cachets à 0,60 : boîtes de 20. — Granulé à 12%. — Poudre.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 cachets par jour ; 1 à 2 cuillerées à café de granulé par jour ; dose moyenne, poudre 0 gr. 60 à 1 gr. 20 en une ou deux fois.

Pharmacie Centrale de France

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV^e).

VÉGÉTOLE EXTERNE

Médication picro-balsamique.

Spécifique des infections locales de la peau et des muqueuses.

Composition. — Complexe liquide renfermant les constituants de plusieurs essences (thym, aspic, citronnelle, etc.) et les produits de réaction de l'acide picrique sur ces constituants.

Propriétés. — Produit non toxique, microbicide, décongestionnant, analgésique et cicatrisant grâce à l'action de l'acide picrique, des essences et de leurs dérivés.

Indications. — Plaies, furoncles, anthrax, panaris. Affections des yeux, du nez, de la gorge, des oreilles. Maladies gynécologiques (en injections). Maladies des voies urinaires en injections et en instillations.

Laboratoire du Végétol

8, rue des Quatre-Fils — PARIS

Téléphone : Archives 65-65.

VEINOFLUINE

Régulateur de la Circulation Veineuse.

Composition. — Extraits mous stabilisés de Cyprès et de Marron d'Inde. Extraits mous d'*Hamamelis Virginica* et de *Viburnum Prunifolium*.

Présentation. Gouttes.

Prop. therap. — Régularisation de la circulation veineuse, augmentation de la résistance de la paroi vasculaire et disparition des réactions douloureuses liées aux phénomènes congestifs.

Indications. — Toutes les congestions, dilatations et inflammations veineuses : varicocèles, hémorroïdes, phlébites. Les troubles utérins de la ménopause ou de la puberté.

Posologie et mode d'emploi. — Trois fois par jour avant les repas, par prises de XXX gouttes dans de l'eau, du vin ou une infusion.

Pharmacie NEUVILLE

239, faubourg Saint-Honoré — PARIS.

VEINOPOSINE

Régénérateur du système artério-veineux.

Composition. — Surrénales, Hypophyse. Ovotest, Thyroïde, Extrait d'Hamamélis, Cratægus, OEsculus, Viburnum. Valériane.

Indications. — Congestion sanguine sous toutes formes, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Vapeurs, Migraines, Troubles ovariens de la Puberté et de la Ménopause.

Formes. — Pilules et gouttes.

Dose :

Pilules : 4 à 6 par jour aux repas.

Gouttes : X à XXX deux fois par jour aux principaux repas.

**Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie Médicale**
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE

VEINOSÉRUM

Indications. — Retour d'âge, Varices, Phlébites, Œdèmes, Hémorroïdes, et tous états congestifs.

1° *Forme gouttes* : Formule très active à base d'extraits de plantes *stabilisées* par procédé spécial (capsicum, gui, marron d'Inde, hamamélis, rhamnées).

Doses : 20 gouttes matin et soir 15 jours par mois. — 15 fr.

2° *Forme liqueur*, à base de citrates alcalins, urotropine et extraits de rhamnées.

Doses : 1 cuill. à soupe matin et soir 15 jours par mois. — 12 fr.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, Place Intérieure-Saint-Michel,
TOULOUSE

VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamélis virginica, Marrons d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

Indications. — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques, Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

Doses. — Trois comprimés avant les repas de midi et du soir.

Laboratoires LEBEAULT

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

VEINOTROPE

Propriétés thérapeutiques. — Traitement des troubles veineux.

Indications. — Varices, Varicosités, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Troubles de la ménopause et de la Puberté.

Composition.

A. — *Veinotrope. M.*

(Usage masculin, comprimés rouges).

Para-thyroïde..	1 milligr.	Pancréas.....	10 centigr.
Orchitine.....	25 —	Hypophyse.....	1 milligr.
Surrénale.....	5 —	Noix vomique.	5 —
Extrait Hamamélis, Marron d'Inde... 30 milligr.			

B. — *Veinotrope. F.*

(Usage féminin, comprimés violets).

Para-thyroïde..	1 milligr.	Pan réas.....	10 centigr.
Ovarine.....	35 —	Hypophyse.....	1 milligr.
Surrénale.....	5 —	Noix vomique.	5 —
Extrait Hamamélis, Marron d'Inde... 30 milligr.			

Mode d'emploi. — De 2 à 6 comprimés une heure avant les repas et suivant les indications médicales.

Laboratoires LOBICA

47, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e)

VELLEDOL ADRIAN

Composition. — Principe actif du gui.

Action. — Hypotenseur constant, régulier et durable.

Indications. — Hémorragies (hémoptysies, ménorrhgies, hématomèse, etc...), congestions localisées et hémorragies congestives. Hypertension, artériosclérose, tachycardies, arythmies, céphalées, vertiges, bourdonnements d'oreilles.

Formes & mode d'emploi. — Pilules dosées à 0,05 : 4 à 6 pilules par jour.

Ampoules de 4 c. c. dosées à 40 cgr., 1 à 3 ampoules par jour.

ADRIAN & C^{ie}

9 et 11, rue de la Perle — PARIS

VÉNECINE

Composition :

Préparée par un procédé physico-chimique breveté, présente sous forme d'eau, à l'état de complexe colloïdal stable (diluée et concentrée) et de solution les éléments essentiels nécessaires à la cellule vivante : calcium, sodium, potassium, fer, silice, strontium, chlore, carbone, soufre.

Propriétés :

La Vénecine paraît être la seule préparation stable contenant du soufre assimilable et fixable par la cellule vivante. Grâce à cette propriété et à sa charge électrique élevée, elle active les échanges et favorise l'activité humorale et tissulaire. C'est un excitant de la croissance et des glandes endocrines.

Indications :

- Chez l'enfant et l'adolescent : arrêt et retard du développement, maladies par carence, troubles endocriniens.
- Chez l'adulte : troubles de la nutrition, rhumatisme chronique, goutte, certaines dermatoses, troubles endocriniens, arthritisme, asthénie, neurasthénie, maladie de Basedow.
- Chez le vieillard : artériosclérose, sénilité.

Présentation :

Forme liquide concentrée en flacons de 200 cc.
Forme liquide diluée en bouteilles d'un litre
En ampoules injectables de 10 centimètres cubes.

Posologie :

- Forme liquide concentrée : deux cuillerées à café dans un verre à bordeaux d'eau ordinaire trois fois par jour à distance des repas.
- Forme liquide diluée : un verre à bordeaux trois fois par jour à distance des repas.
- Ampoules : tous les deux jours une injection intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée.
- Continuer le traitement pendant deux ou trois semaines.

Compagnie Française de la VÉNECINE

7, rue des Italiens — PARIS

VÉRALGINE

Analgésique et antimigrainique.

Action ultra-rapide. Effet prolongé même avec une dose minime.

Composition. — Acet phénétine, Amidopyrine, Triméthylxanthine, Soneryl.

L'association de ce dérivé barbiturique (à la dose de 0 gr. 03 par prise) avec les analgésiques vrais que renferme chaque comprimé renforce l'action médicamenteuse de ces derniers et permet avec des doses beaucoup plus faibles d'obtenir des effets curatifs plus intenses en rapidité et durée, sans aucune intolérance, ni réaction cutanée.

Indications. — Toutes douleurs ou névralgies, Rhumatismes, Goutte, Sciaticques, Migraines périodiques, Migraines des hypertendus, Grippe, Affections dentaires, Périostite. Maux de tête consécutifs aux rachianesthésie, etc.

Les comprimés portent un trait de division permettant de fractionner les doses.

Posologie. — Adultes 1 à 2 comprimés ou cachets.

Enfants 1/4 ou 1/2 comprimé.

Ces doses peuvent être répétées 2 à 3 fois par 24 heures

Laboratoire du MAINGUY

BONDY (Seine).

M. BASSIN Docteur en pharmacie.

Échantillons sur demande.

VÉRIANE BURIAT

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café : 0 gr. 12 amide barbiturique diéthyle et 1 gr. Valériane fraîche et INODORE.

Indications. — Hypnotique fidèle, inodore et sédatif du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats. Sommeil calme, réveil normal.

Posologie. — Comme sédatif : 2 à 5 cuillerées à café espacées dans les 24 heures.

Comme hypnotique : 2 à 5 cuillerées à café 3 heures avant le moment du sommeil, dans une infusion ou eau sucrée.

Laboratoire BURIAT

25, rue Copernic — PARIS (XVI^e).

VERMIRÈNE AUDIBERT

Macération de sèmeu-rontra d'Alep et de chœ-nopodium anthelm n thi um présentée sous forme de sirop de fraise aromatisé à la vanille.

Agreablement accepté par enfants et adultes. Ne nécessite ni diète, ni régime et n'offre pas les inconvénients de la Santonine.

Posologie :

Enfants de 1 à 5 ans : Une cuillerée à café le matin à jeun pendant trois jours consécutifs.

Enfants de 5 à 10 ans : Une cuillerée à dessert.

Adultes : Une à deux cuillerées à soupe.

En cas de crise aiguë doubler les doses.

Prix : 6 francs.

M. AUDIBERT, Docteur en Pharmacie
Cinq Cantons — BAYONNE

VERNIS A LA DIACHUSINE

Arsénicale.

Traitement externe des Néoplasmes, Cancroïdes, Cancer épithélial de la face.

Le Vernis à la Diachusine arsénicale s'adresse aux cancroïdes en général, surtout aux petits cancroïdes de la face.

Mode d'emploi. — On commence à déterger l'ulcération cancéreuse de ses croûtes à l'aide de compresses humides, puis on pratique l'assèchement exact à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Cela fait, à l'aide d'un pinc au, on recouvre de vernis à la Diachusine arsénicale la surface ulcérée de façon qu'il dépasse et recouvre largement ses bords ordinairement épaissis. Il n'y a plus rien à faire alors, qu'attendre que la croûte formée se détache spontanément, ce qui arrive généralement du quinzième au vingtième jour. Une palpation minutieuse permet alors de s'assurer qu'il ne reste aucune induration suspecte, auquel cas on devrait recourir à une nouvelle application de vernis.

Remarque. — Si la tumeur a une surface plus étendue qu'une pièce de deux francs environ, il est préférable de faire des applications successives sur les diverses parties constituant le néoplasme et de mettre un intervalle de neuf à dix jours entre les deux applications,

Laboratoires A. LEJEUNE
142, rue de Picpus — PARIS (XII^e)

VERONIDIA BUISSON

Solution de diéthylmalonylurée associée à l'extract de *Passiflora incarnata* dans un véhicule synergique et agréable au goût. Chaque cuill. à soupe de solution ou chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de principe actif.

Prop. Thér. — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse dans toutes ses manifestations : Névroses diverses. Palpitations. Phobies. Insomnies. Névrose d'angoisse, etc.

Dose. — 2 cuill. à café comme antispasmodique dans le courant de la journée. — 1 à 2 cuill. à soupe ou comprimés comme hypnotique, le soir au coucher.

Établissements Albert BUISSON

F. JALOT & C^{ie}

157, rue de Sèvres — PARIS.

R. C. Seine 222.705 B.

VERTICURINE

Composition. — Silicate de soude, chimiquement pur.

Actions. — Hypotensive-ant-athéromateuse déchlorurante, ramène les viscosités à la normale, fait disparaître les symptômes cérébraux.

Indications. — Artério-sclérose. Angine de poitrine. Troubles cérébraux. Otite scléreuse. Hypertension. Aortite. Bourdonnements. Sclérose cardiaque. Présclérose. Vertiges, Ménopause.

Formes et doses. — 1° *Liquide*: chaque cuill. à soupe représente un gr. de silicate assimilable. Dose : 1 cuill. à soupe aux 2 principaux repas; 2° *Comprimés*: chaque comprimé renferme 0 gr. 50 de silicate assimilable. Dose : 2 comp. à chacun des principaux repas.

Nous recommandons de préférence la solution dorénavant préparée sans goût désagréable.

Laboratoire L. GRIAS, Pharmacien de 1^{re} cl.

47, rue Féray — CORBEIL (S.-et-O.)

VERRULYSE

Composition. — A base de glycérophosphates (phosphate vital) de chaux, fer, manganèse, magnésie, hydrofluosilicate de soude, charbon végétal et quinquina.

Formes. — Poudre légèrement comprimée en petits cachets.

Boîte de 60 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.

Demi-boîte de 30 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de moins de 8 ans.

Dose et mode d'emploi. — *Pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.* — 1 cachet par jour pendant 60 jours, au début d'un repas (toujours le même de préférence).

Pour les enfants de moins de 8 ans. — 1 cachet tous les deux jours (30 cachets en 60 jours) ou mieux : 1/2 cachet par jour délayé dans une cuillerée de potage ou tout autre aliment, pendant 60 jours.

Propriétés. — 1° **Effet local.** — Au bout de 10 à 15 jours, les verrues prennent une teinte rosée sur le pourtour, et deviennent parfois le siège d'une légère démangeaison ; puis elles grossissent un peu, reprennent ensuite leur couleur et leur grosseur normales et disparaissent dans le mois qui suit la fin du traitement, par élimination ou par résorption progressive, sans laisser de cicatrices. En cas de guérison dès les premières semaines, comme cela se produit quelquefois, le traitement doit néanmoins être continué jusqu'au bout, afin d'éviter les récidives.

1° **Effet général.** — Reconstituant. Amélioration très nette chez les enfants, de l'entrain, de l'appétit, du teint.

Indications. — Traitement spécifique des verrues et autres papillomes (larynx, organes génitaux, etc...).

Paraît exercer une action favorable contre d'autres productions épidermiques, pour lesquelles une expérimentation plus étendue est en cours.

Aucune contre-indication. Après l'emploi d'une première boîte, le traitement peut être prolongé et même renforcé sans inconvénient dans les cas exceptionnels où cela est nécessaire (jusqu'à 6 cachets par jour dans les cas de verrues rebelles ou de tumeurs malignes).

Établissements JACQUEMAIRE

VILLEFRANCHE (Rhône).

Soc. à resp. lim. au cap. de 2.000 000 de francs.

Adm^r-Gérant : **M. MIQUET**, D^r en Pharmacie.

VIGARDYNE

(ferment lactique actif).

2 Formes. — *Culture liquide*, en boîtes de 4 flacons de 60 cc : La boîte : 16 francs.

Comprimés, en boîtes de 48 comprimés : La boîte : 12 f.

Indications thérapeutiques. — Affections gastro-intestinales. Entérites sous toutes ses formes, Diarrhées des adultes et nourrissons, Embarras gastriques et intestinaux, Auto-intoxications.

Posologie. — *Culture liquide* : a) *Adultes et enfants* : La moitié d'un flacon 1/2 h. avant chaque repas, dans un peu d'eau sucrée. b) *Nourrissons* : 4 à 8 cuillerées à café par jour avant les tétées. *Comprimés* : a) *Adultes et enfants* : 8 à 10 comprimés par jour avant les principaux repas, délayés dans un peu d'eau sucrée ou de lait tiède. b) *Nourrissons* : 2 comprimés avant chacune des principales tétées.

Echantillons et Littérature :

Laboratoire VIGARDYNE

11, rue des Garennas — CHATOU (S.-et-O.)

Dépôt général pour la France :

Office Commercial Pharmaceutique

71, rue du Temple, PARIS.

VIN DE BAUDON

Antimonio-phosphaté

Comp. — Contient le phosphate de chaux sous une forme non acide, éminemment assimilable. Cette assimilation se trouve exaltée par la présence de l'antimoine qui forme avec le phosphate une véritable combinaison organique et qui agit lui-même par ses vertus propres, comme excitant et régulateur du bon fonctionnement de l'appareil digestif

Avantages. — Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades.

Ind. therap. — Affaiblissement général, anémie, lymphatisme, rachitisme, scrofule, croissance, suppurations prolongées, maladies des os, grossesse, allaitement, etc.

Posol. — Un verre à madère p. les adultes et un verre à liqueur p. les enfants à prendre au moment des repas; on peut en prendre selon les cas jusqu'à 4 ou 5 p. j.

Laboratoire VAUDIN et GUILLAUMIN

Doct. en Pharm. 12, r. Charles-V — PARIS.

VIN DE BUGEAUD

Toni-nutritif

Malaga vieux - Quinquina - Cacao

Indications :

Faiblesse générale, Anémie,
Surmenage, Etats consomptifs, Diabète,
Convalescence des maladies aiguës,
Anémie palustre, etc.

Dose :

Un verre à madère aux deux principaux
repas.

Laboratoires LEBEAULT

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

VIN DE CHASSAING

à la pepsine et à la diastase

S'emploie dans toutes les affections
stomacales provenant d'une insuffi-
sance de digestion, à la dose d'un
ou deux verres à liqueur immédiate-
ment après le repas.

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

1, Quai Aulagnier
ASNIÈRES (Seine).

VIN GIRARD

Iodo-tannique phosphaté.

Nature. — Le *Vin Girard* est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrées par l'usage. — Un verre à madère de *Vin Girard* contient :

Iode..... 0 gr. 075 mil.

Tannin..... 0 gr. 50 cent.

Lacotophosphate de chaux 0 gr. 75 cent.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne; demi-dose pour enfant.

Prop. Thér. — Tonique et reconstituant, augmente la phagocytose.

Indicat. — Lymphatisme, scrofule, tuberculose au 1^{er} degré, engorgements ganglionnaires, convalescences.

Laboratoire A. GIRARD

48, rue d'Alésia, Paris.

VIN ET SIROP NOURRY

Iode et tanin en combinaison stable.

Applications thérapeutiques. — 1^o Lymphatisme dans toutes ses manifestations osseuses, et ganglionnaires. — 2^o Voies respiratoires: Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques. — 3^o Gynécologie: Formation des jeunes filles, Ménopause, Aménorrhée, Dysménorrhée. — 4^o Convalescences. Intoxications chroniques, Anorexies. — 5^o Artériosclérose: Athéromes, Anévrisme de l'aorte, Angine de poitrine. — 6^o Affections thyroïdiennes. — 7^o Syphilis tertiaire.

Formes. — Vin et sirop dosés à 5 centigr. d'iode et 10 centigr. de tanin par cuill. à soupe de 15 gr. (15 milligr. par cuillère à café).

Doses. — La dose moyenne à prescrire est: *Adultes*: une cuill. à soupe; *Adolescents*: une cuill. à dessert; *Enfants*: une cuill. à café, au moment des principaux repas.

Nota. — En raison de la réaction que le Vin Nourry peut avoir sur le métal de certaines cuillères, il est bon d'employer un verre à liqueur ordinaire préalablement gradué, une fois pour toutes avec des cuillerées d'eau.

Laboratoires CLIN

PARIS

VIOFORME CIBA

(et ovules au Vioforme)

Iodochloroxyquinoléine. Succédané de l'iodoforme, inodore, non irritant : antiseptique et kératoplastique.

Indications. — Plaies atones, Ulcères variqueux, Eczéma, Escarres, Brûlures.

Doses. — En poudre, 2 à 3 gr. pour une application. Pommade de 2 à 10 %. (Se formule magistralement.)

Ovules au Vioforme. — Antiseptiques, analgésiques, décongestionnants, désodorisants, résolutifs : métrites, vaginites, etc.

La boîte de six : 13 fr.

Laboratoires CIBA O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

VIOSTEN

Composition. — Huile de foie de morue concentrée, Vitamines (ergostérol irradié), Lipoides Phosphatides, Ether benzylocinnamique.

Injectons en 1 cc. — Comprimés.

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescences, Tuberculoses, Rachitisme.

Chez les nourrissons, employer la Zymatine irradiée (ergostérinée).

Doses. — *Enfants* : Au-dessous d'un an : 1 cc. tous les 4 jours. — 1 comprimé par jour, pendant les repas.

De 1 à 3 ans : 1 cc. tous les 3 jours. — 2 comprimés par jour, pendant les repas.

De 3 à 12 ans : 1 cc. tous les 2 jours. — 4 comprimés par jour, pendant les repas.

Au-dessus de 12 ans : 1 cc. tous les jours. — 6 comprimés par jour, pendant les repas.

Adultes : 1 à 2 cc. par jour. — 6 comprimés par jour, pendant les repas.

Prix : Comprimés, 15 fr. — Ampoules, 20 fr.

LABORATOIRES LESCÈNE

Livarot (Calvados). Paris, 58, rue de Vouillé,
Tél. : Vaugirard 08-19.

VIOXYL MOUNEYRAT

**Puissant accélérateur
de la nutrition générale**

Indications. — Asthénies diverses, Cachexies. Convalescences, Maladies consomptives, Anémie, Chloro-anémie, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose, Neurasthénie, Asthme, Diabète.

Formes. — Elixir et Granulé.

Posologie. — *Adultes* : Débuter par 2 cuillerées à café par jour, une le matin, une le soir, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas. Au bout de 3 ou 4 jours, porter cette dose à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert
VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

VISCO-SÉRUM

Sérum réminéralisateur nerveux sensibilisant, isotonique, isovisqueux.

Indications thérapeutiques. — Tous les états de dépression du système nerveux et de l'appareil cardio-vasculaire.

Présentation :

Ampoules : Boîte de 10 ampoules : 18 fr.

Gouttes : Flacon de 20 grammes : 18 fr.

Posologie. — Une ampoule de 5 cc. tous les deux jours (une cure comprend deux séries de 10 piqûres) Gouttes : XX à chaque repas.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg - PARIS (X^e)-

R. C. Seine 143.981.

VISCUM ZYMA

Composition. — Dialysé de baies, feuilles et tiges de gui blanc, obtenu selon le procédé original du Prof. GOLAZ.

Propriétés. — Le *Viscum Zyma* abaisse la pression sanguine, agit comme tonique du cœur et favorise l'élimination des chlorures et de l'urée.

Indications. — *Convient dans tous les états morbides associés à l'hypertension : artério-sclérose, urémie, albuminurie de la grossesse ; est également indiqué dans certains cas d'épilepsie.*

Mode d'emploi. — S'emploie à la dose de 20 à 30 gouttes, diluées dans un peu d'eau, avant les repas (2 à 3 fois par jour).

Laboratoire " ZYMA "
4, Rue Bellart — PARIS (XV^e).

VITACALCINE

Moncour

Complexe opothérapique irradié.

Composition. — Vitamines, Lipoides et Cholestérine du foie et de la moelle rouge des os frais, ainsi que les éléments minéraux de ces derniers. Les mordants physiques (radiations ultra-violettes), endocriniens (parathyroïde et surrénale) et minéraux (nucléinate de manganèse) en assurent la fixation.

Indications. — Toutes maladies déminéralisantes et hyposthénisantes telles que : Pré-bacillose, Bacillose, Cachexie, Rachitisme, Décalcifications dentaires et osseuses, Neurasthénie, etc.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour.
Enfants : 1 à 4, suivant l'âge.

Le traitement sera prolongé aussi longtemps que nécessaire, la Vitacalcine n'étant pas toxique.

Laboratoire " MONCOUR "
49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE (Seine)
Téléphone : Molitor 08-47.

VITAMINE ROGIER

VITAMINE B.

Indications. — Diabète. Maladies par carence. Troubles de la croissance. Béribéri.

Formes et Doses. — Comprimés. — 4 à 6 comprimés par 24 heures.

«L'influence passagère de l'Insuline peut être prolongée par un régime équilibré.

D'autre part, l'adjonction à ce régime, soit de Vitamine B, soit de Lévilose, ou du mélange de ces deux corps permet d'espacer les injections d'Insuline et de rendre mieux opérante une même dose de cette substance. »

(Communication faite à l'Académie des Sciences, séance du 22 Octobre 1923).

Littérature et échantillon sur demande.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie

56, boulevard Péreire — PARIS.

VITAMORRHUINE

Composition. — Principes actifs de l'huile de foie de morue (vitamines A et D) associés au phosphore et au calcium sous forme de granulés au cacao.

Une cuillerée à café de Vitamorrhutine équivaut à une cuillerée à soupe d'huile de foie de morue type. Préparation vérifiée au point de vue de son activité biologique.

Indications. — Rachitisme, Scrofule, Débilité, Lymphatisme, Tuberculose.

Doses. — *Enfants* : de 3 mois à un an : 1 cuillerée à café par jour (dans du lait) de 1 à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour ; de plus de 5 ans : 3 cuillerées à café par jour.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES

VITARGYL

Composition et Propriétés:

Vitellinate d'argent spécial dosé à 20 %.

Petites masses cristallines, très solubles dans l'eau.

La solution de *vitargyl* est neutre, ne précipite pas par les chlorures en solutions isotoniques, ne coagule pas l'albumine.

Action thérapeutique. — Antiseptique puissant, sédatif, et décongestif externe. Action non corrosive, parfaitement indolore.

Application. — Le *vitargyl* est d'un emploi précieux pour le lavage et le pansement des plaies; pouvoir microbicide énergique, propriétés excitantes sur les éléments réparateurs des tissus.

Indications. — Urologie, Gynécologie, Ophtalmologie, Oto-rhinolaryngologie. Est présenté sous forme pure et en préparations (crayons, ovules, suppositoires), solution en ampoules de 5 cc. ou ampoules stilligoutte.

Fabricants POINTET et GIRARD

38, rue des Francs-Bourgeois, PARIS.

VITERGOMINE

(Vitamine D).

Composition. — Ergostérol irradié dissous de l'huile d'olive et incorporé au saccharure de glycérophosphate de chaux à 5 p. 100.

Action. — L'Ergostérol irradié constitue un véritable catalyseur du calcium.

Indications. — Rachitisme, Troubles de l'ossification, Carie dentaire, Ostéomalacie, Prétuberculose et États de déminéralisation.

Doses. — Par cuillerée à café de 1 gramme environ de granulés.

Enfants: jusqu'à 5 ans, 1 cuillerée à café par jour; de 5 à 10 ans, 2 cuillerées à café par jour; de plus de 10 ans, et pour les *adultes*: 3 cuillerées à café par jour.

Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES

VIVOLÉOL

Huile de foie de morue sélectionnée, non irradiée, garantie active et riche en vitamines :

(Facteur antirachitique et facteur de croissance.)

(Contrôle biologique rigoureux.)

Forme. — Liquide.

Indications :

Troubles de la croissance. Troubles de l'ossification. Troubles de la dentition. États de dénutrition. Lymphatisme. Maladies par carence.

Posologie :

Enfants — Nourrissons :

15 à 30 gouttes par jour, jusqu'à 1/2 cuillerée à café.

Jusqu'à 3 ans :

1/2 à 1 cuillerée à café.

Au-dessus de 3 ans :

1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

Adultes :

1 cuillerée à soupe par jour.

N. B. — Le VIVOLÉOL peut être pris à toute époque de l'année.

Prix : 14 francs.

Laboratoires du VIVOLÉOL

(Annexe des Laboratoires Zizine)

69, Rue de Wattignies, Paris (XII^e).

Téléphone : Diderot 28-96.

VULCASE

(comprimés)

Laxatif-dépuratif.

Soufre organique ; opothérapie biliaire

Propriétés thérapeutiques. — Combat la constipation par action directe sur le foie, n'irrite pas l'intestin, ne provoque pas d'accoutumance.

Indications. — CONSTIPATION. Affections du FOIE et de l'intestin. Dermatoses.

Mode d'emploi. — Prendre deux comprimés soit le matin à jeun, soit vers 17 heures.

Laboratoires P. BRISSON et C^{ie}.
114, avenue Michel et, Saint-Ouen, Seine.

VULNÉRINE DU Dr BERGEN

Principes actifs. — Camphre associé au Phénol, Naphtol. Précipité blanc, Ether éthylopyramido-benzoïque, Oxyde de zinc, etc.

Forme :

Emplâtre semi-fluide en tube d'étain de 50 c. c.

Indications. — *Ulères variqueux*, plaies atones, Brûlures, Eczémas, Cancroïdes, Lupus, Erysipèle, Engelures, Impétigo, etc.

Pansement précieux :

Ni sec, ni humide, ni adhérence, ni macération. Calmant. Epidermisant incomparable. Les brûlures guérissent sans laisser de traces,

Mode d'emploi :

1 ou 2 applications par jour. Recouvrir avec le papier à pansement spécial qui accompagne chaque tube de Vulnérine, puis coton hydrophile et bande. Jamais d'imperméable. Nettoyage à l'éther du pourtour de la plaie.

Prix du tube : 11 fr.

Laboratoire DUCOQ à Langeais, (I.-et-L.).
R. C. 2059, Chinon.

LA YAOURTINE

Culture sèche des ferments du Yaourt.

Composition. — Ferments bulgares sélectionnés, prot. g^s, par un enrobage spécial, de l'action oxygénante de l'air et de l'humidité (Procédé Nestlé).

Formes. — Dragée et granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale, et de ses répercussions cutanées, rénales et hépatiques.

Posologie.

Nourrissons. — 1 à 2 cuillerées à café par jour.
Yaourtine granulée.

Enfants et Adultes. — Cas aigus: 2 à 4 cuillerée p. jour Yaourtine granulée. Cas chroniques: 10 à 12 dragées par jour.

À prendre à jeun avec lait bouilli, 1 h. avant le repas.

L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1^{re} classe
18, place de Laborde, PARIS (VIII^e). Laborde 18-20.

ZOHOL

Prop. thér. — Reconstituant.

Indications. — Anémie, Surmenage, Phosphaturie, Convalescences.

1° Formes: En granulés.

Composition:

Hypophosphite de chaux.....	0 gr. 06
— — — — — fer.....	0 gr. 06
— — — — — manganèse.....	0 gr. 06

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café à chacun des principaux repas.

2° Forme: En ampoules.

Composition:

Hypophosphites composés	0 gr. 18
Eau physiologique Q. P.....	2 cc.

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée.

Laboratoires "Lobica"

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII°)

ZOMINE

du professeur CH. RICHET

Plasma musculaire de bœuf sec et total.

Stimulant de la nutrition en même temps qu'aliment riche en vitamines et facilement assimilable, la Zomine provoque une véritable *régénération musculaire*.

Doses :

1 gramme	{	1/2	cuillerée à café	de 2 à 4 ans
par		1	—	4 à 6 —
année d'âge		1	— 1/2	6 à 8 —
ou		2	—	8 à 12 —

Enfants : La Zomine donne aux enfants *anémiques* ou en *période de croissance*, les *vitamines* et la ration élevée d'*albuminoïdes* dont ils ont besoin.

Adultes : La Zomine est un *aliment médicamenteux* recommandé dans toutes les *anémies*, *convalescences*, *états de grossesse* et d'*allaitement*.

Dose : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prétuberculose et Tuberculose : Dans les premières périodes de la tuberculose, la Zomine provoque une augmentation de poids des malades traités en même temps qu'une amélioration de l'état général.

Dose : 4 à 6 cuillerées à café (ou 2 cuillerées à soupe) par jour.

La Zomine étant très légère, il faut remplir largement les cuillers sans se contenter d'affleurer les bords comme avec un liquide.

La Zomine doit se prendre dans des aliments tièdes ou froids.

Zomine intégrale :	{	Le petit flacon.....	23 fr.
		Le grand flacon.....	45 —
		La boîte de 4 grands flacons..	170 —

Zomine sucrée : en paillettes dosées à 50 o/o de zomine intégrale.

Doses : double des doses de Zomine intégrale.

Le flacon : 25 fr. : La boîte de 4 flacons : 95 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS

ZOMO-MUSCULOSINE BYLA**(sèche)**

EXTRAIT SEC, préparé dans le vide et concentré, de chair musculaire de bœuf, à haut pouvoir métabolique.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-bacillaire, toni-nutritif, excitant physiologique.

Indications. — Convalescence, anémies, tuberculose, neurasthénie, etc.

Doses et mode d'emploi. — Un demi à un tube par jour, délayé dans une tasse de bouillon à peine tiède, ou mélangé à de la purée de légumes, ou encore à de la confiture.

Les Établissements BYLA,
26, avenue de l'Observatoire, Paris.

R. C. Seine 71895.

ZYMATINE LESCÈNE

Poudre sucrée.

Composition. — Ferments, Galactozymases, Alcalinité titrée, Carbonates, phosphates, Lactose.

Propriétés. — Déconstipant, Cholagogue alcalin, Maternise le lait de vache, Fluidifie le caséum, le peptonifie, Réminéralise.

Indications. — *Enfants* : Constipation, Vomissements, Gastro-entérite, Intolérance lactée, Maladies de la nutrition, Dermatoses.

Adultes : Constipation, Vomissements, Hyperchlorhydrie, Ulcères de l'estomac, Affections hépatiques.

Doses. — *Enfants* : 2 à 6 mesures par jour dans lait, eau, bouillies (Eviter température supérieure à 50°). Dans la *constipation*, on peut augmenter les doses sans danger jusqu'à effet.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau avant ou après chaque repas, 2 à 3 fois par jour.

Constipation. — 2 cuillerées à café 3 ou 4 fois par jour.

ZYMATINE IRRADIÉE

Poudre sucrée.

Composition. — Zymatine, Ergostérol irradié, Nuckinate de Ca.

Indications. — Avitaminose, Rachitisme, Pré-tuberculose, Dénutrition, Déminéralisation.

Doses : Enfants.

Jusqu'à 6 mois : 1 mesure matin et soir.

— 1 an : 1 — — midi et soir.

au-dessus de 1 an : 2 mesures matin et soir.

On peut augmenter les doses sans danger :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour.

Prix au public : 10 fr.

Laboratoires LESCÈNE

LIVAROT (Calvados — PARIS 58, rue de Vouillé
Téléph. : Vaug. 08-19)

THE HISTORY OF THE CITY OF NEW YORK

FROM THE FIRST SETTLEMENT OF THE COLONY, IN 1624, TO THE PRESENT TIME.

BY J. C. CALVERT, ESQ., OF NEW YORK.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 1824.

1824

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 1824.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 1824.

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 1824.

1824

NEW YORK: PUBLISHED BY J. C. CALVERT, 1824.

3^e Partie

NOMENCLATURE NOMINALE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES

avec les adresses de leurs
fabricants

Les noms des produits précédés d'un astérisque figurent dans la 2^e partie du présent ouvrage avec leurs compositions, propriétés thérapeutiques, indications et posologies,

A

Abactériol

***Absuric**

***Acécoline**

Acépilline Rambaud

***Acésine Guillaumin**

***Acétylarsan**

***Acide oléique P. Thibault**

***Acidural Dupraz**

***Acimyl Monimart**

***Acodros**

***Acolitol**

***A. D. Grosjean**

***Actine**

***Adolose Legrand**

***Adonidine Clin**

***Adoverne Roche**

***Adral**

***Adrénaline Byla**

***Adrénaline Clin**

***Adrénaline Invar**

***Adrénine Mialhe**

***Adrénocalcine**

Adrénol Total (voir Lipoides)

***Adrénoléine**

Adrénophyséine

Adrénopituine Byla

***Adrèpatine Laleuf**

***Adrialgine**

***Adrianine**

***Aérophagyl**

***Ethone-Falcoz**

***Agamétol.**

54, bd Jacquemain, Bruxelles.

19, r. Drouot, Paris.

Lab. L. LEMATTE & G. BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris.

38, r. Gay Lussac, Paris.

13, r. Cherche-Midi, Paris (7^e)

SPECIA 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.

6, r. Rosenwald, Paris. (Voir : Oléocidase.)

41, r. Etienne-Marcel, Paris.

23, r. Grand-Cerf, Meaux.

BOUVELOT, 62, r. d'Antibes, Cannes (A.-M.).

LANCOSME, 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.

8, r. Lalayette, Paris.

60, r. Vieux-Pont de Sèvres Billancourt.

2, r. des Trois-Frères, Paris.

20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

21, pl. des Vosges, Paris.

Labor. ROBERT & CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.

26, av. Observatoire, Paris.

20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

21, r. Nonnains-d'Yvères, Paris.

8, rue Favart, Paris.

L. ADAM, à Granville (Manche) Adrénol Total (voir Lipoides).

FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.

14, r. de Clichy, Paris.

26, av. Observatoire, Paris.

20, rue du Laos, Paris.

9, r. de la Perle, Paris.

9, r. de la Perle, Paris.

12, boul. Saint-Martin.

9, r. Boissonnade Paris.

Labor. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.

*Agarase

Agaryl Fournier
 *Agocholne Zizine
 *Agomensine Ciba
 Agonol Cognet
 Aimaquinase
 *Airoglyce
 *Airol Roche
 *Albuplast Vigier

Aldogène Carteret
 *Alepsal Genévrier
 *Alexime
 Algaliment
 Algarine Nyrdhal

Algarol
 *Algatan
 *Algocratine Lancosme
 Algodigestine
 Algolane Poulenc
 *Alibourine
 *Aliment Tinardon
 *Allisatine Sandoz
 *Allocaine Lumière
 *Allochrysine Lumière
 *Allonal Roche
 *Allophaquina
 *Aloïne Houdé
 *Aloysine Gouzène
 *Alucol Wander

*Alunozal

Amandol
 Ambrine

Ambrosia
 *Amibiasine
 *Amidal
 *Amino-Sel Byla
 Amipyrrine.

*Ampho-vaccins de
 Ronchèse
 Ampoules bi-iodure
 Hg. Midy

*Ampoules Boissy
 Ampoules Churchill
 *Ampoules de Digalène

RÉAUBOURG, 1, r. Ray-
 nouard, Paris.
 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
 24-26, r. de l'écamp, Paris.
 1, pl. Morand, Lyon.
 43, r. de Saintonge, Paris,
 Sté Rég. de l'Ouest à Rennes.
 55, r. Chabrol, Paris.
 21, place des Vosges, Paris.
 9, r. de la Gare, Levallois-
 Perret.
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 2, r. du Débarcadère, Paris.
 51, r. Gay-Lussac, Paris.
 47, r. Colbert, Tours.
 20, r. La-Rochefoucauld, Pa-
 ris.
 71, r. du Commerce, Paris.
 40, rue Condorcet, Paris.
 71, av. V.-Emman. III, Paris.
 PONCET, à Limoges.
 92, r. Vieille-du-Temple, Par.
 Labor. B. E. A., Belfort.
 17, r. Cadet, Paris.
 3 et 5, r. de Metz, Paris.
 9, cours de la Liberté, Lyon.
 9, cours de la Liberté, Lyon.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 3, r. Watteau, Courbevoie.
 9, r. Dieu, Paris.
 139, r. de Paris, Pantin.
 151 bis, route de Joinville,
 Champigny (Seine).
 SPECIA 86, r. Vieille-du-
 Tempel, Paris.
 5, av. des Tilleuls, Paris.
 48, boul. La-Tour-Maubourg,
 Paris.
 6, r. des Vinaigriers, Paris.
 58, r. de Miromesnil, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 26, av. de l'Observatoire.
 GAILLON, 113, bd Voltaire,
 Paris.
 7, pl. Cassini à Nice (A.-M.).
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 49, r. Hoche, Courbevoie.
 12, r. Castiglione, Paris.
 HOFFMANN LA ROCHE.
 21, pl. des Vosges, Paris.

- Ampoules Egralène** 114, av. Michelet, St-Ouen.
Brisson
Ampoule huile soufrée 114, av. Michelet, St-Ouen.
Brisson
***Ampoules névrosthé-** 4, rue Aubriot, Paris (IV°).
niques Dausse
***Ampoules de Pantopon** Hoffmann-la-Roche et C^{ie},
 21, pl. des Vosges, Paris.
***Ampoules Reipar** DRAPIER, à Audincourt.
Ampoules Seti Brisson 114, av. Michelet, St-Ouen.
Ampoules d'Uriage 15, Champs-Élysées, Paris.
***Amylodiastase Thépé-** 12, r. Clapeyron, Paris.
nier
Anacidase MEUNIER, Auxerre (Yonne).
Analgénine 17, r. Cadet, Paris.
***Anapectone Vassal** 28, r. Hôpital-Militaire, Lille.
***Anaquintine Lescène** à Livarot (Calvados).
Anasepsine J. Muraire 41, r. Francs-Bourgeois, Paris.
Andocrinol (Voir Lipoides Iscovesco).
***Androstine Ciba** 1, pl. Morand, Lyon.
***Anégrine Rivier** 26-28, r. Saint-Claude, Paris.
Anéol 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
Anestile Bengué 47, r. Blanche, Paris.
***Anexol** DROUET & PLET, à
 Rueil (Seine-et-Oise).
***Angiolymphé** 4 bis, r. Hébert, Courbevoie.
Angiosthénine 5, av. de Tilleuls, Paris.
***Angioxyl du D^r Rous-** 97, r. de Vaugirard, Paris.
sel
***Aniodol** 40, r. Condorcet, Paris.
***Antacidyl** DURET & RÉMY, à As-
 nières (Seine).
***Antalgol Dalloz** 13, boul. la Chapelle, Paris.
***Antasthène** 54, faug. St-Honoré, Paris.
***Anthema** SPECIA 86, r. Vieille-du-
 Temple, Paris.
***Anthraxone** Institut de Microbiologie, à
 Sarrebrück.
***Antialgos Christiaens** à Reims.
***Anti-asthmatiques du** Labor. du D^r CLERY, 53,
 D^r Cléry boul. Saint-Martin, Paris.
***Antiasthme Bengalais** FAGARD, 44, r. d'Agues-
 seau, Boulogne-sur-Seine.
***Antiasthmine** 66, r. Nationale, Lille.
Antiépileptique de 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
 Liège
Angiastalgique Winc-
kler MIDY & C^{ie}, 4, r. du Colo-
 nel-Moll, Paris.
***Antigénines** 1, Pl. Lucien-Herr, Paris.
***Antigrippine Midy** MIDY et C^{ie}, 4, rue du Colo-
 nel-Moll, Paris.
***Antimucose Mariani** 41, boul. Haussmann, Paris

- Antipaludique Lumière**
***Antiphi**
***Antiphlogistine**

***Antiphlogosine**
***Antiphymique Vadam**
***Antipsorine**

***Aphosal**
Antipar
Antipyrine U. R.
***Antirrhoïde Bélières**
Antiseptinol

***Antivirus**

Antodyne Poulenc
***Antonal**

Anurol
Anusol

Anytal Brisson
Apaludol

***Aphloïne**

***Aphosal**
***Apioline Chapoteaut**
Aplexil

Apocynine du Dr Deschamps
***Aqintol**

Archésine Trouette-Perret
***Ardogène**

Argent colloïdal électrique

Argent colloïdal Nyr-dhal
***Argybil**

***Argycuprol**

***Arhémapectine Gallier**
***Arhéol Astier**
***Arhine Lambiotte Fr.**
- 9, cours de la Liberté, Lyon.
 Capin-Roquefort (Landes).
 11, r. du Petit-Parc, Saint-Maur (Seine).
 126, r. de la Pompe, Paris.
 111 bis, r. de Turenne, Paris.
 14, r. Gravel, Levallois (Seine).
 48 bis, av. Mozart, Paris.
 121, av. de St-Ouen Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 19, r. Drouot, Paris.,
 C. BARON, aux Sables-d'Olonne (Vendée).
 La Biothérapie, 131, r. Cambronne, Paris.
 92 r. Vieille-du-Temple Paris.
 Lab. CARESMEL, 2, quai Paul-Bert, Tours.
 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
 Pharmacie du Dr MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
 114, av. Michelet, St-Ouen.
 AUCLAIR, à Aigurande (Indre).
 15, r. des Immeubles Industriels, Paris.
 48 bis, av. Mozart, Paris.
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
 POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 LALEUF, 20, r. du Laos, Paris.
 Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
 9, r. du Temple, Enghien (Seine-et-Oise).
 MARONNEAU - MOREL, 16, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 20 r La-Rochefoucauld Paris.
 LANCOSME, 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 4 bis, r. Hébert, Courbevoie (Seine).
 36, b. Montparnasse, Paris.
 45, r. du D -Blanche, Paris.
 20, r Dumont-d'Urville, Paris. (16°).

- *Arquéritol
- *Arrhéнал Adrian
Arrhéniques Clin
- *Arrhénomartiol Clin
- *Arrhénuclène Bergevin
- *Arsaminol Clin.
- *Arsénicaux Bouty
Arsenic Organique
Glasser
- *Arséniode
- Asenion Couturieux
- Asénobenzol Billon
- Aseno-fer Henry
- Asiquinine Lemaître
- *Asi-Strychnal Longuet
- *Arscodyle Leprince
- *Arsylène Roche
- Arsynal Legrand
- Arterion Vincardi
- *Artérioveinine
- Arthri-sel
- Arthritose
- Arzonil
- *Ascéine
- *Asciatine
- *Asclérosel
- *Ascoléine Rivier
- *Aseptone
- Aspiphan
- Aspirine U. R.
- Aspirine Vicario
- Asquirol Poulenc
- Astasol Douveteau
- Astéine Biron
- Asthmatyl
- Asthmor
- *Asthmylose
- *Atemnol
- *Athérolysine
- LESURE, 70, r. Bac. Paris.
- 9, r. de la Perle, Paris
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- à Chateaudun (Eure-et-Loir).
- 20, r. Fossés-St.-Jacques, Paris.
- 3 bis, rue Dunkerque. Paris.
- COIRRE, 79, r. du Cherche-Midi, Paris.
- BURIAT, 25, r. Copernic, Paris.
- 18, av. Hoche, Paris.
- POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- 39, r. Sclessin, Liège.
- 12, r. Vavin, Paris
- 34, r. Sedaine, Paris.
- 62, r. de la Tour, Paris.
- 21, pl. des Vosges, Paris
- GREMY, 14, r. de Clichy Paris.
- VIGUIER, 42, av. Borri-glionne, Nice.
- 121, av. Saint-Ouen, Paris.
- 9, r. Saint-Paul, Paris.
- à Dieppe (Seine-Inférieure).
- 143, Gde-Rue, Guillotière. Lyon.
- CIBA, 1, pl. Morand, Lyon.
- 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- F. CARTIER, 1, r. de la Martinière, Lyon.
- 26, r. Saint-Claude, Paris.
- Labor. MOULIN, 50, r. de République, Puteaux (S.).
- 26, r. Sainte-Clair, Mulhouse.
- 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- 17, boul. Haussmann, Paris.
- 92 r. Vieille-du-Temple Paris
- 20, faub. St-Honoré, Paris.
- 10, r. Lafayette, Grenoble.
- 3, r. du Pont, Epinal.
- 88, av. J.-B.-Clément, Boulogne-sur-Seine.
- 2, r. Lesdiguières, Paris.
- 126, r. de la Pompe, Paris.
- Labor. JONIDS à Levernois, par Beaune (Côte-d'Or).

Atlasantol

***Atolysan**

***Atophan Cruet**

***Atoquinol Ciba**
Atoxyl Poulenc

***Atural**

Aurion Couturieux

***Avanazol Couturieux**
Azigol

***Azotyl**

***Azufrol Couturieux**

MARONNEAU-MOREL 16,
r. des Fauvelles, Courbe-
voie.

16, r. des Fauvelles, Cour-
bevoie.

6, r. du Pas-de-la-Mule. Pa-
ris.

1, pl. Morand, Lyon.

92 r. Vieille-du-Temple Paris.

142, av. de Clichy, Paris.

18, av. Hoche, Paris.

id.

Produits Thévenot, 21 r.
des Roses à Dijon.

46, av. des Ternes. Paris.

18, av. Hoche, Paris.

B

Babeurre Lactella

***Babeurre Nutricia**

Babutyrose

***Backérine**

***Bacté-Phages**

***Bactériophages Leclerc**

***Bactioxyme**

Bains de Brides

***Bain carbogazeux**
Wolo

***Bain Carré**

Bakolyse

***Ballotyl**

***Balmiga**

Balsamiodol

***Balsamol Lescène**

***Balsoforme**

Bandes ulcérophiles
Nozan

Banikol

***Bardane stabilisée**
Dausse

Barkyl

Baume Agerca

***Baume Saint-Antoine**

***Baume Aroma**

***Baume Baissade**

***Baume Bengué**

à Tourcoing.

65, bd Sébastopol, Paris

59, b. Gambetta, Tourcoing

4, pl. des Vosges, Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris

10, r. Vignon, Paris.

15, r. d'Argenteuil. Paris.

41, r. de Verneuil, Paris.

4, r. d'Illzach, Mulhouse.

LANCOSME, 71, av. Victor-
Emmanuel III, Paris.

122, r. Cherche-Midi, Paris.

113, boul. Voltaire, Paris.

18, r. Pierre-Curie, Paris.

10, r. Washington, Paris.

à Livarot (Calvados).

SPECIA 86, r. Vieille-du-
Temple, Paris.

6 ter, r. Voltaire, La Garenne
Colombes.

12, r. des Apennins, Paris.

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

30, r. Bobillot, Paris.

30, r. Bobillot, Paris.

38, r. Soult, Tarbes (H.-P.).

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

Saint-Loup, près Marseille
(Bouches-du-Rhône).

16, r. Ballu, Paris.

- *Baume Delacour
- Baume du D^r Gigon
- Baume Lartigol
- Baume Lorol
- Baume Marta
- *Baume de la Mater-
nité
- Baume Oco
- *Baume Rhodia
- Baume Saihel
- *Baume Selenia
- *Baume Suelta
- *Baumolacpinine
- *Béatol
- *Beef Lavoix
- *Belhémine
- *Belladenal Sandoz
- *Belladone Dausse
- *Bellafoline Sandoz
- *Bemax
- *Benedictus (Produits)
- Benzhermyl
- Benzoate de Naphtol
- *Benzo-Bismuth Millot
- Benzocalyptol
- *Benzoflorine Julien
- *Benzo-iodhydrine
Bruel
- *Benzolactine
- *Benzo-Lactol
- *Benzophosphine
Christiaens
- Benzoquinol
- Benzo-Ringyl
- *Benzyanil
- *Benzylol
- *Berkendyl
- Bestol du D^r Lavoué
- *Bétul-Ol Midy
- *Bexinine Amblard
- Bi-98
- Bianterol
- *Biazan
- 56, bouf. Péreire, Paris.
- 7, r. du Coq-Héron, Paris.
- 78, faub. Saint-Denis, Paris.
- ZEDAIRE, à Grenoble.
- BONNAURE, à Alais (Gard).
- 11, r. Joseph-Bara, Paris,
- 87, r. Lafayette, Paris.
- SPECIA 86, r. Vieille-du-
Temple, Paris.
- 70, Grand'Rue, Sèvres.
- DAVID, & ses Fils.
- 49, r. de Bitche, Courbevoie.
- 13, r. Lacharrière, Paris.
- 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- 46, av. des Ternes, Paris.
- 5, av. Victoria, Paris.
- Labor. de Sérothérapie, Bou-
logne-sur-Seine.
- 3-5, rue de Metz, Paris.
- 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
- 3 et 5 r. de Metz, Paris.
- 5, r. de la Paix, Paris.
- 74, r. Lamarck, Paris.
- 36, q. Fulchiron, Lyon.
- FRAUDIN, 4, av. Desfeux.
Boulogne-sur-Seine.
- 54, r. Bienfaisance, Paris.
- 213, r. Saint-Honoré, Paris.
- 105, r. de Rennes, Paris.
- 36, r. de Paris, Colombes
(Seine).
- 38, r. Albouy, Paris.
- 10, r. du Parc-Royal, Paris.
- 2, r. du Champ-de-Mars,
Reims.
- 1, r. Alexandre-III, Dun-
kerque.
- 9, r. Boissonnade, Paris.
- 37, r. de Bourgogne, Paris.
- 37, r. Galilée, Paris.
- 68, r. Berkendael, Bruxelles.
- Rennes (Ile-et-Vilaine).
- 4, r. du Colonel-Moll, Paris,
à Cunhat (Puy-de-Dôme).
- MARONNEAU-MOREL 16,
r. des Fauvelles, Courbe-
voie.
- Lab. chimie physiologique,
37, r. Tivoli, Bordeaux.
- 1, Pl. Lucien-Herr, Paris.

- Bibromure de Hg Vi-** 17, boul. Haussmann, Paris.
cario.
- *Bi-Citrol Marinier** 159, r. de Flandre, Paris.
***Bicollyre** 276, r. Lecourbe, Paris.
Bi-iodure Cros 10, r. du Bac, Paris.
Bi-iodure Midy 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Bi-iodure Souffron 157, r. de Sèvres, Paris.
Bilexabol 16, r. Fauvelles, Courbevoie.
***Biléyl Fournier** 7, r. Biscornet, Paris.
***Biliase Raby** à Asnières (Seine).
***Bilifluine** Lab. STENE, 2, pl. des
 Vosges, Paris.
- Biliol Bouty** 3 bis, r. Dunkerque, Paris.
***Bilirhéine** 41, r. Etienne-Marcel, Paris.
***Bilivaccin** * La Biothérapie, 131, r. Cam-
 bronne, Paris.
- Billirgyl** 30, r. Miromesnil, Paris.
Biminéral Reynaud DURAND, à Aigues-Mortes.
Binol Roger 177, b. St-Germain, Paris.
***Biocalcose Lematte et** 52, r. Labruyère, Paris.
Boinot
- Biocrine** 122, faub. St-Honoré, Paris.
***Biodermyl Monal** 6, r. Bridaine, Paris.
***Biodynamine** 17, r. Cadet, Paris.
***Biogastrine** 1, boul. Henri-IV, Paris.
***Biogénol Demasles** à Vienne (Isère).
Biogésine Rochard à Lorient.
***Biolactyl Fournier** 7, r. Biscornet, Paris.
***Bionergy** 16, r. Saint-Gilles, Paris.
***Bioborine Girard** 48, r. d'Alésia, Paris.
Biophosphine DEPOUILLY, Le Creusot.
***Bioplastina Sersono** 6, r. des Ursulines, Paris.
***Biophyto** 90, av. des Ternes, Paris.
Biosine le Perdriel 11, r. Milton, Paris.
***Biotose Ciba** 1, pl. Morand, Lyon.
***Biotrigon** 8, r. Pierre-Girard.
***Biozol** 25, r. Drouot, Paris.
Bi Roche 8, r. Pierre-Girard, Paris.
Biscam-Gabail 5, r. Lefebvre, Paris.
Biscols Fraudin 4, av. Desfeux, Boulogne-
 sur-Seine.
- Biscopaks Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques,
 Paris.
- *Bis-ka-ma** DURET et REMY, Asnières,
 (Seine).
- Bismétine Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques,
 Paris.
- *Bismhydral** LANCOSME, 71, av. Victor-
 Emmanuel III, Paris.
- Bismupafne** 194, r. de Rivoli, Paris.
***Bismusodine** 60, r. Auguste-Comte, Lyon.

- *Bismuth Desleaux 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
- Bismuth Perroud 7, r. des Archers, Lyon.
- Bismuth léger Adrian 9, r. de la Perle, Paris.
- *Bismuth Tulasne 68, boul. Malesherbes, Paris.
- *Bismuth du D^r Quesnaville 12, r. de Bucy, Paris.
- *Bismuthés « Maurice » 68, r. Berkendael, Bruxelles.
- *Bismuthion Coutu-rieux 18, av. Hoche, Paris (XVI^e).
- *Bismuthoidol Robin 13, r. de Poissy, Paris.
- *Bivatol Lab. Chimiothérapie, 21, r. d'Aumale, Paris.
- Blastéase 21, pl. des Vosges, Paris.
- *Blédine Jacquemaire à Villefranche (Rhône).
- *Blennosine INSTITUT de MICROBIOLOGIE, Sarrebrück.
- Bokanol 16, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- *Boldine Houdé 9, r. Dieu, Paris.
- Boldo-Gmât 27, faub. Montmartre, Paris.
- *Boldo-Verne à Grenoble (Isère).
- *Boldoine Eparvier 26, Grd' Rue St-Clair, Lyon.
- *Boldolactol A. SALLES 11, boul. de Strasbourg, Paris (X^e).
- *Boldorhéine D^r CHAPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.
- *Boléase Monal 6, r. Bridaine, Paris.
- Bolène Lambda 95, boul. Magenta, Paris.
- Bonbons Lucas (Vermifuges) JOUBERT & SIBASSIÉ, Nantes.
- Bonbons vermifuges LAUMONIER, 225, r. Saint-Martin, Paris.
- Royer 2, r. des Lions, Paris.
- Bornyval LOGEAIS, 22 bis, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
- *Boricine Meissonnier 12, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
- Boro-borax Vigier 21, r. des Roses, Dijon.
- Borocalcyl Thévenot 9, c. Liberté, Lyon.
- *Borosodine Lumière MAYOLI, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- *Borostyrol SOULAIRAC, St-Quentin.
- Borotropine Sevin 14, r. de la Pépinière, Paris.
- *Bouchons Radioactifs Emanas 14, r. de la Pépinière, Paris.
- *Boues Radioactives Emanas LOGEAIS, 24, r., de Silly, Boulogne-sur-Seine.
- *Bougies Américaines 78, faub. Saint-Denis, Paris.
- *Bougies Chaumel 12, r. de Nice, Paris.
- Bougies Raynal 47, boul. Victor, Paris (XV^e).
- *Boules Quiès BONNAURE, à Alais (Gard).
- Bouragar

- *Bouteilles Radioactives** 14, r. de la Pépinière, Paris.
Emana
***Bov'Cardiac** FUMOUBE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Bov'Billc id.
Bov'hepatic id.
***Brides-les-Bains** 46, r. Pierre-Charron. Paris.
Bridia id.
Bromalbin Adrian 9, r. de la Perle, Paris.
***Broméine Montagu** 49, boul. Port-Royal, Paris.
***Bromiase Couturieux** 18, av. Hoche, Paris.
Bromidine Henry 39, r. Sclessin, Liège.
Bromocarpine Rocher 32, r. Grenelle, Paris.
***Bromogénol Pépin** à Courbevoie (Seine).
***Bromomaïsine** 6, r. Rosenwald, Paris.
***Bromone Robin** 13, r. de Poissy, Paris.
Bromovaleron Henry 39, r. Sclessin, Liège.
***Bromovose** Lab. MADYL, 14, r. Miro-mesnil, Paris.
Bromure de camphre 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Clin
Bromure Laroze 2, r. des Lions, Paris.
Bromure de sodium du 7, r. Coq-Héron, Paris.
D^r Gigon
Bromure Souffron 157, r. de Sèvres, Paris.
***Bronchitol** H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
***Bronchodermine** 34, boul. de Clichy, Paris.
Bronchoplastre CAVAILLES, 34, r. Turin, Paris.
***Bronchoseptol** Lab. E. Lauriat, à la Garenne-Colombes (S.).
Brunyl 17, r. de Berri, Paris.
Buccochlore BEAUCHAMP, 5, cours St-Louis, Marseille.
Buctol Paris 4, r. Lamotte-Picquet, Paris.
***Bulgarine Thépénier** 12, r. Clapeyron, Paris.
***Butelline** 21, r. Jean-Goujon, Paris.

C

- *C. 40 Drouet et Plet** 37, r. Marly, Rueil (Seine).
***Cachets du D^r Boveil** 1. r. Lassalle, Lyon.
Cachets Céli LANDES, à Gramat (Lot).
Cachets Charvoz à Tassin-la-Demi-Lune.
Cachets du D^r Faivre à Lyon.
Cachets Fercocq 16, r. Maison-Brûlée, St-Maur.
Cachets Gau 87, r. de la République, Saint-Mandé (Seine).
Cachets Kapytan 76, r. de Sèvres, Paris.

- Cachets opothérapiques Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
***Cachets Roche de Thiocol** HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 21, pl. Vosges Paris.
Cacodylate Vigier 12, b. Bonne-Nouvelle Paris.
Cacodyle Gonnon 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
***Cacodylo Phosphate vital Jacquemaire** à Villefranche (Rhône).
***Cacticardine D^r Con-raux** à Caudebec(Seine-Inférieure).
Cæcaline Gagnière à Clermont-Ferrand.
Caféine Houdé 9, r. Dieu, Paris.
***Caféine Invar** 21, r. Nonnains d'Hyères, Paris.
Cafiodine 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
Calcéose Boillot 9, r. Saint-Paul, Paris.
Calcifia 52, r. d'Aubuisson, Toulouse.
Calciline (Voir : Néo-calciline), 26, r. Vaneau, Paris.
***Calcional** LEMATTE & BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris.
Calciphasine Lab. ELAN, 13, av. Italie, Paris.
Calcitine DIGNE Fils à Fréjus (Var).
***Calcium Sandoz** 3 et 5, r. de Metz, Paris.
Calco-céril 16, r. Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.
***Calcoléol** Produits SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris.
Calcophore 16, r. Raoul-Berton, Bagnolet.
***Calcozymase** 19, r. Franklin, Paris.
Calmigorge à Thury-Harcourt (Calv.).
***Calmitol** 34, r. de la Justice, Aubervilliers.
***Calmosuppos** BOIVERT, La Mothe-St-Heraye (Deux-Sèvres).
Calogyre IMBERT, à Toulon (Var).
Camphemol 1, pl. Morand, Lyon.
***Camphodausse** 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
Camphoral Aguetant 36, q. Fulchiron, Lyon.
***Camphostyl** LACROIX, 37, r. Pajol, Paris.
***Camphro-Salyl Fraisse** 8, r. Jasmin, Paris.
***Capillairal** Arquevaux, à Etampes (Seine-et-Oise).
***Capsellase** 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
Capsoléol Lab. ANIMAT, à Nîmes (Gard).
Capsovules Diplos 18, r. Pierre-Curie, Paris.
***Capsules Bardet** 76, r. de Sèvres, Paris.
Capsules Bonnefond 49, boul. Port-Royal, Paris.

*Capsules Bruel

*Capsules Cognet

*Capsules Dartois

Capsules Dieu

Capsules de Gonosan

Capsules d'Hojasol

Capsules d'Ichtyol Vigier

*Capsules Joret et Homolle

*Capsules de Morrhuine Puy

*Capsules Noguès

*Capsules Pautauberge

Capsules Raquin

Capsules salolées

*Capsules Sérafin

*Capsules Taetz

Capsules Therpinol

Carbaïne Clin

*Carbalcaloides

*Carbatropine

*Carbocitrol

Carboiodine

*Carbolactyl

*Carbonal

*Carbonate de Bismuth

*Cardosanis

*Cardibaïne

*Cardiosthénine

Cardiotonic

*Cardyl

Carnine Lefrancq

Cascara Alexandre

*Cascara Midy

*Cascarine Leprince

Caseoline Girard

Cassitol

Catalysine du Dr Viquerat

*Cataplasme du Dr Le-lièvre

Cataplasme Electrique
Morgin

36, r. de Paris, Colombes (Seine).

43, r. de Saintonge, Paris.

6, r. Abel, Paris.

2, r. Marché des Blancs-Manteaux, Paris.

2, r. des Lions, Paris.

19, r. Ferdin.-Duval, Paris.

12, b. Bonne-Nouvelle, Paris.

165, r. Saint-Honoré, Paris.

Grenoble (Isère).

11, r. Joseph-Bara, Paris.

10, r. Constantinople, Paris.

78, faug. Saint-Denis, Paris.

LACROIX, 31, r. Philippe-de-Girard, Paris.

9, r. de la Perle, Paris.

2, r. Lesdiguères, Paris.

14, r. Victor Hugo, Lyon.

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.

49, boul. Port-Royal, Paris.

64, bd Barbès, Paris.

18, av. Daumesnil, Paris.

19, r. de Fleurus, Paris.

14, r. Cantin, Courbevoie.

7, r. des Archers, Lyon.

49, boul. Port-Royal, Paris.

6, r. d'Assas, Paris.

Dr CHAPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.

GREMY, 14, r. Clichy, Paris.

SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.

78, faub. Saint-Denis, Paris.

41, r. de Rome, Paris.

4, r. du Colonel-Moll, Paris.

62, r. de la Tour, Paris.

48, r. d'Alésia, Paris.

14, r. de Birague, Paris.

FREYSSINGE, 6, r. Abel, Paris.

22, r. Gravel, Levallois Perret.

r. Dauphine, Paris.

Catéményl

Cathiodé Brisson

Cédryl

Cephœmétine

Cerdesol

*Céréales-Bébé

Céréalose

*Cérébrine Fournier

*Cérébroil Leysin

*Cérébrosthéine Dalin

Cérédine Loudenot

Céréol Gigon

*Céréossine

*Cérinil

Cérioma (Produits)

*Cériomine

Cersomine

*Cervol

*Cetemol

*Cethocal

*Cétrarose Gigon

*Charbon granulé
Fraudin

*Charbon Tissot

Chaulmorhuate Pomaret

*Chéloïdine

*Chenanthol

*Chlocçi

*Chloral bromuré Dubois

*Chloral -Geranie

Chloraloseane

*Chloramine

*Chloréthyle Bengué

Chlorhytrol

Chloridia

*Chlorinol

D^r G. LALAUURIE, à Cuxac
d'Aude (Aude).

114, av. Michelet, St-Ouen.
à Narbonne.

44, r. Gambetta, Biarritz.

18, r. Favart, Paris.

FAVRICHON à Saint-Sym-
phorien-de-Lay (Loire).

Labor. ASTIER, 45, r. du
Docteur-Blanche, Paris.

147, bd Montparnasse, Paris.

1 bis, r. Molitor, Paris.

49, quai Saint-Vincent, Lyon.

106, av. du Roule, Neuilly-
sur-Seine.

7, r. Coq-Héron, Paris.

DEHAUSSY, 66, r. Natio-
nale, Lille.

16, r. Sainte-Croix-de-la-Bre-
tonnerie, Paris.

id.

id.

18, r. Favart, Paris.

19, r. de Fleurus, Paris.

15, r. d'Argenteuil, Paris.

8 bis, r. J.-J.-Rousseau,
Fontenay-sous-Bois.

7, r. Coq-Héron, Paris

4, aven. Desfeux, Boulogne-
sur-Seine.

34, boul. de Clichy, Paris.

21, r. Marceau, Paris

DORANTOWICZ, 17 bis, av.
Parmentier, Paris.

HINGLAIS, à Epernay.

L. ADAM, à Granville
(Manche).

DURIEZ, 20, pl. des Vosges,
Paris.

GROSJEAN, 8, r. Lafayette,
Paris.

KUHLMANN, 11, r. de la
Raume, Paris.

FREYSSINGE, 6, r. Abel
Paris.

16, r. Ballu, Paris.

FOUCHÉ, à Houdan (S.-
et-O.).

Produits Dannech, 64, r. des
Tournelles, Paris.

40, r. des Acacias Paris.

Chlorobacilline

*Chlorobyl

*Chloro-Calcion

Choloroforme anesthésique*Chloroforme L a m -
biotte Frères

*Chloro-Magnésion

*Chlorosulfol Vigier

*Cholécystine

Choléine Camus**Choléitoires Byla****Cholélyse Carbou****Choléoboldine Thévenot**

*Choléo-Combretol

*Choléokinase

*Choléolactol Daguin

*Cholergine

Cholotoxine

*Chophytol

*Chrysemine

*Cibalgine

Cigares Gicquel**Cigarettes du D^r Cléry****Cigarettes Espic**

*Cimatryl

CineylGrysa

*Cinnozyl Clin

Cinol

*Cipromarol

Citrase**Citraspirine**

*Citrocarbine

*Citrofluyl

*Citropaine

*Citrosalol

*Citrosodine Grémy

*Clisémine Longuet

*Clonazone Daufresne

TULIVET, St-Germain-en-Laye.

46, av. des Ternes, Paris.

MICHELIS, 9, r. Castex. Paris.**USINES DU RHONE, 21,**

r. Jean-Goujon, Paris.

3, r. d'Edimbourg, Paris.

52, bd du Temple, Paris.

12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

VINCENT, 14, av. Mac-**Mahon, Paris.**

7 à 13, r. Saint-Maurice,

Nanterre (Seine).

26, av. Observatoire, Paris.

8, r. Jean-de-Bellay, Paris.

21, r. des Roses, Dijon.

37, r. de la Fédération, Paris.

à Asnières (Seine).

5, r. des Remises, Saint-Maur.

8, r. de la Source, Paris.

CHAUMONT - CAZALS, à
Vichy (Allier).**D^r BREL, 58, av. Répu-**
blique, Paris.

15, r. d'Argenteuil, Paris.

Labor. CIBA, 1, pl. Morand
Lyon.**BRUN & DUMÉE, 64, r.**
des Tournelles, Paris.

53, boul. Saint-Martin, Paris.

20, r. Saint-Lazare, Paris.

4, pl. Royale, Nantes.

7, r. Saint-André, Le Mans
(Sarthe).20, r. Fossés-St-Jacques,
Paris

à Narbonne

20, r. La Rochefoucauld, Pa-

ris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

22, bd Sébastopol, Paris.

WARIN, 4, ch. de la Muette,
Paris.

4, ch. de la Muette, Paris.

304, r. Saint-Jacques, Paris.

57 bis av. Motte-Picquet Paris

34, r. Sedaine, Paris.

34, r. Sedaine, Paris.

40, r. Thiers, Le Havre.

- Cloranol**
Clupéyl
Coagulène Ciba
Coca Gmet
Cocaine Midy
Coccidal Grémy
Codocol
Codoforme Bottu
Colarsé
Colchiflor Vial
Colchi-Sal Midy
Colitique

Collo-Bacilline
Collobiases Dausse
Colloïdes Amicros
Colloïdes Clin

Colloïdine
Colloïdogénine
Collo-iode Dubois
**Colloïxols (Voir : Com-
 plexes colloïdaux)**
Collophérine Bapt
Collosol Pépin
Collothiol

Colluborine

Collyres stérilisés Clin

Coloplastre
Combrétine Boquillon
Comitiol

Complexes colloïdaux
D^r Riquoir
Complexextraits

Comprimés Adrian
Comprimés d'Alibour

Comprimés Aqua Pura

Comprimés Chéralys
Comprimés de Gibert
Composé Gmet
Comprimés Guillaumin
Comprimés Kléos
- 58, r. Miromesnil, Paris.
 69, av. Faidherbe, à Malo-
 les-Bains.
 1, pl. Morand, Lyon.
 27, faub. Montmartre, Paris.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 20, r. des Martyrs, Paris.
 35, r. Pergolèse, Paris.
 49, r. Thiers, Boulogne-s.-Mer.
 8, r. Vivienne, Paris.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 41 à 47, r. du Docteur-Blan-
 che, Paris.
 11, r. Mansart, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris.
 5, r. Clauzel, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jac-
 ques, Paris.
 LALEUF, 20, r. Laos, Paris.
 10, rue de l'Orne, Paris (15^e).
 35, r. Pergolèse, Paris.

 49, r. de Paradis, Paris.
 4, r. de l'Alma, Asnières.
 9, r. du 4-Septembre, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jac-
 ques, Paris.
 12-14 pass. de l'Ancre, Pa-
 ris.
 20, r. Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 34, r. de Turin, Paris.
 12, r. de Nice, Paris.
 GRORICHARD, 12, pl. La-
 bourée, Besançon.
 ETABL. MERMINOD, 49, r.
 de Paradis, Paris.
 HUCKEL, à Hélicourt,
 (Haute-Saône).
 9, r. de la Perle, Paris.
 DURET & RÉMY, à
 Asnières (Seine).
 ROBERT & CARRIÈRE,
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 12, r. des Saints-Pères, Paris.
 19, r. d'Aubagne, Marseille.
 27, faub. Montmartre, Paris.
 13, r. Cherche-Midi, Paris.

 2, r. des Cordeliers, Meung-
 sur-Loire.

- *Comprimés Maver Et. WOLLACHER & C^{ie},
31, r. Saint-Georges, Paris.
- *Comprimés de Panto-
laxine du D^r Boveil 1, r. Lassalle, à Lyon.
- Comprimés du Prof.
Pénières COUPAT, à Ussel (Corrèze)
- *Comprimés Roy 81, bd Suchet, Paris.
- *Comprimés de Thiocol
Roché HOFFMANN-LA ROCHE,
21, pl. des Vosges, Paris.
- Comprimés Vichy-
Etat G. PRUNIER & C^{ie}, 6, r. de
la Tacherie, Paris.
- Conarsynol 12, pl. Puget, Toulon.
- Condurango Gmet 27, faug. Montmartre, Paris.
- Condurango granulé 45, r. du Docteur-Blanche,
Paris.
- Astier 12, pl. Puget, Toulon
- Conhydrargol Lab. des Etabl. SALLE, 4, r.
Elzévir, Paris.
- *Conjonctol DEGLAUDE, 6, r. d'Assas,
Paris.
- Convallamarine 3, r. du Pont-Epinal.
- Coqueluchyl Labor. CIBA, 1, pl. Morand,
Lyon.
- *Coramine 8, r. de la Source, Paris.
- *Coréine à Boulogne-sur-Seine.
- Corps Thyroïde Mon-
cour 46, r. de la Barrière, Elbeuf.
- *CratæGINE 14, r. Eug.-Delacroix, Paris.
- Cratægol 10, r. du Bac, Paris.
- Cratægus Bocquillon 27, faub. Montmartre, Paris.
- Cratægus Gmet 78, faub. Saint-Denis, Paris.
- Crayons Chaumel 66, r. Nationale, Lille.
- *Crédone Dehaussy 12, r. de Buci, Paris.
- *Crème de Bismuth 34, r. de Turin, Paris
- Quesneville 5, r. Clauzel, Paris.
- *Crème résolutive du
D^r Rap 20, r. du Laos, Paris.
- *Créoline Pearson 157, r. de Sèvres, Paris.
- *Créosal Dubois 20, r. Dumont-d'Urville, Pa-
ris (XVI^e).
- *Crescol 2, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
- *Créosoforme L a m -
biotte Frères 35, r. d. Fr.-Bourgeois, Paris.
- *Crésopirine HATIER à Saint-Etienne.
- *Crésyl Jeyes SPECIA, 86, r. Vieille-du-
Temple, Paris.
- Crinocalcine 151 bis, route de Joinville,
Champigny (Seine).
- *Crisalbine 1, Jardin-Anglais, Le Raincy.
- *Cristolax 9, c. de la Liberté, Lyon.
- Croquettes Marida 9, c. de la Liberté, Lyon.
- *Cryogénine Lumière 66, r. Nationale, Lille.
- *Cryptargol Lumière
- Crythermol

- Crypthiol**
***Crysiodal**
Cupranine Léger
***Cupressus Dausse**
Cuprifer
Cuprase-Ducatte
***Cuprion Couturieux**
Cuprocithine
***Curaluès**
***Curatine Brunet**
***Curatoxine Vendel**
***Curgol Vicario**
***Curiode**
***Curiosan**
Curocalcine
Curogène
***Curovaccins atoxiques**
Cépède (Voir vacci-
nothérapie)
***Curoxyure**
***Cuscutine Foulon**
Cyanauroil du D^r Gigon
***Cyanermine**
Cynarine Estèbe
***Cytobiase**
***Cyto-Manganol**
Cytoplasmine Ducatte
Cytosal
***Cyto-Serum Corbière**
***Cytotropines**
Cytuline Couturieux
- RENARD, 142, av. de Cli-**
chy, Paris.
La Biothérapie, 131, r.
Cambronne, Paris.
2, boul. de Russie, Vichy.
4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
à La Ferté-Macé (Orne).
191, r. Saint-Honoré, Paris.
18, av. Hoche, Paris.
GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
LECOQ & FERRAND,
54, ch. d'Antin, Paris.
23, r. des Ecoiffes, Paris.
114, r. du Temple, Paris.
17, boul. Haussmann, Paris.
17 bis, av. Parmentier, Paris.
16, r. Fauvelles, Courbevoie
11, boul. de Strasbourg Paris.
12, r. des Tribunes, Versailles.
60, r. Mathurin-Régnier,
Paris.
Labor. B. E. A., Belfort.
Ermont (S.-et-O.).
7, r. Coq-Héron, Paris.
37, r. de la Fédération,
Paris.
à Villefranche-Lauragais.
24, r. de Charenton, Paris.
CORBIÈRE, 27, r. Desre-
naudes, Paris.
8, pl. de la Madeleine, Paris.
54, r. Saint-Blaise, Paris
(XX^e).
27, r. Desrenaudes, Paris.
FOURNIER Fr., 7, r. Bis-
cornet, Paris
18, av. Hoche, Paris.

D

- Déclonal**
***Decorpa**
Delbiase
Denisia Brisson
Denisoline Brisson
Dentoxyl
***Dépuratif Kromelinck**
- SPECIA, 86, r. Vieille-du-**
Temple, Paris.
41, r. de Rome, Paris.
8, r. Vivienne, Paris.
114, av. Michelet, St-Ouen.
114, av. Michelet, St-Ouen.
HAUTDIDIER, 37, r. Ga-
illée, Paris.
19, r. Drouot, Paris.

- *Dépuratif Rob-Lechaux** 49, r. de Maubeuge, Paris
***Dépuriode** ANGELINI, 61, rue de
 Seine, Paris.
Dermadésine 41, r. St-Pierre, Caen.
Dermajic R. MONIMART, 23, r. du
 Grand-Cerf, Meaux.
Dermofagine 15, pl. Godefroy-de-Bouillon
 Boulogne-sur-Mer.
***Dermoplastol** 10, r. du Plâtre, Paris.
***Dermo-Stalys** 64, r. La Boétie, Paris.
***Désensibilysine** BÉLIERES, 19, r. Drouot,
 Paris.
***Desitin** ETABL. MERMINOD, 49, r.
 de Paradis, Paris.
Détergine D^r Bourdeau, à Parthenay.
***Diabétifuge** 21, r. Chaptal, Paris.
***Diachusine** 142, r. de Picpus, Paris.
 (Voir Vernis à la Diachusine)
***Diadermine** 12, r. Vavin, Paris.
***Dial Ciba** 1, pl. Morand, Lyon.
***Dialacétine Ciba** id.
***Dialyl Brunot** 16, r. Boulainvilliers, Paris.
***Diasclérol** 2, r. Neuve-Popincourt, Paris.
***Diases Progil** 6, boul. de Strasbourg, Paris.
Diasténine Gremy 14, r. de Clichy, Paris.
***Diastogène** DEHAUSSY, 66, r. Natio-
 nale, Lille.
***Dicaliodé** 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
***Didial Ciba** 1, pl. Morand, Lyon.
Diéménal 18, r. de Beaune, Paris.
***Diénol** 18, r. de Beaune, Paris.
***Digalène Roche** 21, pl. des Vosges, Paris.
Digestif Capmartin 2, r. Marché-des-Blancs
 Manteaux, Paris.
***Digestif Harvey** 104, av. de Paris, Rueil
 (S.-et-O.).
Digestif Henry 39, r. Sclessin, Liège.
Digestif Pinel à Bonnelles (Seine-et-Oise).
Digestirol 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
***Digibaine Deglaude** 6, r. d'Assas, Paris.
***Digifoline Ciba** 1, pl. Morand, Lyon.
***Digimialbaine** MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
Digitale Dausse 4, r. Aubriot, Paris.
Digitale Ecalle 157, r. de Sèvres, Paris.
Digitaline Homolle & 20, r. Fossés-St-Jacques
Quévenne Paris.
***Digitaline cristallisée** 27, r. de la Procession, Paris.
de Nativelle
***Digitaline cristallisée** 8, r. Favart, Paris.
du D^r Mialhe
***Digitaline Invar** 21, r. Nonnains-d'Hyères,
 Paris.

- Dimétol Vicario
 Dimol
 Diiodoforme Taine
 *Dioradin
 *Dioséine Prunier
 Dippol
 Dismenine Henry
 Disménol
 17, boul. Haussmann, Paris.
 Bois-Colombes (Seine).
 9, r. de la Perle, Paris.
 37, r. de la Fédération. Paris.
 1, quai Aulagnier, Asnières.
 87, r. Denf.-Rochereau, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.
 SAUTER, 6, r. Jean-Beau-
 sire, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 13, pl. Delille, Clermont-Fer^d.
 285, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 45, boul. Lafayette, Calais.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-
 Temple, Paris.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-
 Temple, Paris.
 id.
 id.
 29, pl. Bossuet, Dijon.
 Salbris (L.-et-Ch.).
 16, r. des Fauvelles, Cour-
 bevoie.
 6, r. d'Assas, Paris.
 9 et 11, r. de la Perle, Paris.
 LEGOUX Frères, 10, r. de
 Turenne, Paris.
 16, r. Ballu, Paris.
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 131, r. de Vaugirard, Paris.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 COMAR & C^{ie}, 20, r. des
 Fossés-St-Jacques, Paris.
 DEPRUNEAUX, 18, r. de
 Beaune, Paris.
 MANNET, à Loudun
 (Vienne).
 76, boul. Haussmann, Paris.
 MOUSNIER, 9, bd Carnot,
 Bourg-la-Reine.
 49, boul. Port-Royal, Paris.
 52, Bd du Temple, Paris.
 155, boul. Magenta, Paris.
 ANNIC, à Montbron (Char^{es}).
 65, r. Louis-Blanc, Paris.
 20 r La-Rochefoucauld Paris.
 165, r. St-Denis, Courbevoie.
- *Diurédausse
 *Diurène
 *Diurocalcine Gros
 Diurocardine
 Di-Uroïdine
 Dmégon (Néo)
 *Dmelcos
 Dmesta (Néo)
 Dmetys (Neo)
 *Doloma
 *Dolysine Rochereau
 Dosarter
 Dozéol Deglaude
 *Dragées Adrian
 Dragées anticatar -
 rhales
 *Dragées Bengué
 Dragées Carbonel
 Dragées Demazières
 Dragées de fer Cognet
 Dragées de fer Rabu-
 teau
 *Dragées Elkin.
 *Dragées ferro-ergotées
 Dragées Fernel
 *Dragées Gelineau
 *Dragées du Dr Hec-
 quet.
 *Dragées Lumeval
 *Dragées Tonicardia -
 ques Le Brun
 Dragées de Masthophile
 *Dragées Névrosthéni-
 niques "Yse"
 Dragées Nyrdhal
 Dragées Pautauberge

- Dragées pulmonaires** 49, r. de Metz, Nancy.
Giry
Dragées Séranti 7 à 13, r. Saint-Maurice, Nanterre (Seine).
Dragées Somedo à Meudon (Seine-et-Oise).
Dragées Tasch 4, r. d'Ilzach, Mulhouse.
***Dryco (Lait sec)** 3, r. St-Roch, Paris.
Duodénase 12, r. de Nice, Paris.
Dynamocalcine CHAVIALLE à Sèvres (Seine et-Oise).
***Dyspeptine Hepp** Le Chesnay (Seine-et-Oise)

E

- *Eatan** 34, r. Vignon, Paris.
***Eau de Brides (Sous-produits),** 46, r. Pierre-Charron, Paris.
Ebanyl
***Eczéda** 59, r. Nollet, Paris.
***Edistol** Labor. GOBEY, 21, r. d'Aumale, Paris.
***Edo-vaccins** 40, r. des Carmes, à Orléans.
Egralene SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
***Ektogan** P. BRISSENET C^{ie}, 114, av. Michelet, Saint-Ouen.
***Elatine Bouin** 12, r. Lamartine, Paris.
***Elbon Ciba** à Boulogne-sur-Seine.
***Electrargol Clin** Pl. Morand, Lyon.
Electrauroi Clin 20, r. Fossés-Saint-Jacques, Paris.
***Electrocuprol** id.
Electro Hg COMAR & C^{ie}, id.
Electromanganol COMAR & C^{ie}, id.
***Electromartiol** COMAR & C^{ie}, id.
Electropalladiol COMAR & C^{ie}, id.
Electro-platinol COMAR & C^{ie}, id.
Electro-Rhodiol COMAR & C^{ie}, id.
***Electrosélénium** COMAR & C^{ie}, id.
***Eleodermine** 38, r. Soult, Tarbes (H.-P.).
***Elgine Julien** 105, r. de Rennes, Paris.
***Elixir Bonjean** DUSSUEL ET FAURE, à Aix-les-Bains.
Elixir Bryol 97, av. Ledru-Rollin, Paris.
***Elixir Déret** COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
***Elixir Dechamp** 15, rue Rocroy, Paris.
***Elixir Dero** 20, pl. des Vosges, Paris.
Elixir Duret 12, r. de Nice, Paris.
***Elixir Dussaud** 52, r. de Rome, Marseille.

***Elixir eupeptique Tisy**

Elixir de fer Koenig

***Elixir ferro ergoté**

Elixir Glasser

Elixir Glover

***Elixir Grez**

Elixir hépatique Henry

Elixir Houde

***Elixir Hymel**

Elixir Mariani

Elixir Martin-Mazade

***Elixir du D^r Mialhe**

Elixir de Pepto-Car-
dine

Elixir Percy

Elixir polybromuré
Yvon

***Elixir Spark**

Elixir Spes

Elixir du D^r Thermes

***Elixir thiogalacolé Ar-**
quevaux

Elixir Virenque

***Elixir de Virginie Nyr-**
dhal

***Elkin (Dragées)**

Elixir Vital Quentin

***Elzévir-Dentition**

***Embryonine du**
D^r Barré

***Emerson's Bromo-Sel-**
tzer

Emétinol Viel

***Emplâtres R. Cavailès**

Emplâtre Duret

Emulsion Bonnefond

***Emulsion Marchais**

***Endocalcase**

Endocrisines Fournier

***Endopancrine**

***Energétènes végétaux**
Byla

***Enésol Clin**

VAUDIN & GUILLAUMIN

12, r. Charles-V, Paris.

37, av. Marceau, Paris.

MANNET, à Loudun
(Vienne).

à Turckheim (Haut-Rhin).

13, r. des Minimes, Paris.

49, r. Maubeuge, Paris.

39, r. Sclessin, Liège.

9, r. Dieu, Paris.

DUTEIL, 38, r. de Bondy,
Paris.

41, boul. Haussmann, Paris.

à Saint-Vallier (Drôme).

8, r. Favart, Paris.

5, av. des Tilleuls, Paris.

12, r. Sévigné, Paris.

5, r. de la Feuillade, Paris.

19, b. Bonne-Nouvelle, Paris.

10, imp. Milord, Paris.

BRUN & DUMÉE, 64, r.
des Tonnelles, Paris.

Etampes (Seine-et-Oise).

131, r. Vaugirard, Paris.

20, r. La-Rochefoucauld, Paris.

DEPRUNEAUX, 18, r. de
Beaune.

MOUSNIER, à Sceaux.

H. SALLE, 4, r. Elzévir,
Paris.

HAMEL, 10, pl. Thiers, Le
Mans.

62, av. Champs - Élysées,
Paris.

7, r. Saint-Yves, Rennes.

34, r. de Turin, Paris (VII^e).

61, r. de Vaugirard, Paris.

MONTAGU, 49, boul. Port-
Royal, Paris.

11, r. Mission-France, Mar-
seille.

74, r. des Jacobins, Amiens.

26, boul. de l'Hôpital, Paris.

48, r. de la Procession, Paris.

26, av. l'Observatoire, Paris.

20, r. des Fossés-Saint-Jac-
ques, Paris.

- Engelurool**
***Eniode Lefebvre**
***Ennago**
Eno's Fruit Salt
Entalva

Enterioda
***Entéro-Antigènes**

***Enterobyl Dehaussy**
***Entérohépatine**
***Entéroseptyl Cléram-**
bourg
***Entérovaccin Lumière**
***Entéroxin Laclerc**
***Entérozone**
Entérozyme
Enuczéma
Eparseno

Epidosine Grémy
***Eranol**
***Erbamil**
***Erцерhinol**
Ergot de seigle Dausse
Ergotine Bonjean
***Ergotine Lamante**

Ergotine Yvon
Ergotinine Tanret

Erystypticum Roche
Erythrolués

Erséol Prunier
***Esculéol**
Etain Amicros
***Ether anesthésique**

Ether amyvalérianique

***Eucalcium**
***Eucalyptine Lebrun**
***Euchol**
***Eucytol**
***Eudynol**

Eugéine Prunier
***Eugynol Grandval**
Eukéno! Clément
Eukinase Carrion
***Eumietine Leprince**
- 22, r. de Vienne, Paris.
 2, r. Duphot, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 3, av. Lowendal, Paris.
 LUMIERE, 9, cours de la
 Liberté, Lyon.
 39 r. de Clichy, Paris.
 31, r. des Francs-Bourgeois,
 Paris.
 66, r. Nationale, Lille.
 77, bd de Grenelle, Paris.
 10, r. Saint-Antoine, Paris

 J, c. de la Liberté, Lyon.
 10, r. Vignon, Paris.
 56, boul. Pereire, Paris.
 52, r. Labruyère, Paris.
 53, r. Bourgogne, Orléans.
 POULENC Frères, 92, r.
 Vieille-du-Temple Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 45, r. de l'Echiquier, Paris.
 105, bl. Malesherbes, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris.
 99, r. d'Aboukir, Paris.
 M. PARIS, 1, rue Lassalle
 à Lyon.
 5, r. Lafeuillade, Paris.
 10, r. du Commandant-
 Rivière, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 LECOQ & FERRAND,
 54, ch. d'Antin, Paris.
 6, r. de la Tacherie, Paris.
 13, r. Lacharrière, Paris.
 5, r. Clauzel, Paris.
 USINES DU RHONE, 21,
 r. Jean-Gouion Paris.
 G. BRUEL, 36, r de Paris,
 à Colombes (Seine).
 50, boul. de Paris, Marseille.
 155, boul. Magenta, Paris.
 95, boul. Magenta, Paris.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 F. CARTIER, 1, r. de la
 Martinière, Lyon.
 6, r. de la Tacherie, Paris.
 12 et 14 r. Féry, Reims.
 7, pas. Thionville, Paris.
 54, fb. Saint-Honoré, Paris.
 62, r. de la Tour, Paris.

Euonymine Thibault	6, r. Rosenwald, Paris.
Eupaveryl	PACHAUT, 130, bd Haussmann, Paris.
Eupeptique Monavon	à Sainte-Foy, près Lyon.
Euphon	1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Euphonol Aguetant	36, quai Fulchiron, Lyon.
Euphorol Loudenot	106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
Euphoryl	114, r. du Temple, Paris.
Euphrénine Bastia	1, place Carnot, Lyon
Euphytose	Lab. MADYL, 14, r. de Miromesnil, Paris.
Eupnine Vernade	7 à 13, r. Saint-Maurice, Nanterre (Seine).
Eupnogénol	49, r. de Bitche, Courbevoie.
Euréka-Cooky	18, r. Molitor, Paris.
Euronol	15, r. d'Argenteuil, Paris.
Eusomnine Bélières	19, r. Drouot, Paris.
Eusthenol Roze	GMET, 27, faub. Montmartre, Paris.
Eutensyl Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Evatmine Carrion	54, fb. Saint-Honoré, Paris.
Evine	3, r. de la Perle, Paris.
Evolaxine	Lab. du Dr LAURENT-GÉRARD, 40, r. de Bellechasse, Paris.
Evonyl	Bonthoux - Villefranche - sur-Saône.
Exol Cognet	43, r. de Saintonge, Paris.
Exolysés Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Extrait de céréales Adrian	9 et 11, r. de la Perle, Paris.
Extrait Hamyd	GMET, 27, fg Montmartre, Paris.
Extrait de Malt Français Déjardin	10, r. Parent-de-Rozan, Paris (XVI ^e). (Voir Malt).
Extraits Moncour	49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.

F

Facmine Longuet	34, r. Sedaine, Paris.
Fango Fisch et C^{ie}	4, r. d'Ilzach, Mulhouse.
Fantine Adoue	à Pauillac (Gironde).
Farines Benedictus	74, r. Lamarck, Paris.
Farines Bloch	à Tomblaine, près Nancy.
Farines Favrichon	à Saint-Symphorien-de-Lay.
Farine lactée Heudebert	85, r. de Saint-Germain, Nanterre.

- Farine lactée Nestlé
 *Farine lactée diastasée
 Salvý
 *Farines Malteses Jam-
 met
 *Farine de malt Heude-
 bert
 Farré-Curé
 Fébrifuge
 Fébriline
 *Félamine Sandoz
 *Félargent
 Felsol
 Feminoglandol
 Fer-Arsenic
 *Férarsényl
 *Fer Bravais
 Fer Henry
 Fer injectable Roussel
 Fériode Byla
 *Fer Larcade
 Fer Manganèse Ami-
 cros
 Fermentérol Milan
 Ferments Jacquemin
 Ferments organiques
 Zévor
 *Feroxal Buisson
 *Fer-Ovarine Vitalis
 Fer Quévenne
 Fer Rabuteau
 Ferrocálbiose
 Ferrocalcine
 *Ferrocodile Leprince
 Ferropeptone
 *Ferrophytine Ciba
 Ferroplasma
 Ferrygène Carrau
 Fer Jaquemais
 Ficatine
 Figadol Vivien
 Fixase
 Fixine Grémy
 Fixogène Loudenot
 6, av. Portalis, Paris.
 4, r. Lambrechts, Courbe-
 voie.
 47, r. Miromesnil, Paris.
 85, r. de Saint-Germain,
 Nanterre.
 29, r. Mogador, Paris.
 Molière, à Constantine.
 4, fg Stanislas, Nançoy.
 5, r. de Metz, Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 pl. Homme-de-Fer, Stras-
 bourg.
 16, r. des Fauvelles, Cour-
 bevoie.
 AUCHER, La Ferté-Macé
 (Orne).
 GAUTIER, 13, r. Dorian,
 Paris.
 16, r. de Rocroy, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.
 MOUSNIER, à Sceaux.
 26, av. l'Observatoire, Paris.
 151, r. Lafayette, Paris.
 5, r. Clauzel, Paris.
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 à Malzeville-Nancy (M.-et-
 M.).
 COIRRE, 79, r. Cherche-
 Midi, Paris.
 157, r. de Sèvres, Paris.
 38, boul. de Charonné, Paris.
 26, r. Petit, St-Denis.
 20, r. des Fossés-Saint-Jac-
 ques, Paris.
 ROUSSY, Viroflay (S.-et-O.)
 GUÉRIN, Meulan (S.-et-O.).
 62, r. de la Tour, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 1, pl. Morand, Lyon.
 VIVIEN, 6, r. Abbeville,
 Paris.
 34, boul. de Clichy, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 85, r. Turbigo, Paris.
 6, r. d'Abbeville, Paris.
 PARET, à Marseille.
 34, r. Sedaine, Paris.
 106, av. du Roule, Neuilly-
 sur-Seine.

- Floravène
 Floréases
 *Fludiose
 Fluène
 *Fluobyl
 *Fluodyle
 Fluiformol Gonin
 Fluoridia
 Foie - Endocrisines
 Fournier
 *Fondants Dausse
 *Forcival
 Fordynol
 *Foriod
 *Formadermine
 Formagol Bouty
 *Formine Adrian
 *Formocarbène
 Formose
 *Formo-Vaccins
 Formule Jacquemaire 60
 *Formyl
 *Fortossan Ciba
 *Forzol
 *Fosfoxy Carron
 Fostrychnol Chante -
 reau
 *Fosyls Carron
 *Francoplaste Kraus
 Frangoléine
 Frangulose Flach
 *Freinix
 Frêne Gmet
 Frialine Grémy
 Fructia (Brides-les-
 Bains)
 Fructines Vichy
 *Fucobiline Prothière
 Fucoglycine
 *Fucosine Prothière
 Fucus Gmet
 Fumigator Gonin
 MORTIER & C^{ie}, Bordeaux.
 20, faub. Poissonnière, Paris.
 Tétard, à Beauvais.
 LANDRIN, 20, r. La-Rochefoucauld, Paris.
 38, bd Bourdon, Neuilly, Paris.
 10, r. Pierre-Ducieux, Paris.
 60, r. Saussure, Paris.
 50, r. de Lille, à Tourcoing.
 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 6, r. Bridaine, Paris.
 à Saint-Etienne.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
 9, r. la Perle, Paris.
 Tétard, à Beauvais.
 CHAVIALLE, 70, Gde-Rue, Sèvres.
 LUCINIA, 154 bis, r. Breteuil, Marseille.
 Villefranche (Rhône).
 23, r. Valéry-Meunier, Pau.
 1, pl. Morand, Lyon.
 BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
 69, r. de Saint-Cloud, Clamart (Seine).
 8, r. de Constantinople, Paris.
 69, r. Saint-Cloud, Clamart (Seine).
 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
 à Aigurande (Indre).
 6, r. de la Cossonnerie, Paris.
 157, r. de Sèvres, Paris.
 27, faub. Montmartre, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 41, r. de Verneuil, Paris.
 49, av. Wagram, Paris.
 55, r. Auguste-Comte, Lyon.
 11, r. Milton, Paris.
 55, r. Auguste-Comte, Lyon.
 27, faub. Montmartre, Paris.
 60, r. Saussure, Paris.

*Furonculase

Furosyl

Gadéïmol

Gadilène Vasseur

Gadiodine Labesse

Gadoferrol

*Gaduamine

*Gaduase

Gaïacalcine Latour

Gaïacol phosphaté

Pautauberge

Gaïacophosphal Clin

Gaïarsénan Ducatte

Gaïarsol Bouty

*Galabactéine

Galactina

Galactogènes Jolivet

*Galactogil

*Galform

*Galyl Naline

*Gambéol

Gamostyl

*Ganderma

Gangliosane

*Gardenal

Gastérine Frémont

*Gastricine du D^r Du-
hourcau

*Gastrocalcine

*Gastrocaol

*Gastropeptyl

Gastroplasma

Gastro-Sodine

*Gastrotherib

Gastrozymase Bouty

*Gaurol

Gayacolchine

94, boul. des Batignolles,
Paris.

16, r. des Fauvelles, Cour-
bevoie.

G

45, boul. Lefébvre, Paris.

114, r. Faidherbe, Boulogne-
s.-M.).

36, r. des Lices, Angers.

93, r. Nollet, Paris.

RENARD, 142, av. de Cli-
chy, Paris.

Labor. SERVIER, à Orléans.

17, pl. des Vosges, Paris.

165, r. Saint-Denis, Cour-
bevoie.

20, r. des Fossés-Saint-Jac-
ques, Paris.

191, r. Saint-Honoré, Paris.

3 bis, rue de Dunkerque Paris

154 bis, r. Breteuil, Marseille.

68, r. Phalsbourg, Le Havre.

140, faub. St-Honoré, Paris.

Progil, 6, boul. Strasbourg,
Paris.

20, r. Dumont-d'Urville, Pa-
ris (XVI^e).

à Villeneuve-la-Garenne.

24, r. de Ponthieu, Paris.

16, r. des Fauvelles, Cour-
bevoie.

24, r. de Ponthieu, Paris.

2, allées Spach, Strasbourg.

SPECIA, 86, r. Vieille-du-
Temple, Paris.

à Vichy (Allier).

6, r. Louis-Blanc, La Ga-
renne-Colombes (Seine).

17, r. Cadet, Paris.

à Vendôme (Loir-et-Cher).

40, r. des Accacias, Paris.

MILLET, à Rambouillet.

21, r. Violet, Paris.

LA BIOTHÉRAPIE, 131, r.
Cambronne, Paris.

3 bis, r. de Dunkerque, Paris.

30, r. Armand-Sylvestre,
Courbevoie.

40, r. Beinfaisance, Paris.

- *Gaze Néolée
 *Gelagar
 Gelée antidiarrhéique
 Lumière
 *Gélobarine
 Gélocalcine
 *Gélogastrine
 *Gélo-Pansement Byla
 *Gélo-Pansements gastro-intestinaux
 *Gélor
 *Gélotanin
 *Gélotube 29
 *Gelsémium Dausse
 *Génacide
 *Génatropine
 *Génergosine
 *Génésérine
 Genêt Gmet
 *Genhyoscyamine
 Génolactine
 *Génoscopolamine
 *Génostrychnine
 Géodyl
 Geraseptol
 Germocalcine
 *Germose
 Germosine Lumière
 Germyl
 Givrinol
 *Glandocalcyl
 *Glaxo
 *Globugénol
 Globules Hébert
 *Globules Fumouze
 Globules Laincar
 *Globules Romon
 Globules Secrétan
 35, r. Pergolèse, Paris.
 Et. WOLLACKER & C^{ie},
 31, r. St-Georges, Paris.
 9, cours de la Liberté, Lyon.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 121, av. de Saint-Ouen, Paris.
 LICARDY, Neuilly-s.-Seine.
 26, av. Observatoire, Paris.
 8, av. de Grammont, Tours.
 63, r. Faisanderie, Paris.
 Labor. CHOAY, 48, r. Théophile-Gautier, Paris.
 49, r. de Bitché, Courbevoie (Seine).
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 Labor. JONIDS, à Levernois, par Beaune (Côte-d'Or).
 Labor. AMIDO, 4, pl. des Vosges, Paris.
 27, faub. Montmartre, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 3, boul. Courcelles Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 id.
 J. ROBERT, 39, r. de Bourgogne, Paris.
 12, r. Vavin, Paris.
 29, r. de Metz, Toulouse.
 7, r. d'Hauteville, Paris.
 9, cours de la Liberté, Lyon.
 9, r. Petitot, Dijon.
 14, r. d'Auge, Caen.
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
 11, r. Bergère, Paris.
 à Feschés-le-Chatel (Doubs).
 à Saint-Lô (Manche).
 78, faub. Saint-Denis, Paris.
 LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
 MONAL & C^{ie}, 6 r. Bridaine, Paris.
 J. LOGEFAIS, 22 bis, r. de Sully, Boulogne-sur-Seine,

- * **Gloma** (Voir : Malt Wander)
 * **Glottyl**
Glutéokina
 * **Glycérophosphate Dalloz**
Glycérométhylarsénié
Glycérophosphates effervescents
Glycérophosphates Freyssinge
Glycérophosphates Jacqueminaire
 * **Glycérophosphate Robin**
Glycobyl
 * **Glycocarpine**
Glycogène Clin
Glycojasol
 * **Glyco-lactimase Couturieux**
Glyco - phénique D^r Déclat
Glycophosphates granulés Astier
Glyco-Phytol
Glyco-Thymosine
 * **Glyctone phosphatée Charrière**
 * **Glykolaline Robin**
 * **Glyphospher**
Glyphospher
Glyphospho
 * **Gmet (Produits)**
 * **Gobérol**
Goménol
 * **Gonacrine**
Gonéine (Capsules)
 * **Gosiérine Dalloz**
Goudron Freyssinge
Gouttes amères de Baumé
 * **Gouttes Antispasmodiques Dausse**
- 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
 85 bis, r. du Ranelagh, Paris.
 41, r. Etienne-Marcel, Paris (1^{er}).
 13, boul. de la Chapelle Paris.
 6, r. Dombasle, Paris.
 LE PERDRIEL, 11, r. Milton, Paris.
 6, r. Abel, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 13, r. de Poissy, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 DALIN, 49, quai Saint-Vincent. Lyon.
 20, r. des Rossés-Saint-Jacques, Paris.
 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 6, r. de la Tacherie, Paris.
 45, r. Docteur-Blanche, Paris.
 3, r. Chanez, Paris.
 3, av. Lowendal, Paris.
 Arquevaux, à Etampes (Seine-t-Oise).
 13, r. de Poissy, Paris.
 6, ch. Combe-Blanche, Lyon.
 GIVANDEAU, LAVI-ROTTÉ & C^{ie}, Lyon.
 52, r. Aubuisson, Toulouse.
 27, faub. Montmartre, Paris.
 CHARMAISON, Clermont-Ferrand.
 17, r. Ambr.-Thomas, Paris.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 A. GUILLAUMIN, 13, r. Cherche-Midi, Paris.
 13, b. la Chapelle, Paris.
 6, r. Abel, Paris.
 D^r GIGON, 7, r. Coq-Héron, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e),

- *Gouttes Arsénosté-
 niques Dausse
 Gouttes Esurine
 *Gouttes Fluxines
 *Gouttes hallogènes du
 D^r Beru
 Gouttes iodopeptiques
 Narud
 *Gouttes livoniennes
 Gouttes Lo-Lo Tsé
 lsberg
 Gouttes du D^r Ludlam
 *Gouttes Nican
 *Gouttes Paidophiles du
 D^r Guiraud
 *Gouttes Phosphosté-
 niques Dausse
 *Gouttes Pilka
 Gouttes Sap
 *Gouttes Scandinaves
 *Gouttes de Séru
 *Grains céphalgifuges
 Grains d'Évian
 Grains Miraton
 Grains de santé du
 D^r Franck
 *Grains de Vals
 Gramalt
 *Granions de Fouard
 Granulé Bravais
 Granulé calmafrenkel
 *Granulé Carelmiel
 Granulé du D^r Mous-
 saud
 Granulé Girard
 *Granules Chanteaud
 Granules Crosnier
 Granules de Pantofort
 du D^r Boveil
 Granules du D^r Papil-
 laud
 Granules Homolle &
 Quévenne
 Granulé pulmonaire
 Giry
- 4, r. Aubriot, Paris (IV°).
 D^r R. Petit, Angoulême.
 BONTHOUX, à Villefranche.
 3, pl. intérieure Saint-Michel,
 Toulouse.
 38, r. N.-D.-Nazareth, Paris.
 15, r. Immeubles-Industriel,
 Paris.
 F. BOUVIER, 31, bd de la
 Vilette, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 CANTIN, à Palaiseau
 (Seine-et-Oise).
 10, imp. Milord, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV°).
 Lab. ZYMA, 4, r. Bellart,
 Paris.
 83, r. des Martyrs, Paris.
 D^r H. PHILLIPE, 14, r. du
 Palais-Grillet, Lyon.
 69, r. de Sèvres, Paris.
 88, r. de la Vilette, Paris.
 PERROCHON, à Tours.
 6, r. Rosenwald, Paris.
 59, r. Nollet, Paris.
 11, r. Joseph-Bara, Paris.
 CHASSAIGNÉ, à Ruffec
 (Charente-inférieure).
 61, r. Gaston-Laurian Mon-
 treuil (Seine).
 3, r. Mogador, Paris.
 LEMATTE, 52, rue La
 Bruyère, Paris.
 2, quai Paul-Bert, Tours.
 H. RIVIER, 6, r. Saint-
 Claude, Paris.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 (Voir : Produits Chanteaud).
 6, r. Chanoinesse, Paris.
 1, r. Lassalle, à Lyon.
 GIGON, 7, r. Coq-Héron,
 Paris.
 14, r. des Beaux-Arts, Paris.
 49, r. de Metz, Nancy.

*Granulé dépuratif
Künckel
Granulé Tinardon
Granules Houdé
Granules des Vosges
*Grassyl

*Grippol

*Gui Byla
Gui Gmet
*Guipsine Leprince
*Guitose

Gynalcéol
*Gynergène

*Gynocalcion

Gynocrinol
Gynoluteol
*Gynopausine
Gynophiline

3, r. Watteau, Courbevoie.

17, r. Cadet, Paris.
9, r. Dieu, Paris.
21, boul. Haussmann, Paris.
Etablis. BUISSON, 157
r. de Sèvres Paris
INSTITUT DE MICRO-
BIOLOGIE, Sarrebrück.
26, av. Observatoire, Paris.
27, faub. Montmartre, Paris.
62, r. de la Tour Paris.
F. CARTIER, 1, r. de la
Martinière, Lyon.
17, r. Cadet, Paris.
Etablis. SANDOZ. 5, r. de
Metz, Paris.
Lab. CORTIAL, 15, boul.
Pasteur., Paris.
(Voir : Lipoides Iscovesco).
(Voir : Lipoides Iscovesco).
2, r. Nve-Popincourt, Paris.
Douard, Uzel (C.-d.-N.).

41

Hamamélidine

*Hamaméline Roya
*Hamaméliode
Hamamélis Dausse
Hamamélis Gmet
*Hamamélis Grandval
*Hectargyre Naline
*Hectine Naline
Hélénine du D^r Korab
*Hélital
Helmazil
Hémabéol
*Hémagène Tailleur
*Hémagénine Giraud
*Hémalexine

Hémarsyl du D^r Roux

Hématéol
Hématogénol

J. LOGEAI, à Boulogne-
sur-Seine.

41, r. de Rome, Paris.
17, r. Cadet, Paris.
4, r. Aubriot, Paris.
27, faub. Montmartre, Paris.
12 et 14, r. Féry, Reims.
à Villeneuve-la-Garenne.
id.
12, r. de l'Isly, Paris.
15, pl. Nationale, Dieppe.
7, av. Marceau, Paris.
72, av. Kléber, Paris.
SEVENET, 10, r. Le Cha-
pelais, Paris.
pl. de l'Eglise, Argenteuil.
Labor. JONIDS, à Lever-
nois, par Beaune (Côte-
d'Or).
CAILLAU, à Argentat (Cor-
rèze).
81, r. Le Corrège, Bruxelles.
37, r. Galilée, Paris.

- *Hémoantitoxine
- *Hémo - Cyto Sérum
Corbière
- Hémocléine Lafay
- *Hémodrome
- *Hémoductyl
- *Hémofixine
Hémogénase
- *Hémogénol Dausse
Hémoglobine Bovel
- *Hémoglobine Des -
chiens
- *Hémoluol
- *Hémopausine
- *Hémopectal
- *Hémo-Phagostyl
- Hémoplase Lumière
- Hémopoïne
- Hémorroïdine
- *Hémostyl D^r Roussel
- *Hémotonine
Hémoveine
Hémozol
- *Hemypnal
- Hépacoline
- *Héparmone Byla
- Hépatine Bouty
- *Hépatato-Byl
- Hépatocrinol
- *Hépatolax
- Hépatato-Sérine
- *Hépatosodine
- Hépatotanic
- *Hépatozyl
- *Hépatrol
- *Héracléol
- *Hergénol
- Hermophényl
- F. CARTIER, 1, r. de la
Martinière, Lyon.
- Labor. CORBIÈRE, 27, r.
Desrenaudes, Paris.
- 54, ch. d'Antin, Paris.
- LANCOSME, 71, av. Victor-
Emmanuel III, Paris.
- LICARDY, 38, boul. Bour-
don, Paris-Neuilly.
- 4, r. Beaurepaire, Paris.
- à Courpière (Puy-de-Dôme).
- 1 r. Aubriot, Paris (IV^e).
- 101, av. Mozart, Paris.
- 9, r. Paul-Baudry Paris,
(VIII^e).
- 14, r. Cantin, Courbevoie.
- 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- A. FALVY, 40, r. des Aca-
cias, Paris.
- A. PARIS, 4, r. La Motte-
Piquet, Paris.
- 9, cours de la Liberté, Lyon.
- D^r SCHOLL, à Gembloux,
Belgique.
- 1, r. Alexandre-III, Dun-
kerque.
- 97 r. de Vaugirard Paris.
- 157, r. de Sèvres, Paris.
- BRICHARD, à Bar-le-Duc.
- 12, boul. Saint-Martin, Paris.
- 1, pl. Morand, Lyon.
- 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
- 26, av. de l'Observatoire,
Paris.
- 3 bis, r. Dunkerque, Paris.
- 8, r. de la Source, Paris.
- (Voir : Lipoides Iscovesco).
- 83, bd de la Villette, Paris.
- 22, r. Guillaume-le-Conqué-
rant, Caen.
- DURET & RÉMY, Asnières
(Seine).
- 14, r. de Clichy, Paris.
- 40, r. Claire-Paulhac, Tou-
louse.
- 31, r. des Francs-Bourgeois,
Paris.
- Lab. des Etabl. SALLE, 4, r.
Elzévir, Paris.
- Gros, 13, pl. Delille, Cler-
mont-Ferrand.
- 9, cours de la Liberté, Lyon.

- Héroïne Vicario**
Hétérolysine
- Héxachol**
- Hexaformine**
***Héxotal**
Hippo-Carnis
- Hippoplasine du Dr**
Gran
- ***Hipposarcine Roy**
***Hirudinase**
***Histocalcine**
***Histogénol Naline**
Hojasol
***Holos Deschiens**
***Holovarine**
Holuryl
- ***Hopogan**
Hordéomaltine
Hordose
- ***Hormobiline**
Hormolaxine
- ***Hormotone**
- ***Hormovarine Byla**
Hordenine Lauth
Huillaxine Gillot
Huile Boris
***Huiles Cholestérinées**
Dausse
***Huile Crolas**
***Huile Gallina**
Huile F. M. Hegg
Huile grise Duret
***Huile grise Hercé**
Huile grise stérilisée
- ***Hyclal**
- ***Hydralin**
Hydrariode
Hydrastis Dausse
Hydrastis Gmet
Hydrastol
***Hyoscyamine Haude**
Hypercitol
- 11, boul. Haussmann, Paris.
OLIVIERO, 87, r. Denfert-
Rochereau, Paris.
26, r. Sainte-Claire, Mu-
lhouse.
123, pl. Beauvoisine, Rouen.
18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
MORAND, à Auray (Mor-
bihan).
BYLA, 26, av. de l'Obser-
vatoire, Paris.
56, ch. Combe-Blanche, Lyon
114, r. du Temple, Paris.
83, bd de la Villette, Paris.
à Villeneuve-la-Garenne.
19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
9, r. Paul-Baudry, Paris.
48, r. de la Procession, Paris.
A. FALVY, 40, r. des Aca-
cias, Paris.
12, r. Lamartine, Paris.
10, r. Richelieu, Paris.
31, r. des Pierres, Bruges
(Belgique).
17 bis. av. Parmentier, Paris.
DARRASSE, 7 à 13, r. St-
Maurice, Nanterre (Seine).
DÉGÉCÉ, 7, r. Princesse
Paris.
26, av. Observatoire, Paris.
9, r. du 4-Septembre, Paris.
59, r. de Châteaudun, Paris.
14, r. de Birague, Paris.
4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
56 ch. Combe-Blanche Lyon.
4, r. Candolle, Paris.
13, r. Paul-Baudry, Paris.
12, r. de Nice, Paris.
37, r. de Bourgogne, Paris.
VIGIER, 12, boul. Bonne-
Nouvelle, Paris.
DURET & RÉMY, Asnières
(Seine).
37, r. de la Férédation, Paris.
à La Ferté-Macé (Orne).
4, r. Aubriot, Paris.
27, faub. Montmartre, Paris.
222, fg St-Martin, Paris.
9, r. Dieu, Paris.
MATRAY, à Aubières (P.
de D.).

Hypergal Grémy
Hypersan

Hypnase Vergelot
Hypneural Cos
Hypochlorine

Hypochloryl
Hypodermozone
Hypophos Hurbourgne
Hypophosphites Churchill

Hypophosphites Fel-lows
Hypophyse - Endocrinses Fournier
Hyrganol

14, r. de Clichy, Paris.
 P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.

163, r. de Flandre, Paris.
 99, r. d'Aboukir, Paris.
 l'Antiseptique, 48, r. de Londres, Paris.

7 bis, r. de Musset, Paris.
 56, boul. Péreire, Paris.
 à Montmeyan (Drôme).
 12, r. Castiglione, Paris.

5, r. de la Paix, Paris.

26, boul. de l'Hôpital, Paris.

SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.

I. A. M.

Ibogaine Nyrdhal
Ioglandol Roche
Imido Roché
Immunase

Immunizols Grémy
Immune-Antivirus
Immuno-Vaccins
Indhameline Lejeune
Indine
Injection Clin Strychno Phospharsinée

Inhalateur Hojasol
Inhalateur et Inhalations

Inhalation Lancosme

Inhalène
Inhalex
Inhalo-Bol

Inhalol

Inhalone
Inhalo-Sel

Inhaloxyl

D^r LAVOUE, à Rennes (Ile-et-Vilaine).

20, La-Rochefoucauld Paris.

21, pl. des Vosges, Paris.

21, pl. des Vosges, Paris.

Lab. Elan, 13, av. Italie, Paris.

14, r. de Clichy, Paris.

68, r. Berkendael, Bruxelles.

68, r. Berkendael, Bruxelles.

142, r. de Picpus, Paris.

DABAT, à Pau (Bas-Pyr.).

20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

19, r. Ferdin.-Duval, Paris.

Labor. INHAL, 228, r. de Lille, La Madeleine-Lille

71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.

à Berson (Gironde).

37, r. Galilée, Paris.

P. TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest, Paris.

62, r. d'Antibes, Cannes (Alpes-Maritimes).

CH. DEHAY, à Arras.

P. TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest, Paris.

4, chaus. de la Muette, Paris.

*Inolène

*Inotyol

Inoxine

*Insulanol du D^r Roussel

*Insuline Byla

*Insuline buccale For-
net

*Insuline Phyloze (Pou-
dre et pommade)

*Insuline Rogier

*Insulyl Roussel

*Intraits Dausse

*Inhaloxyl

*Ioda

Iodalbin Adrian

Iodalia

*Iodalose Galbrun

*Iodamelis Logeais

Iodargol Viel

*Iodarsenic Guiraud

*Iodaselle Delamarre

*Iodaseptine Cortial

Iode Aucher

*Iodéne Montagu

Iodel

*Iodentérol

Iode Oberlin

*Iode Organique Boissy

Iodéol Viel

Iodéyl Fournier

*Iodex

*Iodhéma

Iodhyrine du D^r Des-
champs

*Iodine Médol

*Iodo-Bismuth Erce

*Iodo-Bismuthate de
Quinine

Iodocéréol Dalloz

Iodocol Carrion

Iodogalle Vial

Iodogéline

Iodo-Juglan

*Iodogénol Pépin

*Iodo-Maïsine

*Iodométine Hautdidier

*Iodone Robin

Iodonion

2, r. Nve-Popincourt, Paris.
D^r DEBAT, 60, r. de Prony,
Paris.

22, av. Opéra, Paris.

97, r. de Vaugirard, Paris.

26, av. Observatoire, Paris.

INSTITUT DE MICRO-
BIOLOGIE, Sarrebruck.

48, r. de la Procession, Paris.

56, boul. Péreire, Paris.

97, r. de Vaugirard, Paris.

4, r. Aubriot, Paris (IV^e).

4, ch. de la Muette, Paris.

63, r. de la Faisandere,

9, r. de la Perle, Paris.

12, r. Vavin, Paris.

8, r. du Petit-Musc, Paris.

22 bis, r. Silly, Boulogne-sur-
Seine.

7, r. Saint-Yves, Rennes.

10, imp. Milord, Paris.

49 r. Thiers, Boulogne-s.-Mer.

15, bd Pasteur, Paris.

La Ferté-Macé (Orne).

49, boul. Port-Royal, Paris.

COUDERT, 116, av. Ledru-
Rollin, Paris (XII^e).

4, r. Candolle, Paris.

17, r. Cadet, Paris.

49, r. Hoche, Courbevoie.

7, r. Saint-Yves, Rennes.

26, boul. de l'Hôpital, Paris.

46, r. Claude-Lorrain, Lille.

4, r. Candolle, Paris.

49, av. Lamotte-Picquet,
Paris.

5, r. Clauzel, Paris (IX^e).

37, r. de Bourgogne, Paris.

FRAISSE, 8, r. Jasmin,
Paris.

13, bd de la Chapelle, Paris.

54, faub. St-Honoré, Paris.

4, pl. Croix-Rousse, Lyon.

CROZET, à Cannes (A.-M).

Morand, à Auray (Morbihan)
à Courbevoie (Seine).

6, r. Rosenwald, Paris.

37, r. Galilée, Paris.

13, r. de Poissy, Paris.

9, r. Victor-Letalle, Paris.

- Iodonoses Clin**
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- *Iodonucléol**
 14, r. de Birague, Paris.
- Iodoplasme**
 85, rue des Morillons, Paris.
- *Iodostarine Roche**
 21, pl. des Vosges, Paris.
- Iodo-Théine Henry**
 39, r. Sclessin, Liège.
- *Iodo-Thyroidine Catillon**
 3, boul. Saint-Martin, Paris.
- Iodo-Trypsine**
 11, r. Torricelli, Paris.
- Iodoveine Leduc**
 JAUME, à Tamaris (Gard).
- *Iodo-Vitasine**
 H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
- *Iodurase**
 18, av. Hoche, Paris.
- Iodure d'Amidon**
 LUMIERE, 9, cours de la Liberté, Lyon.
- Iodures Gros**
 12, r. de Nice, Paris.
- Iodures Foucher**
 142, boul. St-Germain, Paris.
- Iodures Laroze**
 2, r. des Lions, Paris.
- *Iodures Pachaut**
 130, bd Haussmann, Paris.
- *Iodure Philippe**
 14, r. Palais-Grillet, Lyon.
- Iodures Souffron**
 157, r. de Sèvres, Paris.
- Iolase Corbière**
 27, r. Desrenaudes, Paris.
- Ionodoses Clin**
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Ionoides**
 13, r. Pavée, Paris.
- *Ionyl**
 La Biomarine, Dieppe (Seine-Inférieure).
- *Ipéca digitale Dausse**
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
- Irol Churchill**
 12, r. Castiglione, Paris.
- *Irradiol**
 16, r. de Rocroy, Paris.
- *Irrastérine Byla**
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Isacène Roche**
 21, pl. des Vosges, Paris.
- Isobromyl**
 COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Isotonyl (Poudre de Lausanne)**
 87, r. Lafayette, Paris.
- *Ixiium**
 Etablis. BUISSON, 157, r. de Sèvres, Paris.
- *Ixogyne**
 12, r. des Apennins, Paris.

J

- *Jécol**
 Jecorsan Fornet
- *Jemalt Wander**
 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- Jicémine**
 304, r. Saint-Jacques, Paris.
- Jovine Brisson**
 114, av. Michelet, St-Ouen.

Jugland Gmet
 Juglandine Ferrouillat
 *Juglane
 Juglanrégine André
 Jus de raisins Challand
 *Jus de raisins Pampryl
 Juvéol

27, faub. Montmartre, Paris.
 33, r. Daguerre, Paris.
 à Chambéry (Savoie).
 2, r. des Alpes, à Valence.
 Nuits-St-Georges (C.-d'Or).
 2, villa de la Terrasse, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.

K

Kalmine
 *Kalmobrol
 *Kaobrol
 *Kaolinase
 Kéfir Carrion
 Kélène
 Képhaline Brunot
 Képhir Salmon
 *Kerlactine
 *Kerlol Lerck
 *Kidoline
 *Kina Elzevir
 *Kinectine
 Kineurine Moncour
 *Kipsol
 *Kluchol Remeaud
 *Koch-I-Cide
 Kola-fer Trouette
 *Kola granulé Astier
 Kola granulée Roy
 Kola Gmet
 Kola Midy
 Kola Monavon
 Kola Pichat
 *Kolarsine Pautauberge
 *Kolatinés
 Kréazone
 *Kydalose
 *Kymosine Rogier

METADIER, à Tours.
 60, r. Aug.-Comte, Lyon.
 54, r. Paris, Charenton (S.).
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 54, fg. Saint-Honoré, Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris
 10, pl. Thiers, Le Mans.
 28, r. de Trévise, Paris.
 71, av. de Saxe, Lyon.
 à Saint-Etienne.
 GALLIER, 38, boul. Mont-
 parnasse, Paris.
 Lab. des Etabl. SALLE,
 4, r. Elzévir, Paris.
 12, r. du Chemin-Vert,
 Villeneuve-la-Garenne.
 49, av. Victor-Hugo, Bou-
 logne-sur-Seine.
 64, r. La-Rochefoucauld Paris.
 38, r. J.-B. Clément, Bou-
 logne-sur-Seine).
 LEYSIN, 1 bis, r. Molitor,
 Paris.
 15, r. Immeubles-Industriels
 45, r. du D-Blanche, Paris.
 81, boul. Suchet, Paris.
 27, faub. Montmartre, Paris.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 à Sainte-Foye, près Lyon.
 5, cours Charlemagne, Lyon.
 10, r. Constantinople, Paris.
 12, r. du Helder, Paris.
 TROUETTE, 15, r. des Im-
 meubles-Industriels, Paris.
 DALIN, 49, quai Saint-
 Vincent, Lyon.
 56, boul. Péreire, Paris.

L

*Lab-Lacto-Ferment
 *Laccodermes Brisson
 *Lachésine

Lactagol Pearson
 Lactate d'Hg (Voir :
 comprimés Roy)
 Lactéol Boucard
 Lactifère
 Lactigélose
 *Lactimase Couturieux
 Lactobacilline

*Lactobyl
 *Lactochol
 Lacto-Diastal
 *Lactolaxine Fydau
 Lacto Mannitase
 Lactomorphuol

Lactophosphine
 Lactosone
 Lactozymase B.
 Lait albumineux Mol-
 lard

Lait Gallia
 *Lait Glaxo
 Lait Gloria
 *Lait Guigoz
 Lait de magnésie Phil-
 lips

*Lait Mont-Blanc
 *Lait sec Dryco
 Lait sec Nutricia
 Laminiodé

*Lansoyl
 *Lantol Couturieux
 *Laroson Roche
 *Laurenol

Laxagarine
 *Laxamalt

*Laxamer Lefèvre
 Laxatif Châtel-Guyon
 Gubler

*Laxatifs Miraton
 Laxatone Déjardin
 Laxia Darnec'h
 Laxoil

MIALHE, 8, r. Bayart, Paris
 114, av. Michelet, St-Ouen.
 RENAUD, 2, r. Demours,
 Paris.
 43, r. Pinel, Saint-Denis.

30, r. Singer, Paris.
 3, r. Capitaine-Scott, Paris.
 DUCLOY, Arques (P.-de-C.)
 18, av. Hoche, Paris
 r. Saint-Maurice, Nanterre
 (Seine).

46, av. des Ternes, Paris.
 id.

7, av. Marceau, Paris.
 4, r. Lamotte-Piquet, Paris.
 37, r. de Tivoli, Bordeaux.
 DELPECH, 5, r. Danton,
 Paris.

8, r. de la Rompe, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 52, r. La Bruyère, Paris.
 25, cours Lafayette, Lyon.

11, r. de Brony, Paris.
 11, r. Bergère, Paris.
 19, boul. Malesherbes, Paris.
 14, r. J.-J.-Rousseau, Paris.
 62, Champs-Élysées, Paris.

Rumilly (Haute-Savoie).
 3, r. Saint-Roch, Paris.
 65, bd Sébastopol, Paris.
 42, r. Fraternité, St-Mandé.
 5, r. de la Paix, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 19, r. Drouot, Paris.
 5, av. des Tilleuls, Paris.
 LICARDY, Paris-Neuilly.
 66, r. de la Rompe, Paris.
 70, r. Legendre, Paris.

6, r. Rosenwald, Paris.
 109, bd Haussmann, Paris.
 64, r. des Tournelles, Paris.
 12, r. Beautreillis, Paris.

- Laxoléine**
Laxol Fraudin
Laxo-lin
Laxolip Henry
***Laxopeptine Girard**
Laxophore Brachin
Lebnol Thévenot
Lécithine Adrian
Lécithine Clin

Lécithine Vial
Lécithosine Robin
Lenicade Brisson
***Lénicure-Vichy**
***Léniforme**
Leptandrine Royer
***Leucagine**
Leucobules Gallier
***Leucoseptyl**
***Levulose Rogier**
***Levure B. 17**
Levure Coirre

Levure Déjardin
***Levure fraîche Myceta**
***Levurine extractive**
Couturieux
Levuritin

Licardet Brisson
Lientine Grémy
***Limol Churchill**
***Limonade Godfrin**

Lipasonol

***Lipocérébrine Lematte**
et Boinot
Lipiodol Lafay
Lipobil
Lipochol Byla
Lipocytol Grémy
***Lipodeterpénol Zyma**
Lipogazes dermatolo-
giques
***Lipoféine**
***Lipogyre Ciba**
***Lipoïdes Iscovesco**
***Lipoidine Ciba**
Lipol

Liporhine
- MILLET, à Rambouillet.**
4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
182, av. de Versailles, Paris.
39, r. Sclessin, Liège.
48, r. d'Alésia, Paris.
à Joinville (Haute-Marne).
à Dijon.
9, r. de la Perle, Paris.
20, r. des Fossés-Saint-Jac-
ques, Paris.
8, r. Vivienne, Paris.
13, r. de Poissy, Paris.
114, av. Michelet, St-Ouen.
94, bd des Batignolles, Paris.
26, r. Pétreille, Paris.
225, r. Saint-Martin, Paris.
22, r. de la Sorbonne, Paris.
38, bd Montparnasse, Paris.
73, r. Orfila, Paris.
56, boul. Péreire, Paris.
26 bis, r. Dombasles, Paris.
79, r. du Cherche-Midi,
Paris
109, boul. Haussmann, Paris.
4, r. Bellart, Paris.
18, av. Hoche, Paris.

FEIGEL, à Lutterbach
(Haut-Rhin).
114, av. Michelet, St-Ouen.
14, r. de Clichy, Paris.
12, r. Castiglione, Paris.
5, av. Watteau, Nogent-
sur-Marne.
30, r. N.-D.-des-Victoires,
Paris.
52, r. Labruyère, Paris (IX^e).

54, ch. d'Antin, Paris.
29, pl. Wilson, à Denain.
26, av. Observatoire, Paris.
14, r. de Clichy, Paris
4, r. Bellart, Paris.
LECOQ & FERRAND, 14,
r. Gravel, Levallois.
1, pl. Morand, Lyon.
id.
107, r. des Dames, Paris.
1, pl. Morand, Lyon.
10, r. des Fleurs, Ronchin
(Nord).
JOSSE, pl. Wilson, Denain.

- *Liposplénine du D^r Groc 16, r. Saint-Gilles, Paris.
 *Lipo-Vaccins 32, r. de Vouillé, Paris.
 Liqueur d'Hermès 12, boul. Saint-Martin, Paris.
 Liqueur Laprade 49, r. de Maubeuge, Paris.
 *Liqueur Laville 20, r. Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 Liqueur peptophos - ADRIAN, 9, r. de la Perle, phorique Paris.
 Liqueur à la Thyroïdine Bouty 3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
 Liqueur végétale Narud 38, r. N.-D.-Nazareth, Paris.
 Liseronine 19, r. Drouot, Paris.
 *Listose Vicario 17, boul. Haussmann, Paris.
 Litharsyne Ferré 142, bd St-Germain. Paris.
 Lithine effervescente LE PERDRIEL, 11, r. Milton, Paris.
 *Lobuline 37, r. de Bourgogne, Paris.
 Lodolan 52, r. d'Aubuisson, Toulouse.
 *Loraga 70, r. Strasbourg, Vincennes.
 Luargol POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 Luatine 2, av. Parmentier, Paris.
 Lual VAURS, 72, av. Kléber Paris.
 Luarsyl id.
 Luatol POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 *Luchon C¹⁰ Fermière de Luchon (Haute-Garonne).
 *Lucodal 2, quai Paul-Bert, Tours.
 *Ludin REY, 12, r. Montmartre, Dijon.
 *Lusoforme 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 Lutéovar à Ermont (Seine-et-Oise).
 Lycétol Vicario 17, boul. Haussmann, Paris.
 Lytiflore HOURTOULLE, 11, r. des 2-Ponts, Paris (IV^e).
 Lyméogène 26, r. Cambon, Paris.
 Lymphactol 4 bis, r. de Lyon, Paris.
 *Lysats-Vaccins (Voir 65, r. Parmentier, Ivry
 Vaclydun) (Seine).
 Lysol

M

- *Magnésie Durel 7, boul. Denain, Paris.
 *Magnésie Erba 105, boul. Malesherbes, Paris.
 Magnésie Roy 81, boul. Suchet, Paris.
 *Magnésium Hardy 100, r. Montmartre, Paris.
 (Sirop de)
 *Magnétone 10, r. Vignon, Paris.

*Magol Churchill

*Malarsan

*Maltase Fanta

*Malt Barley

*Malt français Déjardin
(extrait)

Maltine Gerbay

Malt Moritz

Malt Régina

Malt Strauss

*Malt Wander

*Maltea Moser

Maltine-Phénix

*Maltosan

*Malt Paillete Progil

Mannelle Endocrisines

Fournier

Mandragnol

*Mangaine

Manganésia

Mangano-Calciqne

*Manganano Phosphat Ju-
lien

Manganoxyl

*Marinol (Labor. du)

Mariode

Marron d'Inde Dausse

Marronine Huard

*Marrubiase

Marsyle Clin

Mas de la Ville

Masglandol

*Maté Douglas

Maya Bulgare

Médicament de Saint-
Boes

Medicoferments

*Menatol

*Menopausine

*Menosedine

*Ménovarine

12, r. Castiglione, Paris.

P. AUBRY, 54, r. de la
Bienfaisance, Paris.

6, r. Guyot, Paris.

id.

10, r. Parent-de-Rosan. Pa-
ris.

à Roanne (Loire).

189, r. de Vaugirard, Paris.

34, r. Pajol, Paris.

12, r. Broca, Paris.

151 bis, route de Joinville,
Champigny (Seine).

8, ch. de Montbrillant, Lyon.

4, r. de Birague, Paris.

151 bis, route de Joinville,
Champigny (Seine).

6, boul. de Strasbourg, Paris.

26, boul. de l'Hôpital, Paris.

GAILLON, 113, bd Voltaire,
Paris.

71, r. Sainte-Anne, Paris.

Produits Dannec'h, 64, r.
des Tournelles, Paris.

à Saint-Amand-Montrond.

105, r. de Rennes, Paris.

23, av. Motte-Picquet, Paris.
à Dieppe (Seine-Inférieure).

COURRET, 75, r. St-Domi-
nique, Paris.

4, r. Aubriot, Paris.

3, av. Orléans, Paris.

COMTE, 60, r. St-Guilhem,
Montpellier.

20, r. des Fossés-Saint-Jac-
ques, Paris.

Arles-sur-Rhône.

16, r. des Fauvelles, Cour-
bevoie.

62, Champs-Élysées, Paris.

322, r. Saint-Honoré, Paris.

par Orthez (Basses-Pyré-
nées).

10, r. de la Viotte, Besançon.

BAILLY, 15-17, r. de Rome,
Paris.

9, pl. de la Paix, Mulhouse.

Demasles, à Vienne (Isère).

41, r. Etienne-Marcel, Pa-
ris.

- Mensuosedyl**
Mentholina
***Méral**
Mercuriaux Vigier
***Mésoforme**
***Mésothorium Buisson**
Méroléol Salle
Mesarca Roche
***Métacuprol**
***Méta-Titane**
***Méta-vaccins**
Métharfer Bouty
Métharsinate Glin
Métharsol Bouty
Méthylarsinate Vicario
Méthylarsinate Vigier
Métricine
***Metritols**
***Mialbaine**
***Micelliode**
Micranyl
***Mictasol**
***Mictoseptol**
Migrainol
Minéraline du D^r Baud
Minéralogène
Minérol
Minérolaxine L Tan-
neur
***Miroxyl**
***Mitigans Roxelane**
Mokavène
Mondorasme
***Moranyl**
***Moréthyl Dausse**
***Morisland**
***Morrhualène Gautier**
***Morrhuéline Jungken**
***Morrhutine Puy**
***Morrhual Chapoteaud**
***Morrhuxine**
***Morubiase Crosnier**
Morubiline
Morucalcium
Moruphyle
***Moruxase Abadie**
AUGIER, 2, r. des Lom-
bards, Paris.
GUIGNIER, Bois-Colombes.
68, r. Berkendael, Bruxelles.
12 b. Bonne-Nouvelle Paris.
17 bis, av. Parmentier, Paris.
157, r. de Sèvres, Paris.
4, r. Elzévir, Paris.
21, boul. des Vosges, Paris.
5, r. François-Ponsard, Pa-
ris.
MÉTADIER, à Tours.
id.
3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
20, r. des Fossés-Saint-Jac-
ques, Paris.
3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
17, boul. Haussmann, Paris.
12 b. Bonne-Nouvelle Paris.
GIRARDEL, à Asnières.
18, r. Pierre-Curie, Paris.
8, r. Favart, Paris.
88, r. de la Villette, Paris.
GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
28, r. du Four, Paris.
29, fb de Bourgogne, Or-
léans.
16, cours Gambetta, Lyon.
14, r. de Birague, Paris.
4, pl. Croix-Rouge, Lyon.
10, r. Richelieu, Paris.
6, r. de Laborde, Paris.
32, r. de l'Ouest, Paris.
38 bis, r. Raphaël, Vanves.
16, r. de Rocroy, Paris.
95, r. de Turenne, Paris.
SPECIA, 86, r. Vieille-du
Temple, Paris.
4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
38, r. Ramey, Paris.
17 bis, av. Parmentier, Paris.
105, r. de Normandie, Cour-
bevoie (Seine).
à Grenoble.
VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
163, r. de Flandre, Paris.
6, r. Chanoinesse, Paris.
32, r. Joubert, Paris.
23, av. Motte-Picquet, Paris.
BOST, Villefranche (Rhône).
3, pl. St-Michel, Toulouse.

- Mouches Albespeyres** 78, faug. Saint-Denis, Paris.
Mucilose MILLET, à Rambouillet.
***Mucinum** CHANTEREAU, 26 bis, r. Dombasle, Paris.
Mucobarytine 12, r. des Tribunes, Versailles
Mucogène Astier 45, r. Docteur-Blanche Paris.
***Mucosodine** 37, r. de la Fédération, Paris.
Muqueuse Endocrisines Fournier 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Musculargyre FEIGNOUX, Montreuil (S.)
Musculogenol 62, r. V.-Hugo, Houplines (Nord).
***Musculosine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
Mustérole 5 bis, r. des Haudriettes, Paris.
Mutandine GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
Muxol Lab. SERVIER, à Orléans,
***Muthanol** 55, boul. Strasbourg, Paris.
Mycodermine 109, boul. Haussmann, Paris.
***Mycolysine Doyen** 5, r. Bourg-Abbé, Paris.
Mycidol Badel à Valence-sur-Rhône.
Myodine Mauchant 14, r. de Birague, Paris.
Myo-Serum 168, b. St-Germain. Paris.
Myrtanol 30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris.
***Myrtilline Demasle** à Vienne (Isère).

N

- *Naïodine Logeais** 22 bis, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
***Narcotile Bengué** 47, r. Blanche, Paris.
Narcyl Grémy 34, r. Sedaine, Paris.
***Narsénol** SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Nasale Ymera 28, r. de Seine, Paris.
Nasocaïne Lab. ANIMAT, Nîmes (Gard).
***Natibaïne** 27, r. de la Procession, Paris.
***Natrosyl** 18, r. Pierre-Curie, Paris.
Nazilante ANIMAT, Nîmes (Gard).
***Nazophyl Darva** 19, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
***Néo-Arsycodile** 62, r. de la Tour, Paris.
Néo-Asclérol 45, r. Caumartin, Paris.
***Néocarsite** 11, r. Joseph-Bara, Paris.
Néofilhos Le Perdrie 11, r. Milton, Paris.
Néo-Calceïne 21, r. Violet, Paris.

- *Néo-Collargol 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- *Néoiacol 105, bd Malesherbes, Paris.
- Néo-Iodure Ménard 3, r. République, Lyon.
- Néo-Kola Lumière 9, cours de la Liberté, Lyon.
- *Néol Bottu 35, r. Pergolèse, Paris.
- *Néo-Laxatif Chapotot 56, boul. Ornano, Paris.
- *Néolides H. B. 35, r. Pergolèse, Paris.
- *Néolyse 55, bd de Strasbourg, Paris.
- *Néo-Mésarca Roche 21, pl. des Vosges, Paris.
- *Néo-Pancarpine 5, r. François-Ponsard, Paris.
- Néo-Phanol 26, r. Sainte-Claire, Mu-
house.
- *Néoplalysines 49, r. de Paradis, Paris.
- Néoquinine Falières 20, r. Fossés-St-Jacques,
Paris.
- *Néo-Rhomnol 62, r. de la Tour, Paris.
- *Néo-Riodine Astier 45, r. Dr Blanche, Paris.
- *Néothorium Millot 54, r. Bienfaisance, Paris.,
COMAR, 20, r. des Fossés-
Saint-Jacques, Paris.
- Néo-Tréparséan 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- *Néo-Trépol 28, r. de l'Hôpital-Militaire
Lille.
- Néphrine Bouty 3 bis, r. de Dunkerque, Paris
- Néphrine Byla 26, av. Observatoire, Paris.
- *Neptal SPECIA, 86, r. Vieille-du-
Temple, Paris.
- *Nergine Heudebert r. Saint-Germain, Nanterre.
- *Nervocithine Tissot 34, boul. de Clichy, Paris.
- *Neurène 8, r. de la Source, Paris.
- *Neuréol LAFARGE, 6, bd Arago,
Paris.
- Neurhémol Vinçon à Auxerre (Yonne).
- *Neurinase 2, r. du Débarcadère, Paris.
- *Neurobore 23, r. des Moines, Paris.
- Neurogaiacol Dethan 11, r. A.-de-Neuville, Paris.
- Neuroiodure Dethan id.
- Neurolipase 23, r. d'Ouessant, Paris.
- *Neuro-Moka 88, r. de la Villette, Paris.
- *Neuro-Pax C^{te} de GRAUWE, 16, r. de
Rocroy, Paris.
- *Neuroplasma 13, r. Lacharrière, Paris
- *Neuroplasmine id.
- *Neurosine Prunier 1, quai Aulagnier, Asnières.
- Neurosthy 4, r. Lamotte-Picquet, Paris.
- Neurotanic GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- *Neurotrol Abadie 3, pl. St-Michel, Toulouse.
- Neurotrope MÉROBIAN, 37, r. Pajol,
Paris.
- *Neurotrophol Byla 26, av. Observatoire, Paris.
- Neurovarol Douetteau 20, faub. Saint-Honoré, Paris
- Neurovoïne GREMY, 14, r. Clichy, Paris

- Neutrol
 Neutrose Vichy
 *Névarsité
 *Névoral
 Névralgésine
 *Névralgol Brossard
 Névraltéine Rogier
 *Nevrosan
 Nevroserum
 *Névrosol
 *Névrosthénine Freys -
 singe
 Nickobalt
 *Nigérine Vincent
 Niketol
 *Nisaméline
 *Nitium
 *Nitroyl Leysin
 *Nopirine Vicario
 *Normacol
 Nortal Clin
 Nosol Agüettant
 *Novargyre Guillaumin
 Novarine Vicario
 *Novarsénobenzol Bilhon
 *Noviode
 *Novo-Brol
 *Novo-Lactol
 Novoseptine
 Nuclabia
 Nucléarène Cognet
 Nucléarrhol Gabriel
 *Nucléarsitol Robin
 *Nucléatol Robin
 Nucléo-fer Girard
 *Nucléophorine
 *Nuclhémose
 Nuclocithol
 *Nujol
 Nurécase
 Nutritine Déjardin
 AMICI, Saint-Sylvestre, Nice.
 49, av. de Wagram, Paris.
 11, r. Joseph-Bara, Paris.
 R. FEIGNOUX, 29, r. des
 Jardiniers, Montreuil (S.)
 DÉBORDES, à Moulins
 (Allier).
 1, r. Cordouans, La Rochelle.
 56, boul. Péreire, Paris.
 P. C. B., 12, r. du Télé-
 phone, Bruxelles.
 4, fg Stanislas, Nancy.
 12, r. des Apennins, Paris.
 6, r. Abel, Paris.
 156, r. de l'Université, Paris.
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 12, r. Paul-Baudry, Paris.
 TROUETTE, 15, r. Im-
 meubles-Industriels, Paris
 BUISSON, 157, r. de Sèvres,
 Paris.
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 17, boul. Haussmann, Paris.
 41, r. de Rome, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 36, q. Fulchiron, Lyon.
 13, r. Cherche-Midi, Paris.
 17, boul. Haussmann, Paris.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-
 Temple, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 8, r. de la Source, Paris.
 Et. DAGUIN. St-Maur (S.)
 57 bis, av. La-Motte-Picquet,
 Paris (XV^e).
 Lab. chimie physiologique.
 37, r. Tivoli, Bordeaux.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège (Belg.).
 13, r. de Poissy, Paris.
 id.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 40, r. Claire-Paulhac, Tou-
 louse.
 RÉMY & LECOQ, 6, p.
 Clichy, Paris
 28, av. Grammont, Tours.
 78 av Champs-Élysées, Paris.
 GRANDVAL, à Reims.
 109, boul. Haussmann, Paris

*Nutrobiase

*Nutromalt

*Nyctal

10, r. Cimarosa, Paris (XVI^e).
151 bis, route de Joinville,
Champigny (Seine).
DURET et RÉMY, As-
nières.



*Ocianine Chevreton

*Ocréine Grémy

52, r. La Bruyère, Paris.

14, r. de Clichy, Paris.

*Odarsol

COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fos-
sés-Saint-Jacques, Paris.

*Odynal Chevalier

à Varennes-sur-Allier.

*Enase Couturieux

18, av. Hoche, Paris.

*Enophos

29, pl. Bossuet, Dijon.

*Oléobiline

2, r. Maréchal-Pétain, Nice.

Oléo-Calcium

MAURES, à Port-de-Penne
(Lot-et-Garonne).

*Oléocidase

6, r. Rosenwald, Paris.

*Oléojasol

19, r. Ferdinand-Duval,
Paris.

Oléo-Bi-Roche

21, pl. des Vosges, Paris.

*Oléiformine « Corbière »

27, r. Desrenaudes, Paris.

Oléo-Iode Dubois

35, r. Pergolèse, Paris.

Oléolaxine

5, av. des Tilleuls, Paris.

*Oléo-Mel

DELFOUR Pouillon (Land.).

Oléo-Psyllium

Labor. ADLER, 36, r.

*Oléthyle Benzyle

Frances-Bourgeois, Paris.

*Onction Angelini

122, faub. St-Honoré, Paris.

*Oliolase Corbière

61, r. de Seine, Paris.

Olivéol Etiévant

27, r. Desrenaudes, Paris.

Onguent Ilon

BRUN, Demi-Lune, Lyon.

*Ophtalmine Leprince

31, r. Illzach, Mulhouse.

*Opobyl

62, r. de la Tour, Paris.

*Opocalcium

BAILLY, 15-17, r. de Rome,
Paris.

Opochlorine

121, av. Gambetta, Paris.

*Opochol

23, r. d'Ouessant, Paris.

Opogénines

TÉTARD, Beauvais (Oise).

Opoglandéol Fray

40, r. Bellechasse, Paris.

Opolaxyl Corbière

DURAND, Aigues-Mortes.

*Oponuclyl irradié

27, r. Desrenaudes, Paris.

Trouette-Parret

15, r. des Immeubles-Indus-
triels, Paris.

*Opopeptol

105, boul. Malesherbes, Paris.

Oposynergines

18, av. Daumesnil, Paris.

*Opothérapie associée

Dr FRAYSSE, 47, r. de

*Opothérapie Bouty

Neuilly, Nanterre (Seine).

*Opothérapie Byla

3 bis, r. de Dunkerque, Paris.

26, av. Observatoire, Paris.

- * **Opothérapiques Meurice** 68, r. Berkendael, Bruxelles.
- * **Opothérapiques Péli-sier** 33, av. de Villiers, Paris.
- Opotonine** 20, r. des Martyrs, Paris.
- * **Opozone Lumière** 9, cours Liberté, Lyon.
- Opsine Grémy** 14, r. de Clichy, Paris.
- * **Opsolysine** 7 à 13, r. Saint-Maurice, Nanterre (Seine).
- * **Orargol** Labor. AMICROS, 5, r. Clauzel, Paris.
- Orchitine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
- * **Orexyl** F. CARTIER, 1, r. de la Martinière, Lyon.
- Orianol** GENTON, à Petit-Quévilly (Seine-Inférieure).
- * **Oriphol** 8, r. Richer, Paris.
- * **Ormatol** E. ROBINEAU, 80 route des Petits-Ponts Drancy (Seine)
- Ortho-Gastrine** LEBLOND, 51, r. Gay-Lussac, Paris.
- * **Orthogénol** COULET, à Hyères (Var).
- Osmoléine** 26, r. des Moines, Paris.
- Osmo-Vaccins P. L.** Lab. BRÉANT, 4, r. de Clichy, Paris.
- * **Osteline** Labor. GLAXO, 11, r. Bergère, Paris.
- Ostéo-hépatine** 8, r. de la Source, Paris.
- * **Ostréine Buisson** 157, r. de Sèvres, Paris.
- * **Ouabaine Arnaud** 27, r. de la Procession, Paris.
- Ouabaine Deglaude** 6, r. d'Assas, Paris.
- * **Ouataplasme Langlebert** SABATIER, 10, r. Pierre-Ducreux, Paris.
- Ovaire - Endocrisines Fournier** 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
- Ovairine** 62, r. Notre-Dame, Bordeaux.
- Ovarigène Disdier** av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
- Ovarine Dubois** 49 av. Lamotte-Picquet Paris.
- * **Ovarine Tisy** 95, r. de Turenne, Paris.
- Ovarose** 58, r. St-Placide, Paris.
- Ovigénine Bouty** 3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
- * **Ovo-lécithine Billon** SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- * **Ovomaltine** 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- Ovothyrol** 8, r. de la Source, Paris.
- Ovules Chaumel** 78, faub. Saint-Denis, Paris.
- Ovules Derma** ROBIN, 13, r. de Poissy, Paris.

- Opothérapie Carrion
 Opothérapie Chaix
 Opothérapie Chevreton
 *Opothérapie Choay
 *Opothérapie Fournier
 Opothérapie Fumouze
 *Opothérapie Henning
 *Opothérapie Moncour

 Opothérapie "Le Pecq"
 Opothérapie Richard
 *Opothérapie U. T. A.

 *Ovules Ivual
 Ovules Magida
 Ovules Roche
 Oxycyanure d'hydrargyre
 *Oxydothyridine Paris
 *Oxydovarine Paris
 *Oxydrol

 *Oxygénase

 Oxygénés du Dr Prim
 Oxygénozone
 *Oxymenthol Perraudin
 *Oxymuth Saca

 Oxynargyl

 Oxy-Thymoline
 *Ozobiase
 Ozol
 *Ozonair

 54, fb. Saint-Honoré, Paris.
 10, r. de l'Orne, Paris.
 52, r. La Bruyère, Paris.
 48 r Théoph.-Gautier, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.
 78, faub. Saint-Denis, Paris.
 49, r. de Paradis, Paris.
 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
 11, r. Beautreillis, Paris.
 79, av. d'Orléans, Paris.
 P. THAVISSEN, 13, rue Sainte-Véronique, Liège.
 5, r. Clauzel, Paris.
 56, r. des Dames, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, Paris.
 4, r. Lamotte-Picquet, Paris.
 id.
 POINTET & GIRARD, 30, r. Francs-Bourgeois, Paris.
 Dr CHAPPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.
 27, r. Fourcroy, Paris.
 11, r. Saint-Sabin, Paris.
 21, r. Chaptal, Paris.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 BESNARD, 56, r. des Dames, Paris.
 GODFRIN, à Nancy.
 37, r. de Marly, à Rueil à Avignon.
 2, r. de Vienne, Paris.

P

 *Pain essentiel Heudebert
 *Pains spéciaux Heudebert
 Pains de régime Mil-liat
 *Pain Redeuil
 Pain de Santé Martin

 *Païphos
 Paludase Corbière
 Panbiase antiphy-mique
 85, r. de Saint-Germain, Nanterre (Seine).
 id.
 319, av. Berthelot, Lyon.
 7, r. Couche, Paris.
 à Montreuil-Belfroy, Maine-et-Loire).
 9, r. Pérignon, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 VAURS, 72, av. Kléber, Paris

- *Panbiline
Panbromine
- *Pancréenne
Pancréas - Endocrisi -
nès Fournier
- *Pancréatine Laleuf
Pandigitale Houdas
- *Panfébrine
- *Pangaduine
- *Pangastrol
- *Pangestyl Narty
- *Panglandine Coutu -
rieux
- *Panhéamol
Panhistol
- *Panlacto-Midy
Panlax Allard
- Panprocol
- *Pantofort du Dr Boveil
(granules)
- *Pantolaxine du Dr Be-
veil (cachets)
- *Pantopon Roche
Panurol Tissot
Panvalérine Delattre
- *Papaine Trouette
- *Papaveryl
- Papier Albespéyres
Papier du Dr Balme
- *Papier Fayard
Papier Gicquel
- Papier iodogène Ey-
monnet
- *Paquets Védé
Paracarbochloryl
- *Paradoliné
Paraffinoléol Hamel
Paragar
- *Paralactine Byla
Paralaxol
Paralymphine
Paratétanine
- *Parathyrocalcine Mon-
cœur
- A Annonay (Ardèche).
17, r. Cadet, Paris.
- 10, r. Poncelet Paris (XVII^e).
26, boul. de l'Hôpital, Paris.
- 20, r. du Labé, Paris.
- 26, r. Saint-Claude, Paris.
- 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- 2, r. du Marché des Blancs-
Manteaux, Paris.
- STOULS, 156, av. Victor-
Hugo, Paris.
- 134, boul. Péreire, Paris.
- 18, av. Hoche, Paris.
- 90, av. des Ternes, Paris.
- 4 bis, r. de Lyon, Paris (XII^e).
- 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Labor. GMET, 27, faub.
Montmartre, Paris (IX^e).
- 222, r. Duguesclin, Lyon.
- 1, r. Lassalle, Lyon.
- 1, r. Lassalle, Lyon.
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- 34, boul. de Clichy, Paris.
- 10, r. du Bac, Paris.
- 15, r. Immeubles-Industriels
Paris.
- Dr BACONNET, 158, av.
Suffren, Paris.
- 78, faub. Saint-Denis, Paris.
- 56, boul. Péreire, Paris.
- 94, boul. Batignolles, Paris.
- BRUN & DUMÉE, 64, r. des
Tournelles, Paris.
- 9, cours Liberté, Lyon.
- 2 et 4, pl. Gambetta, Paris.
- 76, r. Réaumur, Paris.
- 38, r. Ramey, Paris.
- 17, r. de Berri, Paris.
- 107, av. de la Reine, Boulo-
gné-S-S.
- 26, av. Observatoire, Paris.
- à St-Germain-en-Laye.
- 32, r. de Grenelle, Paris.
- 17, r. Bourgelat, Lyon.
- 49 av. Victor-Hugo, Bou-
logne-sur-Seine.

Parathyroïde-Endocri-
sines Fournier
Paratoxine Ducatte
***Paroxyl**

***Passiflorine**

***Passival**

Pastilles Brachat
Pastilles Midy
Pastilles Houdé
Pastilles Méry
Pastilles Miraton
Pastilles Vichy-Etat
Pâte Berthé
Pâte Jane

Pâtes lacto-maltées du
D^r Jacquet
Pâte thionique Ram-
baud

***Patholysine**
Pausodyne

***Paveron Dausse**
Pebromon Henry
Pectine

***Pellicules radifères du**
D^r Vallet

***Pélospanines**

Pepiodon Henry
***Pepsodia**
***Peptalmine**
***Peptodiase**

Pepto-fer du D^r Jaillet

***Peptokola Robin**
***Peptonal**

***Peptonate de fer Robin**
Peptone Byla
Peptone Catillon
Peptone Chapotaud
***Peptone Vassal**
Peptosodine
***Peptozym**
***Peraziolol**
Péricols Legros
***Péristaltine Ciba**

26, boul. de l'Hôpital Paris.

191, r. Saint-Honoré, Paris.
THIRIET & C^{ie}, 26 et 28,
 r. des Ponts, Nancy.
REAUBOURG, 1, r. Ray-
 nouard, Paris.

H. SALLE, 4, r. Elzévir,
 Paris.

5, av. Victoria, Paris.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 9, r. Dieu, Paris.
 16, r. de Rocroy, Paris.
 6, r. Rosenwald, Paris.
 24, boul. Capucines, Paris.
 78, faub. Saint-Denis, Paris.
 2, r. Marché des Blancs-
 Manteaux, Paris.
 89, r. de Rivoli, Paris.

38, r. Gay-Lussac, Paris.

142, r. de Picpus, Paris.
 98, r. d'Angoulême, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 39, r. Sclessin, Liège.
 17 r. Cadet. Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.

FOURNIER Frères, 7, r
 Biscornet, Paris.

39, r. Sclessin, Liège (Belg.).
 12, r. des Appenins, Paris.
 21, r. Chaptal, Paris.
ZIZINE, 24, r. de Fécamp,
 Paris.

DARASSE, 7 à 13, r. Saint-
 Maurice, Nanterre (Seine).
 13, r. de Poissy, Paris.
DURET et REMY, à As-
 nières (Seine).

13, r. de Poissy, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 3, boul. Saint-Martin, Paris.
VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
 28, r. Hôpital-Militaire, Lille.
 46, Gde-Rue, Boulogne-s.-M.
 90, av. des Ternes, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 74, r. Raspail, Bois-Colombes.
 1, pl. Morand, Lyon.

Perles Taphosote*Peroxydines*****Persodine Lumière*****Pertussin Salle*****Perubore****Phagocytine Bureau*****Phagolysine*****Phagostyl*****Phagostyl Mangané*****Phaguryl*****Pharmetan*****Phelaxine Moulines****Phénalgéine****Phénaseptyl****Phénol Bobœuf*****Phiamine Coursaget****Philocardine****Philogastrine*****Phléboguil****Phlyctol*****Phos****Phoscalgène****Phosferyl Fournier*****Phosoforme*****Phosol Quinet*****Phosote Lambiotte*****Phospharsol****Phospharsinol*****Phospharsyl colloïdal
du D^r Pinard*****Phosphate Vital de
Jacquemaître*****Phosphate Pinard****Phosphatine Falières*****Phosphobrom*****Phospho-Fluor-Beynet*****Phospho-Gaiacol Mary****Phosphogénase****Phosphogène Favri-
chon****Phospho-Iodine*****Phosphopinal Juin****Phosphorescine Leker**

20, rue Dumont-d'Urville,
Paris (XVI^e).

135, r. de Rome, Paris.

9, cours de la Liberté, Lyon.

4, r. Elzévir, Paris.

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

26, r. Saint-Claude, Paris.

14, r. Cantin, Courbevoie.

A. PARIS, 4, r. La-Motte-
Piquet, Paris.

A. PARIS, 4, r. La-Motte-
Piquet, Paris.

BAILLY, 15-17, r. de Rome,
Paris.

68, r. Berkandæl, Bruxelles.
à Villeneuve - la - Guyard
(Yonne).

29, r. de Metz, Toulouse.

4, pl. Wilson, Limoges.

47, r. de Rome, Paris.

9, r. Porte-Côté, Blois (L.-
et-Cher).

25, r. Petits-Hôtels, Paris.

34, r. Saint-Lazare, Paris.

H. SALLE, 4, r. Elzévir, Pa-
ris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

213, r. St-Honoré, Paris.

à Châteauroux (Indre).

26, boul. de l'Hôpital, Paris.

37, r. de Marly, Rueil

143, r. du Temple, Paris

20, r. Dumont-d'Urville, Pa-
rie (XVI^e).

46, r. Pierre-Charron, Paris.

MORAND, à Auray.

38, boul. Saint-Denis, Cour-
bevoie.

à Villefranche (Rhône).

88, bd St-Denis, Courbevoie.

6, r. de la Tâcherie, Paris.

22, r. Poncelet, Paris.

165, r. Saint-Honoré, Paris.

32, r. de l'Ouest, Paris.

37, r. Tivoli, Bordeaux.

à Saint-Symphorien-de-Lay
(Loire). (Voir : Produits
diététiques Favrichon).

46, Gde-Rue, Boulogne-s.-M.

10, impasse Milord, Paris.

13, r. Marbeuf, Paris.

- Phospho-Serum**
Phosphotal Clin
- ***Phostaniol**
Phostanno-Gaïacol
Phostyl
- ***Phusasmine**
- Phydermol**
- ***Phylactone Byla**
Phyllosan
Physéine Grémy
Physioscyamine
Physiosthénine
- ***Phytinate de Quinine**
Ciba
Phytine Ciba
Phytogénine Byla
Phytol
Phyto-Tanin
Phytothérapie Coirre
Pilules antidiabétiques
Midy
Pilules Bengué
Pilules Blancard
- Pilules Bosredon**
- Pilules de Brides**
Pilules Coulpier
Pilules du D^r Debouzy
- Pilules Doumer**
Pilules Eparvier
Pilules Gip
Pilules Hardy
Pilules héléniennes
Naud
Pilules d'Hermal
Pilules Laville
- ***Pilules du D^r Séjournet**
Pilules Lartigue
Pilules Lemary
Pilules lithuranées du
D^r Boveil
Pilules de Moussette
Pilules Nella
- r. Dupont-des-Loges, Rennes**
20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
à Fesches-le-Châtel.
93, r. Nollet, Paris.
Lab. P.Y, 58, bd R.-Wallacé
à Puteaux.
E. ROBINEAU, 80, route
des Petits-Ponts, Drancy
(Seine).
70, r. Boucicaut, Fontenay-
aux-Roses.
26, av. Observatoire, Paris.
26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
14, r. de Clichy, Paris.
44, r. Gambetta, Biarritz.
37, r. de Marly, Rueil.
1, pl. Morand, Lyon.
- id.**
26, av. Observatoire, Paris.
3, r. Chanez, Paris (XVI^e).
D^r A. Petit, à Angoulême.
5, bd Montparnasse, Paris.
4, r. du Colonel-Moll, Paris.
47, r. Blanche, Paris.
64, r. La Rochefoucauld,
Paris.
GIGON, 7, r. Coq-Héron,
Paris.
41, r. de Verneuil, Paris.
30, r. Louis-le-Grand, Paris.
LONGUET, 34, r. Sedaine,
Paris.
à Annonay (Ardèche).
26, Grande-Rue, Lyon.
11, r. Joseph-Bara, Paris.
13, r. Minimés, Le Mans.
37, r. Pajol, Paris.
28, r. Saint-Claude, Paris.
20, r. Fossés-St-Jacques,
Paris.
62, r. de la Tour, Paris.
78, faub. Saint-Denis, Paris.
14, r. Palais-Grillet, Lyon.
1, r. Lassale, à Lyon.
20, r. Fossés-Saint-Jacques,
Paris.
4, r. Jean-Goujon, Paris.

- Pilules Oco**
***Pilules Philippe**
Pilules Purgatives du
D^r Dehaut
Pilules de Quassine
Frémint
***Pipérazine Midy**
Pipérasol Tissot
Piscidia Gmet
Pituglandol Roche
***Pituilobine Byla**
Pixel Koehly
Placenta Endocrisines
Fournier
***Plagéine Soulas**
Plasma de Quinton
Plasmocol
Plasone Vours
Pluribiase
***Plurion Couturieux**
Pneumobiol
Pneumo-calcine
Pneumocratol
***Pneumogéine Renard**
***Pneumostyl Daguin**
Pneumotanic Grémy
Podophylle Coirre
***Poliol Churchill**
Polvista
Polybromure Gonnon
Polycine
***Polyferments**
Polyformiate Coutu -
rieux
***Polyminéral Fort**
Polyveinine
***Pommade adrénostyp-**
tique Midy
Pommade Cuticura
***Pommade Fornet à**
l'insuline
***Pommades Kléos**
***Pommade Lenoir**
***Pommade Logeais**
***Pommade au Nestosyl**
***Pommade Noelline**
Pommade Quartier
- 87, r. Lafayette, Paris.
 14, r. Palais-Grillet, Lyon.
 147, faub. Saint-Denis, Pa-
 ris.
 6, r. Abel, Paris.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 34, boul. de Clichy, Paris.
 27, faub. Montmartre, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 7, r. Rodier, Paris.
 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
 119, r. de Sèvres, Paris.
 54, f. Saint-Honoré, Paris.
 16, r. des Fauvelles, Cour-
 bevoie.
 72, av. Kléber, Paris.
 8 av. Parc-Montsouris Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 27, r. Cavenne, Lyon.
 11, r. Torricelli, Paris.
 147, faub. Saint-Denis, Paris.
 142, av. de Clichy, Paris.
 à St-Maur, (Seine).
 14, r. de Clichy Paris.
 79, r. Cherche-Midi, Paris.
 12, r. Castiglione, Paris.
 6, r. Trencavel, Béziers.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 GAILLON, 113, bd Voltaire,
 Paris.
 LALEUF, 20, r. Laos, Paris.
 18, av. Hoche, Paris
 13, r. Lacharrière, Paris.
 JAUME, Tamaris (Gard).
 Labor. MIDY, 4, r. du Colo-
 nel-Moll, Paris.
 3, av. Lowendal, Paris.
 INSTITUT DE MICROBIO-
 LOGIE, Sarrebruck.
 2, r. des Cordeliers, Meung-
 sur-Loire.
 142, r. de Picpus, Paris.
 24, r. Silly, Boulogne-s.-S.
 72, r. Saint-Dominique, Pa-
 ris.
 75, r. de Siam, Brest.
 34, r. de Paris, Essonne
 (Seine-et-Oise),

- *Pommade Radine** DUCLOS, Evreux (Eure).
 (pour brûlures)
Pommades Royer 225, r. Saint-Martin, Paris.
Potion Boissel 4, cours Cicé, Bordeaux.
Potion Bonnet 17, r. Cadet, Paris.
Poudre américaine Le-roy 20, r. La Rochefoucauld, Paris.
Poudre antiasthmatische Henry 39, r. Sclessin, Liège.
***Poudre Escoufflaire** à Baisieux (Nord).
Poudre Klappa pl. Cathédrale, Sens.
Poudre de Lausanne 87, r. Lafayette, Paris.
 (Voir : *Isotonyl*)
Poudre de viande 15, r. Immeubles-Industriels
 Rousseau Paris.
Poudre du Dr Cléry 53, b. Saint-Martin, Paris.
Poudre Espic 20, r. Saint-Lazare, Paris.
Poudre Génia 136, r. Chemin-Vert, Paris.
***Poudre Gynulé** CH. DEHAY, à Arras.
Poudre Lartigue 78, f. Saint-Denis, Paris.
***Poudre laxative de Vichy** 4, quai Aulagnier, Asnières.
***Poudre Noelline** GUINGAMP, (C.-d-N).
***Poudre Paterson** 46, r. de Saintonge, Paris.
***Poudre et Pommade d'Insuline Philozé** 48, r. de la Procession, Paris.
Poudre purgative Kunkel 3, r. Watteau, Courbevoie.
Poudre Rhodys 97, bd St-Germain, Paris.
***Poudre Satine** 11, r. Joseph-Bara, Paris.
Poudre Stear 34, r. Thiers, Gray.
***Prévalidine** 4, r. d'Ilzach, Mulhouse.
***Préventyl** 40, r. d'Enghien, Paris.
***Prézymase** LEBOIME, 19, r. Franklin.
***Prises Delqué** 46, r. Pierre-Charron, Paris.
Probuta Brisson 114, av. Michelet, St-Ouen.
Produits Benedictus 74, r. Lamarck, Paris.
***Produits Billault** 4, pl. de la Sorbonne, Paris.
***Produits Chanteaud** 54 r. Francs-Bourgeois Paris.
***Produits diététiques** FAVRICHON, à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).
Produits Gmet 27, faub. Montmartre, Paris.
Produits Gory 51, r. Mathurins, Paris.
Produits de Malt 5, r. Labroque, Strasbourg.
***Produits organiques** 79, av. d'Orléans, Paris.
 Richard
***Produits Pennès** BOUTY, 3, r. de Dunkerque, Paris.
Progyne Thelliez 83, r. Maubeuge, Paris.
***Propidex** SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.

*Propidon

*Prosthénase Galbrun

*Protaminol Byla

Protéobiol Vaurs

Protéol

Prothéine

Protiode Grémy

*Protiodyne

Protyline Roche

*Proveinase

Provenine

*Proxytases

*Proxytol

Pruneline Bost

Psinase Grémy

*Psothanol

Puberglandol

Pulmine Byla

Pulmobules Hyva

Pulmocardine

Pulmogyl

*Pulmone

*Pulmonine Bouty

*Pulmosérum Bailly

Pulmostéryl

*Pulsamone

*Pulvéol

Punch Novela

*Purganol Daguin

Purgos

Purgyl Koehly

*Pyoformine

Pyramidon U. R.

Pyran

*Pyratone

*Pyréline Collas

*Pyréthane

*Pyroléol Edet

Pyrothéine

SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.

8, r. du Petit-Musc, Paris.

26, av. Observatoire, Paris.

72, av. Kléber, Paris.

5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.

29, pl. Bossuet, Dijon.

14, r. de Clichy, Paris.

29, pl. Bossuet, Dijon,

21, pl. des Vosges, Paris.

MIDY Frères, 4, r. du Colonel-Moll, Paris

4, cité Magenta, Paris.

Labor. des PROXYTASES,
97, r. de Vaugirard, Paris.
id.

à Villefranche (Rhône).

14, r. de Clichy, Paris.

55, bd de Strasbourg, Paris.

16, r. des Fauvelles, Courbevoie.

26, av. Observatoire, Paris.

12, r. Grande, Evreux.

57, r. Origet, Tours.

33, r. Lauriston, Paris.

Lab. DARDENNES, Tours.

3 bis, r. de Dunkerque, Paris.

15 et 17, r. de Rome, Paris.

à Châteauroux (Indre).

6, r. Dombasle, Paris.

10, impasse Milord, Paris.

St-Julien-en-Jarez (Loire).

5, r. Remises, St-Maur (S.).

LAVERGNE, à Vichy.

7, r. Rodier, Paris.

Lab. GOBEY, 21, r. Aumale, Paris.

21, r. Jean-Goujon, Paris.

16, r. des Fauvelles, Courbevoie.

71, b. Saint-Michel, Paris.

15, r. Augustin-Thierry, Paris.

18, r. Ernest-Rousselle, Paris.

21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.

3, r. de Paris, Auxerre.

Q

* Quassia-Kina Rabot
Quassine Frémint

* Quassine Houdé

* Quergemol

Quiétol

Quiétyl

* Quina Baron

Quina-fer Mechling

Quina Laroche

* Quinarsol Grandval

* Quinby

* Quinéine

* Quinicardine

* Quinimuthol Saca

Quinine Pelletier

* Quinio-Salvarsol

Quinium Roy

* Quinobrome

* Quinoforme Lacroix

* Quinoïdine Duriez

Quinol

* Quino-Thorium

Quinquina Gmet

Quinquina granulé As-
tier

Quinquina Watelet

* Quinsal

Quiphos Churchill

* Le Quotidien

49, r. Bitché, à Courbevoie,
6, r. Abel, Paris.

9, r. Dieu, Paris.

BAILLY, 15-17, r. de Rome,
Paris.

POULENC Frères, 92, r.
Vieille-du-Temple, Paris.

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

P. FOURNIE, 3, pl. Misé-
ricorde, Lyon

à Mulhouse.

COMAR, 20, r. des Fossés-
Saint-Jacques, Paris.

12 et 14, r. Féry, Reims.

P. AUBRY, 54, r. Bienfai-
sance, Paris.

21, r. Chatpal, Paris.

27, r. de la Procession, Paris.

89, r. du Cherche-Midi, Paris.

VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.

SPECIA, 86, r. Vieille-du-
Temple, Paris.

81, boul. Suchet, Paris.

Pharmacie centrale de
France, 21, r. des Nonnains-
d'Hyères, Paris.

37, r. Pajol, Paris.

20, pl. des Vosges, Paris.

STEINER, St-Marcel (Eure)

157, r. de Sèvres, Paris.

27, faub. Montmartre, Paris;

45, r. du Docteur-Blanche.
à Paris.

15, av. Montsouris, Paris.

34, r. Thiers, Gray.

12, r. Castiglione, Paris.

A. Chartier, à Saumur.

R

* Radiobaume Adrian

* Radiolysine

* Radiopaque

Radiosérum Jaboin

* Radiotétrane

Radipirine

9 et 11, r. de la Perle, Paris.

41, r. de Rome, Paris.

Heudebert, à Nanterre.

24, r. Montessuy, Paris.

40, r. Bellechasse, Paris.

9, r. Victor-Letalle, Paris.

- Radjunal Chevrier**
 *Raisin vivant (Nutro-
 biase)
 Rami-gouttes
 Ravix

 Réaline
 *Réalphène

 *Réargon
 *Reconstituant Mary
 *Rectagine
 *Rectoline
 *Rectopanbiline

 Rectoplasme
 Rectosol
 *Regyl
 Rein - Endocrisines
 Fournier
 *Renaleptine

 Renetol
 *Renotanic Grémy
 *Réparateur Thuau
 *Résyl
 *Réthragine
 Retropituine Carrion
 Retusol

 Révulsif Boudin
 *Révulsif Milko
 *Révulsif Procipha
 Révulsior
 *Rhagadine Bracque -
 mond
 Rhamnine Henry
 *Rhéantine Lumière
 *Rhésal-Vicario
 *Rhinadrol

 *Rhinhistol
 *Rhinolin
 Rhino-Pro
 *Rhizotanin
 *Rhodarsan

 *Rhodazyl
 Rhodocaïne Coutu -
 rieux
 *Rhoféine
- 21, faub. Montmartre, Paris.
 10, r. Cimarosa, Paris.

 à Levallois-Perret.
 CRAISSON, 14, r. J.-J.-
 Rousseau, Paris.
 GUILLAUME, Issoudun,
 Établis. BUISSON, 157, r.
 de Sèvres, Paris.
 41, r. de Rome, Paris.
 32, r. de l'Ouest, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 164, r. Saint-Honoré, Paris.
 Labor. de la PANBILINE,
 à Annonay (Ardèche).
 MILLET, à Rambouillet.
 164, r. Saint-Honoré, Paris.
 8, r. Richer, Paris.
 26, boul. de l'Hôpital, Paris.

 SPECIA, 86, r. Vieille-du-
 Temple, Paris.
 DUVAL, à Falaise.
 14, r. de Clichy, Paris.
 22, faub. St-Michel, Angers.
 1, pl. Morand, Lyon.
 22, r. la Sorbonne, Paris.
 54, f. Saint-Honoré, Paris.
 119 bis, av. Ch.-de-Fer,
 Rueil (Seine-et-Oise).
 6, r. du Moulin, Vincennes.
 60, cours Emile-Zola, Lyon.
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 PAULIN & BARRE, Tours.
 105, r. de Normandie, Cour-
 bevoie (Seine).
 39, r. de Sclessin, Liège.
 9, cours de la Liberté, Lyon.
 17, boul. Haussmann, Paris.
 A. FALVY, 40, r. des Acca-
 cias, Paris.
 88, r. de la Villette, Paris.
 81, av. Malakoff, Paris.
 4, cité Magenta, Paris.
 56, boul. Ornano, Paris.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-
 Temple, Paris.
 id.
 18, av. Hoche, Paris.

 SPECIA, 86, r. Vieille-du-
 Temple, Paris.

*Rhomzoi Leprince
 *Ricéyl Billault
 *Ricigel

Ricinopalmine
 *Ricomalt

*Riodine Astier
 *Rob Oberlin

Rosanol
 *Royérine Dupuy
 *Rozoderme
 *Rubyl

*Rutonal

*Rythmosysto

62, r. de la Tour, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 ROBERTS & C^{ie}, 5, r. de la
 Paix, Paris.
 5, boul. des Brotteaux, Lyon.
 16, r. des Fauvelles, Courbe-
 voie.
 45, r. du D^r-Blanche, Paris.
 TINARDON, 17, r. Cadet,
 Paris.
 L. HINGLAIS, à Epernay.
 12-14, pas. de l'Ancre, Paris.
 11, r. des Deux-Ponts, Paris.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-
 Temple, Paris.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-
 Temple, Paris.
 COMTE, 60, r. St-Guilhem,
 à Montpellier.

S

*Salantale

Salasenyi
 Salas-Embrocation
 Salbine du D^r Fayès
 *Salénal Ciba
 *Salène Ciba
 Salicaïne
 *Salicaire Dausse
 Salicaire Henry
 Salicarine Viel
 *Salicéral Clin
 Salicol Dussaule
 *Salins du Jura
 *Salubrine Phénix
 Salvanos

*Salvatyl
 *Salvenase Legoux

Salvone
 *Salsanos
 Salvoxyl
 *Salyptol Narty
 *Salyssérum
 *Sambul Gondard
 *Sanas

NOTH et ANSELME,
 42, Grandes-Arcades,
 Strasbourg.
 23, r. d'Ouessant, Paris.
 23, r. d'Ouessant, Paris.
 3, r. du 4-Septembre, Paris.
 1, pl. Morand, Lyon.
 id.
 168, b. Saint-Germain, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 39, r. de Sclessin, Liège.
 7, r. Saint-Yves, Rennes.
 20, r. Fossés-St-Jacques.
 6, r. Abel, Paris.
 11, av. de l'Opéra, Paris.
 14, r. de Birague, Paris.
 2, r. Marché des Blancs-
 Manteaux, Paris.
 24, r. de Ponthieu, Paris.
 6, r. Louis-Blanc, La Ga-
 renne-Colombes (Seine).
 37, r. Frédéric-Fays, Lyon.
 5, r. de la Paix, Paris.
 237, r. Lafayette, Paris.
 134, boul. Péreire, Paris.
 37, r. de Marly, Rueil.
 à Evreux (Eure).
 72, r. du Commerce, Paris.

*Sandoptal Sandoz.
 *Sanedrine

*Sanex Inhalant

Sanguifer Bouret
 *Sanguil
 Sangul Dubat
 *Sanka Delarbre
 *Sanluol

*Sanoformine
 *Sanogyl
 Sanoram
 Santal Blanc
 Santal Bretonneau
 Santal Clin

*Santal Midy
 *Santal Monal
 Santalol Montagu
 Santal Oberlin
 Santal P. Petit
 Santal salolé Lacroix
 Santéine Montagu

*Santhéose
 Santogénol Caubin
 *Sapolan
 Sapogynol
 *Sarco-sérum
 *Sarcoptol
 Sarkol

Saturol
 Sauge Gmet
 Savons Denisol Brisson
 *Savons Mollard

*Savon Perusol
 *Scialine

*Scillarène
 *Scléramine Dausse
 Sclérobil
 Sclérolysine
 *Sclérosérol

*Scléroseum
 Scléroveine Hardy

Scorogènes

3 et 5, r. de Metz, Paris.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 BOISSY, 49, r. Hoche, Courbevoie (Seine).
 87, r. Lafayette, Paris.
 12, r. Saint-Gilles, Paris
 80, faub. Saint-Denis, Paris.
 2, sq. Desnouettes, Paris.
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 131, r. Cambronne, Paris.
 id.

à Narbonne (Aude).
 6, r. Saint-Claude, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 6, r. Bridaine, Paris.
 49, boul. Port-Royal, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 12, bd Saint-Martin Paris.
 31, r. Philippe-de-Girard.
 49, boul. Port-Royal, Paris.
 4, r. du Roi-de-Sicile, Paris.
 62, r. Erlanger, Paris.
 34, r. de Turin, Paris (VIII^e).
 36, r. des Martyrs, Paris.
 107, r. des Dames Paris
 5, r. Clauzet, Paris.
 à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne).

5, av. des Tilleuls, Paris.
 27, faub. Montmartre, Paris.
 114, av. Michelet, St-Ouen.
 2, r. du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
 114, r. du Temple, Paris.
 P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.

SANDOZ, 5, r. Metz, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 65, av. Victor-Hugo, Paris.
 191, r. Saint-Honoré, Paris.
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.

114, r. Temple, Paris.
 Ph. de Genève, 142, bd St Germain, Paris.
 COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

- *Scurocaïne**
- *Scuroforme**
- *Sécacornine Roche**
Sédacrine Crestey
- *Sédatine Christiaens**
- *Sédatoze Gigon**
- *Sédatuline**
- *Sedlitz Ch. Chanteaud**
- *Sédobrol Roche**
- *Sédogastrine**
- Sédogène Sallé
- *Sédol Buisson**
- *Sédoneurol**
- *Sedormid Roche**
- *Sédosine**
Sektal Grémy
- *Selamon**
Sels Clarks
- Sel digestif Bé Me Cé**
- Sel de fruit Crolas**
- Sels Le Perdriel
- *Sel hépatique U. N.**
Arque vaux
- *Sel de Hunt**
- Sel Jolivet**
- Selnos Vichy**
- Sels naturels de Brides-les-Bains**
- Sel Vichy-Etat**
- *Sélénol Couturieux**
Selvan Couturieux
- Sel Zem**
- Sénophile Foucher**
- *Septicémine Cortial**
Séquardine Bouty
- Sérénol**
- *Séro-comprimés Mé-rieux**
- *Serodausse antitoxi-senyl**
Séroferrine
- Séroléine**
- *Seroma**
- *Séroquinol**
- SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.**
id.
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- 164, r. Saint-Honoré, Paris.
à Reims.
- 7, r. Coq-Héron, Paris (1^{er}).
- 46, r. de la Barrière, Elbeuf.
- 54, r. Francs-Bourgeois, Paris (V.: Prod. Chanteaud).
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- ZIZINE, 24, r. de Fécamp, Paris.**
- 14, r. des Pyramides, Paris.
- 157, r. de Sèvres, Paris.
- 66, r. Nationale, Lille.
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- 38, b. Bourdon, Neuilly-s-S.
- 34, r. Sedaine, Paris.
(Voir : Magnetone).
- 16 bis, r. Vivienne, Paris.
- 21, r. Violet, Paris.
- 56, ch. de Combe-Blanche, Lyon.
- 11, r. Milton, Paris.
à Etampes (Seine-et-Oise).
- 16, r. Boulainvilliers, Paris.
- 140, f. Saint-Honoré, Paris.
- 25, r. Drouot, Paris.
- 41, r. de Verneuil, Paris.
- 24, b. des Capucines, Paris.
- 18, av. Hoche, Paris.
id.
- 85, r. Turbigo, Paris.
- 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
- 15, bd Pasteur, Paris.
- 3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
- 11, rue Torricelli, Paris.
- 63, r. Victor-Hugo, Lyon.
- 4, r. Aubriot, Paris.
- 52, r. La Bruyère. Paris.
- C. BARON, aux Sables-d'Olonne (Vendée).**
- 12, r. Montmartre, Dijon.
- Phie centrale de France,
21, r. des Nonnains-d'Hyères, Paris (IV^e).

- *Séro-Sérum Rivier. 26-28, r. St-Claude, Paris.
- Sérosthényl Bouty 3 bis, r. de Dunkerque Paris.
- *Sérum antiasthmatique de Heckel CORBIERE, 27, r. Desrenaudes, Paris.
- Sérum antiphymique (Voir : Antiphymine).
- Vadam Labor. AGUETTANT, 36, q. Fulchiron, Lyon.
- Sérum antityphoïdique de Rodet 26, av. Observatoire, Paris.
- Sérum Collyre 8, r. Jasmin, Paris.
- *Sérums Fraisse 17, r. Bourgelat, Lyon.
- Sérums de l'Institut Mérieux
- *Sérum Nevrotone P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
- Sérum Oliviero 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
- Serum polymicrobien ADLER, 36, r. Francs-Bourgeois, Paris.
- *Sérum végétal D^r CUGUIERE, 19, r. des Chalets, à Toulouse.
- *Séti P. BRISSON & C^{ie}, 114, av. Michelet, Saint-Ouen.
- *Sicopion 31, r. Saint-Georges, Paris.
- *Sidéarsan A. POURSAIN, 2, av. des Tilleuls, Melun (S.-et-M.).
- Sigmoidine Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
- Sigol à Saint-Fons (Rhône).
- *Silguine 1, r. Raynouard, Paris.
- Silicate de soude Pellissier 33, av. de Villiers, Paris.
- *Silicyl 18, r. Ernest-Rousselle, Paris
- *Sillisode 9, r. Castex, Paris.
- Simocalcine CHARMASSON, à Marseille.
- *Sinahin 15, r. d'Argenteuil, Paris.
- Sinapisme Rigollot 13, r. Pavée, Paris.
- *Sinapisme du D^r DUSSUEL & FAURE, à Aix-les-Bains.
- Faure 66, r. Nationale, Lille.
- Sinrénaline 228, r. de Paris, à Montreuil-sous-Bois.
- Sirodion 157, r. de Sèvres, Paris.
- Sirop d'Aconit Ecalle BLOTTIERE, 6, r. Dombasle, Paris.
- Sirop antiasthmatique Favrot COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Sirop d'Aubergier 8, faub. Saint-Denis, Paris.
- Sirop Berthé 64 r La Rochefoucauld Paris.
- *Sirop de Blancard 6, r. Dombasle, Paris.
- Sirop Blottière COULLOUX, 116, r. du Pont, à Auxerre (Yonne).
- *Sirop Brahma 131, r. Vaugirard, Paris.
- Sirop Briant

- Sirop de Broméine**
Sirop Buci
Sirop Bungal
Sirop carbolique du
D^r Vialle
***Sirop composé aux Hyp-**
pophosphites Fellows
***Sirop Crosnier**
Sirop Delabarre
Sirop Derbecq
Sirop de digitale

Sirop du D^r Dubreuil
Sirop de Dusart
***Sirop Famel**
Sirop ferrug. Laroze
***Sirop Gelineau**

Sirop Gelvart
Sirop de Gibert
Sirop Gigon
Sirop Girard
***Sirop Gribell**
Sirop Grimault
Sirop Guilhaumon
Sirop du D^r Hecquet
Sirop d'Hémoglobine
Byla
Sirop d'Hémoglobine
Henry
Sirop d'Hémoglobine
Star
Sirops Henry
Sirop Henry Mure
Sirop d'Iodéine
Sirop Jane

Sirop Jolivet
Sirop Lambert
Sirop de Lamoureux
***Sirop Lanchat**
***Sirop laxatif Gobey**
Sirop Lecœur
Sirop du D^r Manceau
***Sirop de la Maternité**
***Sirop Maver**

***Sirop et Pâte Mireille**

***Sirop Noguès**
- MONTAGU, 49, boul. Port-**
Royal, Paris.
COMAR, 20, r. des Fossés-
Saint-Jacques, Paris.
12, r. Sévigné, Paris.
87, r. Lafayette, Paris.

5, r. de la Paix, Paris.

6, r. Chanoinesse, Paris.
78, faub. Saint-Denis, Paris.
74, b. Beaumarchais, Paris.
LABELONYE, 99, r. d'A-
boukir, Paris.
37, r. Galilée, Paris.
VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
16 à 22, r. des Orteaux, Paris.
2, r. des Lions, Paris.
MOUSNIER, 9, bd Carnot,
Bourg-la-Reine.
24, r. Bagnolet, Paris.
Maisons-Laffitte (S.-et-O.).
7, r. Coq-Héron, Paris.
48, r. d'Alésia, Paris.
19, r. Drouot, Paris (IX^e).
VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
131, r. de Vaugirard, Paris.
49, boul. Port-Royal, Paris.
26, av. Observatoire, Paris.

39, r. Sclessin, Liège.

2, r. Marché des Blancs-
Manteaux, Paris.
39, r. Sclessin, Liège.
71, r. Saint-Jacques, Paris.
49, boul. Port-Royal, Paris.
2, r. Marché des Blancs-
Manteaux, Paris.
140, f. Saint-Honoré, Paris.
25, r. Petits-Hôtels, Paris
73, r. Sainte-Anne, Paris.
à Feschés-le-Châtel.
21, r. d'Aumale, Paris.
GAVIN, Vimoutiers (Orne).
à Château-du-Loir (Sarthe).
36, bd Port-Royal, Paris.
Et. WOLLACKER & C^{ie},
31, r. St-Georges, Paris.
14 bis, r. Nationale, Limay
(S.-et-O.).
11, r. Joseph-Bara, Paris.

***Sirop Nourry**

***Sirop phéniqué Vial**
Sirop polyiodure Gon-
non

***Sirop Prega**
Sirop Rabuteau

Sirop Rami
Sirop Rébillion
Sirop Reinwillier
Sirop Rhégia

***Sirop Roche au thiocol**
***Sirop de Sirtal**

Sirop de Teyssèdre
***Sirop Tinardon**
Sirop Vacheron
Sirop Vauthier Marcq
Sirop Zemmette
***Sirtal**

***Sistomensine Ciba**
***Soderseïne**
***Sodolactine**

***Sodothioli**

***Solmuth**

***Solubaine Nativelle**
***Solucamphre Dela-**
lande
***Soluprotine Roche**
***Soluroi**

***Solution Bardet**
***Solutions Clin**

Solution du Dr Jacobson

Solution Fumouze
Solution Henry Mure
***Solution Laroyenne**
***Solution Pautauberge**

Solution Schoum
***Solvosclérose**
***Solvuric**
Somalgine
***Somnifène Roche**

20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris. (Voir : Vin Nourry).

8, r. Vivienne, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.

66, r. Nationale, Lille.
 COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 r. Chaptal, Levallois-Perret.
 6, r. Pas-de-la-Mule, Paris.
 131, r. Vaugirard, Paris.
 BONNAURE, Alais (Gard).
 21, pl. des Vosges, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

34 fb d'Angoulême Limoges.
 17, r. Cadet, Paris.
 av. Vallioud, Lyon.
 98, r. du Chemin-Vert, Paris.
 85, r. Turbigo, Paris.
 COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
 1, pl. Morand, Lyon.
 18, r. de Beaune, Paris.
 Lab. GERDA, 93, r. Marseille, Lyon.
 Labor. de Médecine Expérimentale, Beauvais.
 14, r. Gravel, Levallois (Seine).

27, r. de la Procession., Paris.
 13, r. Lacharrière, Paris.

21, pl. des Vosges, Paris.
 COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 76, r. de Sèvres, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

CARRION, 54, fg St-Honoré, Paris.
 78, faub. Saint-Denis, Paris.
 à Annonay (Ardèche).
 7, boul. Denain, Paris.
 10, r. de Constantinople, Paris.

19, r. St-Roch, Paris.
 83, bd de la Villette, Paris.
 14, r. de Birague, Paris.
 18, av. Daumesnil, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.

- *Somnothyril
- *Sonery
- *Soporalose
- *Soporigène Delqué
- *Sornyal
- Sorol Churchill
- Spartéine Houdé
- Spasma Couturieux
- *Spasalgine Roche
- *Spasmine Jolly
- *Spasmosédine
- *Spécific Brachat
- *Spécifique Bejean
- Spécifique Rousset
- *Spectrol
- Sphérulines "Mon-cour"
- Spiralgine
- Spirillan
- Splenotanic
- *Spyrolides
- *Stal-Kosal
- *Stalysine
- *Stanion Couturieux
- Stanno-Bardane Henry
- Stannolip Henry
- *Stannoxyl
- *Staphylase du Dr Doyen
- *Staphylocide Audras
- *Staphylo-coccine Fraquet
- *Staphylotanol
- *Staréol Dupraz
- Stéarol
- *Sténergine
- Sténofer Lumière
- *Sténol Chanteaud
- Sténophyl Vigan
- *Stéramine
- Stéridrophil Wuhrlin
- Stérilait
- *Stérinase Vincent
- Lab. CANTIN, Palaiseau (S.-et-O.).
- SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- POINTET & GIRARD, 30, r. Francs-Bourgeois, Paris.
- 46, r. Pierre-Charron, Paris.
- 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- 12, r. Castiglione, Paris.
- 9, r. Dieu, Paris.
- 18, av. Hoche, Paris.
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- 1, r. Christine, Paris.
- 6, r. d'Assas, Paris.
- Lac. chimico-pharmac., à Livry-Gargan (S.-et-O.).
- 12, r. Hospitalières St-Gervais, Paris.
- 9, pl. de la Croix-Rousse Lyon.
- 71, av. Victor-Emmanuel III Paris.
- 46, av. Victor-Hugo, Boulogne-s-S.
- Lab. Servier, Orléans.
- 23, r. de Berne, Paris.
- GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- 19, bd Bonne-Nouvelle Paris.
- 8, r. de la Source, Paris.
- 41-47, r. Dr-Blanche, Paris.
- 18, av. Hoche, Paris.
- 39, r. Sclessin, Liège.
- 39, r. Sclessin, Liège.
- 37, r. de Bourgogne, Paris.
- LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
- 112, r. de Gerland, Lyon.
- 21, r. Chaptal, Paris.
- 55, boul. Strasbourg, Paris.
- 41, r. Etienne-Marcel, Paris.
- M. BONNET, Saint-Etienne.
- 4, pl. des Vosges, Paris.
- 9, cours de la Liberté, Lyon. (Voir : Produits Chanteaud).
- 103, r. Saint-Lazare, Paris.
- Lab. Antiseptiques Chlorés, 40, r. Thiers. Le Havre.
- à Houdouville (Eure).
- 10, r. Card.-Mercier, Paris.
- 14, av. Mac-Mahon, Paris.

***Stérogyl**

***Sthénoléine**
Stibial

Stoshone
Stomacol Boulet

***Stomal**

***Stomarine** Billault
***Stomaxines** Roxelane
***Stoméol** Vichy
***Stomobrol**

***Stomophile**
Stomoxygène
***Stovaine** Billon

***Stovarsol**
***Strictoforme** Dausse
***Strophantine** et **Strophantus** Catillon

***Strychnal** Longuet
***Strychnarsitol** Robin

***Stupho**
Succharure Leprince
Suc-Durham

Succomusculine
Sucre Edulcor Ferré

Suc Wiandyl

Sulfarène

Sulfarsenol Pluchon

***Sulfarsinol** Lefèvre

***Sulfarsiode**

Sulfate d'Atropine Clin

Sulphydral Ch. Chanteaud

Sulfo-benzol

***Sulfo-bore** Roy

***Sulfobyl**

Sulfodermol Rambaud

***Sulfoidol** Robin

***Sulfoléine** Rozet

***Sulfo-Mésarca** Roche

Sulfo-mel du D^r Fayès

Sulfo-rhinol Fayès

***Sulfureux** Pouillet

***Sulfurine** du D^r Langlebert

Lab. Chimiothérapie, 21, r. d'Aumale, Paris.

88, r. de la Villette, Paris.
POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.

37, r. F. Fays, Lyon.

36, av. Duquesne, Paris.

Lab. P.Y., 58, bd R.-Wallace, à Puteaux (Seine).

22, r. Sorbonne, Paris.

38 bis, r. Raphaël, Vanves.

38, r. Ramey, Paris.

4, av. Brazza, Romainville (Seine).

17 bis, av. Parmentier, Paris.

SOULAIRAC, à St-Quentin.

SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.

id.

4, r. Aubriot, Paris (IV^e).

3, boul. Saint-Martin, Paris.

34, r. Sedaine, Paris.

13, r. de Poissy, Paris.

38, r. Mainguy, Bondy (S.)

62, r. de la Tour, Paris.

14, r. de Birague, Paris.

10, r. de l'Orne, Paris.

142, b. Saint-Germain Paris.

27, r. Petits-Hôtels, Paris.

(Labor. du), à Agen.

36, r. Claude-Lorrain, Paris

66, r. de la Pompe, Paris (XVI^e).

F. CARTIER, 12, r. Martinière, Lyon.

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

54, r. Francs-Bourgeois, Paris.

239, f. Saint-Honoré, Paris.

81, boul. Suchet, Paris.

Lafarge, 6, bd Arago, Paris.

38, r. Gay-Lussac, Paris.

13, r. de Poissy, Paris.

à Vendôme.

21, pl. des Vosges, Paris.

3, r. du 4-Septembre, Paris.

3, r. du 4-Septembre, Paris.

112 r. du Bâc, Paris.

9, r. de la Perle, Paris.

- *Sulfurion Couturieux 18, av. Hoche, Paris.
- *Sulfuryl Monal 6, r. Bridaine, Paris.
- Sulphaqua Pépin 9, r. du 4-Septembre, Paris.
- Sulphénine Treuette 15, r. Immeubles-Industriels, Paris.
- *Suppargyre du D^r Faucher 34, boul. de Clichy, Paris.
- Suppo-Cuivrol Matray, Aubières (P.-de-D.).
- *Suppo-Gynals 18, r. Pierre-Curie, Paris.
- Suppositoires Chau- 78, faub. Saint-Denis, Paris.
- mel
- *Suppositoires Corbière 27, r. Desrenaudes, Paris.
- *Suppositoires à l'Es- 13, r. Lacharrière, Paris.
- culéol
- *Suppositoires Hymel DUTEIL, 38, r. de Bondy Paris.
- *Suppositoires Midy 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- *Suppositoires Logeais 24, r. de Silly, Boulogne-sr-S.
- *Suppositoires Pépet 56, boul. Péreire, Paris.
- Suppositoires Royer 225, r. Saint-Martin, Paris.
- Surrénale - Endocrisi- 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
- nes Fournier
- Surrénaline Bouty 3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
- Surrénotanig Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
- *Sylcase Grysa 7, r. Saint-André, Le Mans.
- *Sylvol 46, r. Pierre-Charron, Paris.
- Sylvor 4, q. Pasteur, Cette.
- *Sympathyl 8, r. de Constantinople, Paris.
- Synase 40, r. des Acacias, Paris.
- *Syncaïne Clin 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- *Synergyl Vadam 111 bis, r. de Turenne, Paris.
- *Synthol 3 à 9, r. de l'Abreuvoir, Boulogne-sur-Seine.

T

- *Tablettes de Brides 41, r. de Verneuil, Paris.
- *Tablettes Hova Lab. Zyma, 4, r. Bellart, Paris.
- *Tablettes oxymenthol Labor. SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris.
- Perraudin 3, r. St-Sébastien Gryphe, Lyon.
- *Tablettes Perroud GIBAN, à Sens (Yonne).
- Tablettes Renard 17, r. Rochechouart, Paris.
- Tablettes de Phos- phargol
- Tablettes de thyroïde CATILLON, 3, boul. Saint-Martin, Paris.

- *Tablettes Zeva
- *Taburol Monal
- *Tænifuge Bardet
- *Tænifuge du D^r Duhou-
rcau
- *Tænifuge Kirn
- Tænifuges Limousin
- *Tamar Indien Grillon
- *Tampol Roche
- Tampovules Corbière
- Tanacétyl Clin
- Tannurgyl
- Tanosal
- *Tapo-Madyl
- Tarbisol
- Tartrate Borico-potas-
sique du D^r Gigon
- *Tartrate Borico-potas-
sique Pachaut
- Tartro-Bi Roche
- *Taxol
- *Tébéphaguine
- *Técarine
- Tégéol
- Teinture de Cocheux
- Tercinol
- Tercyn Chéron
- Térébules Gallier
- *Terkal Monal
- Ternose Trouette
- Terpine Boveil
- Terpine Gonnon
- Terpinol Adrian
- *Tetranitrol Roussel
- Testicule - Endocrisi-
nes Fournier
- Tétralgine Routhier
- Thalaphyl
- *Thalassotonine Vadara
- *Thaolaxine
- Thapsia Le Perdriel
- Thé de Brides
- *Thébaïl
- *Théinol Bailly
- 60, cours Emile-Zola, Lyon
- 6, r. Bridaine, Paris.
- 76, r. de Sèvres, Paris.
- 6, r. Louis-Blanc, La Ga-
renne-Colombes (Seine).
- DANIEL-BRUNET, 8, r.
de la Source, Paris.
- 10, r. du Bac, Paris.
- 13, r. Pavée, Paris.
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- 20, r. Fossés-St-Jacques,
Paris.
- 6, r. Delaborde, Paris.
- FEIGEL, à Lutterbach.
(Haut-Rhin).
- 14, r. Miromesnil, Paris.
- 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- 7, r. Coq-Héron, Paris.
- 130, boul. Haussmann, Paris.
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- 46, av. des Ternes, Paris.
- Institut de Microbiologie,
Sarrebruck.
- SPECIA, 86, r. Vieille-du-
Temple, Paris.
- 20, r. des Martyrs, Paris.
- 36, q. Fulchiron, Lyon.
- 158, r. Saint-Jacques, Paris.
à Vincennes
- 38, bd Montparnasse, Paris.
- 6, r. Bridaine, Paris.
- 15, r. des Immeubles-Indus-
triels, Paris.
- 9, pl. des Terreaux, Lyon.
- 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- 9, r. de la Perle, Paris.
- 10, r. Washington, Paris.
- 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
- à Vierzon (Cher).
- BOUTTET, à Ruffec (Cha-
rente-Inférieure).
- 111 bis, r. de Turenne, Paris.
- DURET & REMY, à As-
nières.
- 12, r. Milton, Paris.
- 41, r. de Verneuil, Paris.
- 11, r. Joseph-Bara, Paris.
- 15 et 17 r. de Rome, Paris

- *Théïsine Dubat
 *Themsaline Zyma
 Théobromine Guillaumin
 Théobromine Houdé
 *Théobromine Invar
 Théobromine Rousseau
 Théobromine Vicario
 *Théobromose
 *Théobryl Roche
 Théosalvine
 *Théosalvose
 Théosol Rousseau
 *Théoxanthine
 *Thigénol Roche
 *Thiocol Roche
 Thionhydrol Grémy
 *Thiosote-Lambiotte
 Thiosyl
 *Thoroxyl
 Thyms - Endocrisi -
 nes Fournier
 Thymine
 Thymol doré
 Thymoléine
 Thymusine Byla
 Thyratoxine Byla
 Thyrénine Grémy
 Thyrocréine Grémy
 Thyroïde - Endocrisi -
 nes Fournier
 *Thyroidine Bouty
 Thyroïdine Byla
 *Thyroxine Roche
 *Tiodine Cognet
 Tisanes Dausse
 Tissus Le Perdriel
 *Tochlorine
 Tonigénine
 *Tonikéine, Lematte et
 Boinot
 Tonilécithine Rogier
 Toniphlébine Hardy
 Toniphosphine
 Tonique Koenig
 *Tonique Roche
 Toni-sérum Freyssinge
 80, faub. Saint-Denis, Paris.
 4, r. Bellart, Paris.
 13, r. du Cherche-Midi, Pa-
 ris.
 9, r. Dieu, Paris.
 21, r. Nonnains-d'Hyères,
 Paris.
 à Ermont (Seine-et-Oise).
 17, boul. Haussmann, Paris.
 10, r. du Plâtre, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 13, r. Cherche-Midi, Paris.
 13, r. Cherche-Midi, Paris.
 à Ermont (Seine-et-Oise).
 6, r. d'Assas, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 id.
 14, r. de Clichy, Paris.
 20, r. Dumont-d'Urville, Pa-
 ris (XVI^e).
 M. BERGER, à Orléans.
 40, r. de Bellechasse, Paris.
 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
 11, ch. de la Muette, Paris.
 10, impasse Milord, Paris.
 ABOU, 26, r. Temple, Paris.
 26, Observatoire, Paris.
 id.
 14, r. de Clichy, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
 3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 11, r. Milton, Paris.
 SPECIA, 86 r. Vieille-du-
 Temple, Paris.
 Labor. à Montrevel (Ain).
 52, r. Labruyère, Paris (IX^e).
 56, Bd. Péreire, Paris.
 Ph. de Genève, 142, bd
 St-Germain, Paris.
 56, r. des Dames, Paris.
 37, av. Marceau, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 6 r. Abel, Paris.

*Tonudol

*Tonyo "F"

Topique Bertrand

Topiques Chaumel

*Topique stomacal
Dausse

*Tot'Hamelis

*Total-Tonic

*Tréparsol

*Tréparsénans

*Trépol

Trépoquinol

Tréposan

Trépositaires

*Triase

*Tribromure Gigon

*Tricalcine

*Tridigestine Dalloz

*Tridynol

*Triganol Vigier

*Triglandyne Bouty

Triglandol Bouty

Tri-Iodo-Ercé

Trilactine

*Trinitrine Caféinée
Dubois

*Trinitrine Roussel

Trinitrine Vicarie

*Triradol

*Trisodyl Rozet

*Tritonine

Trixyl Fraudin

*Trophène

*Tubérol

*Tryparsamide

*Trypsogen

*Tubes Dulcis

*Tubes Ferlux

*Tubes du D Guiraud

Tubes Levasseur

Tubes Sals

LICARDY, 38, boul. Bourdon, Paris-Neuilly.

VARGAS, 6, r. Chauveau-Lagarde, Paris.

à Oullins (Rhône).

78, faub. Saint-Denis, Paris.

4, r. Aubriot, Paris (IV°).

CHANTEREAU, 26 bis, r. Dombasle, Paris.

29, fb. Bourgogne, Orléans.

LECOQ & FERRAND, 14,

r. Gravel, Levallois-Perret.

COMAR, 20, r. des Fossés-

Saint-Jacques, Paris.

22, r. de la Sorbonne, Paris.

id.

16, r. des Fauvelles, Courbevoie.

16, r. des Fauvelles, Courbevoie.

4, pl. des Vosges, Paris (IV°).

7, r. Coq-Héron, Paris.

21, r. Chaptal, Paris.

13, b. la Chapelle, Paris.

18, r. Orphéon, Lille.

12, bd Bonne-Nouvelle, Paris

3 bis, r. de Dunkerque, Paris

id.

37, r. de Bourgogne, Paris.

14, r. de Birague, Paris.

LALEUF, 20, r. du Laos, Paris.

10, r. Washington, Paris.

17, boul. Haussmann, Paris.

55, b. Strasbourg, Paris.

BENDERITTER, à Vendôme.

BRUN & DUMÉE, 64, r. des Tournelles, Paris.

4, av. Desfeux, Boulogne-s-S.

48, r. de la Procession, Paris.

23, r. des Moines, Paris.

SPECIA, 86, r. Vieille-du-

Temple, Paris.

DÉGÈCE, 7, r. Princesse,

Paris.

D^r FERRY, à Bourg (Ain).

G. BOUSQUET, à Albi.

10, imp. Milord, Paris.

23, r. de la Monnaie, Paris.

Oullins (Rhône).

Tuberculine C. L.

***Tulle gras Lumière**
Tuya Feuillé

***Tymocalcine**

POULENC Frères, 92, r.
Vielle-du-Temple, Paris.
Cours de la Liberté, Lyon.
D^r BIDOT, 4, r. du Cirque,
Paris.
16, r. des Fauvelles, Cour-
bevoie.

U

***Uclarsyl**

***Ulcéobalnéine**

***Ulcéosine**

***Ulcéobande**

***Ulcéoplaque**

***Ulcéosol**

Ulcérine Berger

***Ulcérophile Nosan**

Ulmairé Gmet

***Ulmarrène Gigon**

Ultrargen Leclerc

Ultravitamine

***Uracétose**

***Uralysol**

Uraséol

***Uraseptine Rogier**

***Urazine**

***Uréol Ch. Chanteaud**

***Uriclarine**

***Urifluine**

***Urilyson**

Urisal du D^r Des-
champs

***Urisanine**

***Urobuccol Malmanche**

Urocarbol

Urocédrol

Urocléan

***Uroformine Gohéy**

***Uroïodine**

***Urol Neuville**

89, r. du Cherche-Midi, Pa-
ris.

10, r. du Parc-Royal, Paris.

10, r. du Parc-Royal, Paris.

10, r. du Parc-Royal, Paris.

10, r. du Parc-Royal, Paris.

10, r. du Parc-Royal, Paris.

F. BOUVIER, 31, bd de la
Villette, Paris.

6 ter, r. Voltaire, La Garenne-
Colombes (Seine).

27, faub. Montmartre, Paris.

7, r. Coq-Héron, Paris.

10, r. Vignon, Paris.

Villefranche-sur-Saône.

10, r. du Parc-Royal, Paris.

46, av. des Ternes, Paris.

17, r. Cadet, Paris.

56, boul. Péreire, Paris.

SPECIA, 86, r. Vieille-du-
Temple, Paris.

54, r. des Francs-Bourgeois.
Paris. (V.: Pr. Chanteaud.).

114, av. Michelet, Saint-
Ouen.

4, pl. des Vosges, Paris.

1, pl. Morand, Lyon.

49, av. Lamotte-Picquet,
Paris.

28, r. Milton, Paris.

104, av. de Paris-Rueil (S.-
et-O.).

GENTON, Petit-Quévilly
(Seine-Inférieure).

GALLO, à Aurillac.

ADLER, 36, r. Francs-
Bourgeois, Paris.

21, r. Amale, Paris.

45, bould. Lafayette, Calais.

239, faub. St-Honoré, Paris.

- Urolithiase**
***Urométine Lambiotte** Sté Rég. de l'Ouest, Rennes.
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris (XVI^e).
***Uromil** D^r BELIERES, 19, rue
 Drouot, Paris.
***Urophile Bailly** 15 et 17, r. de Rome, Paris.
***Urosan** 12, r. des Sts-Pères, Paris.
***Utéramine Zyma** 4, r. Bellart, Paris.
***Uvé** 18, r. Saint-Amand, Paris
 id.
***Uvesterol**
Uviostérine (Voir : Irrastérine)

V

- Vabéol** 30, r. N.-D.-des-Victoires,
 Paris.
Vaccin anti-asthmatique Labor. STÉNE 2, pl. des
 du Pr. Minet Vosges, Paris.
Vaccin antigonococci- OLIVIERO, 87, r. Denfert-
 que Rochereau, Paris.
Vaccin antitubercu- Lab. des Indus. Biologiques,
Vaccins antipollin 26, av. Observatoire, Paris.
***Vaccins atoxiques sta-** SPECIA, 86, r. Vieille-du-
 bilisés Temple, Paris.
***Vaccins atoxiques Cé-** 60, r. Mathurin-Régnier,
 pède Paris.
***Vaccins Bactériens** Labor. Biochimie Médicale,
 I. O. D. 16, r. Dragon, Marseille.
 leux Bossan 25, r. Royale, Paris.
***Vaccins Bruschetti** 7, r. Biscornet, Paris.
***Vaccinothérapie Cépède** 60, r. Mathurin-Régnier,
 Paris.
***Vaccins Glin** 20, r. Fossés-St-Jacques,
 Paris.
Vaccins du D^r Creuzé 1, r. Bonaparte, Paris.
Vaccins Inava 26, r. Pagès, Suresnes, (S.).
***Vaccins Lucinia** (Voir : Formo-vaccins).
Vaccins microbiens GREMY, 14, r. de Clichy,
 curatifs Paris.
***Vaccins du profes-** 2, pl. des Vosges, Paris.
 seur Minet
***Vaccins de Ronchèse** 7, pl. Cassini, Nice (A.-M.).
***Vaccins Sténé** 2, pl. des Vosges, Paris.
***Vaccins de Weill et** 37, r. de Bourgogne, Paris.
 Dufourt
***Vaclydun**
Vacodyl
***Vacuoline**
- LEBOIME, 19, r. Fran-
 klin, Paris.
 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
 39, r. de la Gare, Bondy
 (Seine).

- Vadérol**
***Valbornine Rogier**
***Valéral Puy**
Valéramyl Foulon
***Valérianate Gabail**
Valergyl Doucet
***Valérianate Grignon**
Valérianate Pachaut
***Valérianate Pierlot**
***Valériane Byla**
Valériane Dausse
Valériane Gmet
***Valériane Pachaut**
***Valérianose Gigon**
***Valerium Thibault**
***Valérinodor Malmanche**
Valérobromine Le - grand
***Valéromenthol**
***Valéronal**
Valimyl Clin
Valtine
Valyl Midy
***Vanadarsine Guillaumin**
***Vanadine Chevrier**
Vaniol
***Vanucléol**
Varicure Marck
***Varilaxine**
***Varisclérine**
***Variserum Lebon**
***Vascurol**
Vasogènes
***Vasolaxine**
***Végéphos**
***Végétol Fournier**
Veinargyre
Veinicura
Veinoglandol
Veinophiline
- DURAND, à Joigny (Yonne).**
56, boul. Péreire, Paris.
à Grenoble (Isère).
à Ermont (S.-et-O.).
5, r. Lefebvre, Paris.
r. Gambetta, Bolbec.
2, r. Duphot, Paris.
130, b. Haussmann, Paris.
26, r. Saint-Claude, Paris.
26, av. Observatoire, Paris.
4, r. Aubriot, Paris.
27, faub. Montmartre, Paris.
130, b. Haussmann, Paris.
7, r. Coq-Héron, Paris.
6, r. Rosenwald, Paris.
104, av. de Paris, Rueil
(Seine-et-Oise).
DARRASSE, 7 à 13, r.
Saint-Maurice, Nanterre
(Seine).
10, r. Poncelet, Paris
(XVII^e).
BERGER, 14, r. des Pyra-
mides, Paris.
20, r. Fossés-St-Jacques,
Paris.
12, r. Tour-des-Dames, Paris
4, r. du Colonel-Moll, Paris.
13, r. du Cherche-Midi,
Paris.
21, faub. Montmartre, Paris.
16, r. des Fauvelles, Cour-
bevoie.
37, r. Pajol, Paris.
à Neuilly-sur-Seine.
164, r. Saint-Honoré, Paris.
61, r. de Seine, Paris.
à Charost (Cher).
GUÉRIN, Meulan (S.-et-O.).
43, r. Pinel, à Saint-Denis.
7, r. Biscornet, Paris.
21, r. Nonnains-d'Hyères,
Paris.
8, r. des Quatre-Fils, Paris.
29, r. des Jardiniers, Mon-
treuil (Seine).
42, boul. Péreire, Paris.
16, r. des Fauvelles, Cour-
bevoie.
27, r. Poids-Farine, Mar-
seille.

Veinoposine**Veinofluine*****Veinoserum Abadie*****Veinosine*****Veinotrope*****Velledol Adrian*****Vénecine*****Véralgine*****Vérianne Buriat*****Vernis à la Diachusine*****Vermirene Audibert****Véroginol*****Véronidia Buisson*****Verrulyse*****Verticurine****Vésicatoires d'Albepayres****Vexillan****Viburniode****Viburnum Gmet*****Vigardyne****Vigogastrine****Vin d'Anduran****Vin Aroud*****Vin de Baudon****Vin Bravais*****Vin de Bugeaud*****Vin de Chassaing****Vin Désyles*****Vin Girard****Vin de Kola Midy*****Vin de Lavoix****Vin Mariani****Vin de Moride*****Vin Nourry****Vin de Séguin****Vin Urané Pesqui****Vin de Vial****Vin Voguet*****Vioforme Ciba*****Viosten*****Vioxyl Mouneyrat****Viridol*****Viscoserum*****Viscum Zyma**

40, r. Claire-Paulhiac, Toulouse.

239, faub. St-Honoré, Paris.

3, pl. St-Michel, Toulouse.

5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.

46, av. des Ternes, Paris.

9, r. de la Perle, Paris.

7, r. des Italiens, Paris.

38, r. du Mainguy, Bondy.

25, r. Copernic., Paris.

142, r. de Picpus, Paris.

Cinq Cantons, Bayonne.

101, av. Mozart, Paris.

157, r. de Sèvres, Paris.

MIGUET, Villefranche.

GRIAS, 47, r. Feray, à

Corbeil (Seine-et-Oise).

FUMOUEZE, 78, faub. Saint-

Denis, Paris.

89, av. Wagram, Paris.

GIRY, 49, r. de Metz, Nancy

27, faub. Montmartre, Paris.

11, r. des Garennes, Chatou.

222, r. Duguesclin, Lyon.

MOUSNIER, à Sceaux.

6, r. Dombasle, Paris.

12, r. Charles-V, Paris.

3, r. Mogador, Paris.

5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.

1, quai Aulagnier, Asnières.

Levallois-Perret (Seine).

48, r. d'Alésia, Paris.

4, r. du Colonel-Moll, Paris.

(Voir : Beef Lavoix).

41, boul. Haussmann, Paris.

LANDRIN, 20, r. de La

Rochefoucauld, Paris.

20, r. des Fossés-Saint-Jac-

ques, Paris.

165, r. Saint-Honoré, Paris.

au Bouscat-Bordeaux.

36, pl. Bellecour, Lyon.

5, r. Eug.-Delacroix, Paris.

1, pl. Morand, Lyon.

D^r LESCENE, 58, r. de

Vouillé, Paris et Livarot

(Calvados).

Villeneuve-la-Garenne (S.).

65, r. Monge, Paris.

55, boul. Strasbourg, Paris.

4, r. Bellart, Paris.

*Vitalcaine Moncour

Vitaderme Bergonier
Vitagéine

Vital Extrait

*Vitamina

*Vitamine Rogier

*Vitamorrhue

Vitamyl

*Vitargyl

Vitazem

*Vitergomine

Vitosine Décornez

Vitricines Carves

Vivassol

*Vivoléol

Vocaldop

Voltargol Robin

*Vulcase Brisson

*Vulnérine Bergen

49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.

122, bd Murat, Paris.

SÉGUIN, 7, r. Ste-Isaure, Paris.

E. BASSOL, à Ste-Alvère (Dordogne).

8, r. Vivienne, Paris.

56, boul. Péreire, Paris.

P. C.B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.

4, pl. des Vosges, Paris.

POINTET & GIRARD, 30, r. Francs-Bourgeois, Paris.

85, r. Turbigo, Paris.

Pharmacie centrale de Belgique, 12, r. du Téléphone, Bruxelles.

à Ornans (Doubs).

à Chambéry (Haute-Savoie).

78, faub. Saint-Denis, Paris.

24, r. de Fécamp, Paris.

222 faub. St-Martin, Paris.

13, r. de Poissy, Paris.

114, av. Michelet, St-Ouen.

DUCOQ, Langeais (I.-L.).

X

Xémaderma

59 r. Châteaudun, Paris.

Y

*Yaourtine

Yogourth (Extrait de)

Yoghourt Karlos

Yoghourt Lactella

Yoghourt Lagnel

Yohourth Carrion

Yohimbine Gilbert

Yse

Ystaline

18, pl. Laborde, Paris.

23-25, r. Singer, Paris.

à Lécuse (Nord).

à Tourcoing.

7, r. de la Pépinière, Paris.

54, faub. St-Honoré, Paris.

2, r. du Marché des Blancs-Manteaux, Paris.

62, r. Louis-Blanc, Paris.

2, pl. du Th.-Français, Paris.

Z

Zaryl

Zédeno

Zingal

12, r. des Apennins, Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

11, ch. de la Muette, Paris.

*Zohol
 *Zomine du Dr Richet
 Zomol
 *Zomo - musculosine
 Byla
 *Zymatine Lescène

46, av. des Ternes, Paris.
 34, r. Sedaine, Paris.
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
 26, av. de l'Observatoire,
 Paris.
 à Livarot (Calvados).





